

BILDER-ATLAS

ZUR WISSENSCHAFTLICH-POPULÄREN

NATURGESCHICHTE DER VÖGEL

IN IHREN

SÄMMTLICHEN HAUPTFORMEN.

VON

LEOP. JOS. FITZINGER,

DR. DER PHILOS. UND MED., DIRECTOR DES ZOOLOGISCHEN GARTENS IN MÜNCHEN, MITGLIEDER DER KAINS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU WIEN, DER KAINS. LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER, DER AKADEMEN ZU PHILADELPHIA UND NEAPEL, DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFTEN ZU BERLIN, HALLE, DRESDEN, LEIPZIG, FRANKFURT A. M., HAMBURG, FREIBURG, NÜRNBERG, BRESLAU ETC.

Enthaltend 347 Abbildungen.



WIEN.

DRUCK UND VERLAG DER KAISERL. KÖNGL. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1864.

g QL
674
F55
1864
Atlas
BIRKEL

Fig. 1



Fig. ?




Fig. 1. Der grosse rothe Ara. (Ara Macao.)

Fig. 2. Der neu-hollandische Erd-Papagei. (Pecoporus formosus.)

(DS)

Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 3. Der grosse Halsband - Parkit

(*Psittacula Alexandri*).


Fig. 4. Der grünflügelige Scharlaach Parkit

(*Aprosmictus scapulatus*).

Fig. 5.



Fig. 6.



(*Lorius domicella*).
(*Psittacus erythrosines*)

Fig. 5. Der violetthöckige Lorbeer

Fig. 6. Der graue Papagei

Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 7.



- Fig. 7. Der weißköpfige Amazonen Papagei (*Chrysopsitta leucophrys*).
Fig. 8. Der spätlingartige Zamore-Papagei (*Psittacula palmerina*).
Fig. 9. Der rothbaulige Kakadu (*Cacatua moluccensis*).

LEHR. DE. ZOOLOG. 1875. 1. 12. 10.

Fig. 10. Der große gelbhalsige Kakadu.

*Fig. 10. Der große gelbhalsige Kakadu.
(Chlorurus galerita L.)*

*Fig. 11. Der gemeine Rohen Kakadu.
(Calyptorhynchus banksii L.)*

Fig. 10.

Fig. 11.



Fig. 12.




Fig. 12. Der schwarze Kuckuck oder Kakadu
(*Cacatua*).
Fig. 13. Der langschmälige Nestor
(*Nestor productus*).

Fig. 13.



Fig. 12. Der schwarz Hüftsel Strakadu oder Kakadu
(*Aterglossum alternatum*).
Fig. 13. Der langschmälige Nestor
(*Nestor productus*).



Fig. 14. Der südamerikanische Greif-Vogel oder Cordilleren-Condor (*Gymnogyps Condor*).

Fig. 16




Fig. 16. Der rothkopfige „Aas-Gräber“ (Cathartes „Ara“)

Fig. 15



Fig. 15. Der süd amerikanische Königs-Gräber oder Geier-König
(Sarcophagus Pagan)

Fig. 17.



Fig. 17. Der ägyptische Schopf-Gier (*Neophron percnopterus*).



Fig. 18. Der weißköpfige Iringen-Gier (*Gyps fulvus*).

Lehr- und Natur-Büchern von G. J. d. Kügelgen, 1835, Taf. 1.

Fig. 18.

Fig. 19.



Fig. 19 Der grosse oder Wunders-Albatros (Laysan-Albatros).

Fig. 20.




Fig. 20 Die angolische Rabe (Laysan-Albatros).

Laysan-Albatros (Laysan-Albatros).

Fig. 21. Der gewöhnliche Bussard oder hämmer Gmel. (*Gypaetus barbatus*).
Zeichnung Farben nach d. v. Hertw. Stahl. Druck v. F. A. Senn.





Fig. 22. Der afrikanische Stelzen Geier. (*Gypogeranus serpentarius*).

Fig. 23.




Fig. 23. Der blauhaeusche Vireo
(*Polyphorus chloronotus*)
Fig. 24. Der Gold-Veller
(*Ixocitta chrysater*)

Fig. 24.



Fig. 24. Der Fasanengel in der Hof- u. Staatsdruckerei.
(*Polyphorus chloronotus*).
a. Ixocitta chrysater.)

Lith. u. in Farben gedr. in der Hof- u. Staatsdruckerei.



Fig. 25. Der Weißstorch oder hängende Säule (*Ciconia helvola*). a alter Vogel b jünger Vogel

Fig. 26. Der amerikanische Hanter- oder Harpyien-Aller.

Thrasatus Harpyius)

Fig. 27. Der afrikanische Schauf-Aller.

(*Syndrus Bachal*)




Fig. 27.



Fig. 26.

Fig. 28. Der meitschwanzige oder gemeine See-Ahler. (*Haliaeetus albicilla*).
Fig. 29. Der gewöhnliche Fluss- oder Fisch-Ahler
(*Pandion haliaetus*).



Fig. 28

Fig. 29



Fig. 31.




Fig. 30. Der rothe Milan oder Hühner Greif. (*Milvus regalis* J.)
Fig. 31. Der weiße Gabel-Feldr. (*Vulturina furcata*).

Fig. 30.



Fig. 32
Fig. 33





Fig. 32. Der islandische Kädel- oder Jagd-Hab.
(*Hierofalco islandicus*).
Fig. 33. Der gemeine Thurm Kädel
(*Tinamorus alaudarius*).



U. F. A. v. V. - 1752

Fig. 34.
Fig. 35.




Fig. 34. Der gemeine oder Hühner-Habicht. (*Aquila palumbarius*).
Fig. 35. Der gemeine Sperber oder Sperlings-Falk. (*Accipiter Nisus*)


Fig. 36



Fig. 36 Der gemeine Buscharend oder Hauß - Greif
(*Buteo buteo*)

Fig. 37 Die Röhr - Weiche
(*Circus aeruginosus*)

Fig. 38






Fig. 41.



Fig. 41. Der gewöhnliche Uhu oder die große Ohr-Eule
Bubo virginianus

Fig. 42.



Fig. 42. Der gewöhnliche Uhu oder die große Ohr-Eule
Strix aluco

Fig. 44.



Lith. u. v. Barth, ged. v. d. h. k. Hof. u. Staatsdruckerei.

Fig. 43. Die gemeine Hörn-Ohr-Nute (*Otus vulgaris*).

Fig. 44. Die gemeine Schleier-Rute (*Myotis planiceps*).

Fig. 43.



Fig. 45.




Fig. 46.



Fig. 47.




Fig. 45. Der große Tukan (Ramphastos Toco).

Fig. 46. Der grünschankliche Tukai (Tucanus discolorus).

Fig. 47. Der vielbändige Araçari (Pteroglossus pluricinctus)




Fig. 48. Die afrikanische Narina. (*Chapaloderma Narina*).

Fig. 49. Der glänzende Curruc. a Männchen, b Weibchen. (*Citurus resplendens*).

Fig. 51.




Fig. 51. Der große schwarzen Vogel
(*Trochilus major*)

Fig. 50.



Fig. 50. Der große schwarzen Vogel
(*Trochilus major*)

Fig. 51. Der niederländische Rauenschnabel
(*Syntrops Vanur Hollandicus*)

Fig. 51. Der niederländische Rauenschnabel
(*Syntrops Vanur Hollandicus*)



Fig. 52

Fig. 52. Die grüne Malkoha (Phoenicophaeus curvirostris)
Fig. 53. Der Haugenhörnige Habicht - Bilduk (Accipiter tridactylus)



Fig. 53

Fig. 53. Der Haugenhörnige Habicht - Bilduk (Accipiter tridactylus)



Fig. 54 Der gencine hickuk (*Cuculus canorus*) a. alles Manaden b. braune Varietät

Fig. 55 Der mittschwanzige hong-hickuk (*Cuculus albirostris*)

Fig. 56.



Fig. 57.



Fig. 58.




Fig. 56. Der langschwänzige Fledgeln-Hinuk
(*Saurothera velata*). Fig. 57. Der rotflügelige Regen-Hinuk
(*Coccyzus americanus*)

Fig. 58. Der schwanzschwundige Sparr-Hinuk.
(*Centropus melanorhynchus*)

Fig. 55. Der rothüngelige Regen-Hinuk
(*Coccyzus americanus*)

Fig. 59.



Fig. 60.



Fig. 61.



Lith. u. in Farb. ged. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 59. Der hunte Kehl-Schnurrvogel (*Megalaema versicolor*).

Fig. 60. Der furchenschnäbige Bartvogel (*Pogonias dubius*).

Fig. 61. Der grossschnäbige Dickkopf (*Tamatia macrorhyncha*).

Fig. 62.




Fig. 63.



Fig. 65.



Fig. 62. Der grüne Glanzvogel (Gelbula viridis).

Fig. 63. Der brasilianische Stummel-Glanzvogel (Jacamaralcyon tridactylus).

Fig. 64. Der schwarze Baum-Specht oder Schwarzspecht (Dryocopus Martius).

Fig. 65. Der gemeine Haub-Specht (Picoides tridactylus).

Fig. 66.




Fig. 67.




Fig. 68.



Fig. 69.



Lütken. Fürst groß, dicker Holzsteckwärzchen:

Fig. 66. Der graue Gras-Specht oder Grauspecht.

(*Gecinus canus*).

Fig. 67. Der goldflügelige Erd-Specht oder Goldspecht

(*Colaptes auratus*).

Fig. 68. Der wellenstreifige Zwerg-Specht

(*Picumnus minutissimus*).

Fig. 69. Der gemeine Wendehals

(*Yungipicus torquilla*).

Fig. 71.



Lithau in Farb. Abb. S. 1. t. v. 22. m. 1890. (Vogelkunst.)

(*Buceros rhinoceros*).

Fig. 70.




Fig. 10. Der grosse Kastorn-Vogel (*Buceros rhinoceros*).

Fig. 11. Der indische Doppelkastorn-Vogel (*Buceros bicornis*).

Fig. 73.



Fig. 73. Der langschwänzige Tocko.
(*Picus canus*.)

(*Torinus macrourus*)

Fig. 74.



Fig. 72. Der gebauchte Nashornvogel. (*Pmetoceros cristatus*)

(*Pachyramphus hypoxanthus*)

Fig. 73. Der langschwänzige Tocko.
(*Picus canus*.)

(*Torinus macrourus*)

Fig. 74. Der rothschwänzige Tocko.
(*Pachyramphus hypoxanthus*)

(*Torinus macrourus*)

Fig. 76.




Fig. 75.



Fig. 78.



Fig. 77.



Fig. 75. Der grosse Jäger-Kisvogel

(*Ducelo gigas*).

Fig. 77. Der violette Mummel-Kisvogel

(*Ceyx purpurea*).

Fig. 76. Der molukkische Paradies-Kisvogel

(*Tanysiptera Pea*).

Fig. 78. Der gemeine Kisvogel

(*Alcedo Lapida*).

Fig. 79.



Fig. 80.



Fig. 81.



Fig. 79. Der gemeine Bieneßesser.

Merops Apiaster.

Fig. 80. Der brasilianische Stäger,

Momotus brasiliensis.

Fig. 81. Der grüne Plattschnabel.

Todus viridis.



Fig. 82.



Fig. 83.



b

- Fig. 82. Der sumatraische Starvogel liebhaber (Coragyps sumatrensis).

Fig. 83. Der rothe Ziervogel (Pipra Aureola).

Fig. 84. Der guianische Lippenvogel (Rhipidura crocea) a. Stämmchen b. Weibchen.

Fig. 85.




Fig. 86.



Jack u. Farben - verl. v. A. K. - Ant. u. Gedruckerei

Fig. 85. Der capische Turako (*Tauraco albocristatus*).

Fig. 86. Der violette Pisangfresser (*Musophaga violacea*)



Fig. 87. Der grosse Hauben-Turako.
(*Chrysococcyx giganteus*).

Fig. 88. Der amerikanische Sasa.
(*Opisthocomus cristatus*).

Fig. 89.



Fig. 90.



Fig. 91.



Fig. 92.




Fig. 89. Der capische Klammervogel.

(*Colius capensis*).

Fig. 90. Der chileische Zahnschnabel

(*Phytotoma Rara*).

Fig. 91. Der Fichten-Kreuzschnabel.

(*Loxia curvirostra*).

Fig. 92. Der gemeine Gimpel.

(*Pyrrhula vulgaris*).

Fig. 93
Fig. 94
Fig. 95
Fig. 96




Fig. 95



Fig. 96



Fig. 93 Die gewöhnliche Steinbock-Lärche (*Abies alba orientalis*)
Fig. 94 Der Gold-Sommer (*Photophanes nivalis*)

Fig. 95 Die Wild-Lärche (*Abies alba circinata*)
Fig. 96 Der Gold-Summer (*Photophanes nivalis*)

Fig. 97.



Fig. 99.




Fig. 100.



Fig. 101.



Fig. 97. Der Haus-Sperling. (Passer domesticus). Fig. 98. Der Erlen-Zeissig. (Chrysomiris Spinus).

Fig. 99. Der Buch-Fink. (Fringilla Coelebs.).

Fig. 100. Der gemeine Kernbeisser. (Coccothraustes vulgaris).

Fig. 101. Der virginische Hauben-Kernbeisser oder Cardinal-Vogel. (Cardinalis virginianus).

Fig. 102.



Fig. 103.




Fig. 104.



Fig. 105.



Fig. 102. Der Paradies-Trauervogel oder die Paradies-Witwe (*Vidua paradisaea*).

Fig. 103. Der rotschlämmbige Wiberregel (*Placirox sanguinirostris*).

Fig. 104. Der guianische Paradies-Tanagra (*Tangara guianensis*).

Fig. 105. Der urtümliche Dick schnabtl. (*Pitylus grossus*).

Fig 106



Fig 107




Fig 108




Fig 109



Fig 106 Die gemeine Bart Meise (*Panurus barbatus*) a Männchen b Weibchen

Fig 107 Die gemeine Schwan's Meise (*Orius canadensis*) a Männchen b Weibchen.

Fig 108 Die gemeine Haubten Meise (*Lophophanes cristatus*)

Fig 109 Die Sicht Meise (*Parus major*)

Fig. 110.



Fig. 111.




Fig. 112.



Fig. 113.



Lith. u. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 110. Der chinesische Sammtvogel. (*Liothrix sinensis.*)

Fig. 111. Der guianische Feuer-Schmuckvogel. (*Phoenicocerous carnifex.*)

Fig. 112. Der gemeine Seidenschwanz. (*Ampelis garrulus.*)

Fig. 113. Der amerikanische Kuhlgrahel. (*Gymnoderus foetidus.*)

Fig. 114.



Fig. 115.



Fig. 116.



Fig. 114. Der weißbaulige Schwanz-Würger (*Dicrurus leucostigma*).

Fig. 115. Der philippinische Bluchongu Würger (*Dicrurus philippinus*).

Fig. 116. Der molukkische Paradies Lebu Würger (*Dissemurus paradiseus*).

Fig. 117.



Fig. 120.



Fig. 119.



Lith. u. in Farben gedr. zu d. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 117. Der fenerfarbene Phönixvogel. (*Pericrocotus flammeus*.)

Fig. 118. Der gauamusche Sperlingswürger. (*Tityra cayana*.)

Fig. 119. Das dreifarbiges Würgerhälbchen. (*Heteroxolmis tricolor*.)

Fig. 120. Der langschwänzige Spermu-Würger. (*Chubernetos Veturus*.)

Fig. 121.




Fig. 122.




Fig. 123.



lith. u. Kurb. gedr. i. d. k. k. Hofn. Staatsdruckerei.

Fig. 121. Der nordamerikanische Königsmüller (*Tyrannus tyrannus*).

Fig. 122. Der gehäubte Tschitru - Fliegenschläpper (*Tyrannus cristata*).

Fig. 123. Der gespaltene Fliegenschläpper (*Myiarchus crinitus*).

Fig. 124.



Fig. 125.



Fig. 126.



Fig. 124. Der Sing-Grünwürger (*Vireo nonaboruensis*). Fig. 125. Der grosse Würger (*Lanius excubitor*).

Fig. 126. Der gewellte Buschhäher (*Thamnophilus undulatus*).

Fig. 127.



Fig. 128.



Fig. 127. Die pfiefende Bürgerkrähe

Fig. 128. Die stahlfarbene Pleiskrähe


(*Gymnorhina tibicen*)

(*Phonygama viridis*).
d. v. 127. 128.

Fig. 130.



Fig. 129.



Lith. u. in Farbe ged. in ddkk Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 29 Die genuine Maudelkrähe. (*Coracias garrulus*)

Fig. 30 Die abyssinische Maudelkrähe. (*Coracias caudata*.)

Fig. 133.



Fig. 131.




Fig. 132.




Fig. 131. Die violettfarbene Rolle (*Burtonia madagascariensis*). Fig. 132. Der Eichel- oder Fusslärcher (*Garrulus glandarius*).
Fig. 133. Die gekräuselte Elster-Lilie (*Ptilorhynchus quatuorlineatus*).

Fig. 134.




Fig. 135.



Lith. u. far. J. F. K. L. nach einer Zeichnung von A. G.

Fig. 134. Die grüne Hitze. (*Cissa thalassina.*)

Fig. 135. Die wandernde Elsterkräh'e. (*Dendrocitta vagabunda.*)

Fig. 136.



Fig. 137.



Fig. 136. Die gehaubte Brüderkräh'e. (*Coracina cephaloptera*)

Fig. 137. Die guianische Brüderkräh'e. (*Gymnophaps caloua*)



Flocken-Vögel und ihre Höfe in Süd-Amerika

Fig. 138. Die rothbrüstige Schmuckkrähe (*Pyroderus scutatus*).

Fig. 139.



Fig. 139. Der gemeine Paradiesvogel (*Paradisea apoda*).

Fig. 141.



Fig. 140.




Fig. 140. Der prachtvolle Königs - Paradiesvogel. (*Cicinnurus regius*) Fig. 141. Der neuguianische Gold - Paradiesvogel. (*Parotia amara*)

Fig. 143.




Fig. 142.



Lith. u. i. Furb. gedr. i. d. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 142. Der höll- oder Steirrabe

(*Corvus Corax*)

Fig. 143. Die gemeine Saatkrähe

(*Frugilegas vulgaris*).


Fig. 146.



Fig. 144.



Fig. 145.



Lith. u. in Farb. gedr. d. k. k. Hof's. Staatsdruckerei.

Fig. 144. Die gemeine Dohle

(*Monedula turrium*.)

Fig. 145. Die gemeine Elster

(*Pica caerulea*.)


Fig. 146. Die gemeine Steinkrähe

(*Frugilus graculus*.)

Fig. 147.



Fig. 148



Lith. u. i. Farb. gedr. v. d. k.k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 147. Der Tannen oder Steinheher

Fig. 148. Der gemeine oder Kirsch-Pirol

(*Nucifraga Caryocatactes*).

(*Oriolus Galbula*).

Fig. 149.



Fig. 150.



Inkl. u. Farb. gedr. v d. k. Hes u. Staatsdruckerei

Fig. 149. Der violettschöne Atlasvogel

(*Ptilorhynchus holosericeus*).

Fig. 150. Der sumatraische Grabel


(*Gracula religiosa*).

Fig. 151.

Fig. 153.



Fig. 152.



Lith. von F. K. gr. v. d. J. H. Holz. Staatsdruckerei

Fig. 151. Der afrikanische Mäzenhäher. (*Buphagus africanus*). Fig. 152. Der Rosenbülbü. (*Pidorus roseus*).

Fig. 153. Der gemeine Star. (*Sturnus vulgaris*).

Fig. 154.




Fig. 155.



Fig. 156.




Fig. 154. Der ionesische Kehlschwanz

(*Dicrurus forficatus*).

Fig. 155. Die zweibindige Sturzohle

(*Coccycuas bicolor*).

Fig. 156. Der gemeine Troupial

(*Icterus galbula*).

Fig. 157.



Fig. 159.



Fig. 158.



Fig. 157. Der königl. Amazilia-Humming-

(*Myiotheretes imperator*).

Fig. 158. Die große Pitta

(*Pitta corvina*).

Fig. 159. Die gemeine Wasser-Amsel

(*Turdus cinereocinctus*).

Fig. 160.



Fig. 161.



Fig. 162.



Fig. 163.



Lith. u. Burgh. und K. K. Hof- u. Staats- Druckerei.

Fig. 160. Der rothliche Sumpf-Schwalzer (*Crateropus rubiginosus*). Fig. 161. Der rufische Ruhud (*Pyconotus ruficeps*).
Fig. 162. Die Sing-Drossel. (*Turdus philomelos*). Fig. 163. Der gemeine Wiesen-Pieper. (*Anthus pratensis*).

Fig. 164.



Fig. 165.



Fig. 166.



Fig. 167.



Fig. 164. Die weiße Bachstelze (*Motacilla alba*). Fig. 165. Der gekrönte Buschkrickerler (*Sylvicola coronatus*).

Fig. 166. Das Gart'n-Rotschwänzchen (*Erithacus phoenicurus*). Fig. 167. Das genuine Rothabichtchen (*Rubecula familiaris*).

Fig. 168.



Fig. 169.



Fig. 170.




Fig. 171.



Fig. 168. Der schwarzkehlige Wiesenläufer

(*Pratincola Rubecula.*)

Fig. 169. Das gemeine Goldhähnchen

(*Regulus cristatus.*)

Fig. 170. Der Wald - Laubsänger

(*Phyllopteneste sibilatrix.*)

Fig. 171. Die Mönchs - Grasmücke oder das Schwarzplättchen (*Curruca atricapilla.*)

Fig. 172.




Fig. 173.



Fig. 175.



Fig. 174.



Fig. 172. Die Wiedl-Nachtigall. (*Luscinia Philomela*).

Fig. 173. Der Teich-Rohrsänger oder Rohr-Spiessvogel. (*Calamonachus arundinaceus*.)

Fig. 174. Der gelockte Buschschlüpfer. (*Drymocichla maculosa*.)

Fig. 175. Der europäische Zaunschlüpfer oder Zaunkönig. (*Troglodytes europeus*.)

Fig. 176.




Fig. 176. Der neuhollandische Leiervogel (*Menura superba*).
Foto: C. L. Hartmann, nach einer Zeichnung von G. R. Gray.

Fig. 178.



Fig. 177.



Fig. 177. Der gemeine Wiedehopf

Fig. 178. Der große krause Wiedehopf

(*Upupa epops*).

(*Upupuchus speciosus*).

Fig. 179.




Fig. 180.




Fig. 179. Der schillernde Glanz-Wiedehopf. (*Seleneoides albicus.*)

Fig. 180. Der geschnürte Brunk-Wiedehopf. (*Craspedophora magnifica.*)

Fig. 181.



Fig. 182.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. K. Hof v. Seeger. Innsbruck.

Fig. 181. Der braune Töpfervogel

(*Eurnarius rufus*).

Fig. 182. Der gemeine Mauerläufer

(*Tachodroma muraria*).

Fig. 184.



Fig. 183




Fig. 185.




Fig. 186



Fig. 183. Der guauische Baumbüllerer

(Aethopyga gaiavensis).

Ziehen zu Port. u. Ind. v. H. d. R. v. der K.

Fig. 184. Der gewöhnliche Baumbüßer

(Certhia familiaris).

Fig. 185. Der gemeine Sichelbaumbücker

(Xiphorhynchus procurvus).

Fig. 186. Die gemeine Spechtmeise

(Sitta europaea).

Fig. 187.




Fig. 188.



Fig. 189.




Fig. 190.



Lith. u. i. Barb. gedr. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 187. Der rothe Honigschleicher (*Myzomela sanguinolenta*).

Fig. 188. Der gemrene Honigfresser (*Meliphaga phrygia*).

Fig. 189. Der schwarzköpfige Honigschlürfer. (*Melithreptus lunulatus*).

Fig. 190. Der blaue Zuckerongel (*Cnemidophanes cyaneus*).



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 191. Der caffersche „Paradies“-Honigvogel
(*Promerops caffer*).

Fig. 193.

Fig. 192.



Fig. 194.

Fig. 195.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 192. Der stahlblühene Prunk-Honigvogel

Fig. 193. Der grüne Blauz-Honigvogel

Fig. 194. Der goldkehliges Topaz-Hülibri

Fig. 195. Der säbelschnablige Wald-Hülibri

(*Cinnyris chalybeus*)

(*Hydrydipna metallicus*)

(*Topaza petta*)

(*Hylocharis rufirostris*).

Fig. 196.




Fig. 197.

Fig. 198.




Fig. 199.




Fig. 200.



Lith. in Flarb. ged. i. d. k. k. Hof.-Stralsdruckerei.

Fig. 196. Der prächtige Honig-Kolibri (*Mellisuga magnifica*). Fig. 197. Der goldohrige Strahlen-Kolibri (*Heliangelus cornutus*).

Fig. 198. Der goldschmückende Komet-Kolibri (*Supho sparganura*). Fig. 199. Der columbische Schnäbel-Kolibri (*Dicimaster ensifer*).

Fig. 200. Der augenstreifige Sonnen-Kolibri (*Practornis superciliosus*).

Fig. 201.




Fig. 202.



Fig. 203.



Fig. 204.



Lith. u. i. Barb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 201. Die gemeine Hausschwalbe (*Chlidon. urbica*).


Fig. 202. Die langflügelige Stachelschwalbe (*Acanthylis caudata*).

Fig. 203. Die gemeine Satangan-Schwalbe (*Collocalia esculenta*).

Fig. 204. Die gemeine Mauer- oder Thurmschwalbe (*Cypselus apus*).



Fig. 205.



Lieth. u. in Buch ged. i d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 205. Die afrikanische Steuer-Nachtschwalbe. (*Macrocyptilarufa*.)

Fig. 206. Die langstielige Gabel-Nachtschwalbe. (*Hydropsalis longipennis*.)

Fig. 207.





Fig. 208.



hath in England, & in the


Fig. 207. Der gemeine Nachtschwalbe oder die Zugenvögel (Caprimulgus europaeus).

Fig. 208. Der langohrige Buchenwogel (Asio otus corvulus).

Fig. 209.



Fig. 210.



Lith. u. i Farb. gedr. i. d. k. h. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 209. Die Gewürz-Baum-Taube. (*Treron aromaticus*.)

Fig. 210. Die Feldtaube. (*Columba Livia*.)

Fig. 211




Fig. 212.



Lith. u. in Frankl. ged. in d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 211. Die Kropftaube. (*Columba guernei*.)

Fig. 212. Die Trommettaube. (*Columba dasypus*.)

Fig. 213.




Fig. 214.



Fig. 213. Die Pflaumentaube (*Columba laticeuda*).

Fig. 214. Die kanadische Wander-Taube (*Ectopistes migratorius*).

Fig. 2/5.



Fig. 2/6.




Fig. 2/5. Die mikoharsche Zier Taube (*Columba microharica*).
Fig. 2/6. Die hirsche - Kied Panther (*Gamer curonata*).

bild u. k. Herb. geogr. v. d. k. Hof - u. Staatsdruckerei

Fig. 2/6. Die hirsche - Kied Panther (*Gamer curonata*).



Lith. u. Farb. gebr. v. d. J. & Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 217. Der plumpse Dromed
(*Didus ineptus*).




Fig. 218.



Fig. 218. Das braune Jaka - Huhn (Practope cristata).

Fig. 219. Das gemeine Purrayan Huhn (Ortalisida Motmot).



Fig. 290.

Lith. in Buch. ged. in d. K. Hofl. Staatsdruckerei.

Fig. 290. *Bras generv. Shaco Hahn. (Cuc. Acton.)*



Hab. 227. Das Paar - Holm - Huhn (*Phasianus gallopinus*)

Fig. 222.





Fig. 223.



lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 222. Das niederländische Talegalla Huhn

(*Tinamotis Lathami*).

Fig. 223. Das gefleckte Leipou Huhn

(*Tinamotis ocellatus*).



Litho u. Farb. gedr. v d. k. K. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 224. Der gemeine Pfau. (Pavo cristatus.)



Lith. n. v. O. und d. A. H. 1750.

Fig. 225. Der doppelsporige Sporn-Pfau (*Polyplectron bicalcaratum*, ♂)




Fig. 226. Der Riesen-Pfau - Augen-Pfau oder Argus (*Argus giganteus*)

Lith. a. i. Farb gear. i. d. k. Hofn. Staatsdruckerei




Fig. 227.

Fig. 228.

*Fig. 2d. Dergencine Phasen (*Phasianus colchicus*).*

Fig. 228. Der chinesische Goldfrosch (*Phrynomantis picta*).

T. H. Huxley's "Darwinism" 17




Lith. u. Farb. graviert d. k. Hofp. Staatsdruckerei.

Fig. 229. Der indische Glanz-Pasun
(Lophophorus impejanus)



Fig. 231.




Lith. u. i. Farb. gezeichnet d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 230. Das grüne Huhn - Huhn (*Gallus Bankiva domesticus*) Das Huhn
Fig. 231. Das grüne Huhn Huhn (*Gallus Bankiva domesticus*) Das Huhn
Das Hähnchen
Das Hühnchen



Fig. 332. Hals schwarz geköpfte Horn-Huhn. (*Tropicoperus Hastingsii*).



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 233. Das gemeine Truthahn (Meleagris Gallopavo) Das Männchen.





Fig. 235.



Erth u. Farb geähr. a. d. si n. Ho. u. Steinstruktur.

Fig. 234. Das gemeine Truth-Huhn. (Meleagris gallopavo.) Das Weibchen.

Fig. 235. Das gemeine Perl-Huhn. (Numida Meleagris.)


Fig. 236.



Fig. 237.



Fig. 238.




Lith. von Rieb. gal. in d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 236. Der gemeine Pratincole. (*Francolinus vulgaris*)

Fig. 237. Das gemeine Rapphuhn. (*Sturna Perdix*)

Fig. 238. Die gemeine Wachtel. (*Colinus communis*)



Lith. u. i. Farb.-gedr. i. d. h. Hof u. Staatsdruckerei

(*Lipaugus cristatus*.)
(*Tinamix punctata*.)
(*Callipepla californica*.)



Lith. u. i. Forb. gegr. i. d. k. k. Hof' u. Standsdruckerei
(Tetrao urogallus vulgaris).

Fig. 292. Das gemeine Auerhuhn



Litho von Farbgrind nach H. K. Straats brukkeri

Pl. 363. Das Blau-Wallakuan oder Schuhlahuhn (Centropus Tertius)





Fig. 244.



Lith. u. i. Rarb, gedr. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 244. Das nordamerikanische Heide-Huhn (*Capidonia Cupido*).

Fig. 245. Das Moor-Schneehuhn (*Chragopus ulnas*).

Fig. 246.




Fig. 248.





Fig. 247.



Lith. u. r. Farb. gedr. v. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 246. Das tatarische Fausthuhn

(*Syrrhaptes paradoxus*).

Fig. 247. Das Ganga - Sandhuhn

(*Pterocles Alchata*).


Fig. 248. Das gemeine Strandhuhn

(*Pterocles orbignyanus*).

Fig. 249.



Fig. 250.



Lith u. Farb grdr v.d. k.k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 249. Der weiße Schreihahn (Pterocles alba)

Fig. 250. Das rostfarbene Schnabel-Sturzhalu (Rhinoptilus rufescens).



Lith. u. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 251. Der afrikanische Strauss. (*Struthio camelus.*)




Litho. in Farb. ged. in d. k. Hof. u. Staatsdruckerei

Fig. 252. Der große Bande oder große amerikanische Strauss. (*Rhea americana*)



Fig. 253. Der Emu oder neuholländische Casuar. (Dromaeus Novaehollandiae)




Lith. u. in Farb. ged. in der k.k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 254 Der indische Cassuar. (Casuarius Benn.)



Fig. 255. Der langschmiegige Riki (*Rhinocrypta australis*).
Lith. u. farb. gr. v. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei.



Lith. u. v. Barb. gedr. i d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 256. Der grmeine Trappe (*Otis tarda*)



Fig. 256.




Fig. 257.

Fig. 257) Der gemeine Zinngreifape. (*Vitellus campestris*.)

Fig. 258) Der gemeine Bragentruppe. (*Houbara undulata*.)

Fig. 256) Ein Vogel, gezeichnet von P. H. Staudt, nach einer Zeichnung von J. G. Schreber.





Fig. 260.



Lith. u. in Farb. ged. in d. k.k. Hof. u. Staatsdruckerei

Fig. 259. Der grosse Tretl. (Otidicenus eremita.)

Fig. 260. Der isabellfarbene Rennvogel. (Cuscinus gallus.)

Fig. 261.





Fig. 262.



Lithogravur. Farb. gezeichnet. A. K. 12. Auflage. Druck. am

Fig. 261. Der gemeine Wiesen Vogel oder die Brachschmalbe (Glareola pratincola).

Fig. 262. Der gemeine Goldregenpfeifer (Actitis apricaria).

Fig. 263.





Fig. 264.



Lith. u. in Farb. ged. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 263. Der gemeine Sporn-hibitz (*Hoplopterus spinosus*).

Fig. 264. Der gemeine hibitz (*Vanellus cristatus*).

Fig. 265.





Fig. 266.



Ende u. in Farb gedr. v. K. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 265. Der gemeine Steinwälzer (*Arenaria interpres*).

Fig. 266. Der europäische Austernfischer (*Haematopus ostralegus*).

Fig. 267.





Fig. 268.



Zwei von Föhren: 3 f. 1851. Friederichsen.

Fig. 267. Die Wald-Schnepfe (*Scolopax rusticola*).

Fig. 268. Die gemeine Heer-Schnepfe oder Beccassine (*Gallinago scolopaceus*).




Fig. 269.




Fig. 269. Der Alpen-Sumpftäuber. (Pediadna cinerea).

Fig. 270. Der grosse Brachvogel. (Numenius arquata).



Fig. 274. Die gemeine Streitshuhpe (Arenaria pugnax).

Fig. 272.




Fig. 273.




Fig. 272. Der Teich-Wasserläufer (*Totanus stagnatilis*).

Fig. 273. Die grasse Pfuhlschnepfe (*Limosa aegoecephala*).




Fig. 274




Fig. 275.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF POLY(1,3-PHENYLENE SULFONE) 23

Fig. 24. Der schwarzäugige Säbelschnäbler (*Recurvirostra Arctica*). *Fig. 25*. Der schwarzflügelige Strandreiter (*Himantopus crandulus*).

Fig. 276.




Fig. 277.





Fig. 276. Der plattschnäbige Wassertreter
(*Phalaropus fulicarius*).

Fig. 277. Das schwarze Wasserhuhn
(*Fulica atra*).

Lithogravur nach einer Zeichnung von A. G. H. Schlegel.



Fig. 278.



Lith. u. Farb. gedr. a. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.


Fig. 278. Das grünfüssige Rohrhuhn (*Gallinula chloropus.*)

Fig. 279. Das europäische Porphyrr oder Sultanhuhn (*Porphyrio antiquorum.*)

Fig. 280.



Fig. 281.



färb. u. i. St. farb. gedr. v. d. k. k. Hof' u. Staatsdruckerei

Fig. 280. Die Wasser-Ralle (*Rallus aquaticus*).

Fig. 281. Die Wiesen-linarre oder der Wachtelkönig (*Ortygornis Crex*).

Fig. 282.



Fig. 282.



Fig. 282. Der Jakana-Spornflügel (Parra Jacana).

Fig. 283. Der chinesische Wasser-Fasan (Hydrophasianus sinensis).



Fig. 284. Der südamerikanische Wühlgans oder hanichi (*Patamedea cornuta*).

Fig. 285.



Lith. u. im Farb.-gcl. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 285. Der gemeine Kreischvogel oder die Chaaja (Chauna Chavaria.)

Fig. 286. Der gemeine Trompetenvogel (Psophia crepitans).

Fig. 286.





Fig. 287.



Lith. und i. Farb. ged. in d. k. Hof. v. Steindorff.

Fig. 287. Der südamerikanische Schreier oder die Karame. (*Casuarius cristatus*)

Fig. 288.




Fig. 288. Verschiedenfarbige Rallenart. (*Casuarius cristatus*)



Lith. a. in Barb. ged. in d. k. k. K. K. Staatsdruckerei

Fig. 289. Der gemeine oder graue Kranich. Grus cinerea.



Fig. 290. Der nomadische Jungfränen-Kranich. (*Anthropoides virgo*)



Lith. u. in Farb. ged. in d. k.k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 291. Der gemeine Kronen- oder Pfauenkraxich. (*Balearica pavonina*)



Fig. 292. *Pörgnane oder Fischadler:* (*Andea cinerea*)

Illustration nach Finsch u. K. H. Hoff - in: *Die Vogelwelt von Ceylon*

Fig. 293. *Pörgnane oder Fischadler:* (*Andea cinerea*)



Farbig gedr. & Hot. u. Stained u. color.

Fig. 293. Der grosse Silberreiher (*Egretta alba*).

Fig. 294.



Fig. 295.



Litho u. in Farbe gedr. in d. Hdt. zu Wien von F. K. Schöpflin.

(*Ardeola minuta*).

Fig. 294. Die gemeinsame Zwerg-Rohrdommel
(*Botaurus stellaris*).




Fig. 296

Fig. 297.



Fig. 296 Der gemeine Sootireiher (*Onychoprion fuscatus*)

Fig. 297 Der afrikanische Braun - oder Überwings (Sula dactylatra).

Luhr in der Farb gest. in d.k.p. Hod n Steuerstruckert

Fig. 299.




Fig. 299. Der brasiliense Blaustrichender (Gancrona cochlearia.)

Fig. 298.




Fig. 298. Der gemeine Lanthier (Dromas ardeola.)



Fig. 300. Der sudanische Wulfschnäbler (*Balaeniceps Rex*).



Fig. 301. Der weisse Storch (*Ciconia alba*).



Z. v. w. P. 2. und w. d. k. H. d. - taatsdruckerei.

Fig. 302. Der amerikanische Ringsterch oder Jabiru. (*Mycteria americana*.)




Fig. 303. Der afrikanische Krapfstorch oder Marabu (*Leptoptilos crumenifer*.)

Fig. 303. Der afrikanische Krapfstorch oder Marabu (*Leptoptilos crumenifer*.)

Fig. 305.




Fig. 306.



Fig. 304. Der afrikanische Klaffschwanz
(*Batrator tamelligrus*).

Fig. 305. Der afrikanische Schluher oder Vimmersatt
(*Tantalus Ibis*).

Die Abbildungen sind nach einer Zeichnung von Dr. G. W. Geist und einer Photographie von Dr. H. L. M. Wohl.

Fig. 304. Der afrikanische Klaffschwanz
(*Batrator tamelligrus*).

Fig. 305. Der afrikanische Schluher oder Vimmersatt
(*Tantalus Ibis*).



Fig. 306. Der rothe Prunk - Ibis (*Eudocimus ruber*)

Fig. 307. Der gelbe Ibis. (*Threskiornis aethiopicus*)

L. 18. u. 20. Fein. gezeichnet. in. Akadem. Zeichn. 1819. Tafel. 1. v. 2.



Fig. 308 Der massive Wallfisch: (*Portulaea interrotata*).



Fig. 309. Der rosenfarbene Flamingo. (*Phoenicopterus roseus*).




Fig. 3/0 her stammt sehr Mocher - Schonau. / Olor manusculus.)

Fig. 311.



Fig. 312.




Fig. 311. Die neuholländische Hühnergans (*Cereopsis novaehollandiae*).

Fig. 312. Die gemeine Ringelgans (*Brennula bernicla*).

Fig. 313.




Fig. 314.




Fig. 313. Die kanadische Schwanen- oder Trompetengans (*Cygnopsis canadensis*).

Fig. 314. Die graue oder Wild-Gans (*Anser anser*).

Fig. 315




Fig. 316.




Fig. 315. Die ägyptische Fuchsente (*Netta erythrophthalma*).

Fig. 316. Die gemeine Fuchs- oder Brautente (*Netta rufina* Vulpina).

Fig. 317.





Fig. 318.



Lith. u. farb. gedr. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 317. Die Storch- oder Wild-Eente

(*Anas Buschus*).

Fig. 318. Die gemeine Spieß-Eente

(*Anas crecca*).

Fig. 319.



Fig. 320.




Fig. 319. Die chinesische Pracht- oder Mandarin-Ente. (*Aix galericulata*.)

Fig. 320. Die gewöhnliche Löffelente. (*Aythya ferina clypeata*.)

Fig. 321.




Fig. 322




Fig. 321. Die gemeine oder türkische Bisam-Eule (*Cairina moschata*).

Fig. 322. Die nordische Eis-Eule (*Tadorna glacialis*).

Fig 323.




Fig 324




Fig 323. Die gemeine Eider-Eente oder Eider-Gans. (*Somateria mollissima*)

Fig 324. Der gemeine Schnabel-Sägetaucher (Merganser serrator.)

Fig. 325.



Fig. 326.




Fig. 325. Der schwarze Scheerenschnabel

Lith. Farb gedr. d. k. Hof - Dr. zu nachter
(*Rynchops nigra.*)

Fig. 326. Die gemeine Nee - Schwalbe

(*Sterna Hirundo.*)




Fig 327.




Fig 327. Die gemeine Lach-Möve (*Chroicocephalus ridibundus*).

Fig 328. Die gemeine Stutzschwanz-Raubmöve (*Gutierrezia sterna*).

Fig. 329.



Fig. 330.




Fig. 329 Der gemeine Schmalbarts Sturmvogel. (*Thalassarche pelagica*.)

Fig. 330 Der arktische Sturmvogel. (*Fulmarus glacialis*.)

Selbst u. i. Kärt grdr i d. k.k. Akad. für Naturk.

Fig. 33. Der grüne Mantiss / Biomphlea ciliata /




Fig. 332.




Fig. 333.




Fig. 332. Der gemeine Fregattenvogel (Tachypterus Aquila).

Fig. 333. Die gemeine Scharbe oder der grosse Cormoran (Phalacrocorax Carbo).



Lith u i Erb.-geld i d k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 334. Der gemeine Pelikan oder die grosse Kropffischarte (*Pelicanus onocrotalus*.)

Fig. 336.




Fig. 335.




Fig. 335. Der gemeine oder Bassan's Tölpel (*Larus bassana*)

Fig. 336. Der gemeine Sonnen oder Tropikvogel (*Phaëton aethereus*)




Fig. 337.




Fig. 338.

lith. u. farb. gedr. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 337. Der amerikanische Schlangenvogel

(*Plotus Anhinga*).

Fig. 338. Der senegalische Lappenfuss

(*Vanellus senegallus*).

Fig. 340.




Fig. 339. Der gehabte Lappentucher oder Steinfischer (*Pingurops cristatus*).
Fig. 340. Der grasse Blä- oder Scoltancher (*Glyptemus glauculus*).

Fig. 339.




Fig. 342.



Fig. 343.



Fig. 341.



lith. u. farb. grdr. i d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

(Mergulus alle)

(Gymnale columba)

Fig. 342. Der kleine Hirabentaunder (Mergulus alle)
Fig. 343. Der grösse Papagrein - oder Skariki Taucher (Phalacrocorax fuscicollis)

Fig. 345.



Lith. u. Farb. gear. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 344. Der gemeine Larettaucher (*Morus arcticus*)

Fig. 345. Der gemeine Schnabidentaucher (*Fratercula Torda*.)

Fig. 346.



Fig. 346 Der grosse Alk *Uria impennis*.

Fig. 347. Der patagonische Flaschenhals oder königs-Pinguin (*Spheniscus patagonicus*).

Lith. u. v. Farb.-gdr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 347.



Fig. 347. Der patagonische Flaschenhals oder königs-Pinguin (*Spheniscus patagonicus*).