

J o h a n n L a t h a m s

allgemeine Uebersicht

d e r V ö g e l.

Aus dem Englischen übersezt
u n d
mit Anmerkungen und Zusätzen versehen
v o n

Johann Matthäus Bechstein,

Gräflich Schaumburg, Lippschem Bergrathe, der öffentlichen Lehranstalt und der Societät der Forst- und Jagdkunde zu Waltershausen Director, der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, der Churfürstlich Mainzischen Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt, der Churfürstlich Sächsischen ökonomischen Societät zu Leipzig, der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, der botanischen Gesellschaft zu Regensburg, der physikalischen Privatgesellschaft zu Göttingen, und der naturforschenden und mineralogischen Gesellschaft zu Jena Mit- oder Ehrenmitglieder.



Dritten Bandes zweyter Theil.

Mit vier und zwanzig ausgezeichneten Kupfertafeln.

N ü r n b e r g,
in der kaiserl. königl. privilegirten Kunst- und Buchhandlung A. C. Schneiders und Weigels.

1 7 9 8.

John Latham's
allgemeine Übersicht
der Vögel
mit ausgemahlten Kupfern
aus dem Englischen
übersetzt
Sechster Band.



Der schwarze Vorkahnschnabel.

Rürnberg,
In der Kaiserl. Kön. privil. Kunst- u. Buchhandlung,
bei A. B. Schneider u. Weigel. (1798.)

I n h a l t.

Cormoran p. 509.

Drossel, schwarzgezungte p. 542.

Ente, Atlantische p. 481. **Alexandrinische** p. 482. **Arabische** p. 482. **Bahamische** p. 438. **Baum** p. 432. **Bergs** p. 432. **Bisam** p. 413. **Blässen** p. 434. **Brands** p. 436. **Brasilische** p. 439. **braune** p. 422. **Brillen** p. 416. **buntschneblige** p. 422. **Caspische** p. 481. **Chinesische** p. 471. **Damiatische** p. 422. **dickköpfige** p. 450. **Domitikaner** p. 453. **darkelblaune** p. 469. **Gattair** p. 483. **gemeine** p. 424. **Georgische** p. 416. **gluckende** p. 449. **goldgelbe** p. 451. **Gulaund** p. 405. **Hauten-** p. 465. **Herbsts** p. 431. **Jacquins** p. 485. **Islandische** p. 469. **Keluschla** p. 481. **Knack** p. 472. **Kalben** p. 468. **Kraggen** p. 420. **Kronens** p. 484. **krummschnäblige** p. 429. **Lappmärkische** p. 444. **Mexikanische** p. 454. **mit weißen Augenbraunen** p. 430. **Mönchs** p. 484. **Neuseeländische** p. 467. **Nili** p. 423. **Nyrokos** p. 465. **Quack-** p. 461. **rothbraune** p. 453. **rothhäufige** p. 415. **rothköpfige** p. 480. **rothschnäblige** p. 438. **Ruder** p. 443. **Sammert** p. 418. **Schnatter-** p. 444. **schwarzackli** p. 483. **schwarzschwänzige** p. 404. **Eichels** p. 445. **Streisatz** p. 482. **Sommers** p. 469. **Spanische** p. 552. **Spattel** p. 462. **Spieß** p. 453. **Stüllers** p. 458. **Strauß** p. 467. **Tafels** p. 450. **Trauers** p. 417. **weißschneblige** p. 449. **weißköpfige** p. 415. **weißstirnte** p. 483. **Winters** p. 455.

Stink, olivenfarbiger p. 544. **Sperlings** p. 544. **Fregatvogel, gemeiner** p. 504. **kleiner** p. 506. **von Palmerston** p. 508. **weißköpfiger** p. 507.

Gannet, großer p. 521. **kleiner** p. 523. **Gans, Aegyptische** p. 395. **Antarktische** p. 386. **Vastard** p. 483. **Berg** p. 399. **Beringss** p. 404. **Vernakels** p. 405. **Blässen** p. 403. **blausflügelige** p. 408. **Bohnens** 484. **Brent** p. 406. **bunte** p. 386. **Canadische** p. 393. **Coscorabai** p. 483. **Eider-** p. 409. **gemahlte** p. 388. **gemeine** p. 399. **graufköpfige** p. 398. **kurzflügelige** p. 384. **Königs** p. 411. **Magellanische** p. 387. **Niesens** p. 390. **rothe** p. 397. **Roßhäls** p. 396. **Schnees** p. 388. **Schwanens** p. 390. **schwarzrükts** p. 392. **schwarzflügelige** p. 394. **Trapps** p. 385. **streifköpfige** p. 480. **Grasmücke, grauliche** p. 546. **Grünspecht, kleiner** p. 540.

Kolibri, prächtigster p. 541. **Kriekente, Afrikanische** p. 477. **Amerikanische** p. 476. **gemeine** p. 473. **Hinas** p. 479. **Madasgaskarische** p. 477. **Manillische** p. 478. **Sommers** 474. **von St. Domingo** 476. **spitzschwänzige** p. 477. **von Coromandel** p. 478. **vom See Vailal** p. 479.

Räffente, gemeine p. 439. **Samarkandische** p. 442. **Mexikanische** p. 441. **rothbrüstige** p. 442.

Inhalt.

M

Meerschwalbe, Aegyptische S. 313. Afrikanische p. 311. aschgraue p. 319. Australische p. 322. bekranzte p. 316. Cayennische p. 310. Chinesische p. 321. dunkelbraune p. 317. dumme p. 312. gemeine p. 317. gestreifte p. 316. graue p. 324. Kaspiische p. 308. Kentische p. 313. Kire p. 312. kleine p. 320. Penanische p. 319. Philippinische p. 325. rothbraune p. 316. rußschwarze p. 310. schwarze p. 323. Sibirische p. 322. Sträubersche p. 325. Surinamische p. 310. unbestimmte p. 314. weiße p. 320.
 Meve, Arktische p. 342. braunköpfige p. 336. dreizehige p. 344. gefleckte p. 331. gemeine p. 333. grauliche p. 329. große p. 326. Heeringes p. 328. Kitiwake p. 345. kleine p. 343. Lach p. 337. Mantel p. 327. Polo Condor p. 347. rothbeinige p. 335. schwarzköpfige p. 334. schwarzzeilige p. 340. Silber p. 330. Sibirische p. 346. Skeaz p. 338.

N

Napageytaucher, ältlicher p. 289. Arktischer p. 279. gehäubter p. 287. gehörnter p. 278. großer p. 277. kleiner p. 290. Labradorischer p. 282. Parkit p. 288. plattschnäbliger p. 292. scheer messerschnäbliger p. 283. schwarzschnäbliger p. 285. schwärzlicher p. 287.
 Pelikan, brauner p. 499. Carolinischer p. 503. Großer p. 496. Manillischer p. 501. Philippin. p. 502. rauchschnäbliger p. 504. rosenfarbener p. 499. rothrückiger p. 502. sägeschnäbliger p. 498.
 Penguin, Antarktischer p. 489. Caspischer p. 489. Chilischer p. 495. gemeiner p. 486. kleiner p. 494. Magellanischer p. 491. mit dem Halsbande p. 493. Papus p. 488.

Pfeifente, Amerikanische p. 449. Capsche p. 447. gemeine p. 446.
 Pirol, braunköpfiger p. 538.

S

Schlängenvogel, schwarzbüchiger p. 532. Surinamischer p. 534. weißbüchiger p. 532.
 Schwan, schwarzer p. 483. schwarzköpfiger p. 384. Sting p. 379. Stummer p. 382.
 Sturmvogel, Antarktischer p. 352. aschgrauer p. 355. blauer p. 363. Brasiliischer p. 349. brauns bandirter p. 358. breitschnäbliger p. 362. Capischer p. 352. Eis p. 450. Fulmar p. 353. gabelschwänziger p. 359. gemeiner p. 356. grauer p. 350. Kurilischer p. 350. Meers p. 359. Norfolkischer p. 351. Riesens p. 347. rußfarbiger p. 358. schneeweiß p. 358. schwarzer p. 349. schwarzzeiger p. 357. schwärzlicher p. 364. Segler p. 360. Taucher p. 562. Ungewittervogel p. 360. vom stillen Ocean p. 364. Wasserfischerer p. 356. weißbrüstiger p. 351.

T

Tauchente, blaue, p. 378. braunköpfige p. 366. blaue p. 378. gabelschwänzige p. 377 gehäubte p. 372. gemeine p. 365. kleine p. 376. rothbrüstige p. 370. Sardinische p. 377. weiße p. 374.
 Taucherhuhn, dummes p. 292. kleines p. 294. marmorirtes p. 298. schwarzes p. 295. weißes p. 297.
 Tarock p. 344. weiße p. 332. Winter p. 338.
 Töpel, brauner p. 525. gefleckter p. 526. gemeiner p. 524. kleiner p. 525. Thage p. 526.
 Tropikvogel, gemeiner p. 527. geißer p. 529. rothschwänziger p. 520. schwarzschnäbliger p. 529.

V e r z e i c h n i s s der in diesem Theile enthaltenen Gattungen.

Neunte Ordnung: Schwimmvögel. (Fortsetzung).

Vier und achtzigste Gattung. Papageytaucher. S. 277.	Enthält 12 Arten.
Fünf und achtzigste Gattung. Taucherhuhn. S. 292.	— 5 —
Sechs und achtzigste Gattung. Taucher. S. 298	— 9 —
Sieben und achtzigste Gattung. Verkehrtschnabel. S. 306.	— 1 —
Acht und achtzigste Gattung. Meerschwalbe. S. 308.	— 26 —
Neun und achtzigste Gattung. Weve. S. 326	— 21 —
Neunzigste Gattung. Sturmvogel. S. 347.	— 23 —
Ein und neunzigste Gattung. Tauchente. S. 365.	— 10 —
Zwey und neunzigste Gattung. Ente. S. 379.	— 116 —
Drey und neunzigste Gattung. Penguin. S. 485.	— 11 —
Vier und neunzigste Gattung. Pelikan. S. 495.	— 31 —
Fünf und neunzigste Gattung. Tropfenvogel. S. 527.	— 3 —
Sechs und neunzigste Gattung. Schlangenvogel. S. 538.	— 3 —
*) Gattung. Pirol. S. 538.	— 1 —
**) Gattung. Specht.	— 1 —
***) Gattung. Kolibri. S. 541.	— 1 —
****) Gattung. Drossel. S. 542.	— 1 —
*****) Gattung. Fink. S. 544	— 3 —
*****) Gattung. Sänger. S. 546.	— 1 —

Dreizehn Gattungen, und mit den Zusätzen zwey hundert und neun und siebenzig Arten.

Namen

Namen der Abbildungen.

- Titeltupfer: der schwarze Verkehrtschnabel S. 306. — 114. Der schwarzbüchige Schlangenvogel. S.
 Taf. 101. Papagentaucher. 1. gehörter, 2. Parz 532.
 tit. 3. Schwärzlicher. 4. Gehäuter. S. 287. — 115. Der Reispirol. I. 2, S. 350. III. S.
 288. 538.
 — 102. Der Arktische Papagentaucher mit asch. — 116. Der prächtigste Kolibri. 1. Männchen,
 grauen Wangen, S. 279. 282. 2. Weibchen. S. 541.
 — 103. Das marmorirte Taucherhuhn. S. 298. — 117. 1. Der gelbbrüstige Sänger. S. 545.
 — 104. Der Chinesische Taucher. S. 304. 2. Die schwarzgeäumte Drossel. S. 542.
 — 105. Die gestreifte Meerschwalbe. S. 316. — 118. Der gefleckte Kernbeißer. Weibchen. S.
 — 106. Die Arktische Meve. S. 342. 543.
 — 107. Der Riesensturmvogel. S. 347. — 119. Der rothhäufige Ammer. S. 543.
 — 108. Die gehäute Tauchente. S. 372. — 120. 1. Der Sperlingsfink. S. 544. 2. Der
 — 109. Die spornfüßige Gans. S. 394. olivenfarbige Fink. S. 545.
 — 110. Die rothköpfige Ente. S. 480. — 121. Die grauliche Grassücke. S. 546.
 — 111. Der kleine Penguin. S. 494. — 122. Der Squatto; Reiher. Männchen S.
 — 112. Der gefleckte Wasserrabe. S. 516. 547.
 — 113. Der rothschwänzige Tropfenvogel. S. 530. — 123. Der Detjardingische Brachvogel. S. 547.

Bier und achtzigste Gattung. Papagentaucher.

Der Schnabel ist stark, dick, erhaben, an den Seiten zusammengebrückt^{a)} (compressed). Die Nasenlöcher sind linienförmig, und laufen mit der Schärfe des Schnabels parallel. Die Zunge ist fast so lang, als der Schnabel. Drey Zehen, die alle vorwärts stehen.

1. Der große Papagentaucher. (Great Auk.)

- Alca impennis LIN. Syst. XII. I. p. 210. 3. Ed. XIII. I. 2. p. 550. No. 3. b) —
Faun. Suec. No. 140. — BRÜNN. orn. No. 105. — MÜLLER Zool. p. 17.
— Faun. Groenl. No. 52.
Le grand Pingoin. BRISS. orn. VI. p. 85. No. 1. pl. 7. — BUFF. ois. IX. p. 393.
pl. 29. — Pl. enlum. 367.
Penguin, or Goifugel. RAU Syn. p. 118. No. 1. — WILL. orn. p. 322. pl.
65. — EDW. Nat. Hist. pl. 147. c)
Great Auk. Br. Zool. II. No. 229. pl. 81. — Arct. Zool. No. 424. d)
Lev. Mus. e)

Er hat die Größe einer gemeinen Gans und ist drey Fuß lang. Sein Schnabel ist vier und ein Viertel Zoll lang, ein groß Stück mit pflaumartigen, kurzen Federn bedeckt, von Farbe schwarz, und mit verschiedenen Furchen durchzogen; die Farbe am Kopf, Hals und Oberleibe mit Flügel, und Schwanz schwarz; das Uebrige weiß, und ein breiter, eysförmiger Fleck von dieser Farbe nimmt den größten Theil des Raums zwischen dem Schnabel und den Augen ein; die kürzern Schwungfedern haben weiße Spitzen, und dieß bildet einen länglichen Streifen auf den Flügeln, welche so klein sind, daß sie zum Fluge ganz untauglich werden, dann sie sind, bis zum ersten Gelenke, kaum über vier Zoll lang; die Füße sind schwarz.

In

a) Die letzte Art ausgenommen, bey welcher er eingedrückt (depressed) ist; da sie aber außerdem mit den übrigen übereinkommt, so mag sie noch am Ende dieser Gattung stehen.

b) Latham Ind. orn. II. p. 791. n. 1. B.

c) Selts manns Vögel V. Taf. 42. B.

d) Uebers. von Herrn von Zimmermann II. S. 471. Nr. 341. B.

e) Vergl. ferner: Pallas Spic. Zool. V. 2. Dessen N. G. merkwürdiger Thiere V. 2. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 317. Nr. 3. B.

In Herrn Junstall's Museum steht ein Vogel dieser Art, der nur zwey oder drey Furchen auf den Schnabel hat, und dessen eiförmiges Fleck zwischen dem Schnabel und den Augen schwarz und weiß gesprenkelt ist. Wahrscheinlich ein junger Vogel.

Dieser Vogel läßt sich zuweilen auf der Insel St. Kilda sehen, erscheint daselbst zu Anfang des Maies, und zieht im Junius wieder weg. Er legt nur Ein großes, sechs Zoll langes, weißes, unregelmäßig mit purpurfarbenen Streifen, und am breitem Ende mit schwarzen oder rostfarbenen Flecken bezeichnetes Ey dicht an die Seeküste (Sea-mark)^{ee)}, und man sagt, wenn ihm dieses Ey weggenommen werde, so lege er kein zweytes wieder. Er brütet spät, weil die Jungen im August nur noch mit grauen Pflaumsfedern bedeckt sind. Selten trifft man ihn über dem Ankergrund hinaus an. Zuweilen besucht er die Küsten von Norwegen, die Ferroe-Inseln, Island, Grönland und Neufundland^{f)}. Er lebt mehrentheils vom Seescorpion,^{g)} Lumpfisch^{h)}, und andern Fischen dieser Größe. Die jungen Vögel fressen die rosenrothe Rhodiserwurzeⁱ⁾ und andere Pflanzen. Die Alten sieht man sehr selten an der Küste, ob man gleich die Jungen häufig da antrifft. Es ist ein sehr schöner Vogel, geht schlecht, taucht aber sehr gut, und wird auf die nämliche Art gefangen, wie der Scheermesserschnäblige Papagentaucher (Nr. 5.) und der arktische Papagentaucher (Nr. 3.). Die Haut zwischen den Kinnladen läßt sich wie eine Blase ausdehnen, und dient den Grönländern, wie die einiger anderer Vögel^{k)} um die Wurfpfeile über dem Wasser zu erhalten. Die Haut des Körpers wird wahrscheinlich von den Eskimos zu Kleidungsstücken gebraucht^{l)}.

2. Der gehörnte Papagentaucher. (Tufted. |A.)

(S. die hundert und erste Kupfertafel, Figur 1.)

Alca cirrhata Lin. Ed. XIII. I. 2. p. 553. No. 10. m) — Pall. Spicileg. V. p. 7. pl. 1. et 5. n)

Le Macareux de Kamtschatka. Buff. ois. IX. p. 368. — Pl. enlum. 761.

Tufted Auk. Arct. Zool. No. 432 o)

Lev. Mus. p)

Dieser ist etwas größer als der gemeine arktische Papagentaucher (No. 3); neunzehn Zoll lang. Sein Schnabel ist ein und drey Viertel Zoll lang, an der Wurzel eben so hoch, und auf drey Furchen durchschnitten; seine Farben sind so ziemlich wie beim arktischen Papagentaucher; die Stirn, die Schläfe und das Kinn weiß; der Augenstern gelbbraun; über jedem Auge entspringt ein Busch von vier Zoll langen, oder noch längern Federn, die sehr artig an

ee) Soll wohl Sea-marge heißen; denn in Pennant's Arkt. Zool. wird seine Brutart auf den von dem Ufer entfernten Felsen angegeben. B.

f) Arct. Zool. — Br. Zool.

g) Cottus Scorpio. Lin. B.

h) Cyclopterus Lumpus. Lin. B.

i) Rhodiola rosea. Lin.

k) Faun. Groenl.

l) Arct. Zool.

m) Latham Ind. orn. II. p. 791. n. 2. B.

n) Desselben N. G. merkwürdiger Thiere. V. S. 15. Taf. 1 und 5. Fig. 1 und 3. B.

o) Uebers. II. S. 475. Nr. 349. B.

p) Stellers Kamtschatka S. 182. Dessen Nov. Comment. Petropolit. IV. p. 621. tab. 12. fig. 16. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 822. Nr. 10. B.

Tab: 101.



Papageytaucher 1.) Gehörnter. 2.) Parkit. 3.) Schwärzlicher. 4.) Gehäubter





Der Arktische Papageytaucher mit aschgrauer Wangen.



an beyden Seiten des Halses herabfallen, und fast bis an den Rücken reichen. Diese Federn sind weiß, so weit sie am Kopfe liegen, hernach aber schön semischlebergelb; das übrige Gefieder schwarz, am hellsten an dem untern Theile, und ins Aschfarbene übergehend; die Schäfte der Schwungfedern weiß; der Schwanz sehr kurz, und besteht aus sechzehn Federn; die Füße bräunlich orangefarben; die Klauen schwarz.

Das Weibchen ist sehr wenig vom Männchen verschieden; doch ist es kleiner¹⁾; sein Schnabel statt dreyer nur mit zwey Furchen durchzogen; und der Federbusch kleiner.

Diese Art wohnt in Kamtschatka und den benachbarten Inseln. Unsrer letzten Reisenden haben sie zuerst etwas gegen Süden vom Cap. Hermogenes angetroffen, und nachher täglich, zuweilen in großen Flügen²⁾. Pallas³⁾ bemerkt, daß die Mädchen in Kamtschatka den Federbusch dieser Vögel nachahmten, indem sie einen ähnlichen Streifen von der weißen Haut des Vielfraßes (Gloutton) hinter jedem Ohr anbrachten, der dann als eine Zierrath hinten herabhänge; und dieß sey eins der kostbarsten Geschenke, das ein Liebhaber seinem Mädchen nur immer machen könne. Die Schnäbel dieses und des arktischen Papageytauher (Nr. 3.), wurden sonst von den Eingebornen für ein Zaubermittel (charm) gehalten, und von den Priestern als Amulet getragen; in der That hat man sie auch noch heut zu Tage in ihrem Kopfschmuck gesehen, wahrscheinlich aber nur noch als Zierrath. Die Häute werden zusammengeheft, und zu Kleidungsstücken gebraucht. In Kamtschatka heißt dieser Vogel Murchagatka, und in Oshotka, Igilma⁴⁾. In seiner Lebensart kommt er mit dem letztern überein, und wie dieser bauet er unter die Erde, und legt sein Nest mit Federn und Seepflanzen aus. Er legt ein weißes Ey zu Ende des May oder zu Anfang des Junius, das allein essbar ist; denn das Fleisch des Vogels selbst ist unschmackhaft und hart. Er lebt von Krebsen, Seekrabben und Schaalthieren, welche letztere er mit seinem starken Schnabel von den Felsen herabschlägt⁵⁾.

3. Der arktische Papageytauher. (Puffin A.)

(s. die hundert und zweyte Kupfertafel)

Alca arctica. LIN. I. p. 211. 4. Ed. XIII. I. 2. p. 549. No. 4. v) — Faun. Suec. No. 141. — BRÜNN. orn. No. 103. — MÜLLER Zool. No. 140. — FRISCH tab. 192.

Le Macareux. BRISS. orn. VI. p. 81. pl. 6. fig. 2. — BUFF. ois. IX. p. 358. pl. 26. — Pl. enlum. 275.

Ipatka. Hist. Kamtsch. p. 153. w)

Puffin, RAU Syn. p. 120. A. 5. — WILL. orn. p. 325. pl. 65. — Hist. Groenl. vol. II. pl. 1. — ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 78. 79. — EDW. Nat. Hist.

N n 2

pl.

1) Einige von denen, die ich gesehen habe, maßen nur vierzehn und einen halben Zoll.

2) Cook's last Voy. vol. II. p. 44.

3) Spicil. Zool.

4) Hist. Kamtsch. p. 183.

5) Arct. Zool.

v) Latham Ind. orn. II. 792. n. 3. B.

w) Steller, Kamtschatka. S. 182. B.

pl. 558. fig. 1. x) — Br. Zool. II. No. 232. — Arct. Zool. No. 427. y) — Tour in Wales pl. 20.

Br. Mus. Lev. Mus. z)

Er hat die Größe einer Krickente ^{a)}; seine Länge ist zwölf, und die Breite ein und zwanzig Zoll, und das Gewicht zwölf Unzen. Der Schnabel ist fünf Viertel Zoll lang und von sonderbaren Bau, an den Seiten stark zusammengebrückt, und an der Wurzel fast anderthalb Zoll tief, von wo aus beyde Kinnladen in eine Spitze auslaufen, die etwas gebogen ist, queer über die obere gehen vier, und über die untere drey schiefe Furchen; die Hälfte des Schnabels, zunächst an der Spitze, ist roth; und die Wurzelhälfte blaugrau, außerdem ist noch an der Wurzel eine Art hervorstehender Wachshaut, die voll kleiner Löcher ist; die Nasenlöcher sind ein langer und schmaler Schlitze über der Scheide der obern Kinnlade, und mit derselben parallel; der Augenstern grau; die Ränder der Augenlider karmoisinroth, am obern eine schwielige dreereckige Hervorragung, am untern eine längliche; der Scheitel, der Hinterhals und alle obere Theile sind schwarz, und dieß läuft in einem Halsbände um die Kehle herum; die Seiten des Kopfs, das Kinn und alle untern Theile vom reinsten Weiß; die Füße orangefarben. Einige Vögel haben eine starke Mischung von dunkler Farbe an den Wangen, und einen Flecken, von eben dieser, an beyden Seiten der untern Kinnlade. ^{b)}

Männchen und Weibchen sind ziemlich überein.

Diese Vögel variiren in Rücksicht des Schnabels nach dem Alter außerordentlich. Im ersten Jahre ist er klein, schwach, ohne alle Furchen und von dunkler Farbe; im zweiten größer, stärker, und von hellerer Farbe, mit einer schwachen Spur von Furche an der Wurzel; bey denen von höherem Alter hingegen, ist er von lebhafter Farbe und beträchtlicher Stärke, daher man vermuthet, daß diese Vögel vor dem dritten Jahr nicht völlig ausgewachsen oder wenigstens nicht brüten, besonders da man noch keinen einzigen zu Priestholm gesehen hat, dessen Schnabel nicht von einerley Wuchs (of an uniform growth) gewesen wäre. ^{c)}

Diese

x) Seligmanns Vögel IX. Taf. 68. Fig. 1. B.

y) Ueters. II S. 473. Nr. 344. B.

z) Pallas Spicil. V. p. 1. Dessen Nat. G. merkw. Th. V. S. 10. Phipps Reise nach dem Nordpol. S. 97. Meine N. G. Deutsch. III. S. 705. Bonnors Zool. Beytr. II. S. 815. Nr. 4. B.

a) Teal. s. unten die 92ste Gattung Nr. 98. Anas Crecca. Lin.

b) Hr. Pennant sagt a. a. Ort: „Die Backen sind weiß mit grauer Einfassung“ Ich habe einen Vogel vor mir. (s. Taf. 102) dessen Wangen überall schön hellaschgrau sind und diese Farbe verliert sich am Hinterkopf wie eine aschgraue Querbinde; hinter dem Mundwinkel

steht nach der Kehle zu ein dunkelashgrauer länglicher Fleck; und die Wölkchen der hervorstehenden Wachshaut an der Wurzel des Oberschnabels sind noch voller Pflaumsedern, die härstens artig hervorstehen. Ich glaube, dieß ist ein junger Vogel, der sich noch nicht zum erstenmal gemauert hat; er hat aber sein vollständiges Gefieder, auch alle Furchen am Schnabel, nur ist dieser an der Spitze blässer als bey alten Vögeln. B.

c) S. Tour in Wales, und Abbildungen von Schnäbeln in verschiedenem Wuchs, auf der 20sten Platte — Vergl. die Alca deleta des Brünns und Müllers, — Pallas Spicil. II. p. 22.

Diese Art trifft man in verschiedenen Gegenden der Küsten von England an ^{a)}; einige wenige auf den Felsen vor Dover, und in seiner Nachbarschaft, mehr um Teedles, auf der Insel Wight, Beachy Head und an andern Orten, nirgends aber in so großer Menge, als auf der Insel Priestholm, wo man sie in unzähligen Flügen sieht. Sie kommen dahin vom 5ten bis zum 10ten April, verlassen aber diesen Ort wieder, und kehren zwey bis drey mal vorher zurück, ehe sie Anstalt machen, Höhlen zu graben, welches sie in der ersten Woche des Maies thun. Viele vertreiben die Kaninchen aus ihren Höhlen, und ersparen sich dadurch die Mühe, eigene zu bauen; im letzten Fall sind sie aber so auf ihr Geschäfte erpicht, daß sie sich mit der Hand greifen lassen. Man hat bemerkt, daß diese Arbeit hauptsächlich an die Männchen kommt, und daß diese auch am Brüten Theil nehmen. Die Zergliederung hat es bewiesen. Das Weibchen legt Ein weißes Ey. Die Jungen werden zu Anfang des Junius ausgebrütet, und um den ersten August ziehen sie alle, ohne Ausnahme, hinweg, und zwar nach einem so uneingeschränkten Gesetze, daß sie die zuletzt ausgefrochenen Jungen verlassen, die dann dem Wandervalken ^{c)} zur Beute werden, der an der Oeffnung der Höhle auf sie lauert, wenn sie vom Hunger herausgetrieben werden. Ungeachtet sie aber um diese Zeit die Jungen so vernachlässigen; so ist doch überhaupt kein Vogel aufmerksamer auf sie, denn er läßt sich selbst mit der Hand fangen, und bedient sich aller Verteidigungsmittel, die ihm zu Gebote stehen, um seine Jungen zu retten; und wenn man ihn bey den Flügeln hält, so versetzt er sich die grausamsten Bisse in jedem Theil seines Körpers, den er erreichen kann, gleich als würde er von der Verzweiflung dazu getrieben; ja, wenn man ihn wieder losläßt, so kriecht er, statt davon zu fliegen, oft wieder in die Höhle, zu seinen Jungen ^{d)}.

Die Nahrung dieser Vögel sind Sardellen (Sprats), die kleinere Art der Krebse, und Seegrass (Sea-weeds). Sie sind außerordentlich ranzig von Geschmack, obschon die Jungen mit Gewürzen aufbewahrt, eingepökelt, und von manchen Leuten sehr geschätzt werden. ^{e)}

Sie sind auch in Irland gemein, auf den Sherries-Inseln, drey Meilen N. N. W. von Holyhead, und auf S. Stack bey Holyhead, brüten sie in großer Menge ^{f)}. Sie bewohnen Island und Grönland, und brüten in den äußersten Gegenden dieser Länder, besonders im westlichen Theil von Disko, und auf der Insel Orpikfauk. Auch auf den Færøe-Inseln trifft man sie an, und sie heißen daselbst Lunda. Auf den Faroe-Inseln werden sie Pflugschaar-Nase, (Coulter-nel) genannt, wegen der Form ihres Schnabels; man kennt sie auch unter verschiedenen andern Namen, als: Goldkopf (Gulden-head), Stumpf-

N n 3

Nase

^{a)} Man hat sie auch in Deutschland an der Mündung der Elbe geschossen. B.

^{c)} Peregrine Falcon. s. I. Bd. 1. Th. S. 65. Nr. 52. F. peregrinus L.

^{f)} Arct. Zool. (In der deutschen Ausgabe finde ich diese Stelle nicht. B.)

^{g)} Zu St. Kilda und anderwärts, werden sie eingemacht, und als Seltenheiten nach London geschickt. Die Knochen werden herausgenom-

men, und das Fleisch in die Haut gewickelt. Man ist sie mit Weinessig, und sie schmecken wie gebackene Heringe.

^{b)} „Die in einer erstaunlichen Menge, in Einem Fluge innerhalb Einer Nacht, ankommen, und wenn ihre Zeit kommt, auf eben diese Art wieder wegzgehen.“ Bibl. topogr. Britt. No. 10. p. 10.

Nase (Bottle - nose) und Helegug, in Wales; zu Scarborough, Mullet, und in Cornwall, Pope. ⁱ⁾

In Amerika sollen sie im Winter Carolina besuchen, und unsre letzten Reisenden haben sie in Sandwichsund angetroffen; die Eingebornen schmücken die Vordertheile und den Halsstragen ihrer Robbenhaut-Jacken (Seal-skin Jackets) mit den Schnäbeln dieser Vögel; und die Einwohner von Unalaska tragen lange Röcke (gowns) von den Häuten dieser und anderer Vögel.

An der Küste von Kamtschatka und der Kurilischen Inseln sind sie gemein, so wie auf Penschinski-Bay, fast bis Ahotka; die Einwohner der beiden ersten Länder, tragen die Schnäbel dieser Vögel um ihre Hälse an lederne Riemen (straps) befestigt; und nach dem Uberglauben dieser Völker, müssen ihre Schaman oder Priester sie ihnen mit einer besondern Ceremonie umlegen, damit sie in ihren Unternehmungen glücklich sind. ^{k)}

3. Var. A. Der Arktische Papagentaucher mit aschgrauem Kopfe.

Alca arctica L. I. 2. p. 549. No. 4. ^β

Seine Länge ist sechzehn Zoll. Der Schnabel ist zwey Zoll lang, fast von einerley Farbe mit dem des vorübergehenden, aber an der Wurzel nicht so hoch; der Scheitel bis an den Nacken zu aschfarben; die Schläfe weiß; die Kehle, der Hals und alle obere Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz schwarz; die Brust und die untern Theile weiß; die Füße orangefarben.

Das andere Geschlecht hat einen viel dünnern Schnabel; der Scheitel ist braunschwarz; die Schläfe sind weiß, und dieß läuft rückwärts fast bis an den Nacken; die Schenkel aschfarben; das Uebrige wie bey dem eben beschriebenen. ^{j)}

Dieser wurde auf der Vogelfinsel, zwischen Asien und Amerika angetroffen. — In der Sammlung des Hrn. Jos. Banks. ^{l)}

4. Der labradorische Papagentaucher. (Labrador A.)

Alca labradorica L. I. 2. p. 550. No. 6. ^{m)}

Labrador Auk, Arct. Zool. No. 428. ⁿ⁾

Br. Mus.

Er

ⁱ⁾ WILL. ORN.

^{k)} Hist. Kamtsch.

^{l)} Da die Schnabelform verschieden ist, so sollte man ihn billig für eine besondere Art halten, und den grauköpfigen Papagentaucher nennen.

Ist der oben von mir Note b) angegebene Vogel kein Junger, so ist er

Var. B. Der Arktische Papagentaucher mit grauen Backen. Ich erhielt ihn durch die Güte des Hrn. D. Deharding in Stockholm. Er kam von der Norwegischen Küste. B.

^{m)} Latham Ind. orn. II. 793. n. 4. B.

ⁿ⁾ Hebers. II. S. 474. Nr. 346. B.

Vier und achtzigste Gattung. Papagentaucher.

283

Er hat die Größe des vorigen (Nr. 3.), und fast 12 Zoll Länge. Der Schnabel ist bey nahe fünf Viertel Zoll lang, an der Spitze sehr gekrümmt, etwas erhaben, aber schmaler, als bey irgend einem Vogel dieser Gattung; die obere Kinnlade dunkelroth, die untere weißlich, mit einem schwarzen Flecken bezeichnet, und mit einem Winkel versehen, wie bey der Meve ¹⁾; die Stelle für die Nasenlöcher mit einer schwärzlichen Haut bedeckt; die Nasenlöcher selbst ein bloßer Schlitz, nahe am Rande; alle obern Theile des Gefieders sind schwarz; die Schläfe schmutzig weiß; die Kehle schwärzlich; die untern Theile, weiß; Flügel und Schwanz schwärzlich, letzterer sehr kurz; die Füße roth.

Ein Exemplar dieser Art befindet sich im Brittischen Museum, und ist, wie man vermuthet, von der Labradorischen Küste gekommen.

5. Der scheermesserschnäblige Papagentaucher. (Razor-Bill).

Alca Torda LIN. I. p. 210. I. Ed. XIII. I. 2. p. 551. No. 1. p) — Faun. Suec. No. 139. — Scop. ann. 1. No. 94. — BRÜNN. orn. No. 100. — MÜLLER Zool. p. 16.

Le Pingoin. BRISS. orn. VI. p. 89. No. 2. pl. 8. fig. 1. — BUFF. ois. IX. p. 390. pl. 27. — Pl. enlum. 1003. 1004.

Razor-bill, Auk, or Murre. RAI Syn. p. 119. A. 3. — WILL. orn. p. 323. pl. 64. — ALBIN. Nat. Hist. III. pl. 95. — EDW. Nat. Hist. pl. 358. fig. 2. q) — Br. Zool. II. No. 230. pl. 82. — Arct. Zool. No. 425. r)

Br. Mus. Lev. Mus. s)

Seine Länge ist achtzehn, und seine Breite sieben und zwanzig Zoll. Der Schnabel ist zwey Zoll lang, schwarz, an der Spitze gekrümmt, mit Federn besetzt, die an der Wurzel weit hereinlaufen, und hat vier ausgehöhlte Querstreifen, deren einer weiß ist, und ein schießstehendes Band an beyden Kinnladen bildet; die innere Seite des Mundes ist gelb; vom untersten Theil der Stirn bis zu den Augen läuft ein schmaler, weißer Streifen; der übrige Kopf, das Kinn, die Kehle, der Hinterhals, der Rücken, die Flügel und der Schwanz sind schwarz; die untern Theile von der Brust an weiß; die größern Deckfedern der Flügel haben weiße Spitzen, und dieß bildet ein Band an den Flügeln; die Füße sind schwarz. ¹⁾

Diese

a) Gull. Larus L. f. die 89ste Gattung.

p) Latham Ind. orn II. p. 793. n. 5. B.

q) Seligmanns Vögel IX. Taf. 68. Fig. 2. B.

r) Übers. II. S. 472. Nr. 342. B.

s) Ferner: Schriften der Berliner Gesellschaft IX. S. 74. Nr. 5. Eine vollkommene Beschreibung. Meine N. G. Deutschl. II. S. 744. Nr. 1. Pallas Spic V. p. 3. Desselben N. G. merkw. Thiere. V. p. 12. Scopoli Bemerk. aus der N. G. I. S. 81. Nr. 94. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 819. Nr. 1. B.

1) Am Weibchen ist der Schnabel pechschwarz mit zwey weißen gekrümmten Linien geziert, wovon die erste unvollkommen in der zweyten Furche und die zweyte vollkommen in der dritten Furche sich befindet; der Kopf, welcher auch oben und an den Seiten ganz schwarz ist, hat an beyden Seiten der Halfter eine grade weiß punktirte Linie, welche von dem Rücken des Schnabels bis an den vordern Augenwinkel reicht; auf den Schläfen wenige weiße Punkte und auf beyden Seiten des Genicks einen großen weißen

Diese Vögel untersuchen, wie der große Papagentaucher (Nr. 1.), zuvor ihre alten Brüteplätze, ehe sie sich wieder auf dieselben zum Brüten niederlassen. Sie erscheinen zuerst zu Anfang des Februars, es ist ihnen aber noch kein rechter Ernst zum Brüten, bis zu Anfang des Maies, wo man sie auf den meisten hohen felsigen Küsten Englands antrifft; und hier lassen unsre unbarmherzigen Schützen, die sich im Schießen üben wollen, nur allzu oft viele Hunderte dieser Vögel und der Taucherhühner (Guillemots), lahm geschossen, am Fuß der Felsen langsam dahin sterben; denn sie sind so dumm, daß sich Einer nach dem andern schleßen läßt. Einige nennen sie Papagenschnäbliche Taucherhühner (Parrot-billed Willocks). Sie legen Ein Ey auf den kahlen Felsen, das sie vermittelst eines Rittes so zu besessigen wissen ^{u)}, daß es vor dem Wegrollen gesichert ist, ob es schon, wenn man es mit der Hand wegnimmt nie wieder mit solcher Genauigkeit in seine vorige Stelle gebracht werden kann. Wenn man dieß Ey wegnimmt, so legen sie ein anderes, und wenn auch dieses wieder geraubt wird, wohl noch ein drittes ^{v)}. Die Farbe desselben ist schmutzigweiß, mit vielen unregelmäßigen, schwärzlichen Flecken. Diese Eyer lieben die Einwohner, und setzen sich der größten Gefahr aus, sie zu bekommen, indem sie sich von oben mit Seilen an den Felsen herablassen. Zuweilen vereinigen sich ihrer zwey indem sich jeder ein Seil in der Mitte des Leibes befestiget, und Einer oben festhält, während der Andre sich nach Erforderniß der Umstände herabläßt; wenn aber zuweilen das Gewicht des Untern seinen Kammeraden überwiegt, so fallen beyde herab, und kommen um.

Wir finden diese Vögel in nördlichen Europa, auch in Irland, Grönland und an der Küste von Labrador. In Europa erstrecken sie sich längs dem weißen Meere bis an die nördlichen asiatischen Küsten, und von da bis nach Kamtschatka und dem Meerbusen von Ochotka. Es ist der Einzige Vogel, der das Innere des Baltischen Meeres erreicht; ^{w)} denn man findet ihn daselbst auf den Karls-Ozar-Inseln bey Gothland, und auf der Insel Wondon, in Angermanien ^{x)}.

Dieser

seu Fleck mit schwarzen Punkten bestreut; der Unterhals der Wangen, so wie die Kehle sind schneeweiß bis auf das Kinn, welches sich durch eine aschgraue Farbe unterscheidet; an dem Halse tritt die schwarze Farbe von oben an den Seiten in einem abgerundeten Winkel herab und scheint einen halben Ring zu bilden; der Vordertheil derselben aber ist schneeweiß, so wie die ganze Brust, der Unterleib, die Seiten, Lenden und der After; die schwarzen Flügel haben in der Mitte eine schmale schräge weiße Binde, welche an den Spitzen der hintern Schwungfedern sich endet; die Füße sammt den Nägeln sind rufschwarz, so wie der Schwanz. — Aus dieser Beschreibung ergiebt sich, dünkt mir, hinlänglich, daß der schwarzschnäblige Papas

gentaucher Nr. 6. das Weibchen von diesem Vogel ist, welches fast bey allen Vögeln, die im ersten Jahre wie die Jungen aussehen, der Fall ist, wofür jenen Vogel Hr. Latham im Ind. orn. ausglebt. s. unten. B.

^{u)} Arct. Zool. p. 510.

^{v)} Fabricius sagt in seiner Grönländischen Fauna S. 38. Daß sie zwey große blasse mit schwarzen Flecken bezeichnete Eyer auf den bloßen Steinen an steile Orte des Strands hinlegten. Auch Pontoppidan sagt in seiner N. S. von Norwegen II. S. 124. daß sie in ein Nest 2 Eyer legten. B.

^{w)} Man trifft sie an den deutschen Küsten, ja sogar in deutschen Flüssen zuweilen an. B.

^{x)} Hist. Kamtsch. p. 153. — Arct. Zool.

Dieser Vogel hat eine sehr sonderbare *) Methode zu fischen. Er taucht oft unter und fängt verschiedene kleine Fische, die er an beyden Seiten des Schnabels vertheilt, die Köpfe im Mund, und die Schwänze zu beyden Seiten heraushängend; wenn sie der Mund nicht mehr fassen kann, so zieht er sich auf die Felsen zurück, und verzehrt sie da mit Muße.

6. Der schwarzchnäblige Papagentaucher (Black-billed A.)

Alca Pica. LIN. I. 210. 2. Ed. XIII. I. 2. p. 551. z) — Faun. Groenl. No. 51.

— *unifurcata*. BRÜNN. orn. No. 102. — MÜLLER Zool. No. 158.

Le petit Pingoin. BRISS. orn. VI. p. 92. pl. 8. fig. 2. — BUFF. ois IX. p. 396.

Mergus Bellonii, *Otomania dicta*. RAM Syn. p. 119. No. 2. — WILL. orn. p. 324. pl. 64.

Black-billed Auk. Br. Zool. II. No. 231. — Arct. Zool. No. 426. a)

Br. Mus. Lev. Mus. b)

Dieser wiegt achtzehn Unzen, ist funfzehn Zoll lang, und vier und zwanzig breit. Sein Schnabel ist fast nur halb so breit, als der des vorigen, sehr wenig gebogen, vollkommen glatt auf seiner ganzen Oberfläche, eine geringe Einkerbung an der Wurzel ausgenommen; die innere Seite des Mundes ist hell fleischfarben; der Scheitel, mit Einschluß der Augen, ein Theil des Halses, der Rücken, die Flügel und der Schwanz sind schwarz; an den Seiten des Halses läuft das Schwarze vorwärts, so daß es fast an der untern Seite zusammenstößt; die Schläfe, die Kehle, der Vorderhals und alle untern Theile weiß; von der Stelle hinter den Augen läuft ein dunkles, schwarzes Zeichen nach dem Hinterkopfe hin, wie bey dem kleinen Räucherhuhn *); das Weiße an den Schläfen ist nicht so rein, als an den untern Theilen; alle

y) Zus. a. d. Suppl. S. 264.

z) *Alca Torda* β. junior avis. Latham Ind. orn. II. p. 793. n. 5. B.

a) Uebers. II. S. 472. Nr. 343. B.

b) Ferner: Neue Schwed. Abh. III. S. 104. Naturforscher XIII. S. 180. Meine N. S. Deutschlands II. S. 747. Nr. 2. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 818. Nr. 1. Wie ich schon oben bey den scheermesserschnäbligen Papagentaucher bemerkte, so ist dieß meiner Meynung nach das Weibchen, oder ein junger Vogel (junior avis) von jenem, wie auch Hr. Latham in seinem neuern Werke im Ind. orn. a. a. O. annimmt. Es scheint überhaupt, wie wenn diese Vögel variierten; denn man bemerkt noch:

a) *Alca balthica*, Brunn. n. 101. an welchen Schwanz und Flügel schwarz sind, und der keine weiße Linie an der Seite des Kopfes hat. — Im Darmstädtschen Cabinet befindet sich

diese Varietät: der Schnabel ist gelbbraun; die weiße Linie vom Schnabel nach den Augen fehlt; Flügel und Schwanz sind tiefer schwarz als der Oberleib; die zweite Ordnung der Schwungfedern haben an den Spitzen nur schwache weiße Ränder; die Wangen und der vordere Theil des Halses sind grau.

b) *Alca alba*, Fabricii, welcher weiß ist mit rothem Rücken.

c) *Alcarostro minori sulco nullo*. Pallas Spic. V. p. 4. Dieser hat nur einen halb so großen Schnabel ohne Quersfurchen und anstatt der weißen Halfterlinie am Vorderkopf nur auf jeder Seite den Anfang eines schrägen weißen Striches. Diese Var. hält Hr. Latham im Ind. orn. a. a. O. 2 für einen jungen Vogel (pullus) B.

d) Lesser Guillemot. s. die folgende Gattung Nr. 2.

alle Schwungfedern der zweyten Reihe haben weiße Spitzen, und die der ersten sind von dunklerem Schwarz, als die übrigen; die Füße bräunlich schwarz. ^{a)}

Diesen Vogel sollte man seiner äußern Merkmale nach, für eine vom scheermesserschnäbligen Papagentaucher (Nr. 5) verschiedene Art halten; ich glaube aber ganz gewiß, daß er nichts anders, als das Junge dieses Vogels ist. Herr Pennant bemerkt, daß man ihn zuweilen an unsern Küsten antreffe; dieß geschieht aber nur im Winter, wenn die gemeine Art sie verlassen hat.

Ich habe obigen Vogel, nebst einem andern, der schon etwas mehr ausgewachsen war, in der Mitte des Decembers 1783 erhalten, wo sie an der Küste von Devonshire geschossen wurden ^{c)}; dieser letzte war um einen Zoll länger, und wog neunzehn Unzen; sein Gefieder vollkommen so gezeichnet, wie bey dem oben beschriebenen, außer daß die gewöhnliche weiße Spur zwischen dem Schnabel und den Augen sichtbar war, aber von graulicher Farbe; die vier Furchen über den Schnabel waren noch kaum ausgebildet, aber der Streif über die Kinnladen war sichtbar, und schmutziggelb, statt rein weiß; die Füße bey beyden braunschwarz.

Briffon's Vogel scheint älter zu seyn, als diese beyden, weil bey ihm auch die Stirn weiß ist. ^{d)}

In der ersten Periode also scheint der Schnabel klein, und ohne alle Furchen zu seyn ^{e)}; in der nächsten ist eine kleine Furche an der Wurzel ^{f)}; in der dritten sind die Furchen vollkommen, aber ohne den weißen Streifen, sowohl quer über den Schnabel, als zwischen der Wurzel desselben, und dem Auge ^{g)}; und endlich in der letzten sind beyde vollständig und zwar mit dem Zusatz, daß das Gefieder auf dem Kopfe schwarz ist, welches, wie ich bemerkt habe, nicht vor der Periode des vollkommenen Alters erscheint ^{h)}. Was also unter der Rubrik des scheermesserschnäbligen Papagentauchers gesagt worden ist, muß auch auf diesen angewendet werden. Daß er auch brüte, ehe er sein vollkommenes Gefieder erhält, scheint nicht unwahrscheinlich zu seyn, da Fabricius dieses Umstandes ausdrücklich erwähnt. ⁱ⁾ Sie sollen an der Küste der Insel Candia und in andern Gegenden des Mittelländischen Meeres anzutreffen seyn, wo sich ohne Zweifel auch der vollkommen ausgewachsene Vogel findet, weil mir gesagt worden ist, sie seyen in der Bucht von Gibraltar gemein, wo man mit Vergnügen ihre Befindlichkeit im Tauchen, bey'm Verfolgen der Fische, bemerkt. Denn da das Wasser in der Bucht zuweilen bis zu einer großen Tiefe ganz rein und klar ist, so kann man diese Vögel oft nach ihrer Beute wie ein Vogel in der Luft in dem Wasser gleichsam herumfliegen, und so den Fisch nach jeder Rich-

a) Linne' sagt, die Füße seyen roth; dieß bemerkt aber kein anderer Schriftsteller.

c) Ich verdanke diese Vögel der Gefälligkeit des Herrn Martin, Esq. von Teignmouth.

f) BRISS. orn. vol. VI. pl. 8. fig. 2.

g) Alca deleta, BRÜNN. orn. No. 104. MÜLLER Zool. p. 17.

h) A. uniflucata, BRÜNN. l. c. No. 102.

i) A. balthica, BRÜNN. l. c. No. 101.

k) Siehe die Schnäbel in der ersten und letzten Periode, Tour in Wales Vol. II. pl. 20. am Ende.

l) Faun. Groenl. p. 79. Er bemerkt, sie seyen in größerer Menge in Grönland, als die scheermesserschnäbligen, zur Brütezeit, und verschwänden im Winter.

Vier und achtzigste Gattung. Papagentaucher.

287

Richtung mit der bewundernswürdigsten Geschicklichkeit verfolgen sehen. Sie verfehlen auch ihres Zwecks fast niemals. ^{m)}

7. Der gehäubte Papagentaucher. (Crested A.)

(S. die hundert und erste Kupfertafel, die 4te Figur.)

Alca cristatella LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 552. No. 7. ⁿ⁾

— — PALLAS Spicileg. Zool. V. p. 18. tab. 2 et 5. ^{o)}

Black Stariki. Hist. Kamtsch. p. 156. ^{p)}

Crested Auk. Arct. Zool. No. 434. ^{q)}

Er hat die Größe der Misteldrossel, und ist zwölf Zoll lang. Sein Schnabel gleicht an Gestalt einigermaßen dem des arctischen Papagentauchers (Nr. 3), die obere Kinnlade aber ist an der Spitze mehr haakensförmig, und die Kinnfedern laufen bis zur Hälfte an die untere vor; am Mundwinkel ist ein schwieliger Lappen von karmoisinrother Farbe, wie der Schnabel; die Schnabelspitze gelb; der Kopf ist ziemlich klein, und die Stirn mit einem aufrechtstehenden Federbusch geziert, der aus langen, vorwärts gebogenen Federn besteht, wie bey der gehäubten Ael ^{r)} die Augen sind klein; unter denselben ein weißer Streifen, und hinter ihnen ein anderer, der aus vier bis fünf schmalen, weißen Federn besteht; Kopf und Hals schwarz; der Rücken eben so, mit rostigrothbraunen Flecken bezeichnet, am Steiß ins beiste spielend; die untern Theile dunkelbraun; die Flügel reichen bis an die Wurzel des Schwanzes, der schwarz ist, und aus vierzehn Federn besteht; die äußere ist an der Spitze rostigroth, und die alleräußerste mit undeutlichen weißen Punkten bezeichnet; die Füße sind bläulichgelb; die Schwimmhäute schwärzlich.

Diese Art ist auf den an Japan gränzenden Inseln zu Hause. Eine derselben, in der Sammlung des Hrn. Joseph Banks, kam von der Vogelinsel zwischen Asien und Amerika. Sie schläft des Nachts in Höhlen an der Küste, und in Felsenklüften, wo man sie oft, nebst andern Vögeln dieser dummen Gattung, mit der Hand fängt.

8. Der schwärzliche Papagentaucher. (Dusky A.)

(S. die hundert und erste Kupfertafel, die 3te Figur.)

Alca tetracala. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 552. No. 8. ^{s)}

— — PALLAS Spicileg. Zool. V. 25. tab. 4 et 5. ^{t)}

Dusky Auk. Arct. Zool. No. 435. ^{u)}

No 2

Von

^{m)} Diese letzte Anekdote verdanke ich dem Colonel Davies.

ⁿ⁾ Latham Ind. orn. II. p. 794. n. 6. B.

^{o)} Dessen N. G. merkwürd. Th. V. S. 26. Taf. 3 und 5. Fig. 7 — 9. B.

^{p)} Stellers Kamtschatka. S. 181. B.

^{q)} Uebers. II. S. 477, Nr. 351. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 821. Nr. 7. B.

^{r)} S. allgem. Uebers. I. Bd. 2. Th. S. 382. Nr. 7.

^{s)} Latham Ind. orn. II. 794. n. 7. B.

^{t)} Dessen N. G. merkw. Thiere. V. S. 31. B.

^{u)} Uebers. II. S. 477. Nr. 352. — Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 821. Nr. 3. B.

Von der Größe des Isefarns, und eilf Zoll lang. Sein Schnabel ist verhältnißmäßig kleiner, aber die obere Kinnlade an der Spitze gebogen, die Farbe gelbbraun, die Kante (ridge) weiß; der Augenstern weiß, und mit einem schwarzen Kreiß eingefast; die Stirn mit pflaumsartigen Federn bedeckt, die sehr dicht stehen, und halb nach dieser, halb nach jener Seite zurückgebogen sind; hinter den Augen ein weißer Streifen; Kopf und Hals schwarz, mit einigen wenigen undeutlichen rostfarbenen Flecken am Nacken; die obere Theile des Körpers schwarz; die untern aschgrau, das gegen den After hin weißlich wird; die Flügel reichen bis an die Wurzel des Schwanzes, der aus vierzehn Federn besteht, die alle, die zwey mittlern ausgenommen, an den Enden rostfarben sind; die Füße schwarzgelb; die Schwimmhäute schwarz.

Diese Art wird auf der See zwischen Japan und Kamtschatka angetroffen, und zwar zuweilen sehr weit vom Lande entfernt; in diesem Falle sieht man sie nur einzeln, zu Lande aber in ganzen Heerden *). Ihr Nest baut sie in Höhlen zwischen den Felsen. Im Wasser ist sie bewundernswürdig geschickt, hingegen an der Küste ist kein Vogel ungeschickter und dummer; sie kann sich nur mit Mühe, und zwar wenn sie sich auf einen Stein oder einer andern Erhabenheit mit dem Steiß auflügt, aufrecht auf den Füßen erhalten. Sie fliegen dann und wann des Abends an Bord der Schiffe, wo man sie mit der Hand fangen kann. Ihr Fleisch schmeckt schlecht, auch kann man die Pflaumsfedern nicht von der Haut los trennen, so daß man sie nützen könnte; allein ihre Eier hält man für sehr gut.

9. Der Parkit, Papagentaucher (Perroquet A.)

(s. die hundert und erste Kupfertafel, die 2te Figur.)

Alca Psittacula LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 553. No. 9. w) — PALLAS Spicil. Zool. V. p. 13. pl. 2 et 5. x)

Stariki. Hist. Kamtsch. p. 155. y)

Perroquet Auk. Arct. Zool. No. 433. z)

Dieser ist ein wenig größer, als der kleine Papagentaucher (Nr. 11), ihm aber an Gestalt nicht unähnlich. Sein Schnabel ist an den Seiten stark zusammengedrückt, und sowohl oben als unten erhaben; die Nasenlöcher sind offen, stehen in der Mitte des Schnabels, laufen mit der Schneide parallel, und in einer kleinen Entfernung von diesem, über den Nasenlöchern, ist eine Furche die von der Wurzel bis zur Mitte sich erstreckt; die Farbe des Schnabels ist dunkelroth; das an den Schnabel angränzende Gesicht ist sehr verlängert, daher die Augen, die klein sind, sehr weit hinten am Kopfe zu stehen scheinen; in der Mitte des obern Augenlides ist

*) Dies ist vielleicht die Art von Papagentaucher, deren ELLIS erwähnt, und die sich zu Tausenden sehen ließ. Sie hatte einen zusammengedrückt, und im Verhältniß zum Vogel, großen Schnabel; ein dunkelbraunes oder vielmehr schwarzes Gefieder; eine weißliche Brust; und gegen den Bauch hin war die

Farbe röthlichbraun. ELLIS's Narrat. vol. II. p. 252.

w) Latham Ind. orn. II. 794. n. 8. B.

x) Dessen N. G. merkhw. Th. V. S. 22. B.

y) Steller nova Comment. Petrop. IV. p. 426. tab. 13. fig. 25. 26. B.

z) Uebers. II. S. 476. Nr. 350. — Donders Zool. Beytr. II. S. 822. Nr. 9. B.

Ist ein weißer Fleck; und am hintern Theil der Augen entspringt ein, schmaler Büschel von weißen Federn, die flatternd an beyden Seiten des Halses herabhängen; der Kopf, der Hals und die obern Theile sind schwarz, am Vorderhalse ins schimmelgraue spielend; die untern Theile von der Brust an weiß; die Schenkel schwärzlich; Flügel und Schwanz gleich; der letzte sehr kurz; die Füße schmutziggelb; die Schwimmhäute braun.

Er wohnt, so wie der letztere, in Kamtschatka, auch auf den Inseln gegen Japan zu, und an den westlichen Küsten von Amerika; in der letztern Gegend am häufigsten. Zuweilen sieht man ihn heerdenweise, aber selten weit vom Lande, ausser wenn er von Stürmen verschlagen worden ist. Bey Nacht begiebt er sich in die Felsenklüfte. Ohne ein besonderes Nest zu machen, legt er Ein Ey von der Größe eines Hühnerenes, das schmutziggelb oder weißlich mit braunen Flecken aussieht, in der Mitte des Junius auf den kahlen Felsen oder auf Sand. Es sind, wie die meisten dieser Gattung, dumme Vögel, wovon man sich durch folgende lächerliche Art sie zu fangen, überzeugen kann: Der Fänger stellt sich des Abends in einem weiten Pelzrock, von eigenem Schnitt, mit weiten, offenen Ermeln, unter einen Felsen; wenn nun die Vögel bey der Dämmerung zu ihren Wohnplätzen zurückkehren, so kriechen sie unter die ausgespannten leeren Ermel, um Schutz in der Nacht darin zu suchen, und die unten versteckte Person tödtet sie sobald als sie hineinkommen, und auf diese Art fängt er in Einem Abend so viel, als er nur fortbringen kann. Ihre Dummheit ist auch daran Schuld, daß sie zuweilen an Bord eines Schiffes fliegen, daß sie irrigerweise für ihren Wohnort halten; wodurch die Schiffer des Nachts oder bey Stürmen wissen, daß Gefahr da ist, da sie zu nahe an das Land gekommen sind. Ihre Eyer hält man für eine gute Speise.

10. Der ältliche Papagentauher. (Ancient A.)

Alca antiqua. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 554. No. 11. a)

Ancient Auk. Arct. Zool. No. 430. b)

Lev. Mus.

Etwas größer, als der kleine Papagentauher (Nr. 11), und fast eilf Zoll lang. Sein Schnabel ist fünf Viertel Zoll lang, die Wurzel weiß; von den Nasenlöchern an bis zum Ende schwarz; die Federn laufen sehr weit am Schnabel vor, und die Augen stehen sehr weit hinten im Kopf; der Kopf, die Schläfe und die Kehle sind tief schwarz; die obern Theile des Körpers und die Flügel rußschwarz; die untern Theile rein weiß; an den Ohren, gerade hinter den Augen, entstehen verschiedene lange, schmale, weiße Federn, die an beyden Seiten des Halses liegen, sich an der untern Seite vereinigen, und einen halben Mond bilden; sie sind an ihrem Ursprung etwas gekräuselt, und können vielleicht nach Willkühr des Vogels aufgerichtet werden, wie ein Kragen, (diese geben dem Vogel das ältliche Ansehen); die Füße stehen völlig im After, sind fünf viertel Zoll lang, und von schwärzlicher Farbe; der Schwanz ist kurz, abgerundet und schwarz.

Do 3

Diese

a) Latham Ind. orn. II. 795. n. 9. B.

b) Uebers. II. S. 475. Nr. 347. B.

Diese Art ist in verschiedenen Gegenden vom westlichen Nordamerika bis Kamtschatka, und den Kurilischen Inseln, zu Hause. c)

II. Der kleine Papageyentaucher. (Little A.)

- Alca Alle. LIN. I. 211. 5. Ed. XIII. I. 2: p. 554. No. 5. d) — Faun. Suec. No. 142 — BRÜNN. orn. No. 106, — Faun. Groenl. No. 54, — Arct. Nidr. vol. I. p. 261. tab. 6. — MARTIN Spitzberg. p. 61. tab. I. lit. c.
 Le Petit Guillemot. BRISS. orn. VI. p. 73. No. 2. — BUFF. ois. IX. p. 354.
 Mergulus Melanoleucos, rostro acuto brevi. RAU Syn. p. 135 A. 5.
 Small black et white Diver WILL. orn. p. 343. pl. 59. — EDW. pl. 91. f)
 Groenland Dove, or Sea-Turtle. ALBIN Nat. Hist.
 Little Auk. Br. Zool. II. No. 233 pl. 82. — Arct. Zool. No. 429. g)
 Lev. Mus. b)

Er hat die Größe einer Schwarzdrossel, und ist beynahe neun Zoll lang. Sein Schnabel ist kurz, stark, etwas abgerundet, und schwarz; die obern Theile des Vogels schwarz; die untern weiß; die Schulterfedern weiß gestreift; quer über die Flügel läuft ein weißes Querband; die Füße sind gelblichbraun; die Schwimmhäute schwarz.

Das Männchen soll sich durch eine schwarze Kehle auszeichnen.

Edwards's Vogel, und der in der Britischen Zoologie abgebildete, haben schwarzen Kopf und Hals; und sollen sich, wie man vermuthet, im Geschlecht von dem oben beschriebenen unterscheiden. Dieß ist aber nicht gewiß. Den letzten habe ich aus Nordamerika erhalten, aus welchem Lande ich auch noch zwey andere, von der nämlichen Art gesehen habe; aber die wenigen Exemplare aus England, die ich angetroffen, unter denen sich zwey in meiner eignen Sammlung befinden, gleichen dem zuerst erwähnten.

Ich glaube, diese Art ist nicht sehr gemein in England, weil man sie nur hier und da antrifft. Ich habe sie von Dover erhalten, und ein zweytes Exemplar wurde bey Dartford geschossen. Am häufigsten scheint sie gegen Norden zu seyn, wo man sie in verschiedenen Gegenden bis Spitzbergen gefunden hat. Sie ist gemein in Grönland in Gesellschaft des schwarzschnäbligen Papageyentauchers (Nr. 6.), und hat einerley Nahrung mit diesem. Sie legt zwey bläulichweiße Eyer, die größer, als Taubeneyer sind. Sie fliegt schnell, und taucht geschickt unter; und wenn sie schwimmt, oder auf dem Wasser ausruht, so taucht sie beständig ihren Schnabel in dasselbe. Sie geht besser zu Fuße, als andere ihrer Gattung. Zur stürmischen Jahreszeit wird sie fett, weil die Wellen eine Menge Krebsse und kleine Fische heraufbringen, die sie dann erreichen kann. Wegen ihrer unbeträchtlichen Größe, wird ihr nicht so

c) Arct. Zool.

d) Latham Ind. orn. II. 795. n. 10. B.

e) Martens Spitzbergen. S. 85. B.

f) Seligmanns Vögel. IV. Taf. 77. B.

g) Ueberf. II. S. 474. Nr. 346. B.

b) Forsters Reise. Ed. in 8. I. S. 114.

Phlipss Reise nach dem Nordpol. S. 97.

Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 823. Nr.

5. B.

so nachgestellt, als den andern Arten; man bedient sich aber der nämlichen Methode sie zu fangen, da sie kein sehr verschlagener Vogel ist. In Grönland ⁱ⁾ wird sie Eisvogel genannt, weil sie ein Vorbote des Eises ist ^{k)}. — Zuweilen sieht man sie von reinem Weiß. ^{l)}

12. Der plattschnäblige Papagentaucher. (Flat-billed A.)

Alca pygmaea. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 552. No. 12. *m*)

Pygmy Auk. Arct. Zool. No. 431. *n*)

Dieser ist noch etwas kleiner, als der vorige, und sieben Zoll lang. Sein Schnabel ist unter drey Viertel Zoll lang, und schwarz; längs dem Rücken erhaben (ridged), aber an beyden Seiten der Erhabenheit (ridge) beträchtlich eingedrückt, wie bey der Enten-Gattung; die Nasenlöcher laufen mit der Schärfe der obren Kinnlade parallel; die Schnabelspitze ist nur ganz wenig gebogen; das Gesicht ist etwas verlängert, wie bey dem Parkit-Papagentaucher (Nr. 9), und die Seiten zwischen dem Schnabel und den Augen sind mit einigen wenigen, schmalen, blassen Federn versehen; das Gefieder aller obren Theile ist rußschwarz; Kinn und Kehle sehr hell; der Vorderhals, die Brust und der Bauch heller, als die obren Theile, und stark ins aschfarbene übergehend; die Mitte des Bauchs schmutzig weiß; die Füße schwärzlich. Obiger Vogel ist auf der Vogelinsel, zwischen Asien und Amerika zu Hause, wo ihn unsre letzten Reisenden in beträchtlicher Menge angetroffen haben.

i) Man findet sie da in großer Menge. PHIPP's Voy. p. 186.

k) Arct. Zool.

l) *Alca candida*. Brünn. orn. p. 26. No. 107. — Müller Zool. p. 17. — Man unterscheidet zwey Varietäten:

a) Der kleine weiße Papagentaucher. Er ist rein weiß. Brun. No. 107.

b) Der kleine Papagentaucher mit röthlicher Brust. Arct. Zool. a. a. O. B.

m) Latham Ind. orn. II. 796. n. 11. B.

n) Uebers. II. S. 475. Nr. 348. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 825. Nr. 12. B.

Fünf und achtzigste Gattung. Täucherhuhn.

Der Schnabel ist dünn, zugespitzt; die obere Kinnlade, gegen das Ende hin nur wenig abwärts gebogen; die Wurzel mit kurzen Federn bedeckt. Die Nasenlöcher liegen in einer Höhle, nahe an der Wurzel. Die Zunge ist dünn, und hat fast die Länge des Schnabels. Die Füße haben dreß Zehen, die alle vorwärts stehen.

I. Das dumme Täucherhuhn. (Foolish Guillemot).

Colymbus Troile. LIN. I. p. 220. 2. Ed. XIII. I. 2. p. 685 No. 1. o) — Faun. Suec. No. 149. — BRÜNN. orn. No. 108. — MÜLLER Zool. No. 152. — FAISCH tab. 135.

Le Guillemot. BRASS. orn. VI. p. 70. No. 1. pl. 6. fig. 1. — BUFF. ois. IX. p. 350. pl. 25. — PL. enlum. 903.

Lonruvia Hoieri, Guillemot, or Sea-hen. RAI Syn. p. 120. A. 4. — WILL. orn. p. 324. pl. 65. — ALBIN Nat. Hist. vol. I. pl. 84. — EDW. Nat. Hist. pl. 359. fig. 1. p)

Foolish Guillemot. Br. Zool. No. 234. — Arct. Zool. No. 436. q)
Br. Mus. Lev. Mus. r)

Seine Länge ist siebenzehn Zoll. die Breite sieben und zwanzig, und das Gewicht vier und zwanzig Unzen. Der Schnabel ist dreß Zoll lang, gerade, spitzig und schwarz; die innere Seite des Mundes gelb; die Federn am obern Theil des Schnabels kurz und weich, wie Sammet: von den Augen nach dem Hinterkopf befindet sich eine kleine Theilung von Federn; Kopf, Hals, Rücken, Flügel und Schwanz, sind tief mäusegrau; die Spitzen der kleinern Schwungfedern weiß; die untern Theile des Körpers eben so; die Seiten unter den Flügeln mit schwärzlichen Strichen bezeichnet; gerade über den Knien stehen einzige lange Federn, die sich über die Kniee herkräuseln; die Füße sind schwärzlich.

Herr Brünnich *) erwähnt einer Spielart, die einen breitern und kürzern Schnabel hat, mit gelben Rändern, selbst in getrockneten Exemplaren; und Müller *) einer andern, mit einem weißen Ring um die Augen, und einen eben solchen Strich hinter denselben. *)

Dieser

o) Uria Troile. Latham Ind. orn. II. 796. n. 1. Hr Latham macht aus dieser und den vier folgenden Arten eine besondere Gattung; beym Linne' aber werden diese Vögel mit unter die Taucher gezählt, und machen da nur eine Familie mit dreß Zehen aus. V.

p) Seligmann's Vögel. IX. tab. 49. fig. 1. V.

q) Uebers. II. S. 478. Nr. 353. V.

r) Vergl. ferner: Meine N. G. Deutschlands II. S. 764. Nr. 1. Pontoppidan Nor-

wegen. II. S. 156. Phipps Reise nach dem Nordpol. S. 98. Egede Besch. von Grönland. S. 123. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 374. V.

s) Orn. bor. No. 109.

t) Zool. Dan.

u) Ohne das kleine Täucherhuhn, das nach Latham's bestimmter Angabe im Ind. orn. II. p. 797. n. 1. S. ein junger Vogel ist, sind noch

Fünf und achtzigste Gattung. Taucherhuhn.

293

Dieser Vogel ist ziemlich gemein im Sommer an den Englischen Küsten, wo er zu weilen in ungeheurer Menge an unsern felsigen Klippen angetroffen wird. Zu dieser Zeit gehen unsre Schützen häufig dahin, um sich im Flug-Schießen zu üben; denn dazu schickt sich nichts besser als diese dummen Vögel, weil sie ihre Kameraden Einen nach dem Andern fallen sehen, ohne etwas mehr zu thun, als in einem Kreis herumzufliegen, und sich auf der nämlichen Stelle wieder nieder zu lassen, um auch, wenn die Reihe an sie kommt, geschossen zu werden. In Gesellschaft dieser Vögel befinden sich auch die Papagentaucher, und beyde werden von den Jägern ohne Unterschied Taucherhühner (Willocks) genannt. Sie legen Ein großes über drey Zoll langes Ey, von bläulichweißer oder hell meergrüner Farbe, mit so unregelmäßigen schwarzen Flecken und Streifen, daß keins dem andern ähnlich sieht.

Auf den Orkadischen Inseln sollen sie das ganze Jahr hindurch bleiben *). Die vorzüglichsten Orte, wo sie bekanntlich brüten, sind die unbewohnte Insel Priestholm, unweit der Insel Anglesen; auf einem Felsen, Godrepe genannt, nicht weit von St. Ives in Cornwall; die Farn-Inseln, an der Küste von Northumberland, und die Klippen um Scarborough in Yorkshire **). Sie finden sich auch in den meisten nördlichen Ländern von Europa, bis Spitzbergen *), der Küste von Lappmark, und längs dem weißen und Eismeere, bis nach Kamtschatka. Im Winter trifft man sie häufig an den Küsten von Italien an *). Sie sind auch in Neufundland, und in einigen wenigen Gegenden des festen Landes von Nordamerika bekannt; doch hat man sie bisher nicht für gemeine Vögel in jenen Gegenden ausgegeben. Unsre letzten Reisenden haben sie an der nördlichen Küste von Nootka-Sund angetroffen. *)

Man kennt sie unter verschiedenen Namen. Die Einwohner von Wales nennen sie Guillem; die von Northumberland und Durham, Guillemot oder Sea-hen; in Yorkshire, Scout; in Cornwall, Kiddaw; und in den südlichen Theilen Willock. In Kamtschatka werden sie Uru oder Kara genannt. Die Kamtschadalen erlegen sie in Menge ihres Fleisches wegen, wiewohl es sehr zähe und übel schmeckend ist; mehr aber ihrer Häute wegen, aus denen sie, wie aus den Häuten anderer Vögel, Kleider verfertigen. Auch ihre Eyer werden für große Leckerbissen gehalten *).

Folgende Sonderbarkeit *) hat man an diesem Vogel bemerkt, daß, wenn er in einer Entfernung von der See (out of sight) losgelassen wird, er keinen Versuch zu Fliegen macht; wenn man ihn hingegen nahe genug an die See (within reach of the sea) trägt, so fliegt er dann sehr leicht; und wenn er in frisches Wasser gethan wird, so schwimmt er herum, scheint aber

noch folgende Varietäten zu bemerken:

a) Mit breitem und kürzern Schnabel, auch gelben Schnabelrändern. Brun. No. 109.

b) Die Schwanzfedern sind ganz schwarz. Uria alga. Brun. No. 112.

c) Der Augenkreis und eine Finte hinter den Augen sind weiß? Müller, Zool. dan. prodr. p. 19. n. 152. a.

d) Augen und Kopf sind ungefleckt? Mül-

ler Zool. dan. prodr. p. 19. n. 152. b.

f. Donndorfs Zool. Beytr. a. a. O. B.

v) Br. Zool.

w) Willughby.

x) Phipps Voy. p. 187.

y) Arct. Zool.

z) Cooks last. Voy. II. p. 352.

a) Hist. Kamtsch. p. 154.

b) Zus. a. d. S. 265.

aber keine Neigung zum Untertauchen zu haben, oder wenn er dazu gezwungen wird, so taucht er doch nicht sehr tief unter, und kommt gleich wieder auf die Oberfläche herauf; ob hieran der Mangel eines ihm anständigen Futters im Wasser Schuld ist, oder ob es ihm, als ein seiner Natur nicht zuträgliches Element, zuwider ist, läßt sich nicht bestimmen. — Dieser Vogel trägt, wie der scheermesserschnäbliche Papagentaucher, die Fische mit den Schwänzen zum Schnabel heraus hängend ^{c)}

2. Das kleine Taucherhuhn. (Lesser G.)

Colymbus minor. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 585. No. 14. d)

Ringua. BRÜNN. orn. No. 110. III. — SCOP. ann. 1. No. 103. e)

Lesser Guillemot. Br. Zool. No. 235. pl. 83. fig. 3. f)

Lev. Mus.

Dieser ist kleiner, als der vorhergehende; seine Länge beträgt sechzehn Zoll, die Breite sechs und zwanzig, und das Gewicht neunzehn Unzen. Der Schnabel ist dreiehalb Zoll lang, und schwarz; der Scheitel, Augentreiße, Hinterhals, Rücken, die Flügel und der Schwanz sind schwarz, das hinter den Augen zu beyden Seiten in einem Streifen fortläuft; die größern Deckfedern der Flügel haben weiße Spitzen, und dieß bildet ein schmales Band an den Flügeln; die Seiten des Kopfs, unter den Augen, und alle untern Theile, sind weiß; die Füße schwarz.

Einige Vögel variiren darin, daß bey ihnen der schwarze Streifen hinter den Augen viel breiter ist ^{e)}.

Dieser Vogel ist viel kleiner, als das dumme Taucherhuhn (Nr. 1.), und besucht unsere Küsten nur im Winter; selten sieht man ihn an den Küsten von Wales, aber im Firth of Forth, in Schottland, findet man ihn, in Gesellschaft der schwarzschnäblichen Papagentaucher, in unzähligen Flügen, wo sie auf die Sardellen Jagd machen. Sie werden Morrots genannt, und ziehen alle vor dem Frühling wieder nach Hause ^{b)}. Sie sind auch, nebst den jungen oder schwarzschnäblichen Papagentauchern im Winter häufig an unsern westlichen Küsten, denn ich habe sie aus Teignmouth, in Devonshire, in der Mitte des Decembers 1783 erhalten.

Gute Gründe bewegen mich zu glauben, daß dieser Vogel nichts anders ist, als das dumme Taucherhuhn im jüngern Alter; denn sie sind weder in Form noch Ansehen verschieden; und was anlangt, daß sie an den Seiten des Kopfs und an der Kehle weiß sind, so ist dieß ja bey den jungen scheermesserschnäblichen Papagentauchern eben so, und ich glaube, daß sie sich mit zunehmenden Alter, eben so wie diese Vögel, verändern.

3. Das

c) Herr Jackson.

d) Uria Troile. Latham Ind. orn. II. p. 797. n. 1. β. junior avis. V.

e) Uebers. von Günther. I. S. 88. Nr. 103. V.

f) Uebers. II. S. 479. A. — Donndorfs

Zool. Beytr. II S. 873. Nr. 14. — Ist nach Hrn. Lathams bestimmter Angabe im Ind. orn. ein junges dummes Taucherhuhn. V.

g) Brünntsch.

h) Br. Zool.

3. Das schwarze Taucherhuhn. (Black G.)

Colymbus Grylle. LIN. I. p. 220. 1. Ed. XIII. I. 2. p. 584. No. 1. i) — Faun. Suec. No. 148. — BRÜNN. orn. No. 113. — MÜLLER Zool. No. 151. — Act. Nid. vol. I. tab. 4. — FRISCH tab. 155.

Le petit Guillemot noir. BRISS. orn. VI. p. 76. — BUFF. ois. IX. p. 354. — Pl. enlum. 917. (das Weibchen).

Kaiaver, or Kaior. Hist. Kamtsch. p. 157.

Greenland Dove, or Sea-Turtle. RALL Syn. p. 121. No. 6. — WILL. orn. p. 326. pl. 78. — ANDERSON Groenl. vol. II. pl. 1. — ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 80. (das Männchen).

Black Guillemot. Br. Zool. No. 236. — Arct. Zool. No. 437. k)

Br. Mus. Lev. Mus. l)

Diese Art ist dreyzehn bis vierzehn Zoll lang, zwey und zwanzig breit, und wiegt vierzehn Unzen. Ihr Schnabel ist anderthalb Zoll lang, gerade, dünn und schwarz; die innere Seite des Mundes roth; die Hauptfarbe des Gefieders schwarz, eine starke Mischung von Weißem an den Deckfedern der Flügel ausgenommen; und die kürzern Schwungfedern haben weiße Spitzen; die Füße sind scharlachroth; die Klauen schwarz, Dieß ist sein Sommergefieder.

Männchen und Weibchen sollen in erwachsenem Alter nicht von einander unterschieden seyn; im Winter verändern sie zuverlässig ihre Farbe ^{m)}; zuweilen sieht man ganz schwarze Exemplare ⁿ⁾.

3. Var. A. Colymbus Grylle LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 584. No. 1. β. o)

Größer als letzterer, und achtzehn Zoll lang. Der Schnabel anderthalb Zoll lang, und schwarz; die Hauptfarbe des Gefieders rußschwarz, unten am hellsten; verschiedene der mittleren Deckfedern der Flügel haben weiße Spitzen, und dieß bildet einen breiten, länglichen Fleck quer über die Flügel; die kürzern Schwungfedern sind auch weiß bezeichnet, das sich mit der ersten Farbe in einem scharfen Winkel vereinigt; die Füße sind roth.

Er ist in Unalaska zu Hause. In der Sammlung des Herrn Jos. Banks.

3. Var. B. Colymbus Grylle. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 584. No. 1. γ. p)

Vria balthica. BRÜNN. orn. No. 116. q)

Spotted Greenland Dove. EDW. Nat. Hist. pl. 50. r)

Pl. 2

Ben

i) Uria Grylle. Latham Ind. orn. III. p. 797. n. 2. B.

b) Ueberf. II. S. 478. Nr. 354. B.

c) Ferner: Stellers Beschreibung von Kamtschatka. S. 183. Leem's Lappl. S. 146. Pontoppidon R. S. v. Norweg. II. S. 189. Phipps Reise nach dem Nordpol. 98. Meisner R. S. Deutschl. II. S. 772. Nr. 2. III. S. 702. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 871. Nr. 1. B.

m) Faun. Groenl.

n) Herr Huthins.

o) Latham Ind. orn. I. c. β. B.

p) Latham Ind. orn. I. c. γ. Uria minor striata. Brisson av. VI. p. 78. n. 4. B.

q) Diesen und den folgenden hält man für alte Vögel, im Wintergefieder. Faun. Groenl. Einige werden im Winter ganz weiß. Arct. Zool. (In der Arct. Zool. steht aber auch, daß Hr. Pennant von Huthins sey versichert worden, daß die alten Vögel keineswegs varirten, wie man geglaubt hatte. Eben dieß bestätigt Oedman in Act. Stockh. Die grauen und bunten Vögel sind also die Jungen. B.)

r) Seligmanns Vögel II. Taf. 99. B.

Bei diesem sind die obern Theile bräunlich schwarz, mit Querstreifen von dunklerer Farbe; die Schläfe und die untern Theile, vom Kinn bis zum After, schmutzig weiß, mit hellaschfarbenen Querstreifen; die Deckfedern der Flügel weiß, ein Theil derselben schwarz melirt; die Füße schmutzig fleischfarben. Dieser kam aus Grönland.

3. Var. C. *Colymbus Grylle*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 584. No. 1. 2. 5).
Uria balthica. BRÜNN. orn. No. 115.

Bei diesem sind Kopf, Hals und Brust weiß, sehr undeutlich schwarz gefleckt; der Rücken schwarz, mit einigen weißgerändeten Federn; der Bauch schneeweiß; Flügel und Schwanz schwarz, und ein weißer Fleck an erstern, wie bey den vorigen.

Dieser kam von Christiansöe, und wird daselbst Sildeperris genannt.

3. Var. D. *Colymbus Grylle*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 584. No. 1. 2. 7)

Bei Herrn Joseph Banks bemerkte ich noch eine Spielart, die nicht sehr verschieden ist. Ihre Länge ist vierzehn Zoll; die obern Theile des Körpers sind dunkelschwarz; der Scheitel ist weiß gesprenkelt; der Hinterhals spielt ins Aschfarbene; die größern Deckfedern der Flügel sind unregelmäßig schwarz und weiß bezeichnet; Schwungfedern und Schwanz schwarz; die untern Theile weiß, mit undeutlichen dunkelschwarzen Strichen bezeichnet, das Kinn ausgenommen, das einfarbig weiß ist; die Füße sind hellbraun; die Schwimmhäute schwärzlich.

Aus Kamtschatka?

3. Var. E. *Colymbus Grylle*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 584. No. 1. 2. 11)
Uria grylloides. BRÜNN. orn. No. 114? — Arct. Nidr. vol. I. p. 268.
 Spotted Guillemot. Br. Zool. Vol. II. pl. 83 fig. 2.

Bei diesem besteht das Gefieder aus schwarzen und weißen Flecken an den obern Theilen, und alle untern sind weiß. Bei Brünnichs Vogel war der Bauch schwarz und weiß gefleckt; er vermuthet, dieß sey ein einjähriger Vogel v).

Das schwarze Taucherhuhn findet sich auf der Bass-Insel, in Schottland, und auf der Insel St. Kilda, welche letztere es im März besucht. Sein Nest bauet es tief unter die Erde, legt Ein graues, oder nach andern, zwey w) weißliche Eier, von der Größe der Hühnereier, mit vielen grauen und schwarzen Flecken. Man sieht es auch auf den Felsen von Elandsbino in Caernarvonshire x), und auf den Farn-Inseln an der Küste von Northumberland. Mehrentheils fliehet es paarweise. Es taucht gut unter, daher es von Einigen Taucher-Taube (Diving-Pigeons) genannt wird y).

Man

3) Latham Ind. orn. I. c. 2. B.
 2) Latham Ind. orn. I. c. 2. B.
 1) Latham Ind. orn. I. c. 2. B.
 v) Faun. Groenl.

w) Faun. Groenl. — Nach Stollern sind die Eier weißlich, mit rothfarbenen Flecken, und aschfarbenen Sprenkeln. Br. Zool.
 x) Br. Zool.
 y) Arct. Zool.

Man trifft es an allen Küste von Grönland in Menge an; hier lebt es von kleinen Fischen. Seine Eier legt es zu Anfang des Junius, und die Eingebornen essen sie. Die Haut wird eben so, wie die der Papageyentaucher, angewandt; und die der Füße wird als ein Röder an ihre Fischangeln gebraucht. Es findet sich auch in Spitzbergen ²⁾. In Kamtschatka nistet es auf hohe Felsen in der See, und pfeift sehr laut; daher es die Kosaken, Ivoshil oder Postknecht (Post-boy) nennen ³⁾. In diesem letztern Lande findet sich auch eine Spielart mit einem weißen Strich, der aus dem weißen Fleck an den Flügeln herauskommt ⁴⁾. Auf Hudsons-bay, ist es zu jeder Jahreszeit, an den äußersten Gränzen der Bucht, sehr zahlreich; man nennt es dort Gesekesewuck ⁵⁾.

4. Das weiße Taucherhuhn. (White G.)

Colymbus lacteolus. LIN. Ed. XIII. l. 2. p. 503. No. 13. d)

Cepphus lacteolus. PALL. Spicil. p. 33. e)

Von der Größe des vorhergehenden. Der Schnabel ist bräunlich fleischfarben; die innere Seite des Mundes weiß; der Augenstern braun; die Augenlieder bräunlich fleischfarben; Kopf und Körper so weiß, wie Schnee; der Rücken, die Flügel und die Wurzel des Schwanzes hellgrau; der übrige Schwanz weiß; seine Form etwas spitzig; die Schwungfedern weißlich, längs den Schäften herab ins Braune ziehend; die äußerste ist die längste; alle kürzern Schwungfedern sind fast von gleicher Länge; die Füße dunkelfleischfarben; weit über die Kniee hinauf nackt; die Klauen schwärzlich.

Diesen Vogel führt Hr. Pallas als noch nicht beschrieben an; er hat ihn an der Küste von Holland, wo er zwischen den Dörfern Calwick und Scheveningen ans Land geworfen worden war, im Winter 1760 angetroffen ^{f)}.

Pp 3

5. Das

2) Phipps Voy. p. 186.

a) Der Schnabel sowohl, als die Füße, sollen dort roth seyn; ich finde aber nicht, daß irgend Jemand den Schnabel von dieser Farbe gesehen hat. Zwar sagt Linné: „Rostrum et apedes, et faux sanguinea.“ Ich fürchte aber, er habe dieß nicht aus eigener Beobachtung.

b) Arct. Zool.

c) In den Suppl. S. 265. stehen noch die Worte: „Er ist gemein in der Bucht von Dublin, die er das ganze Jahr hindurch nicht verläßt. Herr Jackson.“

d) *Uria lacteola*. Latham Ind. orn. II. p. 798 n. 3. B.

e) Dessen N. S. merkwl. Thiere. V. S. 42.

Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 870. Nr. 13. B.

f) Var. A. *Colymbus lacteolus*. GMELIN. LIN. I. c. β. *Uria lacteola*. LATHAM I. c. β. — Die Farbe des Oberleibes grauweiß; hinter den Augen ein schwärzlicher Fleck; auf den Flügeln sind schwarze Stellen, und die Spitzen der hintern Schwungfedern sind weiß; der Unterleib schneeweiß; der Schnabel schwarz, an der untern Kinnlade die Wurzel bloßgelb.

Am Rheinstrom Naturforscher XIII. S. 192.

Dieser Vogel scheint eher zu dem dummen Taucherhuhn als hierher zu gehören. B.

5. Das marmorirte Taucherhuhn. (Marbled G.)

(s. die hundert und dritte Kupfertafel).

Colymbus marmoratus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 583. No. 12. g)

Marbled Guillemot. Arct. Zool. No. 438. pl. 22. h)

Lev. Mus.

Dieser ist größer, als der kleine Papageentaucher ⁱ⁾, und zehn Zoll lang. Sein Schnabel ist an den Seiten etwas zusammengedrückt, ziemlich dünn, und einen Zoll lang; der Scheitel schwärzlich, die obern Theile des Körpers sind nach der Quere braungelb, kastanienbraun und schwärzlichbraun gestreift, bis an den Schwanz, der kurz und schwarz ist; die Deckfedern der Flügel sind schwärzlich, einige der kürzern weiß gerändert; die Schwungfedern schwarz; Rinn und Kehle schwärzlich, mit unregelmäßigen, weißen Flecken untermengt; die Seiten des Halses einfarbig schwärzlich; Brust, Bauch und After haben unregelmäßige, schwarze und weiße Streifen und Wellenlinien, und am After spielt die Farbe ins Weiße; Füße und Zehen sind hell orangefarben; die Schwimmhäute und die Klauen schwarz.

Männchen und Weibchen sind ziemlich überein.

Obliger Vogel ist in Prinz Wilhelms Sund an der westlichen Küste von Amerika zu Hause, woher ein Paar ins Leversche Museum gebracht wurde. Einer, den Hr. Joseph Banks besitzt, ward in Kamtschatka angetroffen.

Sechs und achtzigste Gattung. Taucher.

Der Schnabel ist gerade, stark und spitzig; die obere Kinnlade am längsten; die Schärfe beider einwärts gebogen. Die Nasenlöcher linienförmig; der obere Theil durch einen kleinen Hautansatz getrennt. Die Zunge lang und spitzig; an beyden Seiten zunächst an der Wurzel gezähnt. Die Beine dünn und platt. Vier Zehen, wovon die äußerste die längste ist; die Hinterzehe klein, und mit der innern durch eine kleine Haut verbunden. Der Schwanz kurz, und aus zwanzig Federn bestehend.

I. Der Eis-Taucher. (Northern Diver.)

Colymbus glacialis. LIN. I. p. 221. 5. Ed. XIII. I. 2. p. 588. No. 5. ^{k)} — BRÜNN. orn. No. 134. — MÜLLER Zool. No. 155. — FRISCH tab. 185. A. — FAUN. Groenl. No. 62.

Le grand Plongeon tacheté. BRASS. orn. VI. p. 120. No. 6. pl. 11. Fig. 1.

Le

g) *Uria marmorata*. LATHAM Ind. orn. II. p. 799. n. 4. B.

h) Uebers. II. S. 479. Nr. 355. Taf. 22. obere Figur. B.

i) S. oben S. 290. Nr. 11.

k) *Colymbus glacialis*. LATHAM Ind. orn. II. p. 799. n. 1. B.



Das Marmorirte Taucherhuhn.



Sechs und achtzigste Gattung. Taucher.

299

Le Plongeon tacheté. BRISS. l. c. p. 117. No. 5. (ein junger Vogel). ¹⁾

L'Imbrim BUFF. ois. VIII. p. 258. pl. 22. — Pl. enlum. 952.

Colymbus maximus caudatus. RAU Syn. p. 125. A. 4.

Greatest Speckled Diver, or Loon. WILL. orn. p. 341. — ALBIN Nat. Hist. III. pl. 93.

Northern Diver. BR. Zool. II. No. 237. pl. 84. — Arct. Zool. No. 459. ^{m)}
Br. Mus. Lev. Mus. ⁿ⁾

Dies ist der größte Vogel aus der Tauchergattung! Er wiegt sechzehn Pfund, misst fast drey Fuß und sechs Zoll in die Länge, und vier Fuß acht Zoll in die Breite. Sein Schnabel ist fünfsechß Zoll lang und schwarz; Kopf und Hals sind dunkel sammet-schwarz; unter dem Kinn ist ein weißer Fleck, der mit verschiedenen schwarzen parallel hinablaufenden Strichen bezeichnet ist; an beyden Seiten des Halses ist ein großer weißer Fleck, wie das Kinn sehr artig mit schwarzen Strichen bezeichnet, die am hintern Theil fast zusammenstoßen; die Seiten der Brust sind eben so bezeichnet, aber die Striche nicht so zahlreich; der Hinterhals, der Rücken, die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern sind schwarz, mit runden, weißen Flecken besetzt, die immer größer werden, je weiter sie herabwärts stehen; an den Schulterfedern und einem Theil der größern Deckfedern sind die Flecken viereckig, und stehen in Reihen; die Schwungfedern und Schwanz sind schwarz; die Flügel kurz; die Brust und die untern Theile weiß; die Füße schwarz.

Das Weibchen ist kleiner, und der Ring am Hals minder deutlich. Bey jungen Vögeln scheint auch das Gefieder nicht so gleich seine Vollkommenheit zu erhalten, wenn sie auch schon von beträchtlicher Größe sind; daher ich vermuthet, daß der Vogel wenigstens nicht vor dem zweyten Jahr zur Vollkommenheit gelangt. Diese Art ist in verschiedenen Theilen des nördlichen Europa zu Hause, aber nicht sehr häufig an unsern Küsten; auch sieht man sie niemals gegen Süden, ausser in sehr strengen Wintern ^{o)}. Selten trifft man sie auf dem Lande an ^{p)}, sondern sie hält sich mehrentheils auf der offenen See auf, wo sie beständig nach Fischen untertaucht, welches sie mit großer Geschicklichkeit thut, und zugleich hoch und fertig fliegt. Sie ist gemein in Grönland, in Island und in Spitzbergen ^{q)}, wo sie brütet, und sich um diese Zeit in süßen Wassern aufhält. In Norwegen ist sie in ziemlicher Menge, so wie längs der arktischen Küsten, bis zum Flusse Ob, im Russischen Gebiete. Die Barabinzier, ein zwischen dem Ob und Irtysh wohnendes Volk, gerben die Brüste (breasts) dieses und anderer Wasservögel, deren Häute sie so zuzubereiten wissen, daß die Dunen auf ihnen sitzen bleiben; alsdann nähen sie eine gewisse Menge derselben zusammen, und ihre Männer verkaufen sie

¹⁾ Wird aber von Brisson zu einer eignen Art gemacht. B.

^{m)} Uebers II. S. 480. Nr. 356. B.

ⁿ⁾ Ferner: Phipps Reise nach dem Nordpol. S. 98. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 881. Nr. 5. B.

^{o)} Im Jänner 1795 wurde einer auf dem Rheine geschossen, der sich im Darmstädtschen Museum befindet. B.

^{p)} Ein Vogel dieser Art wurde im Jahr 1781 im Julius, bey Reswick im Cumberland, lebendig gefangen. Er wollte vermuthlich nach dem See fliegen, erlaubete aber ehe er ihn noch erreichen konnte. Dr. Heysham. — Willughby erwähnt Eines, der auf der Insel Jersey gefangen wurde.

^{q)} Phipps Voy. p. 187.

sie, wo dann Pelze, Mützen u. dgl. daraus verfertigt werden. Kleider aus diesen Häuten sind sehr warm, und nehmen nicht die geringste Feuchtigkeits an, sind auch dauerhafter als man glauben sollte ⁷⁾. Man findet diese Vögel auch in den Seen der Hudsons-Bay.

Das Weibchen legt im Junius zwey große hellbraune oder steinfarbene (stone coloured) Eyer. — Sie verändern ihren Aufenthaltsort nach der Jahreszeit. Zuweilen findet man sie in Newyork. Die Grönländer bedienen sich ihrer Häute zu Kleidern, und die Einwohner von Hudsons-Bay schmücken ihre Köpfe mit Kränzen von den Federn dieser Vögel ⁸⁾. Im letztern Lande sind sie unter dem Namen *Athine-moqua* bekannt. Weil man sie selten an den Seeküsten sieht, sondern hauptsächlich auf kleinen Landseen (lakes), so werden sie von den Indianern, Landtaucher (Landbengel: Inland Loons) genannt ⁹⁾.

2. Der Imber-Taucher. (Imber D.)

Colymbus Immer. LIN. I. p. 232. 6. Ed. XIII. I. 2. p. 588. No. 6. ¹⁰⁾ — BRÜNN. orn. No. 129. — MÜLLER Zool. No. 29.

Colymbus maximus Gesneri. RAU Syn. p. 126. No. 8. — WIL. orn. p. 342. Le grand Plongeon. BRISS. orn. VI. p. 105. No. 1. pl. 10. fig. 1. — BUFF. ois. VIII. p. 251. — Pl. enlum. 914.

Imber Goose. SIBBALD SCOT. p. 21. — WALLACE Orkney p. 16. — DEBES Ferr. Isl. p. 138. — PONTOPE. Hist. Norw. vol. II. p. 82.

Imber. Br. Zool. No. 238. pl. 84 ¹¹⁾
Br. Mus. Lev. Mus.

Dieser ist kleiner, als der vorige, und hat über zwey Fuß Länge. Sein Schnabel ist vier und ein Viertel Zoll lang und dunkelbraun; Scheitel und Hinterhals sind braun: die Stirn, die Seiten des Kopfs und des Halses braun gesprenkelt, Rücken und Flügel braun, und jede Feder mit hellerem Braun gerändert; In der Mitte des Halses läuft das Braune sehr weit vorwärts, und umgibt ihn beynähe; über diesem ist der Hals schwarz und weiß gefleckt; ausser diesen Zeichnungen, sind alle untern Theile, vom Kinn bis zum After, weiß; letzterer aber braun gesprenkelt; Schwungfedern und Schwanzbraun, letzterer weiß gerändert; die Füße schwärzlich.

Das Weibchen soll eine nicht so bestimmte Farbe haben, indem es an den obern Theilen bloß braun, an den untern Theilen schmutzig weiß, und überhaupt an den Seiten des Halses kaum etwas gesprenkelt ist. Im Leverschen Museum ist ein Vogel, der mit dieser Beschreibung überein kommt; und in meiner eignen Sammlung ein Anderer von eben dieser Art; ich habe sie aber immer für noch nicht ausgewachsene Vögel gehalten.

Diese

⁷⁾ Russia vol. II. p. 231. — Die mit dem Pfau befetzte Seite wird auswärts getragen. Eben d. vol. III. p. 21.

⁸⁾ Arct. Zool.

⁹⁾ Herr Hutchinson.

¹⁰⁾ Latham Ind. orn. p. 800. n. 2. B.

¹¹⁾ Arct. Zool. II. n. 440. Uebers. II. S. 481. Nr. 357. Martini Naturlex. I. S. 399. Taf. 20. Schriften der Dronth. Gesellsch. I. S. 210. Taf. 3. Fig. 1. 2. Pontoppidan Norweg. II. S. 152. Meine N. S. Deutschl. II. S. 780. Nr. 3. Bonndorfs Zool. Beytr. II. S. 382. Nr. 6. B.

Diese Art ist in den nördlichen Gegenden dieses Königreiches bekannter, als in den südlichen, wo man sie nur in strengen Wintern sieht. Sie hält sich auf der See bey den Orkadischen Inseln, und den Ferreo-Inseln auf. Man findet sie auch in Island und in den meisten Ländern des nördlichen Europa^{w)}, auch in Kamtschatka, aber nirgends sonst in Sibirien und Rußland. Sie ist in der Schweiz zu Hause, besonders am Constanz-See, wo man sie unter dem Namen Flunder kennt. Sie soll bis zum bewundern gut untertauchen, und in einer unglaublichen Entfernung von dem Orte, wo sie untergetaucht hat, wieder hervorkommen. Ihr Nest baut sie ins Schilf und zwischen die Wasserpflanzen (lags), und zwar im Wasser selbst, so daß es beständig naß ist, wie bey einigen Steißfüßen. Sie hat einen lauten, scharfen Schrey, und ist sowohl zu Lande, als wenn sie auf dem Wasser schwimmt, schwer zu bekommen; aber nicht selten wird sie unter dem Wasser, mittelst einer Angel, die mit einem kleinen Fisch, ihrer gewöhnlichen Nahrung, bekörnt ist, gefangen. *).

3. Der gesprenkelte Taucher. (Speckled G.)

Colymbus stellatus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 578. No. 17. y) — BRÜNN. orn. No. 130. — MÜLLER Zool. No. 159.

Colymbus caudatus, stellatus. Nov. Comment. Acad. Petrop. vol. IV. p. 424. — WILL. orn. pl. 62.

Le petit Plongeon. BRISS. orn. VI. p. 108. No. 2. pl. 10. fig. 2. — BUFF. ois. VIII. p. 254. pl. 21. — PL. enlum. 992.

Greatest tailed Diver, or Loon. RAN Syn. p. 125. A. 4. var. ? — WILL. orn. p. 341. pl. 61.

Greatest speckled Loon. Br. Zool. No. 239. — ALBIN Nat. Hist. 1. pl. 82. — Arct. Zool. No. 441. z)

Br. Mus. Lev. Mus. a)

Dieser ist noch kleiner, als der vorige; er wiegt dritthalb Pfund, ist sieben und zwanzig Zoll lang, und drey Fuß, neun Zoll breit. Sein Schnabel ist drey Zoll lang, und ein wenig aufwärts gebogen, von heller Hornfarbe, der Rücken der obern Kinnlade schwärzlich; der Kopf dunkelbraun, mit grauen Punkten; der Hinterhals einfarbig dunkelbraun; die Seiten über den Augen, das Kinn und die Kehle weiß; der Vorderhals sehr hell aschfarben; der Rücken dunkelbraun mit eckunden weißen Flecken; die Seiten der Brust und des Körpers eben so, aber mit kleinern Flecken; die Flecken am Steiß und Schwanz sind ganz klein; die Brust und die untern

w) Man trifft sie auch an den deutschen Küsten an. B.

x) Zuweilen wird sie zwanzig Ellen tief unter dem Wasser gefangen, nämlich mit einem Netz, oder einer eisernen Angel, die mit einem Fisch bekörnt ist. — Ein Vogel wird gewöhnlich für dritthalb Silber; Drachmen verkauft. Willughby.

y) Latham Ind. orn. II. p. 800 n. 3. B.

z) Uebers. II. S. 481. Nr. 358. B.

a) Naturforscher XXV. S. 9. Nr. 2. Scopoli Bemerk. aus der N. G. I. S. 80. Nr. 93. Meine N. G. Deutschlands. II. S. 779. Nr. 2. Pontoppidan N. G. von Dänemark. S. 169. Nr. 2. Bonnors Zoöl. Beytr. II. S. 880. Nr. 17. B.

untern Theile weiß; die Schwungfedern dunkelbraun; die Füße braun; Schwimmhäute und Klauen blässer.

Dieser Vogel ist sehr häufig in England, vorzüglich an der Themse, wo er von den Fischern Sardellen-Taucher (Sprat Loon) genannt wird, weil man ihn oft in großer Menge unter den Zügen dieser Fische sieht, nach denen er untertaucht, und sich oft sehr nahe an die Boote der Fischenden hinwagt. Er ist gemein im Baltischen und weißen Meere ^{b)}; in andern Gegenden Rußlands sieht man ihn aber niemals, ob er schon ein Bewohner von Kamtschatka ist. Er legt zwey Eyer ins Gras, an das Ufer der See, nicht weit vom Meer; sie sind vollkommen eyrund, so groß, wie Gänseeyer, dunkelbraun, mit einigen wenigen schwarzen Flecken ^{c)}.

Man sieht diese Vögel auch häufig an den Fischteichen in Frankreich, ausser wenn sie zu gefroren sind, wo sie sich denn nach den Flüssen hinziehen.

Dieser und die drey letzten besuchen Neuport im Winter, kehren aber sehr weit nach Norz den zurück, um zu brüten.

4. Der schwarzkehlige Taucher. (Black-throated D.)

Colymbus arcticus. LIN. I. p. 221. 4 Ed XIII. I. 2. p. 587. No. 4. d) — Faun.

Suec. No. 140. e) — BRÜNN. orn. No. 133. — MÜLLER Zool. No. 154. —

RAH Syn. p. 125. No. 7. — Arct. Nidr. vol. I. p. 140 tab. 2. fig. 1.

Le Plongeon à gorge noire. BRISS. orn. VI. p. 115. No. 4.

Le Lumme, ou petit Plongeon de la mer du Nord. BUFF. ois. VIII. p. 261.

Wormius's Northern Doucker. WILL. orn. p. 343. pl. 62.

Speckled Loon. EDW. Nat. Hist. pl. 146. f)

Black-throated Diver. BR. Zool. II. No. 241. pl. 85. fig. 2. — Arct. Zool. No. 444. g)

Lev. Mus. h)

Dieser misst zwey Fuß in der Länge. Sein Schnabel ist fast zwey Zoll lang, dünn, und schwarz; der vordere Theil des Kopfs und die Kehle sind schwarz; der hintere Theil des Kopfs und des Halses aschfarben; die Seiten des Leiberns weiß, mit schwarzen Flecken; am Vorderhals ist ein großer, schwarzer, fünf Zoll langer Fleck, der bey verschiedenem Licht ins Purpurrothe

b) Auch auf dem Schwanensee ohnweit Erfurt hält er sich alle Jahre auf. B.

c) Arct. Zool.

d) Latham Ind. orn. II. 800. n. 4. B.

e) Linné Iter goth. 341. Der schwarzkehlige Taucher in der Gothländischen Reise hat zwar einen weißen Halstügel, aber auch das rothe Fleck von rothkehligen Taucher, und scheint auch in Ansehung der Rückenfarbe ein Bastard zu seyn. B.

f) Seligmanns Vögel V. Taf. 41. B.

g) Hebers. II. S. 482. Nr. 361. B.

h) Pallas nord. Beytr. IV. S. 22. Naturforscher XII. S. 140. Nr. 94. Linné's auserlesene Abb. II. S. 282. Nr. 26. S. 293. Nr. 82. Lepechin Tageb. der Russ. II. III. S. 14. Meine R. S. Deutschlands II. S. 778. Pontoppidan R. S. von Dänemark. S. 169. Nr. 1. Schriften der Dronth. Gesellschaft. I. S. 205. Taf. 2. Fig. 2. Donnis dorf's Zool. Beytr. II. S. 878. Nr. 4. B.

Sechs und achtzigste Gattung. Taucher.

307

the und Grüne spielt, der Rücken und die obere Theile sind schwarz, die Schulterfedern mit viereckigen, weißen Flecken bezeichnet; die Deckfedern der Flügel eben so, aber mit runden Flecken; Brust und Bauch weiß; die Schwungfedern dunkelbraun; der Schwanz kurz und schwarz; die Füße schwarz, mit einem rothen Anstrich an der innern Seite.

Man trifft ihn hier und da in England an, er ist aber nicht gemein ¹⁾. Nämlich häufig ist er in den nördlichen Ländern Europas, in Norwegen, Schweden und Dänemark. Er besucht die Seen im Innern von Sibirien, besonders die der Arktischen Gegenden. Er ist auch in Island, Grönland und auf den Ferroe-Inseln, so wie in Amerika auf Hudsons-Bay zu Hause ²⁾. Bey Annäherung des Regens soll er schreyen, sehr unruhig seyn, und einen großen Lärm machen ³⁾; daher es die Norweger für sündlich halten, ihn zu töden ⁴⁾; die minder abergläubischen Schweden hingegen, bearbeiten seine Häute, die, wie alle dieser Gattung, außerordentlich dauerhaft (tough) sind, und bedienen sich derselben zu Büchsenfässen und zum Verbrämen der Wintermützen ⁵⁾.

5. Der rothkehlige Taucher. (Red-throated D.)

Colymbus septentrionalis. LIN. I. p. 220. 3. Ed. XIII. I. 2. p. 586. No. 3. ^{a)} —

BRÜNN. orn. No. 132. — MÜLLER. Zool. No. 153.

Colymbus arcticus, collo rufo. Arct. Nidr. vol. I. p. 244. tab. 2. fig. 2.

Le Plongeon à gorge rouge. BRISS. orn. VI. p. 111. No. 3. pl. 11. fig. 1. — Pl. enlum. 308.

Red-throated Loon. EDW. Nat. Hist. pl. 97. ^{o)}

— — — DIVER. Br. Zool. No. 240. pl. 85. fig. 1. — Arct. Zool. No. 443. ^{p)}

Br. Mus. Lev. Mus. ^{q)}

Dieser wiegt drey Pfund, und ist zwey Fuß, fünf Zoll lang. Sein Schnabel ist drey Zoll lang, dünn und schwarz; der Kopf und das Kinn sind aschgrau, mit braunen Lippen; der übrige Kopf, die Seiten des Halses und das Kinn aschfarben; der Hinterhals nach der Länge dunkelbraun und weiß gestreift; die Kehle und ein Theil des Halses schön kastanienroth; von da an alle untern Theile weiß; die obere Theile, die Flügel und der Schwanz dunkelbraun; erstere mit einigen wenigen weißen Flecken; der letztere einfärbig; die Schenkel dunkelbraun und weiß gestreift; die Füße dunkelbraun, mit einem röthlichen Anstrich an einigen Stellen.

Den rothkehligen Taucher sieht man, wie den schwarzkehligen (No. 4), selten gegen Süden, außer in strengen Wintern. Er brütet in den nördlichen Gegenden von Schottland,

N q 2

an

^{d)} In Deutschland habe ich ihn nur im Frühjahr auf den Seen und Teichen bemerkt. Es schien als wenn er allzeit auf den Rückzug nach Norden begriffen wäre. B.

^{e)} EDWARDS.

^{f)} AMOEN. Acad. vol. IV. p. 587.

^{g)} ARCT. Zool.

^{h)} FAUN. Suec.

ⁱ⁾ LATHAM Ind. orn. II. 801. n. 5. B.

^{j)} SELIGMANN'S Vögel IV. Taf. 69. B.

^{k)} UEBERS. II. S. 482. Nr. 360. B.

^{l)} FERNER: Schriften der Berl. Gesellsch. VII. S. 459. Nr. 35. Schriften der Dronth. Gesellsch. I. S. 203. Taf. 2. Fig. 1. Pontapidon N. G. von Norwegen II. S. 158. Mit 1 Kgl. Scheffer Lappi. S. 334. Leem's Nachr. von den Lappi. S. 142. DUNN, Dorfs Zool. Deytr. II. S. 344. Nr. 5. B.

an den Ufern der Seen. Er findet sich in Rußland, Sibirien und Kamtschatka, besucht aber die Seen des innern Landes nicht ¹⁾. Er ist gemein in Island und Grönland, wo er im Junius brüet, und zwey aschfarbene, mit einigen schwarzen Flecken bezeichnete Eyer legt, die länger und schmäler als Hühnereyer sind. Das Nest macht er ins Gras, an die Küsten; es besteht aus Moos und Gras, und steht nahe am Wasser. Er schwimmt, taucht und fliegt gut. Im Fliegen ist er sehr laut. Er hält sich mehr in süßen Gewässern, als in der See auf. Seine Nahrung sind kleine Fische, Krabben und Seeinsekten. Seine Haut benützt man eben so, wie die des vorhergehenden. Er ist im Sommer an den Flüssen der Hudsons-Bay zu Hause, und erscheint sobald als die Flüsse offen sind. Die Eyer legt er im Junius, und das Nest polstert er mit ein wenig Dunen von seiner eigenen Brust aus. — Die Jungen fliegen noch vor Ausgang Augusts aus, und im September ziehen alt und jung weg. Die Einwohner nennen sie Assée-moqua. Sie machen auf die Fische, die sich in den Netzen gefangen haben, Jagd, werden aber oft selbst dabei gefangen ²⁾.

6. Der gestreifte Taucher. (Striped D.)

Colymbus striatus. Linn. Ed. XIII. I. 2. p. 586. No. 16. ¹⁾

Striped Diver. Arct. Zool. No. 442. ²⁾

Sein Gewicht ist zwischen zwey und drey Pfunden. Der Schnabel ist stark, drey Zoll lang und schwarz; Kopf und Hals lichtgrau, mit regelmäßigen, langen, schmalen, abwärts laufenden schwarzen Strichen; der Rücken und die Schulterfedern von einer dunklern Farbe: die großen Schwungfedern, der Schwanz und die Füße dunkelbraun; die Wangen und die ganze untere Seite des Körpers sind glänzend weiß.

Er hält sich auf den Seen des Innern der Hudsons-Bay auf, bey hundert Meilen südwärts von York-Fort, und legt im Junius zwey Eyer. Er fliegt hoch, und bewegt sich vorwärts und rückwärts, wobey er ein großes Geschrey macht, das Regen bedeuten soll. Die Einwohner verabscheuen ihn, weil sie diese Stimme für übernatürlich halten ³⁾. Auf Hudsons-Bay wird er Mathe-moqua genannt ⁴⁾.

7. Der Chinesische Taucher. (Chinese D.)

(s. die hundert und vierte Kupfertafel.)

Colymbus sinensis L. I. 2. p. 586. No. 15. ⁵⁾

Seine Größe ist unbestimmt ⁶⁾. Der Schnabel ist schwärzlich; die obere Theile des Kopfs, des Halses und des Körpers, die Flügel und der Schwanz sind dunkel grünlichbraun, die

¹⁾ Arct. Zool.

²⁾ Vierzehn sind in einem einzigen Netz, auf einen Zug gefangen worden. Hr. Hutchins. — Die andern Arten von Tautchern werden auf die nämliche Art gefangen.

³⁾ Latham Ind. orn. II. p. 802. n. 7. B.

⁴⁾ Uebers. II. S. 481. Nr. 359. B.


⁵⁾ Arct. Zool.

⁶⁾ Herr Hutchins.

⁷⁾ Latham Ind. orn. II. 345. n. 7. B.

⁸⁾ Auf der Zeichnung war die Länge vierzehn Zoll.

Tab. 104



Der Chinesische Taucher.



die Mitte der Federn viel dunkler; der Vorderhals eben so, aber beträchtlich heller; das Kinn hell gelbroth; die Brust und die untern Theile des Körpers gelbröthlich weiß, mit dunkelgelbrothen Flecken bezeichnet; Schwungfedern und Schwanz einfarbig braun; letzterer kurz; die Füße aschfarben.

Ich vermuthete, er sey in China zu Hause, weil ich ihn unter andern schön gemalten Zeichnungen bey Herrn Joseph Banks gesehen habe; er war in der Stellung eines nach Fischen jagenden Vogels mit einem messingnen Ring (brass-ring) um die Mitte des Halses, wie ihn die Abbildung zeigt.

Aus den mancherley unvollkommenen Berichten der Schriftsteller, bin ich ungewiß, welcher Vogel sich die Chineser zum Fischefang bedienen ^{a)}. Inzwischen ist die Thatfache aus den Erzählungen vieler Reisenden bekannt. Der Vogel, den sie hierzu brauchen, hat einen Ring um die Mitte des Halses befestigt, damit er die Fische nicht verschlingen kann; ausser diesem ist noch eine lange dünne Schnur an ihn angebracht; und so nimmt ihn sein Herr mit in das Fischerboot, von dessen Rande aus er nach den Fischen, die vorbey schwimmen, ins Wasser zu tauchen gelehrt wird; und da nun der Ring verhindert, daß die Fische weiter in den Schlund hinunter schlüpfen können, so werden sie aus dem Schnabel des Vogels genommen, sobald er sie gefangen hat. Auf diese Art wird oft eine große Menge Fische in Zeit von wenig Stunden gefangen. Wenn der Besitzer des Vogels genug für sich hat, so wird der Ring aufgemacht, und dem armen Sklaven erlaubt, nun auch seinen Hunger zu stillen ^{b)}.

Ich gebe hier diesen Vogel nicht für den aus, dessen man sich am gewöhnlichsten zu diesem Endzweck bedient; ich hielt es aber für gut, ihn abzubilden, wo nicht als eine neue, doch zum wenigsten als eine nicht allgemein bekannte Art; und aus der Stellung desselben in der Abbildung wird es wahrscheinlich, daß er einer von den Vögeln sey, die man zu dieser Absicht braucht.

Z u s a m m e n f a s s u n g.

8. Der nördliche Taucher.

Colymbus borealis. LATHAM Ind. orn. II. 801. n. 6. BRUN. No. 131.

Es ist noch ungewiß, ob er eine eigene Art ausmacht; denn er ist an Gestalt, Größe und Farbe dem gefleckten sehr ähnlich. Der Oberleib ist schwärzlich mit sehr vielen sternförmigen weißen Flecken; der Unterleib weiß; der Vorderhals fuchsroth, fast gar nicht gefleckt.

Er wurde bey Kopenhagen geschossen.

N o 3

9. Der

^{a)} Man giebt den Kormoran (*Pelecanus Carbo* Lin.) für einen solchen Vogel aus. s. unten Nr. 13. B.

^{b)} Eine Beschreibung dieser Methode zu Fischen, s. in du Halde Hist. Chin. — Osbeck

Voy. vol. II. p. 35. — Salmon Mod. Hist. vol. I. p. 18. — Will. orn. p. 329. und viele andere Schriftsteller, — Zu weiterer Belehrung über diesen Gegenstand, s. den Artikel Kormoran. unter Gen. 94. Spec. 13.

9. Der unbekannte Taucher.

Colymbus ignotus. *Meine N. G. Deutschlands II. S. 782. Nr. 4.*

Wenn nicht Größe und andere Merkmale ihn noch zu sehr unterschieden, so würde ich ihn für den *Imber-Taucher*, und zwar für das Weibchen desselben halten. Ich kann dieß nicht genau bestimmen, da ich letzteres nicht gehörig kenne. Der Schnabel ist 2 Zoll lang, gerade, vorn abgestumpft, oben schwarzgrau, unten weißlich; die Augen sind dunkelbraun; die Füße schwärzlich; die Schwimmhaut weißlich; der hochstehende Hinterzehe mit einem kleinen Lappchen und einem scharfen Nagel. Kopf und Hals haben oben eine schmutzig röthlich-ashgraue Farbe; der Rücken und die Deckfedern der Flügel sind schwärzlich mit ashgrauen Rändern, wodurch diese Theile ein gewölkttes Ansehen bekommen; die Seiten des Halses ashgrau, und weiß eckig gefleckt; der Unterleib silberweiß, der Hals röthlich bespritzt; die Seiten ashgrau; die Schwung- und Schwanzfedern schwärzlich, letztere mit weißgrauen Rändern; der Flügelrand, so wie die innern Deckfedern der Flügel weiß. Die Größe ist wie die einer *Bisamente*, 1 Fuß 9 Zoll (Pariser Maas); der Schwanz dritthalb Zell lang.

Er ist sehr scheu und besucht im Winter die Thüringischen offenen Flüsse und Teiche. Die Federn sind wahre Dunen.

B.

Sieben und achtzigste Gattung. Verkehrt Schnabel.

Der Schnabel dieser Gattung ist stark zusammengebrückt; die untere Kinnlade viel länger, als die obere. Die Nasenlöcher sind linsenförmig und offen. Die Beine dünn; die Hinterzehe sehr klein. Der Schwanz gabelförmig.

1. Der schwarze Verkehrt Schnabel. (Black Skimmer).

(s. das Titellupfer.)

Rhynchops nigra. LIN. I. p. 228. n. 1. Ed. XIII. I. 2. p. 611. No. 1. c)

Le Bec-en-ciseaux. BRISS. orn. VI. p. 223. No. 1. pl. 21. fig. 2. — BUFF. ois.

VIII. p. 454. Pl. 36. — Pl. enlum. 357.

Coupeur d'Eau. FERMIN Surin. vol. II. p. 291.

Bec-de-hache, ou Pied rouge. Hist. Louis. vol. II. p. 117.

Avis novaculae facie, the Sea-Crow. RAI Syn. p. 194. No. 5. pl. 1. fig. 5. —

PETIVER. Gazophyl. tab. 76. fig. 2. (der Schnabel). — EDW. Nat. Hist. pl. 281. d) (der Schnabel).

Cut.

c) Latham Ind. orn. II. p. 802. n. 1. B.

d) Seligmanns Vögel IV. Taf. 80. B.

Sieben und achtzigste Gattung. Verkehrt Schnabel.

307

Cut-water. CATESBY Carol. vol. I. pl. 90. — Arct. Zool. No. 445. e)
Br. Mus. Lev. Mus. f)

Er hat die Größe des schwarzen Lächerhuhns e), zwanzig Zoll in der Länge, und drey Fuß, sieben Zoll in der Breite. Sein Schnabel ist von sonderbarem Bau, indem die obere Kinnlade um einen Zoll kürzer ist, als die untere, welche letztere fünfsechszahl Zoll lang ist, beyde Kinnladen sind an den Seiten stark zusammengedrückt; die obere legt sich in die untere hinein, wie ein Scheermesser in sein Futteral, und beyde sind an den Rändern sehr scharf; die Wurzel des Schnabels ist roth, und an den Seiten der untern Kinnlade sind verschiedene Furchen; die Stirn, das Kinn und alle untern Theile sind weiß; der übrige Kopf und die obern Theile des Körpers, nebst den Flügeln, dunkelschwarz; queer über die Flügel läuft ein weißer Streifen; der Schwanz ist viel kürzer, als die Flügel, und gabelsförmig, seine zwey mittlern Federn schwarz, die nächste zu beyden Seiten eben so, und auswärts weiß gerändert; die vier äußern weiß, längs den Schäften herab schwärzlich gestreift, am geringsten an der äußersten; die Füße schwach, und roth; die Klauen schwarz.

Männchen und Weibchen sind beyde überein. Einige sind braun, statt schwarz, und das Weiße an den untern Theilen ist nicht so rein.

Dieser Vogel ist in Amerika, von Neuport bis Guiana, Cayenne und Surinam zu Hause; und nach Ray auch in Ostindien. Er ist gewöhnlich im Fluge, und berührt die Oberfläche des Wassers, in das er beständig seinen Schnabel taucht, um kleine Fische, die seine Hauptnahrung ausmachen, aufzufangen. Bey stürmischen Wetter sucht er die Küsten, und lebt von Austern und andern Schalthieren, die er, vermöge der Form seines Schnabels, öffnen kann. Zu Madras wird er Ceddel Cauka oder Summoondra Cauky; zu Guiana, Tapatana; und zu Neuport, Stippog genant b). Einige nennen diese Vögel auch Scheermesserschnäbler (Razor-bills).

I. Bar A. Rhynchops fulva rostro nigro. LATHAM Ind. orn. II. p. 805. β. i)
Le Bec-en-ciseaux fauve. BRISS. orn. VI. p. 227. A. k)

Dieser unterscheidet sich von letzterm dadurch daß bey ihm diejenigen Theile rothgelb sind, welche bey jenem schwarzbraun sind; ausserdem aber kommt er vollkommen mit ihm überein.

Es ist in Guiana zu Hause.

e) Uebers. II. S. 483, Nr. 362. B.

f) Meine N. S. Deutschlands II. S. 175.
Donndorfs Zool. Beytr. III. S. 932.
Nr. 1. B.

g) Black Guillemot. S. oben S. 279. Nr. 3.

h) D. Vlagden.

i) Rhynchops fulva. Lin. Syst. I. p. 229. n. 2.
Gmelin, Lin. I. 2. p. 611. n. 2. Hier wird
er für eine besondere Art angenommen. B.

k) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 933,
Nr. 2. B.

Acht und achtzigste Gattung. Meerschwalbe.

Die Vögel dieser Gattung haben einen geraden, dünnen, spitzigen, etwas zusammengedrückten Schnabel; linienförmige Nasenlöcher; eine dünne und spitzige Zunge; sehr lange Flügel; eine kleine Hinterzehe; und einen gabelförmigen Schwanz.

I. Die Kaspische Meerschwalbe. (Caspian Tern).

Sterna caspia. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 603. No. 8. *l*) — PALLAS in Nov. Comment. Acad. Petrop. vol. XIV. p. 582. No. 5. tab. 22. fig. 2.

Sterna Tschegrava. LEPECHIN in Nov. Comment. Acad. Petrop. I. c. p. 500. No. 2. tab. 13. fig. 2.

Caspian Tern. Arct. Zool. p. 526. B. *m*)

Ihre Länge ist ein Fuß, zehn und ein halber Zoll, und ihre Breite drei Fuß, zwei Zoll. Der Schnabel ist karmoisinroth; der Augenstern von matterer Farbe; die Stirn, der Scheitel, der Hinterkopf und die Augenfreize sind dunkelschwarz, hier und da weiß punktiert, und am untern Augenlied ein kleiner, weißlicher Halbmond; der Hinterhals und alle obern Theile des Körpers sind schimmelgrau; die Seiten des Halses, der Vorderhals und alle untern Theile des Körpers, der Steiß und der Schwanz weiß wie Schnee; letzterer gabelförmig; die ersten sechs Schwungfedern dunkelashfarben, mit schwärzlichen Rändern und Spitzen, die andern wie der Rücken; die Füße schwarz.

Bei der von Pallas beschriebenen, waren die Aflerflügel mit pfeilsörmigen, schwarzen Flecken bezeichnet, und die Füße röthlichbraun *n*).

Diese ist sehr häufig auf dem Kaspischen Meere und den anliegenden Gegenden, an der Mündung der Taur; zu Zeiten wandert sie auf den großen Ob-Ström, selbst gegen das Eismeer hin *o*). Sie fischet sowohl auf dem Meer, als in den Flüssen, fast auf einerley Art, wie

l) Latham Ind. orn. II. p. 803. n. 1. B.

m) Ueberf. II. S. 487. B. — Vergl. ferner: Pallas Reise. I. S. 429. II. S. 471. Desisen Auszug I. S. 370. Neue Schwedisch-Abh. III. S. 221. Meine N. S. Deutschlands II. S. 825. Nr. 1. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 917. Nr. 8. B.

n) In Sparrmanns Museum Carlsonianum Fasc. III. n. 62. wird einer Bartetät gedacht, welche der Hr. Verfasser für ein Junges hält. Sie ist es auch, aber ohngefähr im zweyten Jahre. „Der Schnabel ist weiß; der Oberkopf schwarz und weiß gefleckt; die Gegend um die Augen schwarz; der Rücken und die

Flügel aschgrau; die vordern Schwungfedern an den Spitzen schwarz.“ Folgendes ist die Zeichnung der Jungen: Die ganz Jungen sind unten weiß, oben schwarz und braun gefleckt; die ältern sind bis ins dritte Jahr auf den Scheitel nicht rein schwarz, sondern entweder mit weiß gesprengt oder grös überlaufen. Auch der Rücken ist bis zu diesem Alter aschgrau und grös. B.

o) Häufig auf der Insel Stübber in der Ostsee; auch habe ich in Thüringen auf einem großen Teich im Frühjahr 1791 ein Paar angetroffen. B.

Acht und achtzigste Gattung. Meerschwalbe.

309

wie die schwarzköpfige Meve ^{p)}). Zu Zeiten scheinen diese Vögel gleichsam in der Luft zu hängen, und dann schließen sie aber auf einmal ins Wasser nach den Fischen herab; manchmal berühren sie aber bloß die Oberfläche des Wassers, wie die Schwalben. Sie mischen sich auf den Felsen unter die Meven. Sie legen zwey ziemlich große, braune, gefleckte Eyer ^{q)}). Ihre Stimme gleicht dem Lachen eines Menschen. Die Russen nennen sie Tschegrava.

1. Var. A. *Sterna caspia* L. I. 2. p. 603. No. 8. β. 1)
Br. Mus.

Sie hat die Größe der Heringss-Meve ^{r)}), und ein und zwanzig Zoll Länge. Ihr Schnabel ist stark, vierthalb Zoll lang, und dunkelroth; der Scheitel und die Seiten des Kopfs, mit Einschluß der Augen, sind schwarz, mit weißen Flecken; der übrige Kopf, der Hals und die untern Theile weiß; der Rücken schimmelgrau; die Schwungfedern hellgrau, mit weißen Schäften; an den Schulterfedern stehen einige wenige schwärzliche Flecken; der Schwanz ist kurz und gabelförmig, am Ende mit einigen wenigen schwärzlichen Streifen durchzogen; und um vierthalb Zoll kürzer, als die Flügel; die Füße schwarz.

Sie ist in Bombay zu Hause. Die Indier nennen sie Talla.

1. Var. B. *Sterna caspia* L. I. 2. p. 603. No. 8. γ. 1)
Br. Mus. 2)

Ihre Länge ist neunzehn oder zwanzig Zoll. Der Schnabel ist drey Zoll lang, stark und hellgelb, die Nasenlöcher sind durchsichtig; der Scheitel schwarz, die Federn etwas lang, und bilden eine Art von herabhängenden Federbusch am Nacken; der übrige Kopf, der Hals und die untern Theile des Körpers weiß; der Rücken und die Flügel hell aschgrau; die Schwungfedern grau, mit dunkelbraunen Endfäulen; die innern Fahnen, zur Hälfte von der Wurzel an, weiß; der Schwanz grau, und gabelförmig, die Endhälfte der äußern Federn weiß; die Schäfte der Schwungfedern und des Schwanzes weiß; dieser um einen Zoll kürzer, als jene; die Füße schwarz.

Vermuthlich ist sie in China zu Hause. Die nämliche, oder eine ihr sehr ähnliche, habe ich auch von den Freundschaftlichen Inseln, in der Südsee gesehen. Sie wird auch auf Hapae, einer der Sandwich-Inseln, angetroffen ^{v)}).

2. Die

p) Black-headed Gull. s. die folgende Gattung Nr. 2. *Larus marinus*. L.

q) Sie legen zwey bis drey Eyer, von der Größe der Hühnereyer, in den Sand; diese sind weiß, mit dunkelbraunen und schwarzen, sparsam, doch ordentlich gestreuten Flecken. B.

r) Latham l. c. β. B.

s) S. die folgende Gatt. Nr. 3. *Larus fuscus*. L.

t) Latham l. c. γ. B.

u) Caspian Tern. Phill. Voy. p. 160. t. p. 177. B.

v) Herr Latham macht im Ind. orn. die von Sparrmann im Mus. Carls. oben angegebene Jungen zu einer besondern Varietät. l. c. δ. B.

2. Die Cayennische Meerschwalbe. (Cayenne T.)

Sterna cayennensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 604. No. 9. x)

La grande Hirondelle de Mer de Cayenne. BUFF. ois. VIII. p. 346. — PL. enlum. 988.

Ihre Länge ist sechzehn Zoll. Der Hinterkopf schwarz; die obern Theile des Gefieders grau, und die Federn hell gelbroth gerändert; die untern Theile des Körpers weiß.

Sie ist in Cayenne zu Hause.

3. Die Surinamsche Meerschwalbe. (Surinam T.)!

Sterna surinamensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 604. No. 10. y)

Greater Tern. FERMIN Surin. vol. II. p. 187.

Ihre Größe ist nicht angegeben ²⁾. Schnabel, Kopf, Hals und Brust sind schwarz; der Rücken, die Flügel und der Schwanz aschfarben; Bauch und Schenkel schmutzig weiß; Beine und Füße roth; die Klauen schwarz.

Sie ist in Surinam zu Hause, läßt sich aber oft zwey hundert Meilen von der See sehen. Ihr gewöhnliches Futter sind Fische, und sie verfolgt oft die kleinern Meerschwalben, damit sie das wi der von sich gehen, was sie verschlungen haben, das sie dann als eine rechtmäßige Beute weghascht ³⁾. Ich habe einen Vogel dieser Art in einer aus Cayenne gekommenen Sammlung gesehen, der sich blos durch einen gelbrothen Aster auszeichnete. Seine Größe war die der dummen Meerschwalbe ⁴⁾.

4. Die rußschwarze Meerschwalbe. (Sooty T.)

Sterna fuliginosa LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 605. No. 11. c)

L'Hirondelle de Mer à grande envergure. BUFF. ois. VIII. p. 345.

Egg-bird. FORST. Voy. vol. I. p. 113. — COOK'S Voy. vol. I. p. 66. 275. d)

Noddy. DAMPIER Voy. vol. III. part. I. p. 142. pl. in. p. 123. fig. 2. — HAWKES-

WORTH Voy. vol. III. p. 652.

Sooty Tern. ARCT. Zool. No. 547. e)

LEY. MUS.

Sie

x) *Sterna Cayana*, Latham Ind. orn. II. 804. n. 2. B.

y) Latham Ind. orn. II. 804. n. 3. B.

z) Im Ind. orn steht, wie auch unten bemerkt ist, daß sie von der Größe der dummen Meerschwalbe sey. B.

a) Wenn man aus diesem Umstande nicht schließen mußte, daß es ein Vogel von beträchtlicher Größe sey, so sollte man sie für die schwarze

Meerschwalbe (s. unten No. 22. *St. fuscipes*. L.) oder für eine Spielart von derselben halten.

b) Noddy Tern. s. unten No. 6. *St. stolidus*. L.

c) Latham Ind. orn. II. p. 804. n. 4. B.

d) Der Eyvogel. Forsters Netze Ed. 8. I. S. 119. B.

e) Uebers. II. S. 485. Nr. 364. B.

Acht und achtzigste Gattung. Meerschwalbe.

311

Sie hat die Größe der dummen Meerschwalbe (No. 6), und sechzehn Zoll Länge. Ihre Schnabel ist zwey und ein Viertel Zoll lang, und schwarz; die Stirn ist weiß, und dieß läuft zu beyden Seiten nach dem obern Theil des Auges hin, wo es sich in eine Spitze endigt; zwischen den Augen ist ein schwarzer Streifen, der nach dem Hinterkopf hingehet; der Scheitel, der Nacken, der Hinterhals, alle obern Theile, die Flügel und der Schwanz sind rußschwarz; die untern Theile, vom Rinn an, weiß, das sich am untern Theil des Halses ein wenig nach hinten hinziehet; die untern Deckfedern der Flügel und der innere Flügelrand sind weiß; die Schwungfedern dunkel gräulich schwarz; der Schwanz gabelförmig, die äußere Fahne der äußersten Feder weiß, ausser an der Spitze; die Schäfte der Schwungfedern und des Schwanzes sind unten weiß; die Füße schwarz.

Diese Art scheint sehr weit verbreitet zu seyn, da sie unsere Reisenden in verschiedenen Ländern angetroffen haben. Herr Ashton Lever erhielt sie von Newyork, woher ich auch eine in der Sammlung des Capitans Davies gesehen habe; so wie in einer andern Sammlung eine dritte, die von Capenne kam. Auf der Insel Ascension wohnen diese Vögel in ungeheurer Menge. Dampier hat sie an der Küste von Neuholland, und in großer Menge auf den Roca-Inseln, bey Fortuga, angetroffen ^{f)}, wo er die Nester gesehen hat; und unsre letzten Weltumsegler haben sie zwischen Neu-Süd-Wales und Neuguinea vorgesunden, wo sich eine auf der Schiffsrüstung (rigging) niederließ ^{g)}. Sie ziehen auch zuweilen weiter südwärts, denn man hat sie im 48. 38. Grad der Breite bemerkt ^{h)}. Die meisten Matrosen versichern, daß diese und die dumme Meerschwalbe (Nr. 6.), wenn man sie zur See gewahr wird, die Nähe des Landes anzeigen, und sich selten über siebenzig oder achtzig Meilen davon entfernen; Capitän Cook aber sagt, man dürfe sich nicht immer auf dieses Zeichen verlassen ⁱ⁾. Das Exemplar in meiner Sammlung kam von der Weihnachts-Insel, wo sie schaaarenweise sich aufhalten. Sie legen ein einziges Ey ^{k)} auf die bloße Erde, im Monat December, und bauen kein Nest.

5. Die Afrikanische Meerschwalbe. (African T.)

Sterna africana. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 605. No. 12. A)

Br. Mus.

Sie hat die Größe der letztern. Der Schnabel ist schwarz; die Hauptfarbe des Gefieders weiß; der Scheitel schwarz gesprenkelt; die Flügel hell bläulichweiß, ins bleyfarbene spielend, und braun gefleckt; die Schwungfedern hell blaugrau, mit weißen Rändern, die Enden der äußersten ausgenommen; die Flügel sind länger, als der Schwanz, der gabelförmig ist; die Ränder seiner Federn sind dunkelbraun, weiß gesprenkelt; die Füße schwarz.

Sie wohnt in Afrika.

Nr 2

6. Die

f) Voy. vol. III. part. 1. 143. — vol. I. p. 53.

g) HAWKESW. Voy. vol. III. p. 652.

h) FORST. Voy. vol. I. p. 113. — Cook's Voy. vol. I. p. 66.

i) Voy. vol. I. p. 275.

k) Dieß ist nach dem Ind. orn. gelblich mit dunkelbraunen und blaß violetten Flecken besetzt. D.

l) Latham Ind. orn. II. 805. n. 6. D.

Neunte Ordnung. Schwimmvögel.

6. Die dumme Meerschwalbe. (Noddy T.)

Sterna stolidus. LIN. I. 227. 1. Ed. XIII. I. 2. p. 605. No. 1. ^{m)} — Amoen. Acad. vol. IV. p. 240.

Le Fou. Hist. de la Louis. vol. II. p. 129.

La Mouette brune. BRISS. orn. VI. p. 199. No. 15. pl. 18. fig. 2. — Pl. enl. 997.

Le Noddi. BUFF. ois. VIII. p. 461. pl. 37.

Passer stultus, Foolish sparrow. RAI Syn. p. 254. — WILL. orn. p. 385.

Noddy. RAI Syn. p. 132. No. 10. p. 190. No. 2. — SLOANE Jam. vol. I. p. 31.

pl. 6. fig. 2. — BROWN Jam. p. 481. — CATESBY Carol vol. I. p. 88. —

DAMP. Voy. vol. III. part. 1. pl. in p. 123. fig. 6. — Arct. Zool. No. 446. ⁿ⁾

Lev. Mus. o)

Sie hat die Größe der schwarzköpfigen Meve ^{p)}, ist funfzehn Zoll lang, und vier Unzen schwer. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang, dünn und schwarz; das ganze Gefieder rußbraun, den Scheitel ausgenommen, der weiß ist, und am Hinterkopf ins Aschfarbene spielt; Schwungfedern und Schwanz sind dunkler als die übrigen Theile; die Füße schwarz.

Dieser Vogel wird sehr häufig zur See angetroffen; aber selten anderswo, als innerhalb der Wendezirkel. Er soll auf den Bahama-Inseln brüten, und seine Eyer auf den kahlen Felsen legen; so auch auf den Roca-Inseln, in verschiedenen Gegenden der Küste von Brasilien, und in Cayenne. Er fliegt häufig am Bord der Schiffe, wo man ihn mit der Hand fangen kann; ob er aber gleich so dumm zu seyn scheint, so beißt er doch mit dem Schnabel heftig in die Finger, und kratzt mit den Klauen, so daß es für eine zarte Haut nicht rathsam ist, ihn zu greifen. Wenn diese Vögel schaarenweise herum fliegen, besonders zur Brütezeit, so sind sie sehr laut. Man hat mir auch gesagt, sie legten ihre Eyer in großer Menge auf gewisse kleine, felsige Inseln, ohnweit St. Helena, und die Eyer seyen gut zu essen. — Einige Reisenden versichern, die Erblickung dieses Vogels zur See, zeige das nahe Land an; Andre hingegen behaupten das Gegentheil ^{q)}. Wegen ihrer Dummheit nennen sie die Matrosen Dummkopf (Noddy). Auf Otaheite kennt man sie unter dem Namen Diyo.

7. Die fire Meerschwalbe. (Simple T.)

Sterna simplex. L. I. 2. p. 606. No. 13.

Sie hat die Größe der vorhergehenden, und ist funfzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist fast drey Zoll lang, stark und von röthlicher Farbe; der Scheitel beynah weiß; die obern Theile des Halses und Rückens sind hell bleifarben, die untern weiß; hinter jedem Auge ist ein schwarzer Fleck; die kleinern Deckfedern der Flügel, die Schulterfedern und der Schwanz sind wie
der

^{m)} Latham Ind. orn. II. 805. n. 6. B.

ⁿ⁾ Uebers. II. S. 484. Nr. 363. B.

^{o)} Seligmanns Vögel IV. Taf. 76. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 919. Nr. 9. B.

^{p)} Black-cap Gull. s. die folgende Gattung No. 9. *Larus ridibundus*. L.

^{q)} Cook's Voy. Vol. I. p. 275. — Catesby Carol. vol. I. p. 88. Dieser letzte Schriftsteller hat sie über hundert Meilen vom Lande entfernt angetroffen.

Acht und achtzigste Gattung. Meerschwalbe.

313

der Rücken; die mittlern und die größern Deckfedern weiß, einige der letztern aber haben braune äußere Ränder; die Schwungfedern sind schwarz; der Schwanz ist nur ganz wenig gabelförmig, und um vieles kürzer, als die Flügel; die Füße sind roth.

Die Beschreibung ist von einem Exemplar, das aus Cayenne kam, genommen.

7. Var. A. *Sterna simplex*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 606. No. 13. β 1)

Ihre Länge ist dreizehn Zoll. Der Schnabel ist zwey Zoll lang und schwarz, von der Stirn bis zur Mitte des Scheitels, die Seiten des Kopfs, der Hals rings herum, und alle untern Theile, vom Rinn bis zum After, nebst den untern Deckfedern der Flügel, sind weiß; das Uebrige des Scheitels und der Nacken sind schwärzlich, in eine Spitze auslaufend, und an den Rändern etwas weiß gesprenkelt; der Rücken und die Flügel sind dunkel aschfarben, fast schwarz; die Schäfte der Schwungfedern oben kastanienbraun, unten weiß, eben so die äußere Fahne der ersten Schwungfeder; der Schwanz ist wie der Rücken, aber heller, nicht sehr gabelförmig, und viel kürzer, als die Flügel; die Füße sind schwarz.

Diese flog an den Bord eines Schiffs, auf der Reise von Madeira nach Ostindien.

8. Die Aegyptische Meerschwalbe. (Egyptian T.)

Sterna nilotica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 606. No. 14. — HASSELQ. Iter p. 273. No. 41. 1)

Sie hat die Größe einer Taube. Ihr Schnabel ist schwarz; der Kopf und der obere Theil des Halses sind aschfarben, mit kleinen, schwärzlichen Flecken bezeichnet; die Augenkreise schwarz, mit weißen Lippeln; der Rücken, die Flügel und der Schwanz aschfarben; die äußern Schwungfedern dunkel aschfarben; alle untern Theile weiß; die Füße fleischfarben; die Klauen schwarz.

Sie ist in Egypten zu Hause, wo man sie im Jänner zu ganzen Flügen findet, besonders um Cairo. Sie lebt von Insecten, kleinen Fischen u. dgl. Man sieht sie auch oft unter andern Vögeln, auf dem Schlamm, den das Austreten des Nils zurückgelassen hat.

9. Die Kentische Meerschwalbe. (Meerschwalbe von Sandwich: Sandwich T.)

Sterna cantiaca. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 606. No. 18. 2)

Ihre Länge ist achtzehn Zoll. Der Schnabel ist zwey Zoll lang, schwarz, mit einer hornfarbigen Spitze; die Zunge halb so lang als der Schnabel; der Augenstern rufbraun;

Nr 3

Stirn,

1) Latham I. c. β B.2) *Sterna Boysii*. Latham Ind. orn. 806. n.

3) Latham Ind. orn. II. 806. n. 9. B.

10. B.

1) Deutsche Ausgabe: Reise nach Palästina S.

325. Nr. 41. B.

Neunte Ordnung: Schwimmvögel.

Stirn, Scheitel, Hinterkopf und Seiten über den Augen schwarz; der übrige Kopf, der Hals, die untern Theile des Körpers und der Schwanz weiß; der Rücken und die Flügel hell bleifarben, die fünf ersten Schwungfedern grau schwarz, die innern Fahnen sehr tief hinein weiß gerändert, die sechste wie die andern, aber viel heller, die übrigen wie der Rücken; der Schwanz gabelförmig, seine äußerste Feder sechs und ein Viertel Zoll lang; die Flügel reichen etwas über ihn hinaus; Beine und Klauen schwarz; der untere Theil der Füße dunkelroth.

Bei einigen Exemplaren ist der Scheitel weiß getüpfelt.

Bei jungen Vögeln sind die obern Theile stark mit braun gemölkt, und der ganze Scheitel hat eine starke weiße Mischung; dieß ist aber kein Charakteristisches Kennzeichen, weil die Jungen anderer Meerschwalben mit schwarzen Köpfen, eben so sind.

Diese Art ist an den Küsten von Kent in den Sommermonaten sehr gemein, und brütet daselbst. Sie besucht die Küste von Sandwich in großen Flügen, und macht ein freischendes Geschrey. Sie legt vermuthlich ihre Eier zwischen die Klippen, im Junius, und brütet sie noch vor der Mitte des Julius aus, weil ich von dem fleißigen Naturforscher, Herrn Boys, die jungen Vögel zu Ende Augusts 1784 erhalten habe. Um eben diese Zeit wurde ein junger Vogel, fast mit der nämlichen Zeichnung, von D. Leith, von Greenwich, an den Ufern der Themse ohnweit dieses Orts geschossen *). Ob diese Vögel uns nur zu unbestimmten Zeiten besuchen, oder bisher unter andern Meerschwalben unbemerkt mit untergelaufen sind, weiß ich nicht; ich glaube aber, sie sind bisher unter den Britischen Vögeln nicht angeführt worden.

Ein junger Vogel dieser Art ist im Leverschen Museum; er unterscheidet sich aber dadurch, daß er zwischen den Augen hindurch nach dem Hinterkopf hin schwarz gesprengt ist. Dieser soll aus Südamerika gekommen seyn.

Man *) hat mir gesagt, diese Art sey an den Küsten von Suffolk im Sommer eben so gemein, als an denen von Kent, und man könne sie von andern durch ihre beträchtliche Größe im Flug sowohl, als durch ihre verschiedene Stimme, unterscheiden *).

Herr Boys hat mir die Bemerkung mitgetheilt, daß sie ein kürzeres Geschrey mache, als die gemeine Meerschwalbe *), ob sie gleich dieser Art in der Stimme näher komme, als irgend einer andern. Man findet auch, daß sie mehrentheils mit eben dieser in Gesellschaft ist, da hingegen die schwarze Meerschwalbe (Nr. 22) in abgesonderten Schaaren zieht, und alle oben angeführten sind beträchtlich zahlreicher, als die kleine Meerschwalbe (Nr. 18.) — Die Kentische Meerschwalbe läßt sich gewöhnlich in der Nachbarschaft von Romney, um den 17ten April, sehen, und zieht um den 5ten September wieder weg.

9. Var.

*) Ein junger Vogel dieser Art ist bey Shrewsbury geschossen worden. Arct. Zool. No. 526.

*) Zus. aus den Suppl. S. 266.

*) Dr. Wilgese.

a) Common T. f. unten No. 14. St. Hirundo L.

Acht und achtzigste Gattung. Meerschwalbe.

315

9. Var. A. Die gefleckte Meerschwalbe.

Sterna naevia. L. I. p. 228. n. 5. Ed. XIII. I. 2. p. 609. No. 5. b)

Rallus lariformis. Scop. ann. I No. 156. c)

L'Hirondelle-de Mer tachetée. Briss. orn. VI. p. 216. No. 6. pl. 20. fig. 2.

La Guifette. Buff. ois. VIII. p. 339. — Pl. enlum. 924.

Cloven-footed Gull. ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 82.

Kamtschatka Tern. Arct. Zool. p. 225. d)

Lev. Mus. e)

Ihre Länge ist zwölftelb Zoll. Der Schnabel ist schwärzlich; Hinterkopf und Nacken sind schwarz, mit gelbrothbraunen Rändern; das Auge ist an der hintern Seite zur Hälfte mit einem schwarzen Halbmond eingefasst; der übrige Kopf, der Hals und die untern Theile sind weiß; Rücken und Flügel bläulich braun, die Ränder der Federn heller; der äußere Theil der Flügel spielt mehr ins Blaugraue; die Flügel sind länger, als der Schwanz, letzterer ist nur sehr wenig gabelförmig; die Füße dunkelbraun.

Diese haben die Schriftsteller als eine eigene Art aufgeführt; sie ist aber ohne Zweifel bloß ein junger Vogel von der Kentischen Meerschwalbe (Nr. 9). Buffon sagt, sie sey in dem Zustande, worin er sie beschreibt, an den Küsten der Piccardie gemein; lege ohngefähr drey Eyer, auf eine Unterlage von dürrem laub, ins Gras, sitze siebenzehn Tage darüber, und die Jungen kröchen alle auf einmal aus. Sie ist auch um Kamtschatka bemerkt worden f).

10. Die

b) Sterna Boysii, cauda emarginata, corpore variegato, macula aurum nigra. Latham Ind orn. I. c. β. B.

c) Scopoli Bem. a. d. N. & I. S. 125. n. 156. Rallus subtus albido-flavescens, cervice caerulescenti-maculato, digitis marginatis. Linné Syst. Nat. ed. X. tom. I p. 153. No 3.

d) Meersf. II. S. 487. A. f. unten die Stübbersche Meerschwalbe Nr. 26. B.

e) Pallas Reise Auszug. I. S. 370. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 928 Nr. 5. Meine N. G. Deutschlands II. S. 831. Nr. 4. Mir scheint es doch nach Größe, Farbe und nach der großen Anzahl die man im Sommer im Bremschen von einerley Farbe antrifft. zu urtheilen, daß sie eine besondere Art sey. Nach Thüringen kommt sie nur auf ihren Wanderungen, und dann habe ich die Kentische nicht dabey bemerkt. B.

f) Arct. Zool. — In Lathams Ind. orn. I. c. β. wird folgender Vogel für eine Varietät oder vielmehr für eine junge Kentische Meerschwalbe ausgegeben:

Var. B. Die gewölkte Meerschwalbe.

Sterna nubilosa. Mus. Carls. III. n. 63.

Sie ist etwas über 1 Fuß lang; Schnabel und Füße sind schwarz, ersterer lang und dünn; Stirn, Vorderkopf, Augenbraunen, Wangen, Gegend unter den Augen, Kehle, Gurgel, Brust, Bauch, untere Deckfedern des Schwanzes, Weichen und Deckfedern der Unterflügel sind weiß; die Flügel schmutzweiß; die vordern Augenbraunwinkel schwarz; Scheitel und Hinterkopf weiß und schwarz gefleckt; das Genick schwarz, der Nacken bräunlichweiß; der übrige Oberleib rufschwarz und wegen der graulichen Spitzen der Federn aschgrau gewässert; die Deckfedern der Flügel schwärzlich; die vordern Schwungfedern oben schwarz, unten dunkelbraun, mit oben schwarzen, unten weißen Schäften, die erste Feder röthlich rufarben, am innern Rande weißlich, oben und unten mit weißem Schafte, die hintern Schwungfedern oben dunkelbraun; der Schwanz oben schwärzlich, unten dunkelbraun, gabelförmig, aus zehn Federn bestehend, wovon die vier mittlern kürzer sind.

Sinnland ist ihre Heimath. B.

10. Die gestreifte Meerschwalbe. (Striated T.)

(s. die hundert und fünfte Kupfertafel.)

Sterna striata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 609. No. 24. g)

Von der Größe der weißen Meerschwalbe (Nr. 17). Der Schnabel ist schwarz; der Augenstern bleifarben; der Scheitel und die Seiten des Kopfs, unter den Augen weiß, mit Schwarz gesprenkelt; Hinterkopf und Nacken schwarz; der Hinterhals, der Rücken und die Schulterfedern weiß, mit schwarzen, querstehenden Wellenlinien, und viele Federn mit gleichgefärbten Spitzen; die Deckfedern der Flügel bläulichweiß, einige der kleinern schwarz gesprenkelt; die Schwungfedern eben so, mit schwarzen, äußern Rändern, alle untern Theile weiß; der Schwanz auch weiß, und kürzer, als die Flügel; einige seiner Federn mit schwarzen Rändern, und andre mit schwarzen Spitzen; die Füße bleifarben.

Sie ist auf der See und an der Küste von Neuzeeland zu Hause. Aus den Gemälden des Herrn Joseph Banks. Sie gleicht sehr dem Jungen der Kentischen Meerschwalbe.

11. Die bekränzte Meerschwalbe. (Wreathed T.)

Sterna vittata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 609. No. 25. h)

Ihre Länge ist funfzehn Zoll. Der Schnabel ist etwas dünne, fast zwey Zoll lang, und dunkel blutroth; der Scheitel, gerade nach den Augen auf beyden Seiten mit eingeschlossen, bis zum Nacken, schwarz; und dieß ist rings herum mit einem weißen Streifen eingefast; das übrige Gefieder sehr hell aschfarben, an einigen Stellen fast weiß; das Kinn am hellsten; Steiß, After und Schwanz rein weiß; die äußerste Schwanzfeder ins Aschfarbene spielend; die Füße orangefarben.

Eine zweyte dieser Art ⁱ⁾ hat einen kürzern Schnabel; der Schwanz ist aschfarben, mit weißen Schäften; und die Hauptfarbe des Gefieders allenthalben dunkler; vielleicht ein jüngerer Vogel.

Sie ist auf der Weihnachts-Insel zu Hause. In der Sammlung des Herrn Jos. Banks.

12. Die rothbraune Meerschwalbe. (Brown T.) ^{k)}*Sterna spadicea*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 610. No. 26. l)

Sie

g) Latham Ind. orn. II. 807. n. 11. B.

h) Latham Ind. orn. p. 807. n. 12. Donn;

dorfs Zool. Beytr. II. S. 929. Nr. 25. B.

i) *St. vittata* L. l. c. N. 25. B.

k) Die letztere Art (Nr. 23) führt auch diesen Trivial-Namen, Brown Tern. B.

l) Latham Ind. orn. II. 807. n. 13. B.



Die gestreifte Meerschwalbe.



Acht und achtzigste Gattung: Meerschwalbe.

317

Sie ist ein klein wenig größer, als die dumme Meerschwalbe (Nr. 6), funfzehn Zoll lang, und vier und dreyßig Zoll breit. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang und schwarz; die Hauptfarbe des Gefieders röthlichbraun, unten am hellsten; zwischen den Beinen und dem After weiß; der Kopf, der Hals und die untern Theile einsärbig; die Federn auf dem Rücken und die Deckfedern der Flügel an den Enden röthlichweiß eingefast; die Schulterfedern und die Schwungfedern der zweyten Reihe haben weiße Spitzen; die untern Deckfedern der Flügel und der Flügelrand sind weiß; Schwungfedern und Schwanz dunkelbraun, letzterer gabelförmig, die Schäfte beyder unten weiß; die Füße hellröthlichbraun; die Klauen schwarz.

Bei einigen Exemplaren sind die Federn des Halses und der Brust dunkelbraun eingefast.

Sie ist in Capenne zu Hause.

13. Die dunkelbraune Meerschwalbe. (Dusky T.)

Sterna fuscata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 610. No. 6. n)

L'Hirondelle-de-Mer brune. BRISS. orn. VI. p. 220. No. 7. pl. 21. fig. 1.

Sie hat die Größe der schwarzen Meerschwalbe (No. 22) und ist eils Zoll lang. Ihr Schnabel ist anderthalb Zoll lang, graulichbraun, mit einer schwarzen Spitze; Kopf, Kehle und Hinterhals sind dunkelbraun; der Rücken, die Schulterfedern und die obern Deckfedern des Schwanzes eben so, aber die Federn mit gelbrothen Rändern; der Vorderhals und alle untern Theile braun; die kleinern und mittlern Deckfedern der Flügel oben dunkelbraun; die größern schwärzlich; die untern Deckfedern der Flügel aschgraulichweiß; die Schwungfedern dunkelbraun; die Schäfte unten weiß, die zwey zunächst am Körper stehenden, mit gelbrothen Spitzen; der Schwanz wie die Schwungfedern; seine zwey mittlern Federn an den Spitzen gelbroth; er selbst etwas gabelförmig; und wenn er geschlossen ist, so reichen die Flügel nicht ganz bis ans Ende desselben; die Füße mattröth; die Klauen schwarz.

Sie ist auf der Insel St. Domingo zu Hause, und scheint sehr nahe mit der zuletzt beschriebenen verwandt zu seyn, wiewohl sie viel kleiner ist.

14. Die gemeine Meerschwalbe. (Common T.)

Sterna Hirundo. LIN. I. p. 227. 2. Ed. XIII. I. 2. p. 606. No. 2. o) — Faun.

Suec. No. 158. — HASSELQ. Voy. p. 272 No. 40. — SCOP. ann. I. No. 11.

p) — BRÜNN orn. No. 151. 52. — MÜLLER Zool. p. 21. — Faun. Groenl.

No. 69. — KRAM. elench. p. 345. (Larus). — FRISCH av. vol. II. tab. 219.

La

n) Latham Ind. orn. II. 807. n. 14. B.

o) Latham Ind. orn. II. 807. n. 15.

p) Scopoli Bemerk. aus der N. G. I. S. 91. Nr. 111. B.

Neunte Ordnung. Schwimmsvögel.

- La grande Hironnelle - de Mer. BRISS. orn. VI. p. 203. No. 1. pl. 19. fig. 1. —
 BUFF. ois. VIII. p. 331. pl. 27. — Pl. enlum. 987.
 The Sea-Swallow. RAI Syn. p. 131. A. 1. p. 191. No. 7. — WILL. orn. p. 352.
 pl. 68. — ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 88.
 Great Tern. Br. Zool. No. 254. pl. 90.
 Br. Mus. Lev. Mus. 7)

Ihre Länge ist vierzehn Zoll, oder darüber, ihre Breite dreßzig, und ihr Gewicht vier und eine Viertel Unze. Der Schnabel ist dünn, und dritthalb Zoll lang, von Farbe karmoisinroth, am Ende spizig, und schwarz; der Schteltel, mit Einschluß der Augen und des Nacken, schwarz, das am Hinterhals in eine Spitze ausläuft; die Stelle zwischen den Nasenlöchern und den Augen, die Seiten unter denselben, der Hals, und alle untern Theile sind rein weiß; der Rücken und die Flügel schön hellaschfarben; die Schwungfedern grau; zwey oder drey der äußersten sehr dunkel, die Schäfte weiß; der Schwanz stark gabelförmig und weiß, die äußere Fahne der äußersten Feder ausgenommen, die schwarz ist; die Füße karmoisinroth; die Klauen schwarz.

Diese Art ist im Sommer an unsern Seeküsten und an den Ufern der Seen und Flüsse sehr gemein; am häufigsten aber trifft man sie in der Nähe des Meeres an. Sie findet sich nach Maßgabe der Jahreszeit, in verschiedenen Ländern Europens und Asiens ¹⁾, im Sommer bis nach Grönland und Spizbergen, von wo aus sie wieder nach dem südlichen Oestreich und Griechenland zieht. Sie legt drey bis vier Eyer, etwa im Junius, von matter Olivenfarbe, einen und drey Viertel Zoll lang, und mit unregelmäßigen, schwarzen Flecken bezeichnet, unter welchen wieder kleinere, von minder lebhafter Farbe gemischt sind; das spizige Ende ist fast ohne alle Zeichnung. Diese Eyer legt sie ins Gras oder ins Moos. Die Jungen kriechen im Julius aus, und verlassen das Nest bald nachher; ihre Eltern sorgen sehr zärtlich für sie, und in ohngefähr sechs Wochen sind sie flüch.

Dieser Vogel scheint alle die Sitten über dem Wasser zu haben, die die Schwalbe zu Lande hat; denn er streift über die Oberfläche desselben hin, und hascht nach jedem Insekt, das ihm vorkommt; wenn er ausserdem einen Fisch im Wasser gewahr wird, so schießt er gleich in dieses Element herab, fängt ihn, und kommt geschwind wieder an die Stelle heraus, von der er untergetaucht ist.

Er findet sich auch in Amerika, kommt nach Neuengland im May, und zieht im Herbst wieder weg; man nennt ihn dort die Makrelen Meve (Mackarel-Gull). Auf Hudsons-Bay ist er unter dem Namen Schwarzkopf (Black-head) bekannt. Man hat bemerkt, daß er seine Eyer in kleine Höhlen an der Küste legt, die er zuweilen mit ein wenig Laub ausfüllt

1) Sepp. Vog. tab. 105. Met. F. Pennants Art. Zool. II. S. 485. Nr. 365. Pallas nord. Beytr. IV. S. 24. Phipps Reise nach dem Nordpol. S. 99. Levechin Tageb. der Russ. Reis. I. S. 245. Naturforscher XII. S. 143. Nr. 38. Meine

N. G. Deutschlands II. S. 828. Nr. 3. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 921. Nr. 2. B.

2) Man trifft sie in Deutschland allenthalben auf Seen und großen Teichen an. B.

füttert. Oft sieht man ihn in großer Menge auf den kleinen Inseln in der Mitte der Flüsse, und man hält ihn für eine gute Speise. Die Eingebornen auf Hudsonsbay nennen ihn *Renouch ene ou keast* ¹⁾. Es ist ein so kühner Vogel, daß er selbst die Menschen nicht scheut; denn zur Brütezeit fällt er sie an, und schießt oft dergestalt auf sie herab, daß er die Hüte berührt.

Var. A.

Dr. Forster erwähnt einer Spielart auf Hudsons-Bay, die schwarze Beine hat; ihr Schwanz ist kürzer, und minder gabelförmig; und seine äußerste Feder ganz weiß ²⁾.

15. Die Panayische Meerschwalbe. (Panayan T.)

Sterna panayensis, LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 607. No. 16. ^{u)}

L'Hirondelle - de Mer de l'isle de Panay. SONN. Voy. p. 125. tab. 84. ^{v)} —

BUFF. ois. VIII. p. 344.

Von der Größe der vorigen. Ihr Schnabel ist schwarz; der Scheitel schwarz gefleckt; der Hinterhals graulichschwarz; die Flügel oben ochserfarben, unten graulich; der Vorderhals, die Brust und der Bauch weiß; der Schwanz wie die Flügel; die Füße schwarz.

Sie ist auf der Insel Panay zu Hause, und scheint der gemeinen Meerschwalbe (Nr. 14) sehr ähnlich zu seyn, außer daß die obern Theile des Gefieders dunkler sind.

16. Die aschgraue Meerschwalbe. (Cinereus T.)

Sterna cinerea, LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 607. No. 17. ^{x)}

L'Hirondelle - de - Mer cendrée. BRISS. orn. VI. p. 210. No. 3.

Larus niger *fidipes* alter, *alis brevioribus*. RAI Syn. p. 131. No. 5.

The other cloven-footed Gull of Aldrov. with shorte, wings. WILL. orn. p. 354.

Von der Größe einer Schwarzdrossel, und dreyzehn Zoll lang. Der Schnabel ist schwarz; Kopf und Kehle schwarz; bey einigen ist Stirn und Kinn weiß gesprenkelt; der Hals, der Rücken, die Flügel, der Steiß, die Schulterfedern, die obern Deckfedern des Schwanzes und der Schwanz, so wie die untern Theile von der Brust an, aschfarben; die untern Deckfedern des Schwanzes und der Flügelrand weiß; die Füße röthlich; die Klauen schwarz.

S 3 2

Sie

¹⁾ Herr Hutchins.

²⁾ Phil Transact. vol. LXII. p. 421. — Var.

B. Der Schnabel ist gelb, an der Spitze schwarz; die Stirn nicht weiß, sondern hat mit dem Scheitel gleiche Schwärze; das übrige ist wie bey dem Europäischen

Vogel. — Aus der Gegend von Newyork. Im Darmstädtschen Cabinette. B

^{u)} *Sterna panaya*. Latham Ind. orn. II. 808. n. 16. B.

^{v)} Dessen Reise nach Neuguinea. S. 44. B.

^{x)} Latham Ind. orn. II. 808. n. 17. B.

Neunte Ordnung. Schwimmvögel.

Sie ist in Italien und den umliegenden Gegenden zu Hause, wo diese Vogel Rondini Marini (Meerschwalben) heißen.

17. Die weiße Meerschwalbe. (White T.)

Sterna candida LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 607 No. 19. y)

— *alba*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 607. SPARRM. Mus. Carls. I. tab. II.
Lev. Mus. z)

Ihre Länge ist dreßzßhn, ihre Breite dreßßig Zoll. Der Schnabel ist dünn, und schwarz; die Augenlieder sind eben so; die Hauptfarbe des Gefieders ist schneeweiß, aber die Schäfte der Schulterfedern, der Schwungfedern und des Schwanzes, die dreß äußersten Federn desselben ausgenommen, sind schwarz; der Schwanz ist gabelförmig, und um einen Zoll kürzer, als die geschlossenen Flügel; die Füße braun; die Schwimmhäute orangefarben; die Klauen schwarz. Einige haben eine geringe Mischung von braunem am Kopf.

Sie ist auf der Weyhnachts-Insel, und in andern Gegenden der Südsee zu Hause. Man hat sie auch auf der Insel St. Helena gesehen.

Sparrmann ^{a)}, bey dem ich die erste Abbildung dieses Vogels bemerke, sagt, sie sey auch in Ostindien, am Vorgebirge der guten Hoffnung und in verschiedenen Gegenden der Südsee zu Hause.

18. Die kleine Meerschwalbe. (Lesser T.)

Sterna minuta. LIN. I. p. 228. 4. Ed. XIII. I. 2. 608. No. 4. b) — SCOP. anat. I. No. 110. c)

La petite Hirondelle-de-Mer. BRISS. orn. VI. p. 206. No. 2. pl. 19. fig. 2. — BUFF. ois. VIII. p. 337. — Pl. enlum. 996.

Lesser Sea-Swallow. RAU Syn. p. 131. A. 2. — WILL. orn. p. 353. pl. 68. — ALBIN Nat Hist vol II. pl. 90.

Lesser Tern. Br. Zool. No. 155. pl. 90. — Arct. Zool. No. 449. d)
Br. Mus. Lev. Mus. e)

Ihre Länge ist neunthalb Zoll, ihre Breite neunzehn und ein halber, und ihr Gewicht nicht viel über zwey Unzen. Der Schnabel ist gelb, mit einer schwarzen Spitze; der Augenhorn dunkelbraun; die Stirne, bis zum Scheitel, weiß; der übrige Kopf nebst dem Nacken, schwarz;

y) *Sterna alba*. Latham Ind. orn. II. 808. n. 18. B.

z) In Gmelins Linnetschen System sind zwey Vögel aus dieser Art gemacht, die aber Hr. Latham ganz richtig vereinigt, so wie es auch schon Hr. Donndorf Zool. Beytr. II. S. 924. Nr. 18. gethan hat. B.

a) Zus. a. d. Suppl. S. 266.

b) Latham Ind. orn. II. 809. n. 19. B.

c) Dessen Bemerkungen aus der N. G. I. S. 91. Nr. 110. B.

d) Herers. II. S. 486. Nr. 366. B.

e) Meine N. G. Deutschlande. II. S. 837. Nr. 7. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 926. Nr. 4. B.

schwarz; zwischen den Augen, vom Schnabel an, ist ein Streifen von eben dieser Farbe; außerdem sind die Seiten des Kopfs, der Hals, alle untern Theile und der Schwanz am meisten weiß; Rücken und Flügel hellgrau; die Schwungfedern von dunklerem Grau, und viel länger, als der Schwanz; die Füße gelb, die Klauen schwarz.

Diese scheint so ziemlich einerley Aufenthaltsort und Sitten mit der gemeinen Meerschwalbe (Nr. 14.) zu haben; man trifft sie aber nicht so weit nördlich an, noch scheint sie eine so zahlreiche Art zu seyn; inzwischen brütet sie an vielen unterer Küsten. Ihr Ey ist anderthalb Zoll lang, schmutzig gelblichbraun, und über und über mit röthlichen Flecken bestreut. Außer unsern Königreichen, findet sie sich ^{f)} in den südlichen Gegenden Rußlands, am schwarzen und Caspischen Meer und in Siberien am Irtysh. In Amerika hat man sie des Sommers über in Neu-York gesehen. ^{g)}

19. Die Chinesische Meerschwalbe. (Chinese T.)

Sterna sinensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 608. No. 22. ^{h)}
Br. Mus.

Ihre Länge ist achtzehn Zoll. Der Schnabel ist schwarz, fünf Viertel Zoll lang, und mäßig stark; die Nasenlöcher sind durchsichtig; der Kopf, der Hals, der Steiß und die untern Theile weiß; quer über den Scheitel herrscht eine dunkelschwarze Farbe, die die Augen auf beiden Seiten mit einschließt, und in einer Spitze nach dem Nacken herabläuft; der Rücken ist aschgrau, einige seiner Federn hell weißgelb gerändert, die Deckfedern der Flügel schön hellaschfarben, Es 3

^{f)} In Deutschland auf den Seen und großen Teichen. B.

^{g)} Von Herrn D. Vorkhausen aus Darmstadt erhalte ich von zwey Vögeln aus New-Jork folgende von der Europäischen Art abweichende Beschreibung:

Bei dem einen Exemplar ist der Oberleib vom Schnabel an bis zum Schwanz blaßgrau; Stirn, Scheitel und Hinterkopf sind schwarz gefärbt, und das übrige rostbraun geschuppt; von den Augen erstreckt sich ein schwarzes Schattenband bis hinter die Ohren; der Unterleib ist rein weiß; die Flügel sind hellgrau, und dunkler, nach hinten zu rostfarben geschuppt, und schwarz eingefast; die obern Deckfedern des Schwanzes sind weiß; die Schwungfedern aber weiß und braunlich geschuppt.

Das zweite Exemplar hat eine weiße Stirn; der Oberkopf ist grau und schwarz gefärbt, und von den Augen bis hinter die Ohren zieht sich ein schwarzes Schattenband; der

Hals ist ringsum schneeweiß; der Rücken blaßgrau und nur an den Seiten undeutlich geschuppt; Steiß und Schwanz schneeweiß; die Flügel schwarz eingefast, in der Mitte blaßgrau und nach hinten nur undeutlich geschuppt. Bei beyden Exemplaren sind die Augenbraunen schwärzlich und der Schnabel ist am Overtiefer braun, am untern gelb.*

In Größe und Gestalt gleichen beyde Vögel ganz vollkommen der Europäischen kleinen Meerschwalbe, aber in der Zeichnung weichen sie merklich ab. Die Verschiedenheit rührt vielleicht vom Klima her, oder es sind noch wahrscheinlicher Weibchen, oder, wie das erste Exemplar, sicher noch nicht ausgeflogene Junge. Eine verschiedene Art sind sie nicht, da der Bau aller ihrer Theile mit der kleinen Meerschwalbe vollkommen übereinstimmend ist.

B.

^{h)} Latham Ind. orn. II. 926. n. 22. B.

farben, längs der Mitte jedes Schafts herab dunkelbraun gestreift; die Schwungfedern schön aschgrau; der Schwanz kurz, sehr wenig gabelförmig, und heller, als die Flügel; die Füße schlank, und orangefarben; die Klauen krumm, und schwarz.

Sie ist in China zu Hause, und scheint mit der letzten sehr nahe verwandt zu seyn.

20. Die Australische Meerschwalbe. (Southern T.)

Sterna australis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 608. No. 21. i)
 Lev. Mus.

Ihre Länge ist achthalb Zoll. Der Schnabel ist anderthalb Zoll lang und schwarz; die Stirn schmutzig gelblichweiß; Rücken, Flügel und Schwanz schmutzig hellaschfarben; die untern Theile grau; die Schwungfedern weiß; der Schwanz gabelförmig; die Füße ziemlich lang, und dunkelschwarz; die Schwimmhäute orangefarben.

Ich habe ein Exemplar gesehen, das volle neun Zoll lang war.

Sie ist auf der Weihnachts-Insel zu Hause.

21. Die Sibirische Meerschwalbe. (Meerschwalbe mit dem Hut: Hooded T.)

Sterna metopoleucos. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 608. No. 23. k)
 ——— GMELIN in Nov. Comment. Acad. Petrop. vol. XV. p.
 475. No. 17. tab. 22.

Sie hat die Größe der kleinen Meerschwalbe (Nr. 18.), und ihre Länge ist acht und ein Viertel Zoll. Ihr Schnabel ist einen und ein Drittel Zoll lang, an der Wurzel roth, hierauf gelb, mit einer schwarzen Spitze; der Augenstern blaugelb; die Stirn weiß; die Schläfe, der ganze Kopf und der Hals schwarz; der Rücken schimmelgrau; die untern Theile und der Schwanz weiß, letzterer gabelförmig; die Schwungfedern aschfarben; die erste und zweite ausgezogen, die sehr lang, und braun sind; die Füße saffrangelb; die Klauen schwarz.

Männchen und Weibchen sind überein.

Dies ist ein Russischer Vogel, der im Frühjahr paarweise über das schwarze Meer herkommt, und sich zuerst ohngefähr hundert Werste von Weronez sehen läßt. Er nistet im Junius, legt mehrentheils zwey Eyer, hält sich am Wasser auf, wie andere Meerschwalben, fliegt hoch und schnell, und ist schwer zu schließen, ausser wenn der Jäger vorher einige andere Arten geschossen hat, die er dann in die Luft wirft, und hierdurch den Vogel näher an sich lockt. Im Herbst geht er wieder dahin zurück, woher er gekommen ist.

22. Die

i) Latham Ind. orn. II. p. 926. n. 21. B.

k) Latham Ind. orn. II. p. 809. n. 22. B.

h) Dieser Kunstgriff wird oft bey den Britischen Meerschwalben, so wie bey dem Meewen angewendet.

22. Die schwarze Meerschwalbe. (Black T.)

Sterna fassipes. LIN. I. p. 228. 7. Ed. XIII. I. 2. p. 610. No. 7. *m*) — BRÜNN. orn. No. 153.

Larus merulinus. SCOP. ann. I. No. 108. ? *n*)

— *niger fassipes* etc. RAU Syn. p. 131. 4. A. 6.

L'Hirondelle - de - Mer noire. ou l'Epouvantail. BRISS. orn. VI. p. 211. No. 4.

— BUFF. ois. VIII. p. 341. — Pl. enlum. 333.

Scare - Crow. RAU Syn. p. 131. A. 3. — WILL. orn. p. 353. pl. 68.

Cloven footed Gulls. WILL. I. c. p. 354. § 4. 6. pl. 78.

Black Tern. BR. Zool. No. 256. — Arct. Zool. No. 450. *o*)

BR. Mus. Lev. Mus. *p*)

In Rücksicht der Größe hält sie zwischen der gemeinen (No. 14) und der Kleinen Meer-
schwalbe (Nr. 18) die Mitte; ihre Länge ist zehn Zoll, ihre Breite vier und zwanzig, und ihr
Gewicht zwei Unzen. Ihr Schnabel ist schwarz; Kopf, Hals und Körper sind rußschwarz;
Rücken, Flügel und Schwanz dunkelschwarz; letzterer minder gabelförmig, als bey irgend
einer andern Art; der After und die untern Deckfedern des Schwanzes weiß; die äußerste
Schwanzfeder weiß gerändert; die Füße dunkelroth. Das Männchen hat einen weißen Fleck
unter dem Kinn *q*).

Diese besucht, gleich den andern Britischen Arten, im Sommer unsre Küsten, ist aber
auch eine große Strecke davon auf vielen Flüssen, und in verschiedenen unsrer Sümpfe, sehr ge-
mein; hier und da sieht man sie an schilfreichen Plätzen, und an vernachlässigten Fischteichen *r*). Ihrer
Eier sind drey bis vier, von schmutzig grünlicher Farbe, mit schwarzen Flecken, und in der
Mitte mit einem schwarzen Band eingefast; sie legt sie in das Schilf, oder in die Moräste und
andre sumpfige Stellen. Ihre Nahrung besteht aus Insecten *s*) und kleinen Fischen, die sie
sich fast mit der nämlichen Geschicklichkeit zu verschaffen weiß, als die andern Arten dieser Gat-
tung. Um Cambridge wird sie Karnschwalbe (Car-Swallow) genannt. Auf dem festen
Lande findet sie sich sehr weit nördlich, ist sehr zahlreich in Siberien, und an den Salzseen der
Tartarischen Wästen. In Europa bis Island. Vermuthlich ist sie auch auf Hudsons-
Bay zu Hause *t*), und wahrscheinlich eben dieselbe, die Herr Kalm in großen Flügen über den
41. Grad nördlicher Breite, und den 47. Grad der Länge, etwas südlich von der Küste von
Neufundland gesehen hat *u*).

33. Var.

m) Latham Ind. orn. II. p. 810. n. 23. B.

n) Dessen Bemerk. aus der N. G. I. 1. 90.
Nr. 108. B.

o) Uebers. II. S. 486. Nr. 367. B.

p) Meine N. G. Deutschlands II. S. 833. Nr.
5. Bonndorfs Zool. Beyr. II. S. 929.
Nr. 7. B.

q) Dieß Unterscheidungsmerkmal trägt, denn man
trifft zuweilen Weibchen mit einem solchen
Fleck, und auch Männchen ohne denselben an,
schwärzlicher aber sind die letztern immer als die
erstern. B.

r) Auf Seen und Teichen in Deutschland ge-
meinh. B.

s) In dem Magen eines dieser Vögel wurden
Käfer und Larven gefunden. WILL. orn.
p. 354.

t) Arct. Zool.

u) Kalm sagt, sie sey etwas dunkler gewesen, als
die gemeine Meerschwalbe; die Flügel be-
standen aus eintgen Hunderten, und zuweilen
ließen sie sich auf dem Schiffe nieder. Trav. vol.
I. p. 23.

23. (Var. A.) Die graue Meerschwalbe.

Sterna nigra. LIN. I. p. 227. No. 3. Ed. XIII. I. 2 p. 608. No. 3. v) — FAUN. Suec. No. 159. — MÜLLER Zool. No. 171. — GEORGI Reise p. 171. — SEPP. Voy. pl. in p. 131.

L'Hirondelle-de-Mer à tête noire, ou le Gachet. BRUSS. orn. VI. p. 214. No. 5. — BUFF. ois. VIII. p. 342.

Diese ist ein wenig größer, als die letztere, und zehnhalb Zoll lang; ihr Schnabel ist schwarz; der Kopf, der Hals und die Brust eben so; um die Augen herum stehen einige wenige graue Federn; der Rücken, der Streiß, die Schulterfedern und die obern Deckfedern der Flügel sind aschfarben; der untere Theil der Brust, der Bauch, die Schenkel, die untern Deckfedern der Flügel und der Unter weiß; die Schwungfedern sind an den Enden dunkler gefärbt; der Schwanz ist wie die Schwungfedern, die äußerste Feder zu beiden Seiten aber, an der äußern Fahne weiß, und aschfarben gerändert; der Schwanz selbst etwas gabelförmig; die Füße mattroth; die Klauen schwarz.

Sie soll in verschiedenen Gegenden Europa's zu Hause seyn; ich erinnere mich aber nicht den Vogel gesehen zu haben. Sehr wahrscheinlich ist er eine Spielart von letzterm, denn ich habe bei einigen Exemplaren mehr oder minder Weißes zwischen den Beinen bemerkt.

Man *) hat beobachtet, daß diese Art einige Tage nach den andern Meerschwalben, an den Küsten von Kent sich sehen ließ; und, weil sie etwas in ihrer Lebensart von ihnen abweicht, so vereinigt sie sich nicht mit denselben. Die schwarze Meerschwalbe legt ihre Eier nicht an das Ufer der See, wie die andern, sondern brütet und nährt sich in den Gewässern (flows), innerhalb des Landes. Sie ist ein minder schöner Vogel, und ihre Stimme viel freisender, als die andern Meerschwalben.

24. (23) Die unbestimmte Meerschwalbe. (Brown T.)

Stexna obscura. L. Ed. XIII. I. 2. p. 608. No. 20. y)

Brown Tern. RAN Syn. p. 151. A. 15. — WILL. orn. p. 352. — Br. Zool. II. No. 253.

„Die ganze untere Seite ist weiß; die obere braun; die Flügel zum Theil braun, zum Theil aschfarben; der Kopf schwarz; der Schwanz nicht gabelförmig. Dieser Vogel fliegt in

v) *Sterna nigra*. Latham Ind. orn. II. p. 810. n. 4. In der Synopsis führt sie Hr. Latham bloß als Varietät von der schwarzen auf, allein im Ind. orn. trennt er sie wieder als Art, ob er gleich noch nicht gewiß ist. Ich habe sie mehrmals gesehen, und glaube, daß sie wirklich als Art verschieden ist. Meine

N. G. Deutschlands II. S. 836. Nr. 6. Cetti N. G. v. Sardinien II. S. 299. Pallas Reise. Ausg. I. S. 370. Donnders Zool. Beytr. II. S. 925. Nr. 3. B.

x) Zus. a. d. Suppl. S. 267.

y) Latham Ind. orn. II. 810. n. 25. S.

„in Gesellschaft.“ Das ist die Beschreibung des Ray und Willughby, aus der man nichts gewisses abnehmen kann. Wahrscheinlich, weil der Schwanz nicht gabelförmig ist, ist es ein junger Vogel; ob aber aus der Gattung Meerschwalbe oder Meve, bleibt noch unbestimmt.

25. Die ²⁾ Philippinische Meerschwalbe. (Philippine T.) *

Le petit Fouquet des Philippines. SONN. Voy. p. 125. tab. 85.

Sie ist zweymal so groß, als die gemeine Meerschwalbe (Nr. 14). Ihr Schnabel ist gebogen, schwarz, und am Ende spitzig; der obere Theil des Kopfs, nebst den Augen, weiß; an der Wurzel des Schnabels ist ein schmaler, schwarzer Streifen, der die Augen umgibt, und sich in eine Spitze endigt; der Hals, die Brust und der Bauch sind weinbeeren-grau (vinaceous-grey); die obern Theile eben so, aber dunkler; Schwungfedern, Schwanz und Füße schwarz.

Sie ist auf den Philippinen zu Hause, und findet sich oft in einer großen Entfernung vom Lande.

Z u s a t z.

26. Die Stübbersche Meerschwalbe.

Sterna Stubberica. Meine N. G. Deutschlands II. S. 828. Nr. 2.

Sie ist achtzehn Zoll lang. Schnabel, Füße und Schenkel sind schwarz; die Stirn und der Raum über den Augen weiß; der Rücken und die Flügeldeckfedern aschgrau; der Unterleib weiß.

Sie hält sich auf der Insel Stübber auf. Sie legt drey Eier auf den Sand, welche bey weißem Grunde braune und schwarze Flecken, und die Größe der Krickenten-Eier haben.

Vielleicht ist sie mit der Kentischen Meerschwalbe (Nr. 9) von einerley Art, wenigstens trifft die Beschreibung mit Pennants Ramschatkaiser Meerschwalbe, Art. Zool. II. S. 487. A. überein. La Guiffette? Buffon VIII 339. Pl. enlum. 924.

B.

Neun

²⁾ Diese ist in den Suppl. a. a. O. hinzugekommen. *) Sterna philippina. Latham Ind. orn. II. 805. n. 7. B.

Neun und achtzigste Gattung. Meve.

Der Schnabel ist stark, gerade, an der Spitze aber abwärts gebogen; am untern Theil der untern Kinnlade ist eine eckige Erhabenheit. Die Nasenlöcher sind länglich, und schmal, und sitzen in der Mitte des Schnabels. Die Zunge ist ein wenig gespalten. Der Körper ist leicht; die Flügel sind lang. Die Füße klein, und bis über die Kniee nackt; die Hinterzehe klein.

Zwischen den Meyen und den Meerschwalben scheint eine große Verwandtschaft statt zu finden, und einige Schriftsteller haben sie als Eine Familie betrachtet; sie sind aber vollkommen unterscheidbar, und leicht in zwey Gattungen zu trennen. Die Meyen sind im Ganzen mehr proportionirte Vögel, als die Meerschwalben, und haben einen viel stärkern, und am Ende gekrümmten Schnabel, einige fast so stark gekrümmt, wie bey manchen Raubvögeln; da er hingegen bey den Meerschwalben größtentheils gerade und dünn ist. Die Beine sind bey diesen ebenfalls viel schwächer, als bey den Meyen, und der Schwanz am Ende gabelförmig ^{b)}, ein Umstand, den man bey der letzten Gattung nicht bemerkt. Inzwischen findet sich bey beyden eine große Ungewißheit, in Rücksicht des Gefieders, die in den verschiedenen Perioden des Lebens ihren Grund hat; diese Ungewißheit hat manche Schriftsteller veranlaßt, viele Vögel für Arten anzusehen, wo spätere Beobachtungen bewiesen haben, daß dieser Unterschied bloß von dem verschiedenen Alter oder Geschlecht herrühre. Aber es bleibt hierüber noch vieles zu bestimmen übrig, indem Irrthümer dieser Art bloß allmählig und durch wiederholte Beobachtungen weggeräumt werden können ^{c)}.

1. Die große Meve. (Great Gull.)

Larus ichtyaetus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 599. No. 16. d) — PALLAS Trav. vol. II. Append. No. 27. e)

Sie hat die Größe der Bernakelgans ^{f)}, ist auch wohl zuweilen noch größer; ihr Gewicht beträgt zwischen zwey und drey Pfunden. Der Schnabel ist an der Wurzel dunkelgelb, gegen das Ende hin karmoisinroth, und die Spitze gelb, nahe an dieser ist er mit einem dunkeln

b) In Rücksicht der jungen Meerschwalben muß diese Behauptung sehr eingeschränkt werden, weil bey einigen Arten die Schwanzfedern, in dieser Periode am Ende fast gleich sind.

c) Im Ind. orn. wird diese Gattung von Hrn. Latham in zwey Familien eingetheilt: a) die Nasenlöcher ohne Wachshaut, und b) mit einer Wachshaut. Zu letzterer gehören die Skua-Meve Nr. 14, die Keesack-Meve (Nr. 15 Note), die schwarze

zehige Meve Nr. 15, und der Struntz jäger Nr. 16; alle übrigen gehören zur ersten Familie. B.

d) Latham Ind. orn. II. p. 811. n. 1. B.

e) Dessen Reise Auszug II. S. 240. Gmelins Reise I. S. 152. Taf. 30. 31. Act. Holm IV. S. 119. 7. Donndorfs Zool. Beitr. II. S. 907. Nr. 16. B.

f) Bernacle Goose. s. unten Gen. 92. Sp. 26. Anas erythropus. L.

felbraunen Fleck durchzogen; die innere Seite des Mundes ist roth; der Augenstern braun; der Kopf und der Hals zur Hälfte schwarz; die Augenlieder weiß; der Rücken und der Steiß hellgrau; die kürzern Schwungfedern eben so, aber dunkler; die großen Schwungfedern weiß, die ersten fünf mit schwarzen Spitzen; der Schwanz am Ende gleich, und weiß; die Füße röthlichbraun.

Diese Art ist an den Ufern des Caspischen Meeres zu Hause, und ein von der schwarzköpfigen Meve (Nr. 9) ganz verschiedener Vogel, da er um ein beträchtliches größer ist. Er legt seine Eier in den bloßen Sand, ohne die geringste Zubereitung zu einem Neste zu machen. Sie sind länglich-eiförmig, mit zahlreichen, braunen Flecken, unter welchen einige hellere gemischt sind. Im Flug hat er einen heiseren Schrey, der einigermaßen dem Gefrächze des Raben gleicht.

2. Die Mantelmeve. (Schwarzrückige Meve: Black-backed G.)

Larus marinus. LIN. I. p. 225. 6. Ed. XIII. I. 2. p. 598. No. 6. g) — Faun Suec. No. 155. — BRÜNN. orn. No. 145. — MÜLLER Zool. No. 163.

Le Goiland noir. BRISS. orn. VI. p. 158. — BUFF. ois. VIII. p. 405. pl. 31. — Pl enlum. 990.

Great black et white Gull. RAI Syn. p. 127. A. 1. — WILL. orn. p. 344. pl. 67. — ALBIN Nat. Hist. vol. III. pl. 94.

Black-backed Gull. BR. Zool. II. No. 242. — Flor. Scot. I. pl. 5. fig. 2. — Arct. Zool. No. 451. b)

Lev. Mus. i)

Ihre Länge ist neun und zwanzig Zoll; die Breite fünf Fuß, neun Zoll, und ihr Gewicht beynähe fünf Pfund. Der Schnabel ist sehr stark und dick, und fast vier Zoll lang, von Farbe hellgelb, die untere Kinnlade aber mit einem rothen Fleck bezeichnet, in dessen Mitte ein schwarzer sitzt; der Augenstern ist gelb; die Ränder der Augenlieder orangefarben; der Kopf, der Hals, die ganze untere Seite, der Schwanz und der untere Theil des Rückens sind weiß; der Oberrücken und die Flügel schwarz; die Schwungfedern haben weiße Spitzen; die Füße sind hell fleischfarben.

Herr Pennant macht die Bemerkung, er habe an der Küste von Anglesee einen Vogel getroffen, der in jeder Rücksicht diesem gleiche, die Größe ausgenommen; auch fehlte ihm der schwarze

Et 2

g) Latham Ind. orn. II. 813. n. 6. B.

h) Uebers. II. S. 488. Nr. 368. B.

i) Ferner: Neue Schwedische Abh. IV. S. 100. Nr. 3. Schriften der Berliner Gesellschaft VII. S. 461. Nr. 39. Pontoppidan N. S. von Dänemark. S. 169. Nr. 2. Meise N. S. Deutschl II. S. 815. Nr. 7. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 906. Nr. 6. Hr. Latham rechnet auch im Ind. orn.

als Altersverschiedenheiten hierher: a) die Silber-Meve Nr. 5, als einen sehr alten Vogel, und b) die gefleckte Meve als eine Junge im ersten Jahre. Das letztere scheint mir wegen der Größe eben so, das erstere aber ein vollkommener Vogel und zwar mit Buffons grandes Mouette cendrée und Gmelins It. 2. p. 191. Taf. 22. einerley zu seyn. B.

schwarze Fleck am Schnabel, und die Füße waren lebhaft gelb; die ausgebreiteten Flügel maßen nur vier Fuß, fünf Zoll; seine Länge war zwey und zwanzig Zoll; sein Gewicht ein halbes Pfund; der nämliche Vogel ist auch zu Bullstrode, in Buckinghamshire, geschossen worden. Einer dieser Art, der auf der Themse nicht weit von meinem Orte, geschossen wurde, maß volle zwey Fuß in der Länge.

Diese Art ist in verschiedenen Gegenden von England zu Hause, und brütet auf den höchsten Klippen. Ihr Ey ist an beyden Enden stumpf, dunkel olivenfarben, am breitem Ende ganz schwarz, und das übrige sparsam mit dunkleren Flecken besäet. Sie ist auch an den meisten nördlichen Küsten Europens gemein, und besucht Grönland, hält sich aber vorzüglich auf den entlegenen Felsen auf. Sie legt im May drey Eyer, und zwar auf die Dunghaufen, welche die Vögel von Zeit zu Zeit da lassen. Sie gackert wie eine Gans. Man sagt, sie greife andere Vögel an, und sey besonders ein Feind der Eider-Gans^{k)}; inzwischen sind Fische ihr gewöhnliches Futter. Sie ist auch in Amerika, bis nach Südcarolina, zu Hause, wo sie das alte Weib (Old-Wife) genannt wird^{l)}.

Ich habe auch einen dergleichen Vogel gesehen, der vom Vorgebürge der guten Hoffnung kam, er maß aber nur zwey und zwanzig Zoll; der Schnabel war wie gewöhnlich; der Augenstern rußbraun; der Rücken olivenfarben. Er soll in den Buchten dieses Vorgebirgs brüten, besonders auf Felsen und den kleinen Inseln der Falso-Bay. Die Jungen sind braun gefleckt.

Parkinson^{m)} hat ihn ebenfalls an der Küste von Neuholland angetroffen; die Länge ist nicht angegeben, er beschreibt ihn aber mit einem hochgelben Schnabel, an dessen höcherigem Theil ein scharlachrother Fleck sich befindet; die Winkel des Mundes und der Augenstern lebhaft scharlachroth; die Füße grünlichgelb.

3. Die Heerings-Meue. (Herring G.)

Larus fuscus. LIN. I. p. 225. 7. Ed. XIII. I. 2. p. 599. No. 7. n) — Faun. Suec. No. 154. — SCOP. ann. I. No. 10. o) — BRÜNN. orn. No. 142. — MÜLLER Zool. No. 164. — GEORGI Reise p. 171. — FRISCH tab. 218.

Le Goiland gris. BRISS. orn. VI. p. 162. No. 3.

— — à manteau gris-brun, oule Bourgmestre. BUFF. ois. VIII. p. 418.

Herring Gull. RAI Syn. p. 127. A. 2. — WILL. orn. p. 345. — SLOANE Jan. vol. II. p. 322. — BR. Zool. II. No. 246. pl. 88. — ARCT. Zool. No. 452. p)

LEV. Mus. q)

Ihre

- k) Faun. Groenl. Cider Duck. f. unt. Gen. 92. Sp. 29. Anas mollissima. L.
 l) Arct. Zool.
 m) Voy. p. 144.
 n) Latham Ind. orn. II. 815. n. 8. B.
 o) Ueberf. I. S. 90. Nr. 107. B.
 p) Ueberf. II. S. 488. Nr. 369. B.
 q) Ferner: Meine N. G. Deutschl. II. S. 818. Nr. 7. Cetti N. G. von Sardinien II. S. 309. Neue Schwed. N. G. IV. S. 104. Nr. 4. Pantoppyden Dänemark. S. 169. Nr. 3. Donndorfs Zool. Beyträge II. S. 908. Nr. 7. B.

Ihre Länge ist drey und zwanzig Zoll, die Breite zwey und funfzig, und das Gewicht dreyßig Unzen, und mehr. Ihr Schnabel ist gelb, an der untern Kinnlade ein orangefarbener Fleck; der Augenstern strohgelb; die Ränder der Augenlieder roth; Kopf, Hals und Schwanz weiß; der Rücken und die Deckfedern der Flügel aschfarben; der obere Theil der fünf ersten Schwungfedern schwarz, und an den Enden mit einem weißen Fleck bezeichnet ¹⁾, die Füße hell fleischfarben.

Die Jungen sind aschfarben, mit braunen Flecken ²⁾.

Die Herings-Meve ist in unserm Königreiche gemein, und hat einerley Aufenthaltsort mit der Mantelmeve (Nr. 2). Sie soll ein Nest aus dürrm Gras machen, und drey schmußigweiße, schwarz gefleckte Eyer legen. Sie lebt von Fischen, und ist ein großer Feind der Heringe, daher ihr Name; sie hält sich beständig bey den Netzen auf, und ist so kühn, daß sie ihre Beute im Angesicht der Fischer davon trägt ³⁾. Sie findet sich in den meisten nördlichen Gegenden Europas, so wie an dem Caspischen und schwarzen Meere, und den Flüssen, die in diese fallen; auch an den großen Seen Sibiriens. Auch trifft man sie in Island, Grönland und Hudsons-Bay an. Im Winter zieht sie nach Süden, und findet sich dann in Jamais Ea. Sie soll auf einigen Inseln an der Küste von Südkarolina brüten ⁴⁾.

4. Der Bürgermeister, oder die grauliche Meve. (Glaucous G.)

Larus glaucus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 600. No. 17. x) — BRÜNN. orn. No. 148.

— MÜLLER Zool. No. 169. — Faun. Groenl. No. 64.

Le Goiland cendré. BRISS. orn. VI. p. 160. No. 2. — Pl. enlum. 253.

— — à manteau gris. BUFF. ois. VIII. p. 406. pl. 32. y)

Glaucous Gull. Arct. Zool. p. 352. B. z)

Sie ist größer, als die Heerings-Meve (Nr. 3). Ihr Schnabel ist gelb, mit einem orangefarbenen Fleck am Ende; der Kopf und die untern Theile des Körpers sind weiß; der Rücken und die Flügel schön schimmelgrau; die großen Schwungfedern am dunkelsten, und mit weißen Spitzen ⁵⁾; die Füße hell rothgelb.

Et 3

Sie

1) Bey Brisson sind die Schwungfedern braun; die zwey ersten haben einen weißen Fleck an den Spitzen, und schwarze Ende; die Spitzen der zwey nächsten sind weiß; die zwey folgenden haben braune Enden, und die Spitzen aller übrigen sind weiß.

2) Br. Zool. — Brissons Mouette grise (Orn vol. VI. p. 17.) scheint ein junger Vogel zu seyn; er ist zwanzig Zoll lang; die obern Theile sind grau; die untern weiß; der Schenkel grau; die großen Schwungfedern und der Schwanz grau, mit gelbrothen Rändern; die äußern Schwangfedern eine große Strecke an den innern Fahnen weiß. Ich besitze einen sol-

chen Vogel der sich blos durch schön hell blaue graue Schulterfedern unterscheidet.

3) Br. Zool.

4) Arct Zool.

5) Latham Ind. orn. II. 814. n. 7. B.

6) Le Bourgmaster. Buff. VIII. p. 418. B.

7) Uvers. II. S. 494. B. Martens Spitzb.

8) 60. t. L. Trampier Wallfisch. S. 75.

9) Neue Schwed. Abh. IV. S. 96. Nr. 1. Von:

10) topptid an Dänemark. S. 169. Nr. 4. Olaf:

11) sens Reise durch Gr. I. S. 190. B.

12) Nach Brissons Beschreibung haben nur die

vier ersten schwarze Enden und alle weiße Spitzen;

aber die äußerste hat einen schwarzen Fleck auf dem Weissen.

Neunte Ordnung. Schwimmvögel.

Sie ist in Norwegen, Lapmark, Grönland und Spitzbergen zu Hause. Die Holländer nennen sie den Bürgermeister, weil sie der Meister aller Seevögel ist. Sie nistet hoch auf den Klippen; sie lebt von toden Wallfischen, begleitet die Wallfische, um sich von ihrem Unrath zu nähren, und tödet und frist die Jungen des scheermesserschnäblichen Papagayauchers. Sie fliegt fast beständig, und hat eine heischere Stimme, wie ein Rabe. Sie lebt auch von Fischen, und verschmäht selbst die schwarze Kauschbeere nicht. Herr Forster hat mir gesagt, er habe sie auf Terra del Fuego und Neuseeland angetroffen. Ich habe sie auch von der Hudsons-Bay erhalten, wo sie drein und zwanzig Zoll lang, und vier Fuß breit war; sie gieng aber darinn von Brissons Beschreibung ab, daß sechs Schwungfedern an den Enden schwarz waren; an der Spitze der äußersten war ein großer, weißer Fleck; an der zweyten ein kleinerer, an der innern Fahne, ohnweit der Spitze, und die Spitze selbst weiß; die vier nächsten waren bloß an den Spitzen weiß; die kürzern Schwungfedern waren an den Enden gleichfalls weiß, die Füße bräunlich roth, und die Klauen schwarz.

5. Die Silber-Meve. (Silvery Gull.)

Larus argentatus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 600. No. 18. b)
Silvery Gull. Arct. Zool. p. 533. c. c)

Von der Größe der Heerings-Meve (Nr. 3). Der Schnabel ist gelb, mit einem orangefarbenen Fleck; Kopf und Hals sind weiß, mit abwärts laufenden, aschgrauen Strichen; der Rücken und die untern Theile des Körpers, wie bey der graulichen Meve (Nr. 4), der untere Theil der großen Schwungfedern graulich, der obere schwarz, die Spitzen weiß.

Sie ist in Norwegen zu Hause. Im Brittischen Museum befindet sich eine, die obiger sehr ähnlich ist. Ihre Länge ist ohngefähr sechzehn Zoll; ihr Schnabel anderthalb Zoll lang; die Schwungfedern wie bey der obigen; die zwey ersten aber sind an den Enden, fast eines Zolls breit, weiß, die andern haben bloß einen Flecken an den Spitzen; aber nur sechs von den großen Schwungfedern haben schwarze Enden; Schnabel und Füße waren blaß; da aber der Vogel eine Zeit lang im Weingeist gelegen hatte, so kann man nichts gewisses in Rücksicht ihrer sagen. ^{d)}

6. Die

b) *Larus marinus*. Latham Ind. orn. II. 814. n. 6. *β. avis aetate proventus*. Scheint aber, wie hier, mit *Larus maculatus*. S. G. Gmelin it. 2. p. 195. tab. 22. und Buffons La grande Mouette cendrée. VIII. p. 426. Pl. enlum. 977 eine besondere Art auszumachen. (s. oben Nr. 2. Note.) Wenn man sie wie Oedmann, Neue Schwed. Abh. IV. S. 120.

Nr. 2. zu der gemeinen Meve Nr. 8. rechnete, so steht die Größe schon entgegen. B.
c) Uebers. II. S. 494. c. — Pontopidan N. S. v. Dänemark S. 169. Nr. 7. — Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 910. Nr. 18. B.
d) Dieß war wohl eine graue Meve. B.

6. Die gefleckte Meve. (Wagel G.)

Larus naevius. LIN. I. p. 225. 5. Ed. XIII. I. 2. p. 598. No. 5. c)

— *maculatus*. BRÜNN. orn. No. 146. (ein junger Vogel?)

— *varius*. BRÜNN. I. c. No. 150.

Le. Goiland varié, ou le Grisard. BRISS. orn. VI. p. 167. No. 5. pl. 15. —
Buff. ois. VIII. p. 413. pl. 33. — Pl. enlum. 266.

Wagel, Burgo-master of Groenland, great grey Gull. RAR. Syn. p. 130. A. 13.

— WILL. orn. p. 349. pl. 66.

Wagel. Br. Zool. II. No. 247. A. — Arct. Zool. No. 453. f)

Br. Mus. Lev. Mus.

Dies ist eine große Art, die fast zwey Fuß lang, und ohngefähr fünf Fuß breit ist c); ihr Gewicht beträgt beynahe drey Pfund. Ihr Schnabel ist schwarz, und dritthalb Zoll lang; der Augenstern dunkelbraun; das ganze Gefieder besteht aus einer Mischung von Braunem, Aschfarbenem und Weißem; die Mitte jeder Feder ist braun, die untern Theile des Körpers sind eben so, aber heller; die Schwungfedern schwarz; der untere Theil des Schwanzes schwarz und weiß gesprenkelt; nahe am Ende ein schwarzer Streifen; über diesen hinaus ist das Ende weiß; die Füße schmutzig fleischfarben, bey einigen weiß.

Der obige Vogel besucht die Seeküsten vieler Gegenden von England, aber nicht in beträchtlicher Zahl; zuweilen sieht man ihn an den Ufern der Themse, mit andern Meven, und man ist der Meinung, er sey das Weibchen der Mantel-Meve (Nr. 2); dies ist aber bisher von den Schriftstellern noch nicht hinlänglich ausgemacht worden ^{b)}. Herr Pennant scheint der entgegengesetzten Meinung zu seyn; und in der That, die verschiedene Zeichnung der Schwungfedern und des Schwanzes rechtfertigt die Vermuthung nicht. Es scheint überhaupt keine leichte Sache zu seyn, die Meven, in Rücksicht ihrer richtigen Unterabtheilungen, in Arten zu rangiren; und ich habe viele Gründe, zu glauben, daß sie beträchtlich vervielfältigt worden seyen, indem die Schriftsteller Spielarten für Arten angesehen haben. Ich will meine Dritte, vierte und fünfte Art, als Beispiele hiervon, anführen.

Die Mantel- (Nr. 2) und die Heeringss-Meve (Nr. 3) kommen, die Größe ausgenommen, so vollkommen überein, daß ich sie, wenn mir die Autoren nicht das Gegentheil versicherten, für Eine und ebendieselbe Art halten würde. Das nämliche gilt auch von meiner graulichen (Nr. 4) und silberfarbenen (Nr. 5), wenn man sie mit der Heeringss-Meve (Nr. 3) ver-

e) *Larus marinus*. Latham Ind. orn. II. p. 814. 1. pullus primi anni. Latham scheint hier mehr Recht zu haben als Oedmann, der sie in den neuen Schwed. Abh. IV. S. 112. Nr. 2 zu einer jungen Wintermeve im ersten Jahre (*Larus tridactylus* L.) macht.

f) Uebers. II. S. 489. Nr. 370. — Pallas Reis. Ausz. I. S. 370. — Meine N. S.

Deutschlands II. S. 814. Nr. 5. — Dondorfs Zool. Beytr. II. S. 905. Nr. 5. B.

g) Zuweilen fünf Fuß, sechs Zoll. Br. Zool.

h) Fabricius vermuthet, er sey das Junge der Mantelmeve (Nr. 2) Faun. Groenl. p. 102. — Linne' beschreibt ihn als einjähriges Junges von der Heeringss-Meve (Nr. 3). Faun. Suec. p. 54. No. 154.

Neunte Ordnung. Schwimmdogel.

veraleicht; denn sie sind fast gar nicht verschieden, ausser daß etwa eine Schwungfeder mehr oder weniger Weißes an der Spitze hat, und daß die Farbe des Rückens und der Deckfedern der Flügel heller oder dunkler ist. Inzwischen glaube ich doch, es möchte noch einige Zeit dazu gehören, ehe die wahre Beschaffenheit dieser Sache erörtert werden wird. In Rücksicht dessen, daß die gefleckte Meve (Nr. 6) das Weibchen der Mantel-Meve (Nr. 2) seyn soll, wie Einige behaupten, befürchte ich, die Verschiedenheit möchte zu groß seyn, als daß man dießfüglich annehmen könnte; bis dieses indessen klar wird, habe ich eben jetzt ein Junges von der Heerings-Meve (Nr. 3, mit allen Zeichen der gefleckten Nr. 6), vor mir, und der Unterschied besteht bloß in der Größe, und einem bleysfarbigen Anstrich an den Schulterfedern.

Wenn ein Schriftsteller die Thatfachen nicht gewiß bestimmen kann, so muß er beständig seine Zweifel angeben, damit der Leser auf seiner Hut seyn könne; hierdurch aufmerktsamer gemacht, als er ausserdem wäre, wird er bey so ungewissen Gegenständen, wenigstens zu der gewünschten Belehrung geleitet werden.

7. Die weiße Meve. (Ivory G.)

Larus eburneus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 596. No. 14. i) — PHIPPS Voy. p. 187.

Larus candidus. Faun. Groenl No. 67. — MÜLLER Zool p. 8.

La Mouette blanche. BUFF. ois. VIII. p. 422. — Pl. enlum. 994.

Rathsherr. MARTIN Spitzberg. p. 77.

Senateur SALERN. orn. p. 382.

Ivory Gull. Arct. Zool. No. 457. k)

Lev. Mus.

Ihre Länge ist sechzehn, und ihre Breite sieben und dreyßig Zoll. Der Schnabel ist zwey Zoll lang und bleysfarben, mit einer blassen Spitze; die Augenkreise sind seffrangelb; das Gefieder über und über weiß; die Flügel sehr lang und viel länger als der Schwanz und selbst die Beine; die Füße bleysfarben; die Klauen schwarz.

Die Jungen sind mit länglichen schwarzen Flecken, besonders am Rücken und an den Flügeln bezeichnet; und haben schwarze Schnäbel.

Diese Art scheint die allernördlichsten Gegenden vorzuziehen, denn sie ist an beyden Küsten von Grönland zu Hause, und wird sehr weit in die See hinein angetroffen, nähert sich auch selten dem Lande, ausser zur Brütezeit; dann ist sie aber ziemlich zahm, so daß man sie ohne Schwierigkeit schießen kann, da sie hingegen zur See sehr scheu ist. Sie ist häufig auf dem Eismeer, zwischen Asien und Amerika, und auf Cap Denbigh¹⁾. Unsrer letzten Reisenden haben sie auf Unalaska angetroffen^{m)}. Sie soll auch auf Hudsons-Bay zu Hause seyn; wenn

i) Latham Ind. orn. II. p. 816. n. 10. B.

b) Ueberf. II. S. 491. Nr. 374. — Phipps Reise nach dem Nordpol. S. 98. — Tramppler Wallfisch. S. 70. — Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 900. Nr. 14. B.

c) Br. Zool. — Eine schneeweiße Meve,

mit Schwarz längs der obern Seite der Flügel, haben unsre letzten Reisenden im Nothasund angetroffen. Cooks last. Voy. vol. II. p. 352.

m) ELLIS's Narrat. p. 15. 252 - 67.

wenn dieß aber der Fall ist, so muß sie in der Größe beträchtlich variiren; Eine, die mir Herr Hutchins beschrieb, maß sieben und zwanzig und einen halben Zoll in die Länge, und fünf Fuß in der Breite; Schnabel und Füße waren fleischfarben; der Augenstern weißgelb; das Gefieder schön weiß, einige wenige von den Deckfedern des Schwanzes ausgenommen, die dunkelbraun gestreift waren. Sie ist, nach seinen Beobachtungen, an den Küsten selten, zahlreicher aber auf den Inseln und den Seen im Innern des Landes, wo sie ein einfaches Nest aus dürrem Gras auf den Boden baut, und vier weiße Eyer legt. Die Jungen sind schwärzlich, und die Alten bekommen ihre Weiße nicht vollkommen vor dem dritten Jahre.

8. Die gemeine Meve. (Common G.)

- Larus canus. LIN. I. p. 224. 3. Ed. XIII. I. 2. p. 596. No. 3. n) — Faun. Suec. No. 153. — HASSELQ. Voy. p. 272. No. 39. — SCOP. ann. I. No. 104. o)
 BRÜNN. orn. No. 141. — MÜLLER Zool. No. 162. — GEORGI Reise. p. 170.
 La Mouette cendrée. BRISS. orn. VI. p. 175. No. 8. pl. 16. fig. 1.
 La grande Mouette cendrée BRISS. I. c. p. 182. No. 10. pl. 16. fig. 2. — BUFF.
 ois. VIII. p. 428. — Pl. enlum. 977.
 Common Sea-Mall. or Mew. RAU Syn. p. 127. A. 3. — WILL. orn. p. 345.
 pl. 76.
 White web-footed Gull. ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 84.
 Common Gull. Br. Zool. II. No. 249. pl. 89. fig. 2. — Arct. Zool. No. 458. p)
 Lev. Mus q)

Diese ist sechzehn bis siebzehn Zoll lang, sechs und dreyßig Zoll breit, und wiegt ein Pfund. Ihr Schnabel ist gelb; die Augenlieder sind braun; der Kopf, der Hals, die untern Theile des Körpers und der Schwanz weiß; Rücken und Flügel hellgrau; der äußere Rand der vier ersten Schwungfedern, und die Spitzen der fünf ersten, schwarz; die vierte und fünfte aber haben einen weißen Fleck an den Spitzen; die übrigen, die drey zunächst am Körper stehenden ausgenommen, haben weiße Enden; die Füße sind matt grünlichweiß *).

Diese Vögel weichen etwas in der Zeichnung von einander ab; bey Einem, der zwölf Unzen wog, und siebzehn Zoll Länge hatte, war der Kopf und der Hals zur Hälfte, mit kurzen, dunkelbraunen Streifen besetzt; die Enden der fünf ersten Schwungfedern waren schwarz, die äußerste am dunkelsten, die zwey ersten aber hatten einen schwarzen Streifen an der Spitze; alle andern waren wie der Rücken, mit weißen Enden; ausserdem war er dem oben beschriebenen gleich. Dieser wurde an der Themse, im Februar geschossen, und war mager.

Dieß

- n) Latham Ind. orn. II. p. 815. n. 9. B.
 o) Uebers. von Günther I. S. 89. Nr. 104. B.
 p) Uebers. II. S. 491. Nr. 375. B.
 q) Kerner: Pallas nordische Ventr. IV. S. 10.
 Neue Schwed. Abh. IV. S. 47. Naturforsch. XII. S. 143. Nr. 96. Pontoppidan N.

- G. v. Dänemark. S. 169. Nr. 1. Zorn's
 Petineth. II. S. 437. Meinel's N. S. Deutschl.
 II. S. 808. Nr. 3. Donndorfs Zool. Beytr.
 II. S. 901. Nr. 3. B.
 *) Bey dem zuletzt citirten Brisson'schen Vogel,
 sollen die Füße roth seyn; ausserdem ist er vom
 erstern nicht wesentlich verschieden.

Dies scheint die gemeinste unter allen Meven zu seyn, da man sie in großer Menge an unsern Küsten und Flüssen findet, die an die See angränzen. Man sieht sie auch sehr weit nördlich, z. B. in Island und den Russischen Seen; sie wird auch in der Nähe des Caspischen Meeres, an verschiedenen Küsten des Mittelländischen Meeres, und gegen Süden bis Griechenland angetroffen *); ferner ist sie in Amerika an der Küste von Newfoundland zu Hause *). Sie brütet auf den Felsen und Klippen, wie andere dieser Gattung; ihre Eier sind anderthalb Zoll lang, dunkelolivbraun, und mit unregelmäßigen, dunkelröthlichen Flecken bezeichnet *). Es ist ein zahmer Vogel, der sich zu hunderten an den Ufern der Themse und anderer Flüsse, im Sommer, wie im Winter, zur Zeit der Ebbe, sehen läßt, wo er verschiedene Würmer und kleine Fische aufleckt, die die Ebbe zurückgelassen hat; oft geht sie auch den Pflug auf den benachbarten Aekern, der Würmer und Insekten wegen, die aufgewühlt werden, nach. Sie liebt vorzüglich, wie die Saatkrähe, die ausgeackerten Malkäferlarven *).

9. Die schwarzköpfige Meeve. (Black-headed G.)

Larus ridibundus. LIN. I. p. 225. 9. Ed. XIII. I. 2. p. 601. No. 9. x) — SEPP.

Vog. pl. in p. 153. (Männchen und Weibchen)

Larus cinereus. SCOP. ann. I. No. 105. y)

La Mouette rieuse, à pattes rouges. BRISS. orn. VI. p. 196. No. 14. — BUFF. ois. VIII. p. 433. — PL. enlum. 970.

Brown-headed Gull. ALBIN. Nat. Hist. vol. II. pl. 86.

Pewit, Black-cap, or Sea-Crow. RAR. Syn. p. 128. A. 5. — WILL. orn. p. 347. pl. 66. Br. Zool. II. No. 252. — Arct. Zool. No. 455. z) — Flor. Scot. pl. 5. fig. 1.

Lev. Mus. a)

Ihre Länge ist funfzehn Zoll, ihre Breite drey Fuß, und ihr Gewicht zehn Unzen. Der Schnabel ist etwas dünn, und blutroth; die Augenlieder sind roth; der Augenstern ist nussbraun; Kopf und Kehle sind dunkelbraun, bey alten Vögeln schwarz; an jedem Augenliede ist ein kleiner, weißer Fleck; Rücken und Flügel sind aschfarben; der Hals, alle untern Theile, und der Schwanz, weiß; die zehn ersten Schwungfedern weiß, mit schwarzen Rändern, und mehr

x) In Deutschland findet man sie im August und September oft häufig auf den Seen und Teichen, wo sie vermuthlich aus dem Norden kommen und auf ihren Wanderungen nach Süden begriffen sind. B.

z) Arct. Zool.

a) „Der Eier sind zwey, von der Größe der Hühnerener.“ DECOUV. Russ. vol. I. p. 249.

y) Man kann sie leicht zähmen; sie laufen dann auf dem Hofe unter dem Federvieh herum und fressen mit den Enten Brod, Gemüse, Vogeleidarme, Wotzen und Gerste.

Hierher rechnet Hr. Latham im Ind. orn.

so wie Oedmann in den Schwedischen Abh. IV. die Wintermeeve, welche Nr. 13. beschrieben ist, und sagt es sey eine junge gemeine Meeve in ihrer ersten Kleidung, daher man sie auch mit den alten an den Ufern der Flüsse, auf feuchten Wiesen und auf Sümpfen zugleich antrifft B.

x) Latham Ind. orn. II. Ser. n. 2. B.

y) Uebers. v. Günther I. S. 89. Nr. 105. B.

z) Uebers. II. S. 490. Nr. 372. B.

a) Pallas nord. Beytr. IV. S. 10. Meine R. S. Deutschl. II. S. 819 Nr. 8. Dönnsdorf's Zool. Beytr. II. S. 912. Nr. 9. B.

mehr oberweniger Schwarzem an den Spitzen, die übrigen aschfarben mit weißen Enden; die Füße wie der Schnabel; die Klauen schwarz.

Die schwarzköpfige Meve (Black-cap), oder Pewit-Meve ^{b)}, wie sie von einigen genannt wird brütet an den Ufern einiger unserer Flüsse, aber eben so oft in den Sümpfen des innern Landes von Lincolnshire, Cambridgeshire und anderer Gegenden Englands ^{c)}. Ihr Nest baut sie auf den Boden, aus Binsen, dürrem Gras u. dgl. und legt drey grünlichbraune, mit rothbraunen Flecken bezeichnete Eyer. Nach der Brütezeit entfernt sie sich wieder nach den Seeküsten. Sie brütet auch in Northumberland und Schottland, und man findet sie auch durch ganz Rußland und Sibirien, bis nach Kamtschatka, aber nicht weiter gegen Norden. Man sieht sie den ganz n Winter hindurch in großer Menge in Aleppo, wo sie so zahl ist, daß sie die Weiber, wie man sagt, von den platten Dächern (terraces) ihrer Häuser, mit hingeworfenen Stückchen Brod anlocken, die diese Vögel in der Luft fangen ^{d)}.

Sie ist in Nordamerika zu Hause, kommt im Mai nach Neuengland, und zieht im August wieder weg ^{e)}. Die jungen Vögel in der Nachbarschaft der Themse, werden für eine gute Spelse gehalten, und Rothbeine (Red-leggs) genannt; aber die schwarzköpfigen werden ungleich geringer geschätzt, weil sie von ranzigem Geschmacke sind, wie dieß bey den meisten alten Vögeln gewöhnlich ist.

Sie ^{f)} erscheint zuerst bey Romney, an der Küste von Kent, um den 17ten April, und zieht zu Anfang des Septembers wieder weg. Einige wenige kommen im Winter wieder ^{g)}.

10. Die rothbeinige Meve. (Red-legged G.)

Larus cinerarius. LIN. I. p. 224. 4. Ed. XIII. I. 2. p. 597. No. 4. b)

Larus canus. SCOP. ann. I. No. 106.

Larus albus major. RAU Syn. p. 129. No. 9.

La petite Mouette cendrée. BRISS. orn. VI. p. 178. No. 9. pl. 17. fig. 1. —

BUEF. ois. VIII. p. 431. — Pl. enlum. 969.

Greater white Gull of Bellonius. WILL. orn. p. 348. — Br. Zool. II. p. 542. var. i)

U u 2

Diese

b) Pewit heißt eine Meve.

c) Auf den Seen in Deutschland ist sie nicht selten. B.

d) Russel Aleppo. p. 70.

e) Arct. Zool.

f) Zus. aus den Suppl. S. 268.

g) Herr Woyz. Unter diese Art wird nach Hrn. Latham im Ind. orn. auch die rothbeinige Meve (*Larus cinereus*, L.) Nr. 16. als ein noch nicht vollkommen ausgewachsener Vogel gerechnet. Wenn er aber keine besondere Art ist, so gehört er nach Herrn Oedmann eher zu der dreizehnten

Meve Nr. 19. Auch die braunköpfige Meve Nr. 11. macht Hr Latham im Ind. orn. zu einer schwarzköpfigen, und zwar wie es scheint, mit mehreren Rechte, da es ein junger Vogel zu seyn scheint. B.

b) *Larus ridibundus*. Latham Ind. orn. II. p. 812. u. 2. S. s. oben. B.

i) Pallas Reis. Ausg. I. S. 470 Neue Schwed. Abh. IV S. 113. Nr. 12. Mel, ne R. G. Deutschlands. II. S. 812. Nr. 4. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 903. Nr. 4. Naturforscher XII. S. 143. Nr. 97 B.

Diese kommt in vielen Stücken mit der schwarzköpfigen Meve (Nr. 9) überein, von der sie eine Spielart, oder noch wahrscheinlicher, ein junger Vogel zu seyn scheint. Der vordere Theil des Kopfs ist weiß; die Augenkreise sind dunkelbraun; von jedem Mundwinkel läuft ein dunkler, breiter Streifen weg, der den Hinterkopf umgiebt; hinter diesem ist ein zweyter, der von einem Ohre zum andern reicht; die Enden und die äußere Ränder der drey ersten Schwungfedern sind schwarz, die Enden und nur die innere Seite der zwey nächsten eben so, aber die Schäfte und der untere Theil weiß, die Spitzen der zwey nächsten weiß, und unten ein schwarzer Streifen, die übrigen, so wie die der zweyten Reihe, aschfarben; ausserdem gleicht sie der schwarzköpfigen Meve (Nr. 9).

Ich besitze in meiner eigenen Sammlung einen Vogel, der in allen Stücken mit der schwarzköpfigen Meve (Nr. 9) übereinkommt, ausgenommen, daß die Federn des Kopfs weiß sind, hier und da mit einer dunklen Schattirung, und ein großer Fleck von eben dieser Farbe an den Ohren; wenn man aber die Kopffedern aufhebt, so bemerkt man sobald, daß sie bloß an den Spitzen weiß sind, und der Vogel nur ein junger vom ersten Jahre ist ^{k)}, weil diese Art den vollkommen schwarzen Kopf nicht vor dem zweyten oder dritten Mausern bekommt.

10. Var. A. *Larus cinerarius*. L. I. 2. p. 597. No. 4. β 1).
La pepite Mouette grise. Briss. orn. VI. p. 173. No. 7.

Die Länge ist funfzehn Zoll. Der Schnabel ist sieben Viertel Zoll lang, orangefarben, mit einer schwarzen Spitze; der Augenstern weißlich; der Scheitel, der Hals, der Rücken, und der Steiß grau und weiß melirt; die Seiten des Kopfs und alle untern Theile weiß; die Deckfedern der Flügel und die kleinern Schwungfedern, wie der Rücken; die größern, und am weitesten vom Körper entfernten Deckfedern dunkelbraun mit weißen Rändern; die großen Schwungfedern dunkelbraun mit weißen Spitzen; der Schwanz dunkelbraun, seine mittlern Federn mit weißen Spitzen, die andern bloß an den innern Zähnen weiß bezeichnet; die Füße orangefarben; die Klauen schwarz.

Ich vermuthet, dieß sey nichts anders, als die schwarzköpfige Meve (Nr. 9), mit noch unvollkommenem Gefieder.

11. Die braunköpfige Meve. (Brown-headed G.)

Larus erythropus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 597. No. 15. m)
Red-legged Gull. Arct. Zool. p. 533. E. n)

Ihre

k) Dieser letzte kommt Linne's *L. cinerarius* am nächsten.

l) *Larus crepitatus*. Latham Ind. orn. II. p. 819. n. 14. β. Hier wird sie als eine Var

rietas der schwarz zehigen Meve Nr. 15. angegeben. B.

m) *Larus ridibundus*. Latham Ind. orn. II. p. 812. γ B.

n) Uebers. II. S. 495. E. B.

Ihre Länge ist vierzehn Zoll, die Breite zwey Fuß, elf Zoll, und das Gewicht sieben Unzen. Der Schnabel ist roth; die Augenlieder sind scharlachroth; Kopf und Kehle mausfarben, mit weißen Flecken; Hals und Bauch weiß; Rücken und Schulterfedern aschfarben; die Deckfedern der Flügel dunkelbraun, mit schmutzigweißen Rändern; die äußere Seite und ein Theil der innern der vier ersten Schwungfedern, schwarz; der Schwanz besteht aus zwölf weißen Federn, wovon die zehn mittlern an den Spitzen fast einen Zoll breit, schwarz sind, die äußersten sind einfärbig; die Füße roth.

Diese wurde an den Ufern der Esk, zu Netherby, dem Landfise des Herrn James Greham, erlegt, und mir durch Hrn. Dr. Meysham mitgetheilt. Sie stimmt auch mit der rothbeinigen Meve der Arktischen Zoologie überein, die in Anglessee geschossen worden ist. Ein Exemplar dieser Art ist auch aus Kamtschatka geschickt worden.

12. Die Lach-Meve. (Laughing G.)

Larus Atricilla. LIN. I p 125. 8. Ed. XIII. I. 2. p. 600. No. 8. o) — Nov.

Comment. Acad. Petrop. vol. XV. p. 478. tab. 22. fig. 2. (ein junger Vogel)

Larus major cinereus Baltneri. RAU Syn. p. 129. No. 8.

La Mouette rieuse. BRISS. orn. VI. p. 192. No. 13. pl. 18. fig. 1. — BUFF. ois. VIII. p. 433.

Baltner's great ash-coloured Sea-Mew. WILL. orn. p. 346. pl. 67.

Laughing Gull. CATESBY Carol. vol. I. pl. 89. — Arct. Zool. No. 454. p) Lev. Mus.

Sie ist etwas größer als die schwarzköpfige Meve (Nr. 9); achtzehn Zoll lang, und drey Fuß breit?). Sie unterscheidet sich von jener bloß durch die Beine, die, statt roth, schwarz sind.

Man hat mir gesagt, daß Männchen und Weibchen, sowohl von dieser als der vorigen Art, im erwachsenen Zustande einander gleich sind; daher sind der, von Brisson als ein Weibchen aufgeführte Vogel, mit aschgrauem Kopfe und weißgefleckten Stirn und Kehle; so wie der in den Petersburger Abhandlungen, der kleiner ist, und einen schwarz und weiß gefleckten Kopf hat, ohne Zweifel junge Vögel.

Diese Art findet sich in Rußland, am Don, besonders um Eschercassk. Ihre Stimme gleicht einem heisern (coarse) Gelächter, daher ihr Name. Man hat sie auch in mehr als einer Gegend des festen Landes von Amerika angetroffen, und sie ist sehr häufig auf den Bahamas-Inseln; ich habe sie auch von Cayenne gesehen.

Ich habe gehört, daß eine Meve mit schwarzem Kopfe und dunkelgelbem Augenstern, im Mai nach Hudsons-Bay komme, wo sie ihr Nest auf die Fichtenbäume mache, vier bleyfarbene

Uu 3

o) Latham Ind. orn. II. 813. n. 3. B.

q) Nach Catesby wiegt sie acht Unzen.

p) Uebers. II. S. 489. Nr. 301. B.

farbene Eyer lege, und im September nach Süden ziehe. Sie lebt von Fischen und Würmern, und wird von den Einwohnern Akeese-keeff genannt *).

13. Die Winter-Meue. (Winter G.)

Larus hybernus. LIN. Ed. XIII I. 2. p. 596. No. 13. *)

La Mouette d'hiver. BRISS. orn. VI. p. 139. No. 12. — BUFF. ois. VIII. p. 437.

Guaca-guaca. RAU Syn. p. 130. No. 12. — WILL. orn. p. 352.

Winter-Mew, or *Coddy-Moddy*. RAU Syn. p. 130. A. 14. — WILL. orn. p. 350. pl. 66. — BR. Zool. II. No. 248. pl. 86. — ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 87.

Lev. Mus.

Ihre Länge ist achtzehn Zoll; die Breite dreß Fuß sechs Zoll, und das Gewicht siebenzehn Unzen. Der Schnabel ist dünn, und zwey Zoll lang, hornfarbig, mit einer schwarzen Spitze, und am Ende gebogen; der Augenstern rußbraun; der Scheitel, der Hinterkopf und die Seiten des Halses weiß, mit länglichen, dunklen Flecken; der Rücken aschfarben; die Schulterfedern, und die Deckfedern der Flügel eben so, mit dunkelbraun bezeichnet; die Stirn, das Kinn, die Kehle, die Brust, die untern Theile und der Steiß weiß; die erste Schwungfeder schwarz, die sechs folgenden mehr oder minder schwarz an den Enden, die andern mit weißen Spitzen; der Schwanz weiß, mit einem schwarzen Streifen nahe am Ende durchzogen; die Füße schmutzig bläulich-weiß.

Diese Meue ist sehr gemein in England, und wird viel tiefer im Innern des Landes bemerkt, als irgend eine andere. Herr Pennant macht die Bemerkung, daß die gallertartige Substanz, die unter dem Namen Stern-Gallerte (Star-shot oder Star-jelly) bekannt ist, ursprünglich von diesem Vogel, oder einem dieser Art, herrührt, indem sie nichts anders sey, als die halb verdauten Ueberbleibsel von Erdwürmern, von denen sich diese Vögel nähren, und die sie oft aus ihren Mägen wieder von sich geben *),

14. Die Skua-Meue. (Skua G.)

Larus Catarrhactes. LIN. I. p. 226. II. Ed. XIII; I. 2. p. 603. No. 11. *)

Catarrhacta Skua. BRÜNN. orn. No. 125. — MÜLLER Zool. No. 167.

Le Goiland brun. BRISS. orn. VI. p. 165. No. 4. — BUFF. ois. VIII. p. 408.

Catarr-

*) Herr Hutches,

*) *Larus canus*. Latham Ind. orn. II. 815. n. 9. β. Hier wird sie für einen jungen Vogel der gemeinen Meue Nr. 8. ausgegeben. B.

*) Br. Zool. — Morton Northampt. p. 353. — Während meiner Correspondenz mit dem verstorbenen Herrn J. Platt von Oxford, erinnere ich mich, daß er mir die Bemerkung mit-

getheilt, er habe einstmals einen Klumpen dieser Stern-Gallerte gefunden, und bey der Untersuchung die noch unaufgelösten Zehen eines Frosches oder einer Kröte daran hängen gesehen, woraus er schloß, es seyen die noch nicht ganz verdauten Ueberbleibsel eines dieser Thiere, die ganz von dem Vogel verschluckt wurden.

*) Latham Ind. orn. II. 812. n. 12. B.

Neun und achtzigste Gattung. Meve.

339

Catarrhactes, or Cornish Gannet. RAIL. Syn. p. 128. A. 6. — WILL. orn. p. 348.

Catarracta of Aldrovand. RAIL. Syn. p. 129. No. 7? — WILL. orn. p. 349. pl. 67?

Brown Gull. ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 85.

Skua Gull. BR. Zool. II. No. 243. — ARCT. Zool. p. 531. A. v)

Lev. Mus. x)

Sie hat die Größe eines Kolk-Raben, ist zwey Fuß lang, vier Fuß sechs Zoll breit, und drey Pfund schwer. Ihr Schnabel ist sieben Viertel Zoll lang, und schwarz, am Ende stark gekrümmt; und ein Drittel seiner Länge mit einer Art schwarzer Wachshaut bedeckt, an deren Ende die offenen Nasenlöcher angebracht sind; das Gefieder an den obern Theilen des Kopfs, des Halses, des Rückens und der Flügel ist sehr dunkelbraun, und die Federn rostbraun gerändert; Kopf und Hals spielen ins Aschgraue, besonders die Stirn und das Kinn; Brust, Bauch, Schenkel und After sind blaß dunkel rostfarben; die Füße schwarz, rauch, und mit Warzen besetzt; die Klauen stark gekrümmt; die Hinterzehe sehr kurz, die Klaue aber gekrümmt und scharf.

Dies ist eine sehr gefräßige und kühne Art, die sich mehrentheils in den nördlichen Gegenden unsrer Königreiche aufhält; jedoch trifft man sie zuweilen auch gegen Süden an, wie zwey oder drey Beispiele beweisen; Ein Exemplar davon ist in meiner eigenen Sammlung, und bey Greenwich geschossen worden. Sie besucht am häufigsten die Schottländischen und die Feroe-Inseln; ist auch gemein in Norwegen, und bis Island! Auf der felsigen Insel Fou-la wird sie sehr geschätzt, weil sie die Heerden vor dem Adler sichern soll, den sie mit großem Grimm angreift und verfolgt; und die Einwohner läugnen, daß sie jemals das Federvieh beschädige oder anfalle¹⁾. Sie macht oft Jagd auf die kleinern Meven, und andere Vögel, auf die nämliche Art, wie der Habicht. Man hat sie jene im Flug angreifen gesehen, damit sie die Fische fallen lassen sollen, die sie etwa vorher gefangen haben, wie wir oben von dem weißköpfigen Fischadler²⁾ erzählt haben. Während der Brütezeit ist sie, in Rücksicht ihrer Jungen, bis zum Erstaunen beherzt; denn sie greift mehrere Personen zusammen ohne Furcht an, wenn sie sich ihrem Aufenthalte nähern³⁾. Diese Vögel sind auch in verschiedenen hohen Breiten der südlichen Halbkugel gemein. Unsre Weltumsegler haben sie auf den Falklands-Inseln, besonders um Port Egmont, angetroffen, daher sie Port-Egmont-Hühner genannt werden; dorten, und auf Terra del Fuego, machen sie, wie man bemerkt hat, ihre Nester in das dürre Gras⁴⁾. Nach der Brütezeit zerstreuen sie sich über den Ocean, und man sieht sie mehrentheils paarweise⁵⁾. Man hat sie in Kenguuelens-Land, auf dem Vorgebürge

1) Uebers. II. S. 493. A. B.

2) Forsters Reise Ed. 8. I. S. 113. Pons toppidan Norweg. II. S. 182. Dönn dorfs Zool. Beytr. II. S. 915. Nr. 11. B.

3) Hr. Forster sagt, sie zerreiße auf den Feroe-Inseln oft ganze Lämmer in Stücken, und trage sie in ihr Nest. Voy. vol. I. p. 118.

4) S. allgem. Uebers. I. B. 1. Th. S. 25. Nr. 3.

5) Mehr über ihre Lebensart s. in der Britischen Zoologie.

b) Forster l. c. p. 293.

c) Cooks Voy. vol. I. p. 44.

bürge der guten Hoffnung und anderwärts angetroffen ⁴⁾). Allenthalben sind ihre Stitten; in Rücksicht ihrer Dreistakelt, die nämlichen. Man hat mehrmalen gesehen, daß sie den größten Schiffsvogel (Albatross, - Diomedea) angegriffen, und nachdrücklich verfolgt hat, so lange er im Flug war, und dieser verzagte Niese hatte keine andere Ausflucht als sich ins Wasser herabzulassen; worauf die Meve verschwand. Ich kann nicht mit Gewißheit sagen, ob dieß Kolbs Seefröße (Sea-Crow ^{e)}) ist, von der er uns sagt, daß sie häufig am Cap sey, weil er ihr Fleisch für delikats und sehr geschätzt ausgibt, da doch, aus der Lebensart der Skuas-Meve, gerade das Gegentheil folgen sollte; doch wird es wieder dadurch wahrscheinlich, wenn er sagt, die Federn seyen sehr weich, und würden zum Ausstopfen der Betten und Kissen gebraucht; noch mehr aber wird die Vermuthung, daß dieser Vogel wenigstens aus der Gattung der Meven sey, bekräftigt, weil die Federn aller Arten dieser Gattung ohne Unterschied, am Cap zu diesem Endzweck gebraucht werden sollen; ja sie werden den Gänsefedern noch vorgezogen, und jährlich viele Tausende zu diesem Zwecke getödtet ^{f)}).

15. Die schwarzzeehige Meve. (Black-toed G.)

Larus crepidatus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 602. No. 20. g) — HAWKESW. Voy. vol. I. p. 15.

Catarrhacta Cephus. BRÜNN. orn. p. 36. No. 126, fig. *ibid* — MÜLLER Zool. p. 21. — Philosoph. Transact. vol. LII. p. 135. — RAI Syn. p. 129. No. 11. — WILL. orn. p. 351. pl. 67.

Le Stercoraire rayé. BRISS. orn. VI p. 152. No. 2. pl. 13. fig. 2.

L'Abbé, ou Stercoraire. BUFF. ois. VIII. p. 441. pl. 34. — Pl. enlum. 991.

Black-toed Gull. Br. Zool. II. p. 244. pl. 86. — Arct. Zool. No. 460. h)

Diese ist funfzehn Zoll lang, neun und dreszig Zoll breit, und elf Unzen schwer. Ihr Schnabel ist anderthalb Zoll lang, und an Gestalt dem der vorigen Art fast gleich, nur dünner (slenderer) und weniger gekrümmt; die Nasenlöcher laufen an den Schnabel vor, und liegen in einer Art von Wachsheit, wie bey der vorigen; Kopf und Hals sind schmutzweiß; die Seiten des Halses dunkelbraun bezeichnet; Brust und Bauch weiß, und mit zahlreichen dunkelbraunen und gelblichen Strichen durchzogen; die Seiten, und der After nach der Queere schwarz und weiß gestreift; der Rücken, die Schulterfedern, die Deckfedern der Flügel und der Schwanz schwarz, und sehr schön weiß, oder hell rostfarbig gerändert; die Schäfte und Spizen der Schwungfedern weiß, die äußere Fahne und die obere Hälfte der innern, schwarz die untern Theile der letztern aber weiß; der Schwanz schwarz, mit weißen Spizen, seine zwey mittlern Federn fast um einen Zoll länger, als die übrigen, die Schäfte weiß, die äußern Fahnen der äußersten rostfarben gefleckt; die Füße bläulich bleifarben; der untere Theil der Zehen und Schwimmhäute schwarz. Diese Beschreibung ist aus der Brittischen Zoologie.

Ein

⁴⁾ Hawkesw. Voy. vol. II. p. 283. — Cook I. c. p. 44. 272. — Forst. I. c. p. 109. 118. — Cooks last. Voy. vol. I. p. 88 und anderswärts.

^{e)} Kolb. Cap. vol. II. p. 241.

^{f)} Kolb. Cap. vol. I. p. 244.

^{g)} Latham Ind. orn. II. 819 n. 14. B.

^{h)} Uebers. II. S. 492, Nr. 377. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 915. Nr. 20. B.

Ein Vogel dieser Art wurde bey Oxford gefangen, und ein anderer zwischen den Inseln Teneriffa und Bonavista angetroffen ¹⁾).

Im Leverschen Museum ist ein Vogel dieser Art, aber viel kleiner als der oben beschriebene; die Hauptfarbe aber ist braun; Kopf und Hals sind mit zahlreichen, dunklern Querstreifen durchzogen; Brust und Bauch schmutzig weiß gesprenkelt; die Seiten eben so gestreift; die Wurzel des Schwanzes weiß; das übrige seiner Länge dunkelschwarz; die Form abgerundet; die zwey mittleren Federn nicht länger, als die übrigen; die Füße, die Zehen so wie die Schwimmhäute zur Hälfte gelblichbraun; die Endhälfte schwarz.

Herr Hutchins hat ebenfalls eine, der schwarzzehigen ähnliche, Art auf Hudsons Bay angetroffen; dieser Vogel ²⁾ ist aber größer, wiegt mehr, als der in der Britischen Zoologie beschriebene, und ist so groß, als irgend einer dieser Gattung, die sich dort aufhalten; er kommt im April an, bauet ein einfaches Nest aus Gras, und legt zwey hellrostigrothe, schwarzgeleckte Eier. So wie der Winter herbenkommt, zieht er sich an die offenen Wasser zurück, und wird daselbst Equimeaux keeask ³⁾ genannt ⁴⁾).

Die schwarzzehige Meve ist ein seltner Vogel, und scheint auf dem festen Lande häufiger zu seyn, als in England; häufig findet man sie in Dänemark, wo man sie, wie Brännich erzählt, oft unter den Viehheerden versteckt sieht, und mit der Hand fangen kann. Sie scheint hier von einem langen Flug ermüdet zu seyn, oder eine Weile auszuruhen, um ihre Reise weiter zu verfolgen.

Zu ⁵⁾ Anfang des vorigen Septembers (1786) hat mir Herr Jackson einen Vogel dieser Art zum Präsent gemacht, der in Fieldplace, bey Horsham, in Suffex, geschossen wurde. Er geht in einigen Stücken von dem oben beschriebenen ab. Seine Länge ist sechzehn Zoll; das ganze Gefieder von dunklerer Farbe, und mit Ruffarbe melirt; die Schwungfedern an den Spizen eben so bezeichnet; die Brust weiß gesprenkelt; der Schwanz am Ende etwas abge-

1) Hawkesw. Voy. vol. I. p. 15. — Der Mist dieser Vogel ist roth; und hiervon ist vermuthlich die Ursache, daß sie sich von der blauen Kräuselschnecke (*Helix janthina* L.) nähren, deren Bewohner den Purpur (*Purpera*) der alten Griechen hergab. — Diese Schnecke soll an den Küsten von Sommerhethire und Südwaless gefunden werden. Phil. Trans. vol. XV. p. 1278.

2) 15 a. Die Keeask Meve.

Larus Keeask. Latham Ind. orn. II. p. 818. n. 13.

Dieser hier beschriebene Vogel wird in Latham's Ind. orn. a. a. O. als eine besondere

Art beschrieben. Er ist groß, 22 Zoll lang. Der Schnabel ist 3 Zoll lang, und schwarz; die Hauptfarbe ist dunkelbraun; die Deckfedern der Flügel weißbunt; der Schwanz schwarz, weiß geheckt und an der Spitze weiß; die Füße schwarz; die Zehen so wie die Schwimmhäute halb weiß und halb schwarz. Er wohnt in Amerika in der Hudsons-Bay. Das Uebrige siehe oben im Text. B.

3) Ich würde diesen Vogel für nichts anders als für die Skua Meve (Nr. 14) halten, wenn nicht Hr. Hutchins sagte, die Hälfte der Zehen und Schwimmhäute sey schwarz.

4) Zaf. a. d. Suppl. S. 268.

abgerundet; die Schwungfedern reichen, wenn sie geschlossen sind, einen Zoll über die Schwanzspitze hinaus *).

16. Die arktische Meve, oder der Struntjäger. (Arctic G.)

(s. die hundert und sechste Kupfertafel.)

Larus parasiticus LIN. I. p. 226. No. 10. Ed. XIII. I. 2. p. 601. No. 10. *) —
Faun. Suec. No. 156.

Catarrhacta parasitica, BRÜNN. orn. No. 127. 128. — MÜLLER Zool. No. 166.
— Faun. Groenl. No. 68.

Le Stercoraire. BRISS. orn. VI. p. 150. No. 1. (das Weibchen).

— — — à longue queue. BRISS. l. c. p. 155. No. 3. (das Männchen).

L'Abbé à longue queue. BUFF. ois. VIII. p. 445. — Pl. enlum. 762. p)

Strunt-jäger. RAR. Syn. p. 127. No. 2.?

Arctic Birds. EDW. Nat. Hist. pl. 148. 149. q)

Arctic Gull. BR. Zool. II. No. 245. pl. 87. — Arct. Zool. No. 459. r).

Lev. Mus. s)

Die Länge ist ein und zwanzig Zoll. Der Schnabel ist anderthalb Zoll lang, sehr stark gekrümmt, und von dunkelbrauner Farbe; die Nasenlöcher liegen in einer Art von Wachshaut, wie bey den zwey letzten; der Scheitel ist schwarz; die Seiten des Kopfs, die Stirn, der Hals und alle untern Theile weiß; queer über die Brust läuft ein blaß dunkelbrauner Streifen; die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz sind schwarz; die Wurzel der Schwungfedern an den innern Fajnen weiß; die zwey mittlern Schwanzfedern fast um vier Zoll länger, als die übrigen; die Füße schupplig, nicht sehr stark, und schwarz.

Ich habe einen andern Vogel dieser Art bemerkt, bey dem das Kinn und der Hinterhals dunkelbraun und weiß gesprenkelt waren; am untern Theil des Halses zieht sich die dunkelbraune Farbe an beyden Seiten vorwärts; alle obern Theile sind dunkelbraun; die Brust und die untern Theile weiß, mit unregelmäßigen, dunklen Querstichen durchzogen; die zwey mittlern Schwanzfedern nur sehr wenig länger, als die übrigen.

Das

n) Bey meinem Exemplare hatte der Schwanz nur zehn Federn; der bey Brisson aber zwölf; ich vermuthete daher, daß meinem Vogel einige gefehlt haben. — Im Ind. orn. l. c. wird die oben bey der rothbeinigen Meve Nr. 10. angegebenen Varietät *A. Gavia grisea minor*. BRISSON VI. p. 173. 7. Id. 8vo II. p. 408. *Larus maculatus*. MARS. Dan. V. p. 94. tab. 45. — KLEIN Av. p. 138 14. hierher gerechnet, doch ohne daß der Hr. Verfasser es mit Gewißheit behauptet. B.

c) Latham Ind. orn. II. 819. n. 15. B.

p) Auf dieser Platte scheinen die Schwanzfedern einen Drittheil der ganzen Länge des Vogels auszumachen.

q) Seltamanns Vögel V. Taf. 43. 44. B.
r) Uebers. II. S. 492. Nr. 376. B.

s) Vergl. ferner: Meine N. S. Deutschlands II. S. 821. Nr. 9. Leem's Lapp. in Finnmarken S. 150. Olfassen Zet. I. S. 121. 305. Trampfers Wallfisch. S. 69. Pontoppidan Norw. II. S. 154. Donners Zool. Beytr. II. S. 913. Nr. 10. B.

Tab: 106.



Die Arktische Møve



Das Weibchen soll ganz dunkelbraun seyn, unten am hellsten; die mittlern Schwanzfedern sind nur um zwey Zoll länger, als die andern ¹⁾).

Dies ist ein nördlicher Vogel. Er ist sehr gemein auf den Hebriden, und brütet auf den Heiden; er kommt im Mai, und zieht im August wieder weg; wenn er aufgestört wird, fliegt er herum wie der Kiebitz kommt aber bald wieder herunter. Er findet sich auch auf den Orkadischen Inseln, und an den Küsten von Yorkshire, wo er Feaser genannt wird. Man findet ihn an den nördlichen Küsten von Schweden, Dänemark und Rußland, bis nach Kamtschatka. Er ist gemein in Grönland, wo er sich auf der offenen See aufhält, so wie an den Buchten. Das Weibchen macht ein kunstloses Nest aus Gras und Moos, auf einen Hügel an irgend einer sumpfigen Stelle, und legt zwey aschfarbene, schwarzgefleckte Eier, von der Größe der Hühnereyer. Er schwimmt nicht oft, und fliegt gewöhnlich langsam, außer wenn er andere Vögel verfolgt, die er angreift, in der Absicht daß sie die Fische oder anderes Futter fallen lassen, welches dieser allgemeine Räuber gierig aufhascht. Die meisten Schriftsteller haben erzählt, es sey der Mist der Vögel, dem er beym Verfolgen nachstrebe; neuere Beobachtungen aber belehren uns, daß dieß falsch sey; obschon, in der Voraussetzung, daß es so sey, der Vogel den Namen Rothjäger (Strunt-jäger) bekommen hat.

Edwards erhielt seine beyden Vögel von der Hudsons Bay, wo sie, wie er uns berichtet, Man of War genannt werden; die Eingebornen kennen sie unter dem Namen Utapskeest ²⁾).

17. Die kleine Meve. (Little G.)

Larus minutus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 595. No. 12. *) — PALLAS Trav. vol. III. Append. No. 35. y)

Sie hat die Größe der Misteldrossel. Ihr Schnabel ist röthlichbraun; der Augenstern bläulich; der Kopf und der Anfang des Halses schwarz; der übrige Hals und Körper weiß; der Rücken und die Flügel grau; die Schwungfedern aber an den Enden weiß; der Schwanz gleich, und weiß; die Füße roth.

Sie ist in den südlichen Gegenden von Rußland und Siberien zu Hause, findet sich an den Küsten des Caspischen Meeres, und an den Flüssen, die in dasselbe fallen; und zieht im Sommer nordwärts die Wolga hinauf, um zu brüten.

Er 2

18. Die

*) Br. Zool. Fabricius sagt, Männchen und Weibchen seyen überein, und er wüßte das gewiß, weil er sie aufgezogen. Faun. Groenl. Brunnichs *Catarrhacta coprotheres* (orn. No. 128) kommt mit der letzten Beschreibung überein. Dieser Schriftsteller ist in diesem Punkte selbst ungewiß, sagt aber, man habe ihn in Island und Norwegen für

das Weibchen. — Fabricius nennt ihn einen jungen Vogel. Ich habe keinen gesehen, die zwey zuerst beschriebenen ausgenommen, die im Leyerschen Museum sind.

z) Herr Hutchins.

*) Latham Ind. orn II. p. 813 n. 5. B.

y) Pallas Reisl. Ausg. III. Anh. S. 12. Neue Schwed. Abh. IV. S. 120. B.

18. Die dreizehige Meve.

(18. Der Tarrook. Tarrok G.)

Larus tridactylus. L. dorso conescente, rectricibus albis, digito postico mutico. LATHAM Ind. orn. II. p. 817. No. 11. 2)*Larus tridactylus* LIN. I. p. 224. 2. Ed. XIII. I. 2. p. 595. No. 2. a) — Faun. Suec. N. 157. — MÜLLER Zool. No. 161.

La Mouette cendrée tachetée. BRISS. orn. VI. p. 185. No. pl. 17. fig. 2. — BUFF. ois. VIII. p. 424. — Pl. enl. 387.

Tarrook. RAU Syn. p. 128. A. 4. — WILL. orn. p. 346. pl. 68. — Br. Zool. II. No. 251. — Arct. Zool. p. 533. D. b)

Lev. Mus. c)

Die Länge dieser Meve ist vierzehn, ihre Breite sechs und dreizehn Zoll, und ihr Gewicht sieben Unzen. Der Schnabel ist dick, kurz und schwarz; der Kopf, der Hals und die untern Theile sind weiß; nahe an jedem Ohr, und unter der Kehle, ist ein schwarzer Fleck; am Hinterhals ein schwarzer Halbmond; der Rücken und die Schulterfedern sind bläulichgrau; die Deckfedern der Flügel dunkelbraun, mit grauen Rändern; einige der größern ganz grau; die äußere Seite und die Enden der vier ersten Schwungfedern schwarz, die Spitzen der zwey nächsten schwarz, alle übrigen weiß; die zehn mittlern Schwanzfedern weiß, mit schwarzen Spitzen, die zwey äußersten ganz weiß; die Füße dunkelashfarben; statt der Hinterzehe hat sie einen bloßen Haken. Sie brütet in Schottland mit der folgenden Art (Nr. 19), und ist in andern nördlichen Gegenden Europens, bis nach Island und Spitzbergen, im Balthischen und im weißen Meere, so wie in Kamtschatka, zu Hause. Im Sommer ist sie in Grönland gemein; sie kommt im Frühjahr, und besucht die Seeküsten; nistet in die felsigen Klippen der Buchten, legt im Junius zwey grünlich-ashfarbene, braun gefleckte, Eyer, und zieht im Herbst von den Küsten weg. Man sieht sie oft auf die Wallrosse und Seekälber, der Fische wegen, die diese leßtern in den Untiefen vor sich her treiben, lauern, wo denn diese Vögel plötzlich ins Wasser herabschießen, und ihre Beute machen. Es sind sehr laute Vögel, besonders während der Brütezeit. Sie schwimmen gut, und fliegen eben so geschickt, und eine lange Zeit in Einem fort; oft sieht man sie auf Eischollen, die in der See schwimmen. Sowohl ihr Fleisch, als ihre Eyer werden von den Grönländern sehr geschätzt, und ihre Häute zu Kleidern gebraucht.

18. Var.

2) Hier hat Hr. Latham, der bey Ausfertigung der Synopsis noch ungewiß war, wie andere Naturforscher angenommen, daß die Kittiwake Nr. 19. (*Larus Rissa*. L.) der vollkommene, alte Vogel, und der Tarrook Nr. 18. (*Larus tridactylus*. L.) ein junger unvollkommener Vogel der dreizehigen Meve sey, weshalb ich jene beyden Namen mit diesem allgemeynen vertauscht habe. Uebrigens bleiben die Synonymen. B.

a) Latham l. c. β. B.

b) Uebers. II. S. 495. D. B.

c) Hedmann Neue Schwed. Abh. IV. S. 114.

Hier werden alle Synonymen geordnet, und diese und die folgende Art nach der Altersverschiedenheit ins gehörige Licht gesetzt. Meine N. S. Deutschlands II. S. 805. Pontoppidan N. II. S. 156. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 897. Nr. 2. B.

18. Var. A. *Larus tridactylus* L. I. 2. p. 595. No. 2. ♂?

Ihre Länge ist neunzehn Zoll. Ihr Schnabel ist zwey und ein Viertel Zoll lang, und schwarz; der Kopf, der Hals, und die untern Theile sind weiß; an jedem Ohr ist ein schwarzer Fleck; am untern und hintern Theil des Halses, hat jede Feder, gerade an der Spitze, einen dunkelschwarzen Streifen; der Rücken und die Deckfedern der Flügel sind schön hellaschfarben; vom Flügelbug bis zur Spitze der Schwungfedern der zweyten Reihe, läuft ein schwarzer Streifen, der, bey geschlossenen Flügeln, schieß zu sehn scheint, und davon herrührt, daß die weißen Federn nach dieser Richtung an den Spitzen schwarz bezeichnet sind; die vier ersten Schwungfedern sind schwarz, die innern Fahnen aber weiß, die zwey nächsten weiß, mit einem schwarzen Zeichen dicht an den Spitzen, die übrigen weiß, die der zweyten Reihe weiß, mit einem schwarzen Streifen am Schaft, und parallel mit diesem; der Schwanz ist weiß, und alle seine Federn, die äußersten ausgenommen, einen Zoll breit an den Spitzen schwarz; die Füße dunkelbraun; die hintere Klaue fehlt.

Sie ist in Kamtschatka zu Hause, und scheint die Tarrock in dem höchsten Stande ihrer Zeichnung, und von beträchtlicherer Größe, als gewöhnlich, zu sehn. Ich habe noch eine zweyte bemerkt, bey der die Zeichnung minder deutlich war, und die daneben noch ein schwarzes Gewölke unter dem Nacken hatte. Beyde besitzt Sire Joseph Banks *).

(19. Die Kittiwake. Kittiwake G.) *)

Larus Rissa. LIN. I. p. 224. 1. Ed. XIII. I. 2. p. 594. No. 1. — BRÜNN. orn. No. 140. — MÜLLER Zool. No. 160.

Kittiwake. Br. Zool. II. No. 250. pl. 89. — Arct. Zool. No. 456. f) — PHRYPPS Voy. p. 187. g)

Lev. Mus. h)

Ihre Länge ist vierzehn Zoll, ihre Breite drey Fuß zwey Zoll. Der Schnabel ist gelb, mit grün überlaufen; die innere Seite des Mundes orangefarben; Kopf, Hals, Bauch und Schwanz schneeweiß; Rücken und Flügel grau; der äußere Rand der ersten Schwungfeder, und die Spitzen der vier oder fünf nächsten, schwarz; die Füße dunkelbraun und bloß mit einem Knopf, statt der Hinterzehe.

Zuweilen variiert sie darin, daß sie hinter jedem Ohr einen dunklen Flecken hat i).

Er 3

Sie

*) In den Suppl. S. 268 steht noch der Zusatz:
„Ich habe diese Spielart, die bey Tringmouth,
„in der Landschaft Devon geschossen worden,
„im November 1785 erhalten. Herr Mar-
tin.

e) *Larus tridactylus*. Latham I. c. B.

f) Uebers. II. S. 490. Nr. 373. B.

g) Phrypps Reis. nach dem Nordpol. S. 98. B.

h) Olafsens Jol. I. S. 190. Nr. 9. Pons

toppt dans M. G. von Danemark S. 169.
Meine M. G. Deutschlands II. S. 804.
Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 896. Nr. 1.
B.

i) Ich habe im Februar 1791, da plötzlich sehr he-
ter Wetter einfiel, und diese Meven vermuth-
lich auf ihrer Heimreise begriffen waren, sehr
viele derselben beobachtet, da sie in Menge an
den

Sie bewohnt die Klippen um Flamborough Head, wo sie Sturmvogel (Petrel) genannt wird, die Boss-Insel, die großen Felsen ohnweit des Castells Glains, in der Landschaft Aberdeen, und die Piestholm-Inseln; auch hat man sie in Newfoundland angetroffen; sie findet sich ferner in Grönland, Spitzbergen, Island und dem Norden von Europa; an der arktischen Küste von Asien, und in Kamtschatka ⁴⁾. Von den Isländern wird sie Kittsa genannt.

Einige Schriftsteller behaupten, die Kittiwake sey der Tarrock (Nr. 18) in vollkommenem Zustande ¹⁾, da hingegen Andere das Gegentheil behaupten ^{m)}. Da ich selbst nicht hinlänglich unterrichtet zu seyn glaube, um hierüber entscheiden zu können, so muß ich es künftigen Ornithologen zu bestimmen überlassen.

Z u s a m m e n f a s s u n g.

20. Die Sibirische Meve.

Larus atricilloides. LATHAM Ind. orn. II. 813. n. 4. — GMELIN Linn. I. 2. p. 601. No. 19. — FALK. It. III. p. 335. t. 24.

Sie ist röthlichweiß; Kopf, Augenkreise und Hals sind schwarz; Rücken und Flügel aschgrau; die Beine scharlachroth.

Sie lebt an den südlichen Salzseen von Sibirien.

Die Beschreibung lehrt, daß sie mit der schwarzköpfigen Meve verwandt zu seyn scheint.

21. Die

den Ufern der Teiche und Flüsse todt lagen. Da sie jetzt nicht mehr jung seyn konnten, sondern ausgewacht seyn mußten, so konnte ich hierdurch und aus abgenommenen Kennzeichen schließen, was alte oder junge Vögel waren. Sie sahen durchaus folgendergestalt aus: Kopf, ganzer Unterleib und Schwanz waren schön weiß; auf den Wangen ein dunkelashgrauer Fleck; auch an einigen, die mir Junge zu seyn schienen, ein dergleichen halbmondförmiger Fleck im Nacken; der Oberleib mit den Deckfedern der Flügel schön aschgrau, der Nacken heller; von den weißen Schwungfedern hatten die fünf ersten schwarze Spitzen, wovon die vierte und fünfte noch überdies mit einem weißen Punkte an der Spitze bezeichnet waren; der Schnabel schön gelbgrün;

der Nacken und die Zunge pfirschenroth; die Füße olivenbraun.

Sie müssen nicht so viel Kälte ausstehen können als man gewöhnlich vorgiebt; denn alle waren vor Kälte oder Hunger erstarrt, ließen sich theils leicht todt schließen, theils waren sie schon todt, waren sehr hager und hatten nichts im Magen. B.

k) Arct. Zool.

l) Fabricius in der Grönländischen Fauna.

m) Linne' sagt: „Varietas forte *Lari tridactyli*, junior primi anni.“ Syst. Nat., vol. I. Adend. — Hr. Pennant spricht von ihnen, als von verschiedenen Arten. Br. Zool.



Der Riesen-Sturmvogel.



21. Die Polo-Condor-Meve.

Larus Polo-Condor. Mus. Carls. IV. No. 83.

Sie ist 10 Zoll lang; der Schnabel ist am Oberkiefer etwas gekrümmte, schwarz, mit Nasenlöchern, die an der Wurzel liegen, am Unterkiefer blaß, mit einer schwarzen Spitze, und unter der Spitze mit einer Erhabenheit versehen; die Stirn und der Vorderkopf sind aschgrau; der Scheitel aschgrau und schwarz gefleckt; die Schläfe, der Hinterkopf und Oberhals schwarz; die Schultern hellaschgrau, und durch die rostgrauen Spitzen rostfarben gefleckt; der Rücken hellaschgrau; Kehle, Gurgel, Brust und Bauch weiß; die Deckfedern der Flügel oben schwarzbraun, vorn an den Flugbug mit einem länglichen schwärzlichen Fleck; die übrigen rostgrau; die vordern Schwungfedern grauschwarz mit weißen Schäften, und dergleichen innern schmalen Rand, die hintern schwarzbraun, mit rostfarbenen Rändern und Spitzen; von den zwölf Schwungfedern ist die äußere auswendig schwarz und inwendig weiß gerändert, die zweite und dritte am äußern Rande dunkelbraun, am innern weiß mit rostfarbenen Spitzen, die übrigen bräunlichweiß; überhaupt sieht der Schwanz oben bleifarben und rostfarben weißlich und unten weiß aus.

Diese Art wurde im Chinesischen Meere bey der Insel Polo-Condor gefangen.

B.

Neunzigste Gattung. Sturmvogel.

Der Schnabel dieser Gattung ist gerade, am Ende aber gebogen; die Nasenlöcher sind mehrentheils in eine Röhre eingeschlossen; bey einigen wenigen Arten unterschieden und getrennt. Die Beine etwas über die Knie hinaus nackt; drey Zehen vorwärts, und hinten ein Sporn statt der Hinterzehe *).

* Achte, mit röhrenförmigen Nasenlöchern.

I. Der Riesen-Sturmvogel. (Giant Petrel).

(f. die hundert und siebente Kupfertafel).

Procellaria gigantea. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 563. No. 18. o)

Quebrantahuellos. BOUCAINO. Vog. p. 63. COOK'S Voy. vol. II. p. 205. — FORSTER Voy. vol. II. p. 316. — BUFF. ois. IX. p. 319.

Que-

*) Die neunzehnte Art ausgenommen, bey o) Latham Ind. orn. II. 820. n. 1. B.
der dieses Kennzeichen fehlt.

Neunte Ordnung. Schwimmvögel.

Quebrantahuellos, or Osprey Petrel. FORSTER Observ. p. 202.

— — Mouton. PERNETHY Voy. vol. I. p. 15. tab. 8. fig. 3. (der

Schnabel)

Ossifraga, or Break Bones. ULLOA Voy. 8vo vol. II. p. 214. p)

Br. Mus.

Er ist größer, als eine Gans, vierzehn Zoll lang und sieben Fuß breit. Sein Schnabel ist fünfhalb Zoll lang, beträchtlich stark, und die obere Kinnlade am Ende sehr gekrümmt; die Nöhre auf dem Rücken desselben nimmt wenigstens dritthalb Zoll, von der Wurzel an, ein; seine Farbe ist dunkelgelb, den geglätteten Buchsbaumholz nicht unähnlich; am Mundwinkel ist eine kahle, runzliche, gelbe Haut; der Scheitel ist schwärzlich; die Seiten des Kopfs, der Vorderhals, die Brust und der Bauch sind weiß; der Hinterhals und die obere Theile des Körpers, hellbraun, mit schmutziggelb gesprenkelt; die Schulterfedern, die Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern und der Schwanz einfarbig dunkelbraun; letzterer sechs Zoll lang, und seine Federn in der Mitte am dunkelsten; die Beine vier Zoll lang; die Zehen fünf und von graulichgelber Farbe; die Schwimmhäute schwärzlich; der Sporn hinten am Fuß stark und spizig, aber kurz; die Klauen schwärzlich.

Diese Vögel haben unsre Reisenden in Staakenland, Feuerland, auf der Insel der Verwüstung (I. of Desolation) und in andern Orten, der hohen, südlichen Breiten angetroffen. Man sieht sie oft, mit ausgebreiteten Flügeln, dicht auf der Oberfläche des Wassers, schweben (sailing), ohne daß sie sich jedoch zu bewegen scheinen. Sie sollen, gleich andern dieser Gattung, äußerst rastlos (active), und bey Stürmen, oder bey Annäherung derselben, in größter Menge vorhanden seyn; daher ihre Erscheinung dem Seemann sehr unwillkommen ist. Sie besuchen, wie die Schiffsvögel, auch die nördliche Halbkugel, denn unsre letzten Reisenden haben sie in der Breite 44. 10. N. im März, gesehen ^{q)}; im April an den Küsten des Nutka-Sunds ^{r)}, und wieder weiter nördlich, an der Amerikanischen Küste im Mai, paarweise ^{s)}; woraus man nicht ohne Grund auf die Möglichkeit schließen kann, daß sie im Norden brütet, obgleich bisher noch Niemand mit Gewißheit angegeben hat, wo sie ihre Art fortpflanzen; wenn es im Süden geschähe, so müssen sie auf die nämliche Art wandern, wie die Schiffsvögel, was auch nicht unwahrscheinlich ist, da man sie oft in Gesellschaft dieser Vögel findet, und es ist sicher, daß sie in den südlichen Gegenden in der größten Anzahl angetroffen werden. Capitän Cook hat sie in ungeheurer Menge im Weihnachts-Haven, in Kerquelens-Land ^{t)}, im December angetroffen, wo sie so zahm waren, daß sie sich von unsern Ma-

trogen

p) Arct.; Zool. II. Suppl. p. 71. Donndorfs! Zool. Beytr. II. S. 836. Nr. 18. B.

q) Cooks last. Voy. vol. II. p. 258.

r) Cook a. a. O. p. 290.

s) Cook a. a. O. p. 352. — Wo ich nicht irre ist dieß eine von den Arten, die Stupische genannt werden, und die so häufig auf allen Inseln zwischen Kamtschatka und Amerika

seyn sollen, daß sie ganz damit bedeckt sind. Eine davon soll so groß seyn, als eine Gans oder ein Adler; ihr Schnabel krumm und gelblich; die Augen so groß, wie bey den Eulen; das Roßroth schwarz, über den ganzen Körper mit weißen Flecken melirt. Zwey hundert derselben hat man auf Einmal von einem toben Wallross gefressen gesehen. Hist. Kamtschat. p. 156,

t) Cook a. a. O. vol. I. p. 87.

trofen am Ufer mit Stöcken todschlagen ließen. Es sind fleischfressende Vögel, die von dem Nas der Seefälber, oder der Vögel leben, obschon ihre hauptsächlichste Nahrung Fische sind. Die Schiffsleute zählen sie mehrentheils zu den Schiffsvögeln; bey denen aber, die mehr Unterschied machen, sind sie unter dem Namen Mutter-Cary's Gänse (Mother Cary's Geese) wohl bekannt, und werden für eine sehr gute Speise gehalten *).

2. Der Brasilische Sturmvogel. (Brazilian P.)

Procellaria brasiliana. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 564. No. 19. v)

Le Puffin du Bresil. BRISS. orn. VI. p. 138. No. 4. — BUFF. ois. IX. p. 337. IV.

Majague. RAI Syn. p. 133. No. 3. — WILL. orn. p. 334. pl. 62. x)

Diese Art hat, nach Willoughby, die Größe einer Gans. Ihr Schnabel ist gekrümmt; der Kopf rund und dick; der Hals lang; der ganze Vogel von dunkler und schwärzlicher Farbe, den Vorderhals ausgenommen, der mit gelben Federn geziert ist.

Sie ist in Brasilien an den Mündungen der Flüsse zu Hause; ihr Nest aber, und ihre Eier legt sie an die Küste. Sie ist ein geschickter Vogel, der gut schwimmt und taucht. Ihr Fleisch ist ein sehr gutes Gericht, besonders wenn es jung ist. Ich bin ungewiß, ob dieß ein Sturmvogel ist, oder nicht, halte es aber für billig, Brisson's Meynung zu folgen, wornach er zu dieser Gattung gehört, bis fernere Beweise das Gegentheil darthun.

3. Der schwarze Sturmvogel. (Black P.)

Procellaria aequinoctialis LIN. I. p. 213. 4. Ed. XIII. I. 2. p. 564. No. 4. y)

Le Puffin du Cap. de b. E. BRISS. orn. VI. p. 137.

Le Petrel-Puffin brun BUFF. ois. IX. p. 326.

Shearwater. BROWN Jam. p. 482.

Great black Petrel. EDW. Nat. Hist. pl. 89. z)

Lev. Mus.

Er hat die Größe eines Kolk-Raben, und ist drey und zwanzig Zoll lang. Sein Schnabel ist drey Zoll lang, und die Röhren der Nasenlöcher einen halben Zoll; der ganze Schnabel von gelblicher Farbe, und die Näthe desselben schwarz; der ganze Körper schwärzlichbraun; Füße, Zehen und Schwimmhäute braun; die Klauen schwarz.

Er

z) Cook a. a. O. vol. II. p. 205:

v) Latham Ind. orn. II. 821. n. 2. B.

x) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 83. Nr. 19. B.

y) Latham Ind. orn. II. 821. n. 3. B.

z) Seligmanns Vögel IV. Taf. 73. Forts
setz. Reise Ed. 8. p. 56. Donndorfs
Zool. Beytr. II. S. 836. Nr. 4. B.

Neunte Ordnung. Schwimmvögel.

Er variirt darinn, daß die obere Schärfe (ridge) des Schnabels schwarz, und ein großer, weißer Fleck am Rinn ist ^{a)}).

Er ist auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung und in den angränzenden Gegenden zu Hause. Man hat ihn auch in Neußeeland angetroffen ^{b)}).

3. Var. A. Der Kurilische Sturmvoegel. (Kuril P.)

Procellaria aequinoctialis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 564. No. 4. *β. bb*)
Kuril petrel. Arct. Zool. p. 536. A. c) — PALLAS Spicileg. V. p. 28.

Dieser ist um die Hälfte größer, als der vorige. Er hat einen starken, gelben Schnabel; sein ganzes Gefieder ist einfarbig rothschwarz; die Füße eben so, und roth gestreift.

Er ist auf den Kurilischen Inseln und in Kamtschatka zu Hause.

4. Der graue Sturmvoegel. (Grey P.)

Procellaria grisea. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 564. No. 20. *cc*)
Dark grey Petrel. COOKS Voy. vol. I. p. 258.
Lev. Mus.

Von der Größe einer Dohle, und vierzehn bis funfzehn Zoll lang. Sein Schnabel ist zwey Zoll lang, und braun; das ganze Gefieder schwarz, oder rußfarbig; die untern Deckfedern der Flügel weiß, mit schwarzen Schäften; die Flügel etwas länger, als der Schwanz; die vordere Seite der Füße grünlichblau.

Bey dem Exemplar im Leverschen Museum sind Rinn und Kehle weißlich.

Er ist auf der südlichen Halbkugel, vom 35sten bis zum 50sten Grad, zu Hause, und scheint sehr mit dem schwarzen Sturmvoegel (Nr. 3.) verwandt zu seyn.

5. Der Eis-Sturmvoegel. (Glacial P.)

Procellaria gelida. LIN. Ed. III. I. 2. p. 564. No. 21. *d*)

Seine Länge ist neunzehn Zoll. Der Schnabel ist sieben Viertel Zoll lang und gelb, die Röhre, welche die Nasenlöcher bedeckt, der Rücken der obern Rinnlade, und das Ende der untern schwarz, die Ränder beyder von der nämlichen Farbe; der Schetel, mit Einschluß der Augen, und der Hinterhals, bis an die Schultern, sind hellbläulich aschfarben; die übrigen obern

^{a)} Im 35. 15. Grad S. Breite, und 7. 45. Gr. W. Länge. — COOKS, last. Voy. vol. I. p. 36. — Bey diesem aber waren sowohl Schnabel als Füße schwarz.

^{b)} Forster Voy. vol. I. p. 113. 487.

^{bb)} Latham I. c. *β.* B.

^{c)} Latham II S. 498 Nr. 382. B.

^{cc)} Latham Ind. orn. II. p. 821 n. 4. B.

^{d)} Latham Ind. orn. II. p. 822. n. 5. B.

obern Theile dunkelschwarz; das Kinn, der Vorderhals und die Brust weiß; von hier an bis zum After ist die Farbe hell aschgrau; Füße und Schwimmhäute blau; die Klauen schwarz; die Fußsohle weiß.

Er ist im antarctischen Ocean, nebst vielen andern Arten zu Hause, und findet sich vorzüglich zwischen dem Eise.

6. Der weißbrüstige Sturmvogel. (White-breasted P.)

Procellaria alba. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 565. No. 22. dd)

Seine Länge ist sechzehn Zoll. Der Schnabel ist anderthalb Zoll lang, an der Spitze gekrümmt, und schwarz; der Kopf, der Hals und die obern Theile des Körpers dunkelbraun, benähe schwarz; an der Kehle ist ein weißlicher Fleck; Brust, Bauch und After sind weiß; die untern Deckfedern des Schwanzes aschgrau und weiß melirt; der Schwanz am Ende abgerundet; die Füße schwarzbraun; die vordere Seite der Zehen zur Hälfte schwarz, die äußere Seite der äußern Zehe, ihrer ganzen Länge nach eben so; die Schwimmhäute schwarz; der hintere Sporn stumpf.

Er ist auf den Inseln des stillen Meeres, auf der Turteltauben- und Weyhnachts-Insel zu Hause, und befindet sich in der Sammlung des Hrn. Jos. Banks.

Hierher wird im Ind. orn. I. c. β als Varietät gerechnet:

Der Norfolkische Sturmvogel.

PHILIPP VOY. t. p. 161.

Meyers Zool. Entd. S. 63.

Die Länge ist 16 Zoll; der Schnabel schwarz, sehr zusammengedrückt und gekrümmt, der Oberleib rußfarben; der Unterleib aschgrau; das Gesicht weiß und dunkelbraun gemischt; die Schwungfedern weit über den Schwanz hinausreichend; die Füße gelblich, die Zehen mit der Schwimmhaut nach vorne zu halb schwarz.

Er hält sich auf der Insel Norfolk auf. Er gräbt sich Löcher in den Sand wie ein Kaninchen. In diesen Höhlen liegt er am Tage verborgen, und kommt des Abends hervor um Futter zu suchen.

White glaubt, sein Sturmvogel sey wohl nur eine Varietät vom schwarzen Nr. 3. Er habe die Größe eines Kolkraben. Der ganze Vogel ist dunkelbraun oder schwärzlich; am Kinn ein kleiner weißer Fleck, der an jeder Seite der Kinnlade etwas hinter geht; der Schnabel gelblichweiß.

B.

Hy 2

7. Der

dd) Latham Ind. orn. II. p. 821. n. 6. B.

7. Der antarktische Sturmvoegel (Antartic P.)

Procellaria antarctica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 565. No. 23. e)

Le Petrel antarctique, ou Damier brun. BUFF. ois. IX. p. 311.

Brown et whit Petrel. BOUGAINO. Voy. vol. I. p. 42?

Antarctic Petrel. FORST. Voy. vol. I. p. 108. ee) — Cook Voy. vol. I. p. 257.

Er hat die Größe einer großen Taube, und ist sechzehn Zoll lang. Sein Schnabel ist anderthalb Zoll lang, braun, mit einer schwarzen Spitze; der Augenstern bräunlich ruffarben; die Hauptfarbe des Gefieders der obern Theile dunkelbraun; der untern bläulichweiß; die äußern Schwungfedern weiß, mit dunkelbraunen Spitzen, die großen dunkelbraun, und einige der zunächst am Körper stehenden haben weiße, innere Fahnen; Steiß und Schwanz sind weiß; die Spitzen aller Schwanzfedern fast eines Zolls breit schwarz; die Füße dunkel bleifarben.

Er findet sich innerhalb des antarktischen Kreises, ringsherum. Man hat ihn in Flügen zu zwanzig oder darüber, im 61. 36. Grad S. Breite angetroffen und die Bemerkung gemacht, daß die Dichtigkeit des Gefieders bey dieser Art von Vögeln, sichtbarer ist, als bey andern, indem die Natur Sorge getragen hat, sie dem Klima, in dem sie leben, genau anzupassen.

8. Der Capische Sturmvoegel. (Perlühnerartige Sturmvoegel: Pintado P.)

Procellaria capensis. LIN. I. p. 213. 5. Ed. XIII. I. 2. p. 565. No. 5. f). —

Amoen. Acad. vol. IV. p. 240. — OSBECK Voy. p. 46.

Le Petrel tacheté, ou le Damier. BRISS. orn. VI. p. 146. No 3. — BUFF. ois.

IX. p. 304. pl. 21. — Pl enlum. 964. — PERNETHY Voy. vol. II. p. 72.

Pardela. ULOA Voy. vol. II. p. 304.

White et black spotted Peteril. EDW. Nat. Hist. pl. 90. g)

Pintado Bird. DAMPIER Voy. vol. III. pl. in p. 96. fig. 1.

Br. Mus. Lev. Mus. b)

Er hat die Größe der Kittiwake ⁱ⁾, und vierzehn Zoll Länge. Sein Schnabel ist anderthalb Zoll lang und schwarz; der Kopf, der Hinterhals, die Schwungfedern und der Schwanz sind schwarz; die Seiten des Kopfs schwarz und weiß gesprenkelt; alle untern Theile weißlich, unregelmäßig mit schwarzen Flecken bezeichnet; die Füße schwarz.

Sie pflegen sehr in ihrem Gefieder zu varilren. Diese Vögel sind, wie ich glaube, auf die südliche Halbkugel eingeschlossen, indem man sie selten weit über 30 Grade nordwärts sieht. Am häufigsten sind sie am Vorgebürge der guten Hoffnung ^{k)}, und in den angränzenden Gegenden.

e) Latham Ind. orn. II. 822. n. 7. B.)

ee) Dessen Reise Ed. 8. S. 112. B.

f) Latham Ind. orn. II. 822. n. 8. B.

g) Seltigmanns Vögel IV. Taf. 75. B.

h) Forsters Reise Ed. 8. I. N 53. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 837. Nr. 5. B.

i) S. die vorige Gattung Nr. 19.

k) Dampier und Andere. — Nach der Sage der Matrosen, sollen sie ein sicherer Vorbote der Annäherung an dieses Vorgebürge seyn.

Gegenden. Unsere Matrosen nennen sie Cap-Tauben. Es flogen ihrer immer viele miteinander, selten hoch, sondern fast immer auf der Oberfläche des Wassers schwebend (sweeping) ¹⁾. Zuweilen erscheinen sie in so ungeheurer Menge, daß man ihrer sieben hundert in Einer Nacht gefangen hat ^{m)}. Die Matrosen fangen sie oft mit getheilten Riemen (tarred string), oder mit einem Stück Speck an einer Angelruthe ⁿ⁾. Dampier sagt, er habe sie in der größten Menge ohngefähr zwey hundert Meilen von Brasilien, bis ohngefähr wieder zu der nämlichen Entfernung von der Küste von Neuholland angetroffen. Unsre Reisenden trafen sie in Neuseeland ^{o)}, auf den Falklands-Inseln und in vielen andern Orten an; und in der That scheinen sie ringsherum durch den ganzen Südpol zerstreut zu seyn. Einer ihrer Brüteplätze ist in Kerguelens Land. Ihr Ey hat die Größe eines Hühnereyes, und wird im December gelegt ^{p)}. Wenn sie gefangen sind, schreyen sie fast wie der Papagey und spritzen ein Del aus den Nasenlöchern, den Leuten, die sie halten, ins Gesicht. Sie leben von Fischen, häufiger aber von dem As der Wallrosse u. dgl. um welches man sie zu Zeiten in großer Anzahl versammelt sieht ^{q)}.

Var. A. ^{r)}

Auf der Insel Desolation haben unsre letzten Reisenden eine bedeutende Spielart angetroffen, die sich darin unterschied, daß die Theile, die bey dem gemeinen weiß sind, schön weißgelblich oder semischleiderfarben waren; der Schwanz war weiß, mit schwarzen Spitzen; die Wurzel der Schwungfedern weiß; die Füße braun; die Schwimmhäute schwarz; und zwey der innern Zehen in der Mitte orangefarben. — Diese ist in der Sammlung des Herrn Jos. Banks.

9. Der Fulmar. (Fulmar)

Procellaria glacialis. LIN. I. p. 213. 3. Ed. XIII. I. 2. p. 562. (No. 3. ^{r)}) — FAUN. Suec. No. 144. — BRÜNN. ORN. No. 118. — MÜLLER Zool. No. 144. — FAUN. Groenl. No. 55.

Le Petrel cendré. BRIS. ORN. VI. p. 143. No. 2. pl. 12. fig. 2.

Le Fulmar. ou Petrel Puffin gris-blanc. BUFF. OIS. IX. p. 302. pl. 22. — Pl. enlum 59.

Wagellus Cornubiensium, Burgomaster of Groenland. RAI Syn. p. 130. A. 13. Hasthert, or Sea Horse. WILL. ORN. p. 395.

Vy 3

Ful-

^{d)} Dampier.

^{m)} Auf Maso Fuero. f. Hawkesw. Voy. vol. I. p. 556.

ⁿ⁾ Osbeck Voy. vol. I. p. 109.

^{o)} Forst. Voy. vol. I. p. 489.

^{p)} Cooks last. Voy. vol. I. p. 86.

^{q)} Ives bemerkt, wenn sie gefangen, und an den Bord des Schiffs gebracht worden wären, so könnten sie sich nicht vom Verdeck zum Flug erheben, sehr leicht hingegen könnten sie dieses, aus einem Gefäß mit Wasser. Ives Voy. p. 5.

^{r)} Latham I. c. p. 3.

^{s)} Latham Ind. ORN. II. p. 823. n. 9. V.

Fulmar. Br. Zool. II. No. 257. pl. 91. — Arct. Zool. No. 461. 1)
 Lev Mus. 2)

Seine Länge ist siebenzehn Zoll, und sein Gewicht zwey und zwanzig Unzen. Der Schnabel ist zwey Zoll lang, von hellgrauer Farbe mit einer gelblichen Spitze; der Rücken und die Deckfedern der Flügel sind aschfarben; die Schwungfedern dunkelbraun; das übrige Gefieder weiß; die Füße graulichgelb; bey einigen Vögeln ist der Schwanz hellaschfarben.

Diese Art hält sich in den nördlichen Gegenden Großbritanniens und von da aus viel weiter gegen Norden auf, als unsre Reisenden vorgebrungen sind. In der größten Menge ist sie auf der Insel St. Kilda, wo sie im November erscheint, und das ganze Jahr hindurch da bleibt, den September und October ausgenommen. Sie legt Ein weißes und sehr zerbrechliches Ey, und ihre Jungen werden in der Mitte des Junius ausgebrütet. Sie ist auch sehr gemein in Grönland *) und den angränzenden Ländern, und von großem Nutzen für die Einwohner, als Speise, denn sie essen ihr Fleisch gesotten oder getrocknet, in Ermangelung eines bessern, da es sehr übel riecht und unangenehm schmeckt. Das Fett wird roh gegessen, oder als Del in den Lampen gebrannt; und der kleine Beutel unter der Kinnlade wird in eine Blase geformt, um ihre kleinen Arten von Pfellen darauf zu stützen, womit sie oft den Vogel selbst, wenn er ruhig auf der Oberfläche des Wassers sitzt, erlegen; denn er ist gar nicht sehr auf seiner Huth, und läßt die Leute sehr nahe an sich kommen; daher ihn die Holländer Mallemucke, oder dummer Flieger nennen.

Die Nahrung dieser Art sind größtentheils Fische; sie hascht aber auch begierig nach Allem was in Nahrung verwandelt werden kann, und nach dem Urarath aus den Schiffen, die sie häufig begleitet. Ihrer hundert sitzen oft auf dem Nas eines todten Wallrosses, und picken das Fett heraus das im Magen gleich flüssig wird, und daher den alten Vögeln dazu dient, es wieder in den Mund ihrer Jungen auszuwerfen, und sie damit zu füttern, so lange sie im Neste sind; so spritzen sie es auch bey Gelegenheit, sowohl aus dem Mund, als aus den Nasenlöchern, mit großer Gewalt denen ins Gesicht, die sie fangen wollen, und dieß ist auch in der That die einzige Vertheidigung, deren sie sich gegen ihren Feind bedienen.

Sie sind auch zwischen Kamtschatka und Amerika zu Hause, wo sie, wie ich glaube; mit andere verwechselt, und unter dem allgemeinen Namen: Glupische 2) begriffen werden; sie sind so dumm, daß sie oft in die Boote der Fischenden fliegen. Man versichert, sie seyen so fett, daß die Einwohner weiter nichts zu thun haben, als die Häute auszupressen, aus denen dann

2) Uebers. II. S. 495. Nr. 378. B.

*) Forsters Reise Ed. 8. S. 55. Phtpps Reise S. 97. Pontoppidan Norwegen. II. S. 143. Schriften der Drontheim. Gesellschaft. I. S. 155. Schwedische Abh. XXI. S. 94. Meidingers Vorl. I. S. 125. Nr. 2. Leemss Pappl. S. 143. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 834. Nr. 3. B.

x) Sie brütet in großer Menge an der felsigen Küste im Westen von Disko, und an andern, vom festen Land entfernten Orten. Faun. Groenl.

y) Dieser Name rührt von der Dummheit dieser Vögel her.

dann das Fett wie Del herausläuft, und auch zu eben diesem Zwecke verwandt wird. Eine große Anzahl wurde auf der vierten und fünften der Kurilischen Inseln gefangen, wo sie die Einwohner in der Sonne trocknen, und sich ihrer zur Speise bedienen. Sie finden sich auch an den Küsten von Grönland ²⁾. Auch in den antarktischen Gegenden sind sie ziemlich gemein, vom Vorgebürge der guten Hoffnung aus so weit gegen Süden, als man bisher gekommen ist; und zwar in größerer oder geringerer Menge vom 34. bis zum 70. Grad S. Breite ringsum den Pol herum ³⁾.

Im Britischen Museum bemerke ich einen Vogel dieser Art, der fast zwanzig Zoll lang ist. Er hat einen dunkelbraunen Streifen zwischen den Augen; der Schwanz ist dunkelbraun ⁴⁾ und am Ende spitzig; die Füße von blasser Farbe, fast weiß.

9. Var. A. *Procellaria glacialis*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 562. No. 3. β . c)

Von der Größe des letztern. Der Schnabel ist schwarz, stark, und am Ende sehr gekrümmt; Kopf, Hals, Körper und Schwanz weiß; zwischen den Flügeln hellaschfarben; die ganzen Flügel dunkelschwarz; die Füße dunkelbraun.

Er ist im antarktischen Meere, sehr weit gegen Süden, zu Hause.

10. Der aschgraue Sturmvogel. (Cinereous P.)

Procellaria cinerea. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 563. No. 17. d)
Br. Mus.

Er hat die Größe des vorhergehenden, und ist zwanzig und ein Viertel Zoll lang. Sein Schnabel ist gelblich, mit schwarzen Näthen; der Augenstern aschfarben; alle obern Theile des Gefieders dunkel aschfarben, der Scheitel und die Stirn am hellsten; die untern Theile, vom Kinn bis zum After, weiß; der Schwanz abgerundet und schwarz, die untere Seite der Federn hellaschfarben; die Füße bläulich; die Schwimmhäute hellgelb; Zehen und Klauen blaß.

Ich habe eine Spielart hiervon, mit hellbraunem Schnabel, und tief dunkelschwarzer Brust und Bauch gesehen.

Diese Art ist hauptsächlich in den Gegenden innerhalb des antarktischen Kreises zu Hause. In der Breite vom 48 Grade hat man viele gesehen. Ihr Futter ist mannichfaltig; man hat auch die Schnäbel der Ruttelfische in ihren Mägen gefunden.

10. Der

2) Phypps Voy. p. 186.

3) Forst. Voy. vol. I. p. 52. vol. II. p. 534.
Cooks. Voy. vol. I. p. 252.

b) Nach Brännich, sind die Schwanzfedern ganz schwarz.

c) Latham I. c. β . B.

d) Latham Ind. orn. II. 824. n. 10. B.

II. Der Wasserscheerer, oder gemeine Sturmvogel. (Shearwater P.)

- Procellaria Puffinus*. LIN. I. 213 No. 6. Ed. XIII. I. 2. p. 566. No. 6. e) —
 BRÜNN. orn. No. 119. — Faun. Groenl. No. 56. — MÜLLER Zool. p. 18.
Le Puffin. BRISS. orn. VI. p. 131. No. 1. — BUEF. ois. IX p. 321. — Pl.
 enlum. 962.
Manks Puffin. RAU I. c. p. 134. A 4. — WILL. I. c. p. 333. — EDW. Nat. Hist.
 pl. 379. f)
Shearwater. RAU I. c. p. 133. A. 2. — WILL. I. c. p. 334. — Br. Zool. No.
 258. — Arct. Zool. No. 462. g)
 Br. Mus. Lev. Mus. h)

Seine Länge ist funfzehn Zoll, und sein Gewicht siebenzehn Unzen. Der Schnabel ist sieben Viertel Zoll lang und gelb, mit einer schwarzen Spitze; die obern Theile des Körpers, die Flügel, der Schwanz und die Schenkel sind schwarz; die untern vom Kinn bis zum After weiß; die Füße schwach, an den Seiten zusammengedrückt, vorne weißlich, hinten dunkelbraun.

Büffons Vogel ist etwas größer, kommt aber in der Beschreibung mit diesem überein.

Dieser findet sich im Norden von England, besonders auf Calf of Man und den Orkadischen Inseln; auch in Dänemark, Island, Grönland und ohne Zweifel noch weiter gegen Norden. Nach England kommt er im Februar, nimmt kurzen Besitz von den Raubthier-Höhlen, und verschwindet wieder im April, wo er zurückkehrt. Er legt Ein weißes, an beiden Enden stumpfes, Ei; die Jungen kann man zu Anfang des Augustmonaths ausnehmen; wo eine große Menge von dem Pächter obiger Insel getödtet werden. Sie werden eingesalzen, in Fässer geschlagen, und, wenn sie gekocht sind, mit Bataten gegessen. Den Tag über halten sie sich zur See auf, um Fische zu fangen, und gegen Abend kommen sie zu ihren Jungen zurück, die sie eben so äßen, wie der Fulmar (Nr. 9.); zu Ende Augusts oder Anfang Septembers verlassen sie die Insel. Auf den Orkadischen Inseln bauen sie ihr Nest in Höhlen in der Erde, an den Sandbänken (Shelves) der Felsen und Vorgebürge; man nennt sie dafelbst Lyre, und schätzt sie sehr, sowohl weil man sich ihrer zur Speise bedient, als auch wegen ihren Federn. Sie werden eingesalzen, und eben so benutzt, wie oben gesagt worden. Man fängt auch die Alten, im März; sie sind aber dann mager und nicht so wohl-schmeckend, als die Jungen. — Auf den Orkaden lassen sie sich zuerst im Februar sehen ¹⁾. Sie besuchen auch das Arlandische ²⁾ und das Südmeer ³⁾, denn unsre Reisenden haben sie in verschiedenen Gegenden des letztern angetroffen,

Man

e) Latham Ind. orn. II. 824. n. 11. B.

f) Seltmanns Vögel IX. Taf. 49. B.

g) Uebers. II. S. 496. Nr. 379. B.

h) Forsters Reise Ed. 8. I. S. 52. Pons-
 topidan N. S. v. Dänemark. II. S. 181.
 Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 839. Nr. 6.
 B.

i) Br Zool.

k) Allenthalben, von unserm Canal bis an die
 Küste von Amerika. Kalm, Trav. vol. I.
 p. 23.

l) 25 Grad S. Forst., Voy. vol. I. p. 50.
 — In Neuseeland. ibid. p. 478. —
 Cooks last Voy. vol. III. p. 175.

Man ^{m)} hat bemerkt, daß dieser Vogel wellenförmig fliegt, indem er so weit herabsteigt, daß er fast die Oberfläche des Wassers berührt, und dann wieder wechselsweise hinauffliegt. Im Schwimmen scheint er sich mit der größten Schwierigkeit von der Oberfläche zu erheben, und bey dieser Anstrengung hat der Kopf eine Strecke lang das Uebergewicht, wo dann der Schnabel das Wasser gleichsam zerschneidet; daher der Vogel vielleicht die Namen Cutwater (Wasserschneider) und Shearwater (Wasserschere) bekommen hat ⁿ⁾.

II. Var. A. *Procellaria Puffinus*. LIN. Ed. XIII. I. 2. 566. No. 6. β . o)

Le Puffin cendré. BRISS. orn. VI. p. 134. No. 2. pl. 12. fig. 1.

Le Petrel cendré. BUFF. ois. IX. p. 302. pl. 20.

Er hat ohngefähr die Größe des vorigen. Sein Schnabel ist über zwey Zoll lang und schwarz; der Hinterkopf weißlich, mit einem aschfarbenen A-strich; die übrigen obern Theile sehr artig aschfarben; der vordere Theil des Kopfs, und die untern Theile des Körpers schneeweiß; die Afterflügel schwarz gefleckt; die Schwungfedern äußerlich schwarz; der Schwanz weiß; die Füße graubraun.

Er ist in den nördlichen Gegenden zu Hause, und wahrscheinlich der braune Sturmvogel (brown Shearwater), der oft einen weißen Ring um den Hals hat, und den Kalm als lenthallen von unserm Canal bis an die Küste von Amerika gesehen hat. Er sagt, er habe einen besonders niedrigen Flug, und man habe ihn deutlich Fische fressen sehen ^{p)}.

12. Der schwarzzeheige Sturmvogel. (Black-toed P.)

Procellaria melanopus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 562. No. 16. q)

Lev. Mus.

Seine Länge ist dreyzehn Zoll. Der Schnabel ist anderthalb Zoll lang und schwarz; die Wurzel des Schnabels rings herum, das Kinn und die Kehle sind hell silbergrau, mit kleinen, dunklen Fleckchen bezeichnet; der Scheitel, alle obern Theile des Gefieders, die Flügel und der Schwanz dunkelschwarz, am Rücken ins schimmelgraue ziehend; der Schwanz am Ende abgerundet; Flügel und Schwanz gleich; die untern Theile des Körpers schimmelgrünlich- aschfarben; die Füße sehr blaß; die Schwimmhäute ein Drittel ihrer Länge eben so, das Uebrige bis zum Ende schwarz; die Zehengelenke auch schwarz.

Er soll in Nordamerika zu Hause seyn.

13. Der

^{m)} Zus. aus den Suppl. S. 269.

ⁿ⁾ Herr Jackson.

^{o)} Latham l. c. β . B.

^{p)} Kalm a. a. O.

^{q)} Latham Ind. orn. II. 825. n. 12. Arct. Zool. Suppl. p. 73. B.

13. Der schneeweisse Sturmvogel. (Snowy P.)

Procellaria nivea. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 562. No. 15. r)

Le Petrel blanc, ou Petrel de neige. BUFF. ois. IX. p. 314.

Snowy Petrel. FORST. Voy. vol. I. p. 96. — COOKS Voy. vol. I. p. 33.

Br. Mus. Lev. Mus.

Von der Größe des Capschen Sturmvogels (Nr. 8), und einen Fuß lang. Der Schnabel ist fünf Viertel Zoll lang, seine Farbe schwarz, an der Wurzel ins Blaue ziehend; die Röhre, welche die Nasenlöcher enthält, läuft sehr weit an der obern Kinnlade vor, die am Ende stark gekümmt ist; das ganze Gefieder ist von reinem Weiß, und die Schäfte der Federn schwarz; die Flügel sind länger, als der Schwanz; die Füße dunkel meergrün, oder blau, mit hellen Schwimnhäuten; die Klauen lang und krumm.

Dieser findet sich in den kältern Gegenden der südlichen Länder, auf der Insel Georgia ¹⁾, im Feuerland und anderwärts; aber nirgends in solcher Menge, als in der Nähe des Eises oder innerhalb weniger Meilen von demselben, und ist der Vorläufer des Eintretens desselben; selbst auf den Eismassen sieht man diese Vögel oft in beträchtlichen Flügen.

14. Der braunbandirte Sturmvogel. (Brown-banded P.)

Procellaria desolata L. I. 2. p. 562. No. 14. r)

Seine Länge ist eilf Zoll. Der Schnabel ist einen Zoll lang, schwarz, mit einer gelblichen Spitze; das Gefieder der obern Theile des Körpers ist grünlich aschfarben, am dunkelsten auf dem Scheitel; die Seiten des Kopfs, mit Einschluß der Augen und alle untern Theile des Körpers, weiß; der Flügelrand fast schwarz; Schwungfedern und Schwanz dunkelbraun, letzterer am Ende abgerundet, und mit dunkelbraunen Spitzen; die Füße braun; die Schwimnhäute gelb; die Klauen schwarz; wenn die Flügel ausgebreitet sind, so zeigt sich an ihnen ein dunkelblaues Band von Einer Spitze zur andern, queer über den Leib.

Er ist auf der Insel Desolation zu Hause. In der Sammlung des Hrn. Jos. Banks.

15. Der rußfarbene Sturmvogel. (Sooty P.)

Procellaria fuliginosa. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 562. No. 13. rr)

Seine Länge ist eilf Zoll. Der Schnabel ist schwarz, einen Zoll lang, und an der Spitze gekrümmt; der Augenstern hell aschfarben; Kopf und Hals rußschwarz; der Körper aber überhaupt braun überzogen, fast wie die gemeine Mauerfledermaus ²⁾; der Steiß ist braun; die untern Theile so ziemlich wie die obern, aber heller; der Flügelrand aschfarben melirt; der Schwanz

r) Latham Ind. orn. II. 825. n. 13. B.

s) Forst. Observ. p. 72. Voy. I. c. p. 98. —

Cook I. c. p. 23.

r) Latham Ind. orn. II. p. 825. n. 14. B.

rr) Latham Ind. orn. II. p. 825. n. 15. B.

u) Allg. Uebers. II. B. 2. Th. S. 574. Nr. 34.

Neunzigste Gattung.* Sturmvogel.

359

Schwanz etwas gabelförmig, die Federn selbst aber an den Enden viereckig, von Farbe, so wie die Schwungfedern, schwarz: die Flügel sind, geschlossen, ein wenig länger, als der Schwanz; die Füße dünn, einen Zoll lang und schwarz.

Er ist in Otahite zu Hause. In der Sammlung des Herrn Jos. Banks *).

16. Der gabelschwänzige Sturmvogel. (Fork tail P.)

Procellaria furcata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 561. No. 12. y)

Fork - tail Petrel. Arct. Zool. No. 463. z)

Lev. Mus.

Seine Länge ist zehn Zoll. Der Schnabel ist schwarz und drey Viertel Zoll lang, die obere Kinnlade am Ende stark gekrümmt, und die Röhre in der die Nasenlöcher liegen, reicht etwas an den Rücken derselben hin; die Hauptfarbe des Gefieders ist ein dunkles Silbergrau, das unten am hellsten ist; das Kinn ist sehr blaßgrau; der After weiß; an der Stirn und am Wirbel findet sich eine Mischung von Braunem; der innere Flügelrand ist dunkelschwarz; die Schwungfedern sind schwärzlichgrau; die der zweyten Reihe an den Rändern von hellem Grau; die Deckfedern des Schwanzes sehr lang; der Schwanz selbst hat die Farbe der Schwungfedern und ist gabelförmig, die äußerste Feder an der weißen Fahne weiß; die geschlossenen Flügel haben mit dem Schwanz gleiche Länge; die Füße sind schwarz.

Er findet sich zwischen dem Eis, zwischen Asien und Amerika.

17. a Der Meersturmvogel. (Frigate P.)

Procellaria marina. LATHAM Ind. orn. II. p. 826. No. 18.

Dieser ist neunthalb Zoll lang. Sein Schnabel ist Einen Zoll lang, dünn, und nicht stark gebogen; der Scheitel und der Hinterhals bis an die Schultern sind bläulich aschfarben; der Rücken und die Deckfedern der Flügel braun; der Steiß schimmelblau; die Seiten des Kopfs, über den Augen, und alle untern Theile weiß; unter den Augen ist eine Spur vom bläulich aschfarbenen; der Schwanz scheint, wenn er ausgebreitet ist, in der Mitte ausgehöhlt zu seyn, man kann ihn aber kaum gabelförmig nennen; die Füße sind schwarz; in der Mitte jeder Schwimmhaut ist ein gelbliches Zeichen. Dieß ist die Beschreibung eines Vogels unter den Gemälden des Herrn Joseph Banks.

„Er wohnt im Südmeer, im 37. Grad der Breite, Er varirt mit blassen Steiß.
„Latham Ind. orn. I. c.“ B.

3 3 2

31.

x) In der nämlichen Sammlung ist ein Gemälde, y) Latham Ind. orn. II. 825. n. 16. B.
auf dem jede Schwimmhaut zwischen den Zehen z) Uebers. II. S. 497. Nr. 380. B.
mit einem gelben Fleck bezeichnet ist.

Z u s a m m e n f a s s u n g.

17. b Der Segler.

Procellaria Fregata. LIN. I. p. 212. 2.

GMELIN LIN. I. 2. p. 561. n. 2. — LATHAM Ind. orn. II. 826. n. 17.

Hirundo americana, Rochef. It. 134. t. 135.

Im Ind. orn. ist dieser Vogel von dem vorhergehenden als Art verschieden.

Er ist kleiner als der Ungewittervogel Nr. 18.; oben schwarz, unten weiß; die Füße schwarz.

Er wohnt am großen Weltmeer. B.

18. Der Ungewittervogel. (Stormy P.)

Procellaria pelagica. LIN. I. p. 212. I. Ed. XIII. I. 2. p. 561. No. 1. a) — Faun.

Suec. No. 143. — AMOEN. academ. vol. IV. p. 587. — SCOP. ann. 1. No.

95. b) — MÜLLER Zool. No. 143. — ANDERSON Hist. Island. vol. II. pl. 1.

Le Petrel. BRISS. orn. VI. p. 140. No. 1. pl. 13. fig. 1.

L'Oiseau de tempeste. BUFF. ois. IX. p. 327. pl. 83. — Pl. enlum. 993.

Storm-finch. or little Pitterel. CASESBY Carol. Append. pl. 14. — EDW. Nat.

Hist. pl. 90. c) — BORLASE Cornu. p. 257. pl. 29. — ALBIN Nat. Hist. vol.

III. pl. 92. — WILL. orn. p. 395. — DAMP. Voy. vol. III. p. 97. — Br.

Zool. No. 259. pl. 91. d)

Br. Mus. Lev. Mus. e)

Er hat die Größe einer Schwalbe, sechs Zoll Länge, und dreizehn Zoll Breite. Sein Schnabel ist schwarz; die Hauptfarbe des Gefieders schwarz, an den untern Theilen aber heller, wo sie ins Rußfarbene spielt; die Enden der kürzern Schwungfedern, der Steiß, und der After sind weiß; und die vier äußern Schwanzfedern an den innern Fahnen, an der Wurzel, auch weiß; die geschlossenen Flügel sind nur einen halben Zoll länger, als der Schwanz; die Füße lang und schwarz.

Diese Vögel sind ziemlich gemein, ob man sie gleich außer zur See selten sieht f), und scheinen über das ganze Atlantische Meer verbreitet zu seyn. Ganze Flügel derselben sieht man

a) Latham Ind. orn. II. 826. n. 19. B.

b) Uebers. v. Günther I. S. 82. Nr. 95. B.

c) Seligmanns Vögel IV. Taf. III. B.

d) Arct. Zool II. n. 464. Uebers. II S. 497. Nr. 381. B.

e) Schwedische Akth. VII. S. 93. Taf. 6. Korsfers Reise Ed. 8. I. S. 53. Schriften der Dronth. Gesellsch. I. S. 191. Goetze nahl.

Afterley. II. S. 196. Nr. 20. Donndorfs Zool. Beitr. II. S. 831. Nr. 1. B.

f) Einer wurde zu Sandwich, in Kent, in einem Windsturm, unter einem Fluge Wiedes Höhe, im Jänner, geschossen. Herr Boys. — Ein anderer zu Walthamstow in Essex, der jetzt im Leverschen Museum ist; und ein dritter ist vor kurzem in Oxford geschossen worden.

man mehrentheils um die Schiffe in vollem Segel, besonders aber bey stürmischen Wetter an der Spur der Schiffe, wohin sie sich, als unter einen Schuß vor der Gewalt der Wellen zu flüchten scheinen. Bey Tage sind sie still, bey Nacht aber schreyen sie sehr laut, und werden von dem Schiffsvolk, Mutter Cary's Hühnchen (Mother Cary's Chickens) und Hexen (Witches) genannt, Sie sind vortreffliche Taucher, und man sieht sie eine halbe Stunde lang unter dem Wasser, ohne daß sie dazwischen herausschleichen. Oft ähneln sie den Schwalben, weil sie, wie diese, über die Oberfläche des Wassers dahinschweben, und oft scheinen sie auf dem Rücken desselben zu laufen ^s). Ihre Nahrung sind vermuthlich kleine Fische; sie lesen aber jeden Unrath auf, der aus den Schiffen, denen sie folgen, fällt, oder untersuchen ihn wenigstens ^b). Sehr gemein sind sie gegen Norden, und finden sich in Kamtschatka ⁱ). Die Einwohner auf den Ferroë-Inseln ziehen einen Dacht durch den Körper dieser Vögel, vom Mund bis zum After, der ihnen dann, wenn er angezündet wird, eine Zeit lang statt einer brennenden Lampe dient, indem er von der großen Menge Del, die in den Körper dieser Vögel, so wie in andern dieser Gattung, enthalten ist, fett wird ^k).

Wahrscheinlich brüten diese Vögel in Felsenhöhlen, wie andre dieser Gattung; denn Herr Pennant hat sie im August am Ende der Schatteninsel (Isle of Skie) bemerkt, wo sie sich unter den lockern Steinen verbargen, aber sich selbst durch ihr Zwitschern verriethen ^l).

Man hat sie auch nicht selten in den südlichen Gegenden angetroffen. Forster ^m) sah sie in der Breite von 25 Gr.; Dampier ⁿ) in der Breite von 31; und Osbeck ^o) in der Breite von 34. S.

Die ^p) Vögel besuchen die Insel Chanet zeltig im Winter, zuweilen schon im Oktober. Einer wurde im Jänner ^q) geschossen. In der Mitte des verflossenen Octobers ließ sich einer an den Ufern der Themse, bey Northfleet ^r), sehen, wo ein Knabe einen Stein nach ihm warf, der ihn betäubte, so daß er ihn mit der Hand fangen konnte. Dieser wurde mir geschickt, und, da er nicht verletzt zu seyn schien, so versuchte ich ihn bey'm Leben zu erhalten, er nahm aber durchaus kein Futter. Zwar steckte er seinen Schnabel in ein Gefäß mit Wasser, das in seinem Käfig stand, verwarf aber alle Nahrung, und starb drey Tage nachher, nachdem ich ihn bekommen hatte. Er schien einen strachelnden (brissing) und mit einiger Beschwerde verbundenen, Gang zu haben, wenn er zu Fuß war; und setzte sich oft nieder, wo er denn den Körper der ganzen Länge nach auf dem hintern Theil der Füße ruhen ließ.

g) Dampier. Voy. vol. III. p. 97.

h) Sie fressen mit andern Seevögeln; wenn wir die Gedärme der Ferkel (guts of pigs) über Bord warfen, so waren sie immer die ersten, und legten bey dieser Gelegenheit.“ Osbeck Voy. vol. I. p. 113.

i) Hist. Kamtschatk. p. 155. — Die hier sich befindenden sind größer, als man sie anderwärts sieht. Arct. Zool.

k) Brünn. orn. p. 29.

l) Br. Zool.

m) Voy. vol. I p. 50. 110.

n) Voy. vol. III. p. 97.

o) Voy. vol. I. p. 113.

p) Zus. a. d. Suppl. S. 269.

q) Hr. Voss.

r) Hr. Macretch.

18. Var. A. *Procellaria pelagica*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 561. No. 1. β. 1)

Salerne *) erwähnt einer, von der obigen verschiedenen Art; sie hat die nämliche Größe, weicht aber im Colorit von ihr ab. Ihr Schnabel ist schwarz; der Rücken eben so, mit bläulich purpurfarbenen Wellenlinien; der Kopf, der Kropf und die Seiten des Körpers sind bernache blau, und schillern bey verschiedenem Licht ins Schwarze und Violette; der Hinterhals ist schillernd grün und purpurfarben; die obern Theile der Flügel und der Steiß sind weiß gefleckt; der übrige Körper schwarz; die Füße kurz und schwarz.

Dieser findet sich in der See um Italien, und scheint, wie die andern, auf der Oberfläche des Wassers zu leben, da man bisher noch keinen einzigen in irgend einem Lande gesehen hat; seine Erscheinung soll einen Sturm verkündigen, wenn auch das Wetter noch so heiter ist; man sieht ihn immer in ganzen Flügen.

19. Der Taucher, Sturmvogel. (Diving P.)

Procellaria urinatrix. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 560. No. 11. α)

Er hat die Größe des kleinen Papagentauchers, und ist von starkem Bau; fast wie dieser; seine Länge ist acht und ein Viertel Zoll. Der Schnabel ist fast einen Zoll lang, stark und schwarz, die Mitte der untern Kinnlade weiß an den Seiten; der Augenstern dunkelblau; das Gefieder an den obern Theilen schwarzbraun; an den untern weiß, das Kinn ausgenommen, das schwarz ist; die Haut dieses Theils, so wie die der Kehle ist locker, und dient wie einbeutel, wie bey den Meersturmvogel (Nr. 17); die Flügel sind etwas kürzer, als der Schwanz; die Füße bläulichgrün; die Schwimmhäute schwarz; der Sporn am hintern Theil des Fußes fehlt.

Man hat diese Art in Königin-Charlotten-Sund, und in andern Gegenden in der Nachbarschaft von Neu-Seeland angetroffen, und zwar in großen Flügen, die über der Oberfläche des Wassers flatterten, oder darauf saßen; sie tauchen gut x), und kommen oft mit erstaunender Behendigkeit in einer beträchtlichen Entfernung wieder hervor. Sie quacken wie die Frösche, und zuweilen machen sie ein Geschrey, daß dem Gackern der Hühner gleicht. Man kennt sie unter dem Namen See, tee.

** Unächte, mit deutlichen Nasensöchern.

20. Der breitschnäblige Sturmvogel. (Broad-billed P.)

Procellaria vittata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 560. No. 10. γ)

1) Latham l. c. β. B. 11

2) Orn. p. 383.

3) Latham Ind. orn. II. 827. n. 20. Forsters Reise Ed. in 8. l. S. 120. 199. B.

4) Dieß sind die kleinen Taucher; Sturmvogel (Little Diving Petrels) f. Forst.

Voy. vol. I. 189. 503. — Die Taucher; Sturmvogel verkünden die Nähe des Landes. ibid p. 483.

5) *Procellaria Forsteri*. Latham Ind. orn. II. p. 827. n. 21. B.

Neuntzigste Gattung. Sturmvoegel.

363

Le Petrel bleu. BUFF. ois. IX. p. 316.

Vittated Petrel. FORST. Voy. vol. I. p. 153. — Observ. p. 199.

Blue Peteril. COOKS Voy. vol. I. p. 29.

Liev. Mus.

Er hat die Größe einer kleinen Taube, und ist zwölf Zoll lang. Sein Schnabel ist blaugrau, fünf Viertel Zoll lang, und an der Wurzel fast einen Zoll breit, beyde Kinnladen sind an den Spitzen gebogen, die Ränder fein gezähnt, an jedem Nasenloch eine deutliche, sehr kurze Röhre; die Zunge ist sehr groß, und fleischig, und füllt den ganzen Schnabel aus, indem sie sich nach der Bildung desselben formt; das Gefieder der obern Theile ist bläulich-schwarz, und einige Federn sind in der Mitte braun; unter den Augen ist ein dunkelschwarzer Streifen; die Schwungfedern, und die Enden der sechs mittlern Schwanzfedern sind dunkelbraun, beynahe schwarz; wenn die Flügel ausgebreitet sind, so erscheint ein dunkles Band von einer Spitze zur andern, das quer über den Rücken herabläuft; die Füße sind schwarz.

Das Weibchen hat das nämliche Gefieder; sein Schnabel aber, ob schon er ungleich größer ist, als bey irgend einem andern dieser Gattung, ist kaum halb so breit, als der des Männchens.

Man sieht diese Vögel auf der ganzen südlichen Halbkugel, vom 28ten Grad aufwärts. Man hat sie in Dusky-Bay und andern Gegenden von Neu-Seeland angetroffen. An der Nordwestseite der Anker-Insel finden sie sich in unermesslicher Menge, unter andern Arten; einige fliegend, andere in Wäldern, in Höhlen an der Erde, dicht aneinander, oder unter den Baumwurzeln, und Felsenritzen, wo sie ein Geschrey machen, das dem Quacken der Frösche ähnlich ist; sie fliegen viel bey Nachtzeit, so daß man sie für Fledermäuse hält. Bey Tage sieht man sie nicht, aber um drey Uhr des Morgens sind sie sehr unruhig, und den Tag über tauchen sie in die See, um Futter zu suchen ^{z)}. Dr. Forster bemerkt, diese Vögel seyen außerordentlich stark mit Federn versehen, gleich dem Praguin; denn: „Ihr Gefieder war bewundernswürdig dicht, und vermehrte ihre Größe um ein Beträchtliches; zwey Federn, statt Einer, kamen aus jedem Kiel heraus, die in einander lagen, und eine sehr warme Bedeckung machten.“ ^{a)}

21. Der blaue Sturmvoegel. (Blue P.)

Procellaria coerulea. LIN. Ed. XIII. l. 2. p. 550. No. 9. b)

Blue Petrel. FORST. Voy. vol. I. p. 91.

Another blue Peteril. COOKS Voy. vol. I. p. 32. c)

Br. Mus.

Seine Länge ist zwölf Zoll. Der Schnabel ist fünf Viertel Zoll lang, blau, mit einer schwarzen Spitze, die Mitte der Beugung gelb; die obern Theile des Gefieders sind blaugrau, aber heller, als

z) Forster, Voy. vol. I. p. 153. — Observ. b) Latham Ind. orn. II. 827. n. 22. B.

p. 199. — Cooks last Voy. vol. I. p. 86. c) Forsters Reise Ed. 8. l. S. 93. 107. B.

a) Forster Voy. vol. I. p. 103.

als beym vorigen; die untern Theile weiß; unter dem Auge ist ein dunkelbrauner Fleck; an der Brust ein dunkelbraunes Band; die großen Schwungfedern sind etwas dunkler, als die übrigen Theile, und die innern Rahnen einiger derselben fast weiß; der Schwanz hat die Farbe des Rückens, seine äußerste Feder aber ist weiß, die nächste inwendig weiß, die übrigen haben weiße Spitzen; quer über den Körper und die ausgebreiteten Flügel, läuft ein dunkles Band, wie beym vorigen; die geschlossenen Flügel sind etwas länger, als der Schwanz; die Füße blau; die Schwimmhäute blaß.

Diese fliegen in ganzen Zügen, und sind im Südmeer, vom 47sten bis zum 58sten Grad der Breite zu, zu Hause. Capitain Cook vermuthet, es seyen die Weibchen vom breit schnäblichen Sturmvogel (Nr. 20); der Schnabel hat aber den Grad der Breite nicht, um diese Vermuthung zu bestätigen, und die Farbe des Gefieders, wenn man beyde gegeneinander hält, entdeckt den Unterschied gleich.

22. Der Sturmvogel vom stillen Ocean. (Pacific P.)

Procellaria pacifica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 560. No. 8. d)
Br. Mus.

Er ist zwey und zwanzig Zoll lang, und vierzig Zoll breit. Sein Schnabel ist zwey Zoll lang, bleifarben, und an der Spitze stark gekrümmt; statt einer Nöhre, sieht man bloß die Nasenlöcher, die schief angebracht, eiförmig und etwas erhaben sind, und fünf Viertel Zoll von der Wurzel des Schnabels abstehen; die obere Theile des Gefieders sind schwarz, die untern dunkelbraun; die Füße sind an den Haken (insteps) blaß, und daselbst mit einigen schwarzen Flecken bezeichnet; einige wenige andere sind an den Schwimmhäuten und Zehen.

Er ist in Europa, und auf andern Inseln des stillen Meeres zu Hause, und soll in unzähligen Schaaren fliegen. Sie verschwinden alle auf Einmal, indem sie alle zugleich untertauchen, und dann eben so plötzlich wieder heraufsteigen.

23. Der schwärzliche Sturmvogel. (Dusky P.)

Procellaria obscura. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 559. No. 7. e)
Br. Mus.

Seine Länge ist dreizehn Zoll. Der Schnabel ist anderthalb Zoll lang, die Seiten desselben sind hornfarben, ausserdem ist er schwarz; an der gewöhnlichen Stelle der Nöhre sind nur zwey kleine Löcher, die statt der Nasenlöcher dienen; die Spitze des Schnabels ist gekrümmt; die obere Theile des Schnabels sind dunkelschwarz, die untern weiß; die Seiten des Halses braun und weiß melirt; die Ränder der mittlern Deckfedern der Flügel weißlich; die Füße stehen

a) Latham Ind. orn. II. p. 827. n. 23. B.

e) Latham Ind. orn II. 828. n. 24. Arct.
Zool. Sup. p. 73. B.

Ein und neunzigste Gattung. Tauchente.

365

stehen ganz in dem Aftcr, und sind größtentheils schwarz, die innere Seite ausgenommen, die ihrer ganzen Länge nach blaß ist, die zwey innern Zehen sind gelblich; die Schwimmhäute orangefarben; die Klauen schwarz.

Er ist auf der Weyhnachts-Insel zu Hause. Einer, der um zwey Zolle kürzer ist, und sich im Leverschen Museum befindet, soll von König Georgs-Sund, an der Amerikanischen Küste, gekommen seyn.

Ein und neunzigste Gattung. Tauchente.

Der Schnabel ist dünn, etwas niedergebrückt (depressed) am Ende mit einem krummen Nagel versehen, die Ränder beyder Kinnladen sehr scharf gezähnt. Die Nasenlöcher stehen in der Mitte der Kinnlade, sind klein, und fast eiförmig. Die Füße haben vier Zehen, drey nach vornen, und eine nach hinten; die äußere, vordere Zehe, ist länger als die mittlere.

I. Die Tauchergans, oder die gemeine Tauchente. (Goosander.)

Mergus Merganser. LIN. I. p. 108. 2. Ed. XIII. I. 2. p. 544. No. 2. f) — Faun.

Suec. No. 135. — BRÜNN. orn. No. 92. — MÜLLER Zool. No. 133. —

KRAM elench. p. 343. No. 1. — GEORGI Reise p. 169. — Faun. Groenl. No. 49. — FRISCH av. tab. 190.

Mergus Aethiops. SCOP. ann. I. No. 90. g)

L'HARLE. BRISS. orn. VI. p. 231. No. 1. pl. 22. — BUFF. ois. VIII. p. 267. pl. 23. — Pl. enlum. 951.

Merganser, or Goosander. RAN Syn. p. 134. A. 1. — WILL. orn. p. 333. pl. 64. — Br. Zool. No. 260. pl. 92. fig. 1. — Arct. Zool. No. 465. b)

Br. Mus. Lev. Mus. i)

Ihr Gewicht ist fast ein Pfund; ihre Länge acht und zwanzig, und ihre Breite vierzig Zoll. Der Schnabel ist drey Zoll lang, schmal, an den Rändern beyder Kinnladen gezähnt, die

f) Latham Ind. orn. II. 828. n. 1. B.

g) Uebers. v. Günther I. S. 78. Nr. 90. B.

b) Uebers. II. S. 498. Nr. 383. B.

i) Ferner: Beschäft. der Berlin. Gesellsch. IV. S. 594. Taf. 18 Fig. 3. Meine N. G. Deutschl. II. S. 132. — Hier ist nach Herrn Professor D. Otto gezeigt, daß nach dem Bau der Luftröhre zu urtheilen, die Tauchergans mit dem Wiberchaucher Nr. 2. einerley,

nämlich der einjährige Vogel ist. — Lichtensbergs Magazin IV. 2. S. 148. DALLAS Reise III. S. 475. PONTOPPIDAN N. G. von Dänemark. S. 168. Nr. 1. Dessen N. G. von Norweg. II. S. 126. Neue Schwed. Abh. IV. S. 46. VI. S. 287. ZORNs Pethinoth. II. S. 406. DONNDORFS Zool. Beytr. II. S. 802. Nr. 2. B.

die Spitze der obern stark gebogen, und die der untern ein wenig aufgetrieben (swelling); die Farbe roth; der Augenstern eben so; der Scheitel und der Hinterkopf sind dicht mit Federn bewachsen, und die Farbe dieser Theile, so wie des Halses zur Hälfte, ist schön glänzend grünlichschwarz; der übrige Hals und die untern Theile sind weiß ¹⁾, mit quersiehenden, wellenförmigen, dunkelbraunen Streifen an den Seiten über den Schenkeln; der Oberrücken ist schwarz; die zunächst am Körper stehenden Schulterfedern schwarz, die andern weiß; der Unterrücken, der Steiß und der Schwanz bräunlich aschfarben, die Federn gegen den Steiß hin schmutzweiß gerändert; die kleinern Deckfedern der Flügel weiß, die andern aschfarben, in der Mitte aber auch weiß; zwölf von den großen Schwungfedern schwarz, einige der innern an der innern Spitze aschfarben; die kürzern mehrentheils weiß, und fünf oder sechs derselben an den äussern Rändern grünlichschwarz eingefast; der Schwanz besteht aus achtzehn aschfarbenen Federn, mit dunkelbraunen Schäften; die Füße sind orangefarben.

Diese Art scheint die mehr nördlich gelegenen Gegenden den südlichen vorzuziehen, weil man sie in diesen nicht sieht, ausser bey sehr strenger Jahreszeit. Sie bleibt das ganze Jahr hindurch auf den Orkadischen Inseln, und ist im Sommer auf den Hebriden geschossen worden. ²⁾. Sie ist gemein auf dem festen Lande von Europa und Asien, am meisten aber gegen Norden ³⁾. Sie findet sich auch in Island und Grönland, wo sie brütet, und sich im Winter wieder nach Süden zurückzieht; um diese Zeit findet sie sich am See Latkal vor. Häufig ist sie in Amerika; im Winter in der Provinz Newyork; von da zieht sie im April weg, und wahrscheinlich nach Hudsons-Bay ⁴⁾; und wenn sie einerley Vogel mit der sogenannten Fischerente (Fisberman-Duck) ist, so findet sie sich auch in Carolina ⁵⁾.

2. Die braunköpfige Tauchente, oder der Bibertaucher. (Dun Diver).

Mergus Merganser, Castor. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 544. No. 2. β p)

— — (femina). Faun. Suec. p. 48. — KRAM. elench. p. 343.

No. 2.

Mergus Castor. LIN. Syst. Nat. ed. XII. tom. I. p. 1. p. 209. No. 4.?

Mergus Gulo. Scop. ann 1. No. 88. ⁷⁾

Mergus serratus. BRÜNN. orn. No. 96.

Anas rubricapilla. BRÜNN. l. c. No. 93.

L'Haric

¹⁾ Bey einigen Vögeln ist die Brust niedrig 'gelblich-rosenfarben; ob dieß auf Rechnung der Jahreszeit, oder einer andern Ursache, kommt, weiß ich nicht.

²⁾ Br. Zool. Arct. Zool.

³⁾ In Deutschland auf großen Seen und Teichen; im Herbst und Winter als Zugvogel auf offenen Flüssen und Morästen. Bemerkenswerth ist, daß sich immer nach der Brut und auf den Wandrungen die alten Männchen zusammen halten, und die Weibchen mit den jungen Männchen,

auch eine eigene Schaar ausmachen. Daher ist auch zu erklären, warum man den Bibertaucher, der aus Weibchen und jungen Männchen der Tauchergans zusammengesetzt ist, zu einer besondern Art gemacht hat. B.

⁴⁾ Arct. Zool.

⁵⁾ Lawson, Carol. p. 150.

⁶⁾ Mergus Castor. Latham Ind. orn. II. p. 829. n. 2. B.

⁷⁾ U.vers. v. Günther I. S. 76. Nr. 88. B.

L'Harle cendré; ou le Bievre. BRISS. orn. VI. p. 254. pl. 25.

L'Harle femelle. BRISS. l. c. p. 236. — BUFF. ois. VIII p. 272. — Pl. enlum.
953

Dun-Diver, or Sparling Fowl. RAI Syn. p. 134. A. 2. — WILL. orn. p. 333.

pl. 64. (der Kopf). — ALBIN Nat. Hist. vol. I. pl. 87. — Br. Zool. II. p. 557.

pl. 92. fig. 2. — Arct. Zool. No. 465. *)

Br. Mus. Lev. Mus.

Sie ist kleiner, als die vorige, und mißt sieben und zwanzig Zoll in der Länge, fünf und trenzig Zoll in der Breite, und ist viertelhalb Pfund schwer. *). Ihr Schnabel ist ziemlich wie bey der vorigen, aber matter von Farbe, und der Vogel an der Spitze schwärzlich; der obere Theil des Kopfs und des Halses ist rostigroth, am hellsten an der vordern Seite; die Federn des Scheitels und Nackens sind viel länger, als bey den vorigen; Rinn und Kehle weiß; der Rücken, die Deckfedern der Flügel, der Schwanz und die Seiten des Körpers aschfarben, der untere und vordere Theil des Halses, die Brust und die Mitte des Bauchs weiß; die großen Schwungfedern schwarz; die Schulterfedern dunkler, als der Rücken; die Enden von sechs der kürzern Schwungfedern zwey Zoll breit, weiß, bey der letzten aber ist die innere Zahne, und bey den andern alles übrige hell aschfarben; die Füße orangefarben, aber heller, als bey der vorigen.

Sie findet sich größtentheils an den nämlichen Orten, und zur nämlichen Jahreszeit, mit der vorigen, vor, scheint aber weit gemeiner zu seyn *).

2. Var. A.

Der Vibertaucher *Mergus Castor* L. *), den Linne' und Brisson für eine verschiedene Art angesehen haben, scheint zu wenig von der braunköpfigen Tauchente (Dun-Dive, Nr. 2.) abzuweichen, daß man ihn für einen und ebendenselben Vogel halten kann; inzwischen ist er viel kleiner, da er kaum die weiße Tauchente (Smew, Nr. 5) an Größe übertrifft; die Länge meines Exemplars war ein und zwanzig Zoll, die Breite sieben und zwanzig und das Gewicht siebenzehn Unzen; der Schnabel war zwey und ein Viertel Zoll lang; was die Farben und die Vertheilung derselben betrifft, so sind sie fast wie bey der braunen Tauchente; der Hals aber hat eine größere Mischung vom Aschfarbenern, und zwischen den Nasenlöchern und den Augen ist ein blasser Streifen; das übrige ist wie bey letztbenanntem Vogel.

Dieser soll in Deutschland gemein seyn, und sich zuweilen selbst in Aegypten vorfinden *). Das oben angeführte Exemplar wurde an der Küste von Suffolk erlegt *).

Uaa 2

Neuere

*) Ueberf. II. S. 499. Nr. 383. Das Weibchen der Tauchergans. B.

*) Dies ist natürlich, da die Weibchen und junge Männchen allzeit kleiner sind. B.

*) Weil es eine bekannte Erfahrung ist, daß sich auf den Zug nur die alten Männchen besammen halten, und die jungen Männchen und die

Weibchen wieder eine besondere Schaar ausmachen. Es ist ohngefähr wie beim Hirsch. B.

*) Bievre Oiseau, s. Belon Hist. Nat. des Oiseaux. p. 163. — Diesem Schriftsteller zu Folge baut er auf Felsen und Bäume.

x) Belon a. a. O.

y) Der Amerikanische Vogel weicht, wie mir Hr.

Neuere Schriftsteller glauben, die Tauchergans (Goosander, Nr. 1) und die braunköpfige Tauchente (Dun Diver, Nr. 2.) seyen bloß Männchen und Weibchen, und keine verschiedenen Arten, allein diese Behauptung ist nicht so ausgemacht, daß sie nicht mehrere Zweifel übrig ließe; und folgende Thatfachen bestimmen mich, sie wieder in verschiedene Arten zu trennen.

Erstens, ist die braunköpfige Tauchente stets kleiner, als die gemeine, und Exemplare dieser Art, weichen in Rücksicht der Größe selbst sehr voneinander ab; und wenn wir, im äußersten Fall, die zuletzt beschriebene, bloß als eine Spielart ansehen, so müssen wir noch hinzufügen, daß der Federbusch, bey dem Vogel, den man für das Weibchen hält, beträchtlich länger und dichter ist, als bey dem für das Männchen gehaltenen ²⁾, ein Umstand, den man bey keinem Vogel, der einen Federbusch trägt, bemerkt; denn bey diesen haben in vielen Fällen die Weibchen auch nicht einmal eine Spur von einem Federbusch. Ferner weiß man, daß einige braune Tauchenten ein Labyrinth haben, so gut als die gemeine; hierunter versteht man eine Erweiterung des untern Theils der Luftröhre, unmittelbar vor ihrem Eintritt in die Lungen; und da sich dieses nur bey den Männchen aus der Entengattung vorfindet ³⁾, so schließen wir hieraus mit Recht, daß es bey den Vögeln, von denen hier die Rede ist, sich eben so verhalte, besonders da das nächste Bindeglied mit den Enten ausmachen. Aber der wichtigste Umstand, unter allen oben angeführten, ist, daß einige größere braunköpfige Tauchenten bey der Zergliederung wirklich als Männchen befunden worden sind. Diese Entdeckung verdanke ich der Aufmerksamkeit des Herrn Dr. Hensham, der mir versichert, er habe es öfter, als Einmal so befunden. Den letzten dieses Geschlechts hat er im December zu Carlisle angetroffen. Fera

Hr. Vorkhausen schreibt, von dem Euro-pätschen in folgenden Stücken ab: die Kehle ist nicht weiß, sondern wie der ganze Kopf rothfarbig; der weiße Theil des Halses hat nicht vorn, sondern nur an den Seiten aschgraue Wellenlinien; die Brust und der Bauch sind nicht strohgelb, sondern wie der untere Theil des Rückens weiß, und der Steiß welcher weiß ist, hat zur Seiten aschgraue Wellenlinien; der Querschnitt, welcher den Spiegel theilt, ist schwarz und bey einem andern Exemplare zeigt sich nur am obern Rande des Spiegels eine schwache Spur von ihm. Das Uebrige ist wie bey dem Euro-pätschen Vogel. B.

- 2) Da es nach der anatomischen Untersuchung auch Männchen sind, die hierher gehören, so ist dieser Einwand nicht stark, da junge Männchen einen größern Federbusch als die alten haben können.
- 3) Ray's Worte lauten, in Rücksicht der braunköpfigen Tauchente folgendermaßen: „Haec etiam ampullam seu labyrinthum in aspera arteria habet; quod ma-

ribus proprium opinati sumus.“ Syn. p. 135.

Bev Willughby finde ich folgendes: „Bev der braunköpfigen Tauchente, die ich für das Weibchen der gemeinen halte, fand ich ein großes Labyrinth, so daß ich nicht mit Gewißheit behaupten will, daß diese beyden Vögel nicht mehr, als dem Geschlecht nach, verschieden seyen.“ Orn. p. 336.

Drifson's Figur des Herle cendré, oder Bievre Mergus, castor, L., den ich oben beschrieben habe, soll vom männlichen Vogel genommen seyn. In Rücksicht meines Exemplars, konnte dieser Umstand nicht berichtet werden, weil, da der Vogel aus einer großen Entfernung gekommen ist, die innern Theile schon zu sehr aufgelöst waren als daß man nur mit einem Grad von Gewißheit hätte auf sie Rücksicht nehmen können.

Ferner bemerkt er, die braunköpfige Tauchente sey unendlich gemeiner in Cumberland, als die gemeine, wenigstens zehn bis funfzehn der ersten kämen auf Eine der letztern, die in der That so selten daselbst ist, daß er nicht öfter als Einmal Gelegenheit hatte eine zu zergliedern, die indessen ein Männchen war.

Hlernach ist kein anderer Weg die gegenwärtigen Meynungen der Schriftsteller zu vereinigen, als daß man als möglich annimmt, die jungen Vögel beyder Geschlechter behielten das Gefieder des Weibchens nur eine gewisse Zeit ihres Lebens, ehe sie jenes des Männchens bekämen, wie dieß bey einigen andern Vögeln der Fall ist; indem wir aber dieses zugeben, müssen wir zugleich annehmen, daß sie auch im Stande seyen ihre Art fortzupflanzen, welches, wenn es sich wirklich so verhält, bey Thieren, ehe sie zu ihrer vollkommenen Reife gelangen, nicht gewöhnlich ist ^{b)}).

Zu dieser Ausschweifung hat mich das Verlangen nach einer künftigen Belehrung verleitet; besonders wenn einige Vögel mit dem Gefieder der gemeinen Tauchente, Weibchen sind. Diese kann nur durch wiederholte Beobachtungen, unterstützt von dem untrüglichen Wegweiser der Zergliederung, erhalten werden; eine Sache, die bisher nicht so geachtet worden ist, als es dergleichen Untersuchungen erfordern.

Zur ^{c)} Bestätigung dessen, was ich oben über die Wahrscheinlichkeit, daß die braunköpfige Tauchente und die Tauchergans verschiedene Arten seyn möchten, geäußert habe, hat mir Hr. Dr. Hensham neuerlich gemeldet, daß er vor einiger Zeit zwey braunköpfige Tauchenten zergliedert habe; die eine wog ohngefähr zwey Pfund, und diese war ein Weibchen. Die Eyer waren zahlreich, und sehr deutlich zu sehen. Die andere, viel größere, wog volle drey Prunde; bey dieser war der Federbusch länger, als bey der ersten, und der Bauch lebhaft strohfarben; diese wurde bey der Zergliederung als ein Männchen befunden, und die Hoden waren hinlänglich deutlich, und fiengen an aufzuschwellen. Zu gleicher Zeit bemerkt er, er habe keine einzige Tauchergans erhalten können, obschon man einige dort herum gesehen hat, und zuweilen in Gesellschaft mit den braunköpfigen ^{d)}).

Die braunköpfige Tauchente ist in Irland zu Hause, brütet auf den Inseln Shannon bey Killaloo, und läßt sich den ganzen Sommer hindurch häufig dort sehen ^{e)}).

Die Tauchergans (Nr. 1), der Meerrochen (Nr. 3), und die weiße Tauchente (Nr. 5), erscheinen um Sandwich im Winter ^{f)}).

Aaa 3

3. Der

b) Hierinnen sind ja z. B. der gemeine Kink Beyspiele, ein einjähriges Männchen sieht doch anders aus als ein sechsähriges. W.

c) Zus. a. d. Suppl. S. 270.

d) Mein Freund sagt nicht, ob er ein Labyrinth in dem männlichen Vogel bemerkt habe.

e) Herr Jackson.

f) Herr Boys.

Neunte Ordnung. Schwimmvögel.

3. Der Meerrachen, oder die rothbrüstige Tauchente. (Red-breasted Merganser).

Mergus Serrator. LIN. I. 208. 3. Ed. XIII I. 2. p. 546. No. 3. g) — FAUN. Suec. p. 136. — BRÜNN. orn. No. 96. — MÜLKER Zool. No. 134. — GEORGI Reise p. 169.

Mergus Albellus. — Scop. ann. 1. No. 89. b)

Mergus serratus. BRÜNN. l. c. No. 94. 95. (Männchen und Weibchen).

Mergus cristatus, capite castaneo etc. KRAM. elench. p. 343. No. 2. (das Weibchen).

Mergus cirrhatus fuscus. RAI Syn. p. 135. A. No. 4. — WILL. orn. p. 336. (M. cirrhatus minor) pl. 64. (das Weibchen).

L'Harle huppé. BRISS. orn. VI. p. 237. No. 2 pl. 23. — BUFF. ois. VIII. p. 273. — Pl. enlum. 207.

Red-breasted Goosander. EDW. Nat. Hist. pl. 95. i) — ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 101. — BR. Zool. No. 261. pl. 93. (Männchen und Weibchen).

Br. Mus. Lev. Mus. k)

Ihre Länge ist ein Fuß, und neun Zoll, ihre Breite zwey Fuß, und sieben Zoll, und ihr Gewicht zwey Pfund. Der Schnabel ist drey Zoll lang, die obere Kinnlade dunkelbraun, die untere roth; der Augenstern purpurroth; der Kopf, und ein Theil des Halses sind schwarz, mit grünem Glanze; die Federn am Hinterkopf bilden einen ziemlich langen Busch; das übrige des Halses, und die untern Theile des Körpers, sind weiß; die Brust ist rostigroth, mit einer Mischung von Schwarzem und Weißem; der Oberrücken glänzend schwarz; der Unterrücken und der Steiß nach der Quere braun und hellgrau gestreift; an jeder Seite der Brust stehen fünf oder sechs breite, weiße Federn, die ringsherum schwarz gerändert sind und bey geschlossenen Flügeln, auf der Beugung derselben ruhen; ein Theil der Schulterfedern ist schwarz, die andere sind weiß; die Deckfedern der Flügel ebenfalls theils schwarz, theils weiß; die meisten aber weiß; die Schwungfedern dunkelbraun; der Schwanz braun; die Füße orangefarben; die Klauen schwarz.

Das Weibchen unterscheidet sich dadurch, daß es bloß die Spur eines Federbusches hat; der Kopf und der obere Theil des angränzenden Halses, sind matt rostigroth; das Kinn weiß; der Vorderhals und die Brust rostigroth, mit Schwarz und Weiß gesprenkelt; der obere Theil des Halses, der Rücken, der Steiß und die Schulterfedern aschgrau, der untere Theil der Brust und des Bauches weiß; an jeder Seite der Brust stehen die nämlichen schwarzen und weißen Federn, wie bey dem Männchen; die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel sind fast ebenso, wie bey diesem, haben aber mehr oder weniger dunkelfarbiges, die Füße sind orangefarben, aber heller, als bey dem Weibchen.

Exem-

g) Latham Ind. orn. II. p. 829. n. 4. B.

h) Uebers. v. Günther l. S. 77. Nr. 89. B.

i) Seltmanns Vögel IV. Taf. 85. B.

k) Arct. Zool. II. n. 466. Uebers. II. S. 499. n. 344. *Mergus asiaticus*. Smeltus Reise

II. S. 188. Meine N. S. Deutschl. II. S.

732. Taf. 24. Lepechin Tageb. der Russ.

N. III. S. 14. Pontoppidan Dänemark

S. 168. Donndorfs Zool. Beytr. II. S.

805. Nr. 3. B.

Exemplare von beyden Geschlechtern gehen im Gefieder von einander ab.' Von dem Männchen haben einige zweymal so viel Weißes am Halse, als andere, und das Weiße an den Flügeln ist ungleich reiner. Auch die Weibchen variiren durch ein viel lebhafteres Colorit,

Diese Art findet sich größtentheils in den nördlichen Theilen unsers Königreichs. Man weiß, daß sie auf Loch, Mari, in der Landschaft Ross, und auf der Insel Ilay, brüet¹⁾. Sie findet sich in den meisten Gegenden des nördlichen Europas, auf dem festen Lande, bis nach Island, wo sie Natus-Oud genannt wird; auch in den Russischen Besizungen, an den großen Flüssen Sibiriens, und am See Baikal. Sie ist häufig in Grönland, im Sommer, und brüet an den Küsten²⁾. Ihre Eyer gleichen denen der wilden Ente, sind aber kleiner und weißer. Sie taucht geschickt, und ist sehr behend im Wasser; die Grönländer fangen sie aber oft mit Pfeilen, die sie auf sie abschießen, besonders im August, wo sie in der Mauser ist. Sie ist häufig in Neufundland, und erscheint auf Hudsons-Bay in großen Flügen, wo sie aber, wie man bemerkt hat, größer ist, als in Europa. Sie kommen gewöhnlich paarweise, zu Anfang des Junius, sobald das Eis aufgeht; ihr Nest bauen sie bald nach ihrer Ankunft, besonders auf trockne Stellen, auf dem Boden der Inseln. Sie legen acht bis dreyzehn weiße Eyer, von der Größe der Gänse-Eyer; ihr Nest besteht aus welkem Gras, und ist mit den Pflaumfedern aus ihrer Brust gefüttert. Die Jungen sind schmutziggelblich, gleich jungen Gänschen. Im October ziehen sie alle miteinander wieder weg, nach den Seen, wo sie offenes Wasser haben können. Man kennt sie auf Hudsons-Bay unter dem Namen As-sick³⁾.

Von⁴⁾ einem Männchen dieser Art, das bey Sandwich geschossen wurde, bemerkte ich, daß die Federn, die den Federbusch bilden, einfach schwarz waren; eben so war die Mitte des Scheitels, so wie die Stelle vor den Augen, und unter dem Kinn und der Kehle; am übrigen Halse aber hatte das Schwarze einen grünen Glanz. Dieses Geschlecht ist mit einem sonderbaren und großen Labyrinth versehen. Die Luftröhre dehnt sich, ohngefähr zwey Zoll weit von ihrem obern Eintritt, in eine ensörmige Gestalt aus, dreyimal so weit, als sie vorher war, und läuft ohngefähr zwey Zoll weit so fort; hierauf nimmt sie ihre vorige Gestalt und Größe wieder an, und läuft so fort, bis an ihrer Theilung in die Lungen; an dieser Stelle geht sie durchaus, und vereinigt sich mit einem knöchernen Labyrinth, das an Gestalt einem Herzen nicht unähnlich ist, zwey und einen Viertel Zoll lang, und zwey Zoll breit; die Eine Seite desselben ist von zwey Löchern durchbohrt, deren Eines zweymal so groß ist, als das Andere, und beyde sind mit einer durchsichtigen Haut bedeckt, die ausdehnbar ist, und zur Erweiterung der Höhle des Labyrinths nach der Willkühr des Vogels, dient.

3. Var.

1) Arct. Zool.

2) In Deutschland trifft man sie an den See-
küsten, auf großen Seen und Flüssen an. V.

3) Herr Hutchins.

4) Zus. a. d. Suppl. S. 271.

3. Var. A. Der bunte Meerrachen.

Mergus Serrator, leucomelas. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 546. No. 3. p)

L'Harle blanc et noir. BRISS. orn VI p. 250 No. 4.

— — à manteau noir. BUFF. ois. VIII. p. 250. q)

Er hat die Größe des Icktern. Der Kopf, der Hinterhals, der Rücken, die Schulterfedern und der Steiß sind schwarz; die obern Deckfedern des Schwanzes braun; alle untern Theile weiß; eben so die kleinern Deckfedern der Flügel, und die größern, zunächst am Körper stehenden; die äußern und die Schwungfedern sind schwarz; der Schwanz braun; die Füße roth.

Dies ist eine Spielart vom Männchen *).

3. Var. B. Der schwarze Meerrachen.

Mergus Serrator, niger. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 546 No. 3. γ ς)

L'Harle noir, BRISS. orn. VI. p. 251. No. 5. r)

Von der Größe einer Ente. Der Schnabel schwarz; der Kopf, der Rücken, der Steiß, die Schulterfedern und die obern Deckfedern des Schwanzes schwarz; der Hals kastaniendraun; die Brust; der Bauch und die untern Theile weiß; die Flügel schwarz, und mit einem weißen Querbande durchzogen; der Schwanz und die Füße schwarz.

Er findet sich in Deutschland, und scheint eine Spielart vom Weibchen zu seyn *).

4. Die gehäubte Tauchente. (Hooded M.)

(s. die hundert und achte Kupfertafel.)

Mergus cucullatus. LIN. I. p. 207. 1. Ed. XIII. I. 2. p. 544. No. 1. x)

L'Harle

p) Latham l. c. β. B.

q) Donndorf a. a. O. d. B.

r) Wahrscheinlich ein sehr altes Männchen. B.

s) Latham l. c. γ. B.

t) Donndorf a. a. O. γ. B.

u) Oder vielmehr ein einjähriges Männchen. — Hierher gehört noch:

3. Var. C. Der Sägeschnäbler.

Mergus serratus. BRUN. n. 96.

Hr. Latham hat ihn im Ind. orn. zum Störtaucher (Mergus castor, L.) gezählt. Schottel und Federbusch sind dunkelbraun; die Kehle weißbraun; die hintere Hälfte des Halses bis auf die Brust weiß und braun gefleckt; der untere Theil der Brust, Bauch und After weiß;

Schultern, Rücken, Steiß, Schwanz und Seiten braungrau, indem die Ränder der Federn aschgrau sind; die vordern Schwungfedern schwarz, die hintern an der Spitze weiß, wie die nächsten Deckfedern, daher ein weißer Spiegel mit einem schwarzen Strich; Füße und Schnabel roth. — Ein junges Männchen oder altes Weibchen.

3. Var. D. Der braunköpfige Meerrachen.


Mergus cristatus.

Kopf und Hals sind braun; die Seiten nicht schwarz und weiß, sondern braun und hellgrau gewellt. Füße und Schnabel, wie beim vortgen. — Ein junges Männchen.

B.

x) Latham Ind. orn. II. p. 830. n. 5. B.

Tab. 108.



Die gehäubte Tauchente



Ein und neunzigste Gattung. Tauchente.

373

L'Harle huppé de Virginie. BRISS. orn. VI. p. 258. No. 8. — Pl. enlum. 935.
(das Männchen) pl. 936. (das Weibchen).

L'Harle couronné. BUFF. ois. VIII. p. 280.

Ecatototl altera. RAI. Syn. p. 175.

Wind-Bird. WILL. orn. p. 389.

Round-crested Duck. EDW. Nat. Hist. pl. 360. y) — CATESBY Caro l. vol. 1
pl. 94.

Hooded Merganser. ARCT. Zool. No. 467. z)

Br. Mus. Lev. Mus.

Sie hat fast die Größe zwischen der Pfeif- und Krickente, ist siebenzehn und einen halben Zoll lang, und drey und zwanzig Zoll breit; und ihr Gewicht ist beynähe drey und zwanzig Unzen. Ihr Schnabel ist anderthalb Zoll lang, schwarz, und am Ende mit einem Nagel versehen; der Augenstern goldfarbig; der Kopf mit einem großen abgerundeten, an den Seiten flachen Federbusch versehen; die Augenkreise und die Mitte des Busches schwarz; das übrige weiß, und ringsherum mit schwarzen Spitzen; der Kopf, der Rücken, der Hals und die Schwungfedern schwarz; der Schwanz schwärzlich, die untern Theile von der Brust weiß; die Seiten der Brust, und der untere Theil des Halses, mit schwarzen Wellenlinien, die Deckfedern der Flügel dunkelbraun; über die untern läuft ein weißer Streifen; und an den Schulterfedern ist eine Mischung von der nämlichen Farbe; die Seiten der Brust schön braungelb, und mit schwarzen Strichen durchzogen; die Seiten des Afters eben so, und sehr artig gestreift; die Füße schwarz.

Das Weibchen hat einen dunkelashgrauen, schwarz gesprenkelten Kopf; der Federbusch ist kurz und rostfarben; Rücken, Flügel und Schwanz dunkelbraun; über die Flügel läuft ein weißer Strich; Brust und Bauch sind weiß.

Diese schöne Art ist in Nordamerika zu Hause. Auf Hudsons-Bay erscheint sie zu Ende des Maies, und baut dicht an die See; ihr Nest besteht aus Gras, und ist mit Federn aus der Brust gefüttert. Sie legt vier bis sechs weiße Eyer. Die Jungen sind gelb, und werden im Julius flücker. Im Herbst ziehen sie alle miteinander weg. In Neu-York und andern Orten bis nach Virginien und Carolina, erscheinen sie im November, und halten sich in süßen Wassern auf. Im März ziehen sie wieder nach Norden. Auf Hudsons-Bay werden sie Omiska-scheep genannt ^{a)}.

5. Die

y) Seligmanns Vögel IV. Taf. 88. B.

z) Herr Gutkind.

z) Uebers. II. S. 500, Nr. 385. Donndorfs
Zool. Beytr. II. S. 801. Nr. 1. B.

5. Die weiße Tauchente. (Smew).

Das Männchen.

Mergus Albellus. LIN. I. p. 209. 5. Ed. XIII. I. 2. p. 547 No. 5. a. b) — FAUR.
Suec. No. 137. — BRÜNN. orn. No. 97. — FRISCH av. tab. 172. — KRAM.
elench. p. 344. No. 3.

Mergus albus. SCOP ann. I. No. 91. c)

Mergus Rheni. RAU Syn. p. 135. No. 5.

Le petit Harle huppé, ou la Piette. BRISS. orn. VI. p. 243. No. 3. pl. 24. fig. 1.
— BUFF. ois. VIII. p. 275 pl. 24. — PL. enlum. 449.

White Nun. RAU Syn. p. 135. A. 3. — WILL. orn. p. 337. pl. 64.

SMEW. ALBIN Nat. Hist. 1. pl. 89. — BR. Zool. II. No. 262. — ARCT. Zool.
No. 468. d)

Das Weibchen.

Mergus Albellus LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 547. No. 5. b. — BRÜNN. orn. No. 98.
L'Harle étoilé. BRISS. orn. VI. p. 252. No. 6.

Weesel Coot. ALBIN Nat. Hist. I. pl. 88.

Red-headed Smew. BR. Zool. II. No. 263. e)

BR. Mus. Lev. Mus.

Diese ist etwas größer, als die Krickente ^{f)}, sechzehn bis siebzehn Zoll lang, zwey Fuß breit, und vier und dreyßig Unzen schwer. Ihr Schnabel ist fast zwey Zoll lang und schwarz; die Hauptfarbe des Gefieders ist weiß; der Kopf hat hinten einen Federbusch, dessen unterer Theil schwarz ist; an beyden Seiten des Kopfs ist jein eyrunder, schwarzer Fleck, der am Schnabel anfängt, und die Augen mit einschließt; am untern Theil des Halses, zu beyden Seiten, sind zwey krumme, schwarze Streifen, die vorwärts laufen; die innern Schulterfedern, der Rücken, die Deckfedern an den Seiten der Flügel, und die großen Schwungfedern sind schwarz; der Schwanz ist aschgrau; die Füße sind blaugrau.

Das Weibchen ist sechzehn Zoll lang, drey und zwanzig Zoll breit, und wiegt funfzehn Unzen. Der Schnabel ist bleifarben; der Kopf rostigroth, und hat einen unbedeutenden Federbusch; Wangen, Kinn und Kehle sind weiß; zwischen dem Schnabel und den Augen ist der nämliche schwarze, eyrunde Fleck, wie bey dem Männchen; der Rücken ist dunkel aschfarben; die Flügel, wie bey dem Männchen; der Bauch weiß; die Füße hellaschfarben.

Man

b) Latham Ind. orn. II. 831. n. 6. B.

c) Uebers. v. Günther I. S. 78. Nr. 3. S.

d) Uebers. II. S. 501. Nr. 386. B.

e) Meine N. S. Deutschlands. II. S. 738. Nr.

Nr. 3 — Pontoppidan N. S. von Dän-
nemark. S. 168. Nr. 3. Schriften der Berl.

Gesells. VII. S. 457. Neue Schwedische Abh.

I. S. 224. Cetti N. S. v. Sardin. II. S.

225. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 809.

Nr. 5. B.

f) Teal s. die folgende Gattung, Nr. 88. f.
Anas crecca, L.

Man sieht diese Art in England nur im Winter, wo man sie zuweilen in den südlichen Gegenden dieses Landes antrifft; so auch in Frankreich, in der Nachbarschaft der Piccardie, wo sie Elsterchen (la Piette) genannt wird; einen ähnlichen Namen führt sie, wie ich gehört habe, in Kent, nämlich Elster-Taucher (Magpie-Diver). Auf dem festen Lande finde ich sie bis nach Kravyn; sie besucht auch Island, und hier, oder in einer andern arktischen Gegend bringe sie den Sommer zu; auch brütet sie gewöhnlich daselbst, wahrscheinlich in Gesellschaft anderer Tauchenten; so wie man bemerkt hat, daß sie mit diesen Vögeln, verschiedenen Arten von Enten u. s. w. im Februar auf ihrem Zuge die Wolga hinauf wandert ²⁾. Sie ist auch in Amerika zu Hause, und ist aus Newyork ^{b)} gesandt worden, wo sie wahrscheinlich auch ein Zugvogel ist, wie in Europa.

Z u s a f s.

Ich zähle hierher als Varietäten oder vielmehr Altersverschiedenheiten folgende Vögel:

a. Die kleine Tauchente. *Mergus minutus*. L.

Sie ist Nr. 6 beschrieben. Ich halte sie nach meinen Beobachtungen für weiter nichts als ein junges Weibchen der weißen Tauchente. Freylich ist diesem die Behauptung entgegen, welche in der Arct. Zool. (Uebers. II. S. 501. Not. b.) steht, daß Hr. Plymely verschiedene untersucht, aber zwischen Männchen und Weibchen kein Unterschied im Gefieder gefunden habe.

b. Der Wieselkopf. *Mergus mustelinus*.

Der Kopf ist braun und weiß und unter den Augen ein schwarzer Fleck; der Unterleib ganz weiß; Rücken und Schwanz aschgrau; ein doppelter Spiegel oder auf den Flügeln ist erst ein großer weißer Fleck, dann ein schwarzer, hinter diesem ein schmaler weißer, dahinter ein fingerbreiter schwarzer, und alsdann ein weißer, welcher von den zweyten Deckfedern gebildet wird. — Ein junges Männchen.

c. Die Ungarische Tauchente. *Mergus Pannonicus*.

Sie hat entweder einen glatten oder nur wenig gehäubten, rostfarbenen Kopf, ohne schwarze Flecken unter den Augen; ist weiß mit schwarzem Rücken, Schwungfedern, Schwanz und hat eine aschgraue Brust. — Ein Weibchen.

Bbb 2

d. Die

²⁾ Decouw. Russ. vol. II. p. 145.

^{b)} Arct. Zool.

d. Die gefleckte Tauchente. *Mergus maculatus*.

Sie ist von gewöhnlicher Größe; weiß und blaugrau gefleckt; hat einen anliegenden Federbusch und einen rothen Schnabel mit einer schwarzen Einfassung.

Noch ist zu bemerken, daß sich immer die gleich alten und gleichfarbigen Männchen und Weibchen zusammen halten und paaren, und hierin den Tauben nachahmen. Man findet immer, daß Nr. a, b und c zusammengepaart sind; allein deswegen hat man doch nicht gleich Grund, sie als besondere Arten zu trennen. B.

6. Die kleine Tauchente. (Minute M.)

Mergus minutus. LIN. I. p. 209. 6. Ed. XIII. I. 2. p. 548. No. 6. i) — Faun.

Suec. No. 138. — KRAM elench. p. 344. No. 4.

Mergus tinus. HASSELQ. iter p. 269. No. 37. k)

— — glacialis. BRÜNN. orn. No. 99 — RAU Syn. p. 135.

— — pannonicus. SCOP. ann I. No 92. l)

Le petit Harle huppé (femelle). BRISS. orn. VI. p. 243 No. 3. pl. 24. fig. 2.

L'Harle étoilé. BUFF ois. VIII. p. 278. — Pl. enlum. 450.

Lough Diver RAU Syn. p. 135. — WILL. orn. p. 338. — Br. Zool. II. p. 560.

— Arct. Zool. p. 540 A. m)

Br. Mus. Lev. Mus. n)

Diese ist etwas kleiner, als die vorhergehende, vierzehn und einen halben Zoll lang, und drey und zwanzig Zoll breit. Ihr Schnabel ist schwarz; der obere Theil des Kopfs und die Seiten desselben mit Einschluß der Augen und des Hinterhalses, dunkel rothfarben am dunkelsten am Kopf, dessen Federn etwas länger sind; das Kinn, die Kehle, der Vorderhals und die Seiten desselben, zur Hälfte ihrer Länge, sind weiß; der untere Theil des Halses und die Brust, dunkelbraun und weiß gesprenkelt, der Bauch und die untern Theile weiß; die Flügel sind nicht sehr von denen der vorigen Art verschieden, dunkelschwarz mit einem weißen Flecken an den Deckfedern, und zwey Streifen von eben dieser Farbe unten; die Füße dunkelbraun.

Männchen und Weibchen sind kaum von einander zu unterscheiden, außer in der Größe, denn letzteres ist kleiner.

Was vorhin von der weißen Tauchente (Nr. 5) gesagt worden ist, gilt auch von dieser, in Rücksicht ihrer Wanderungen; man sieht sie zuweilen bis zum 37ten Grad S. Breite, und zwar auf der Insel Tino, im Archipelagus; im Sommer geht sie nach Norden, um zu brüten.

Die

j) Latham Ind. orn. II. 823. n. 7. B.

m) Uebers. II. S. 502. A. B.

k) Hasselquist Reise nach Paläst. S. 322. Nr. 37. B.

n) Vergleiche meine Zusätze zur vorhergehenden Art. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 812.

l) Uebers. v. Günther I. S. 79. Nr. 92. Die Ungarische Tauchente. B.

Nr. 6. B.

Die Vögel dieser Gattung sind überhaupt nicht so wohlschmeckend, als die Enten-Arten; wie wohl ich die beyden letztern oft auf den Märkten in London gesehen habe, und einige sie der wilden Ente nicht viel nachsehen, welche letztere zuweilen den fischartigen Hautgout hat, ein Geschmack, der den Gaumen der Kenner guter Gerichte nicht unangenehm ist *).

Z u s a m m e n f a s s u n g.

7. Die Sardinische Tauchente.

Mergus imperialis. GMELIN LIN. Syst. I. p. 547. No. 4.

— — — LATHAM Ind. orn. II. p. 829. n. 3.

CETTI Uc. Sard. p. 326. Ueberf. II. S. 326.

Sie hat die Größe und Gestalt einer Gans. Der Körper ist abwechselnd schwarz, aschgrau und braun, wie bey der Gans; der Kopf glatt; die ersten Schwungfedern schwarz; der Spiegel fehlt; der Schnabel wie bey den Tauchenten, und von weißer Farbe, in welcher etwas dunkelroth vertrieben ist; weiß sind ebenfalls die Füße mit etwas bengemischtem Roth; die Zunge gefranzt.

Sie hält sich im Winter in Sardinien auf.

Nedmann hält sie (Neue Schwedische Abb. VI. S. 289. Nr. 2.) für das Weibchen einer unbekannten Art, und sagt, daß sie nicht eher zu bestimmen sey, als bis man das Männchen entdeckt habe.

8. Die gabelschwänzige Tauchente.

Mergus furcifer. GMELIN LIN. Syst. I. p. 548. — Mesele Schriften der Verh. Naturf. VII. S. 458. — LATHAM Ind. orn. II. p. 832. n. 8.

Sie ist schwarz; der Schnabel schwarz, in der Mitte ziegelfarben; der Kopf glatt; von den Ohren geht auf beyden Seiten des Halses hin bis zur Brust eine schwarze Binde; die Stirn und die Wangen sind verwaschen dunkelbraun; der Hals, Bauch, After und die Seitenfedern des Schwanzes sind weiß; der Schwanz gabelförmig.

Wohnt in Curland.

Bbb 3

9. Die

*) Im Ind. orn. wird hier, so wie in Gmelins Linne'schen Natursystem der Asiatische Taucher (*Mergus asiaticus*: S. G. Gmelins Reise II. S. 138. als Varietät zugelegt. Er ist 14 1/2 Zoll lang; der Kopf glatt; der Rücken schwarz; der Bauch weiß; Schnabel und Füße sind fleischfarben; die vor-

dern Schwungfedern schwarz; der Schwanz aschrau. — Er bewohnt Astrakan.

Ich habe ihn oben unter der rothköpfigen Tauchente aufgeführt und Nedmann zählt ihn Neue Schwed. Abb. VI. S. 289. Nr. 2) zur Tauchergans. B.

9. Die braune Tauchente.

Mergus fuscus. LATHAM Ind. orn. II. p. 832. n. 9.
Brown Merganser. Arct. Zool. II. Sup. p. 74.

Sie ist siebenzehn und einen halben Zoll lang; am Hinterkopf steht ein Federbusch, der am Untertheile schwarz ist; die Hauptfarbe ist dunkelbraun, am Unterleibe weiß; die Brust bläulich, weißlich gewölkt; Kehle, und Brust schwarz gefleckt; die Flügel schwarz mit einer weißen Binde; hinter den Augen eine weißliche Binde, die bis zum Nacken reicht; die Füße gelblich.

Bewohnt die Hudsons-Bay.

10. Die blaue Tauchente.

Mergus coeruleus. LATHAM Ind. orn. II. p. 833. n. 10.
Blue Merganser. Arct. Zool. II. Sup. p. 74.

Sie ist gehäubt und blau; der Scheitel und Schwanz schwarz; die Kehle, der Bauch und ein Fleck auf den Flügeln weiß; der Schnabel verlängert und schwarz; die Füße blau.

Bewohnt die Hudsons-Bay.

Herr Latham hat diese Tauchente als eine Varietät der Ente mit weißem Gesicht (*Anas discors*, L.) beschrieben, s. unten Nr. 50. Var. A. wo man auch eine weisläufigere Beschreibung findet.

B.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

Diese Gattung hat einen starken, breiten, platten oder eingedrückten, und gemeinlich am Ende mit einem Anhange, den man Nagel nennt, versehenen Schnabel; die Ränder beyder Kinnladen sind mit scharfen blättrigen Zähnen besetzt. Die Nasenlöcher sind klein und eyrund. Die Zunge ist breit, und ihre Ränder an der Wurzel gefranzt. Der Zehen sind vier, drey vorwärts, und eine rückwärts; die mittlere ist die längste.

I. Der Sing:Schwan. (Whistling Swan).

- Anas Cygnus. LIN. Ed. XIII, I. 2. p. 501. No. 1.
 — — ferus. LIN. Syst. Nat. ed. XII. tom. I. p. 2. p. 194. No. 1. p) —
 Faun. Suec. No. 107. — SCOP. ann. I. No. 66. q) — BRÜNN. orn. No. 44.
 — MÜLLER Zool. No. 106. — KRAM. elench. p. 838. No. 2. — GEORGE
 Reise 165.
 Le Cygne sauvage. BRISS. orn. VI. p. 292. No. 12. pl. 28. — BUFF. ois. IX. p.
 3. — Pl enlum 913.
 Elk, Hooper, or Wild Swan. RAN. Syn. p. 136. A. 2. — WILL. orn. p. 356. p.
 69 (der Kopf). — EDW. Nat. Hist. pl. 150. r) — BR. Zool. II. No. 264. —
 Arct. Zool. No. 469. s)
 Lev. Mus.

Der Singschwan, oder (wie er auch genannt wird) wilde Schwan, ist kleiner, als der zahme oder stumme (Nr. 2), und ohngefähr fünf Fuß lang. Sein Schnabel ist drey Zoll lang, von der Wurzel bis zur Mitte gelblichweiß, und von da an bis zum Ende schwarz; um die Augen herum ist eine kleine Stelle unbefiedert; die Augenlieder sind gelblich; das ganze Gefieder ist, ohne Ausnahme, rein weiß; die Füße sind schwarz *).

Diese

- p) Latham Ind. orn. II. p. 833. n. 1. B.
 q) Uebers. v. Günther I. S. 60. Nr. 66. B.
 r) Seltmanns Vögel V. Taf. 44. B.
 s) Uebers. II. S. 502. Nr. 387. — Pallas
 Reis. Musz. II. S. 7. Dessen nord. Beytr.
 IV. S. 8. Dessen Naturg. merkw. Thiere.
 VI. S. 34. Cetti N. G. von Sardinien II.
 S. 328. Beseke Vögel Eurlands. S. 41.
 S. 69. Stellers Kamtschatka S. 190.
 Pontoppidan N. G. v. Norweg. II. S.
 188. Dessen N. G. v. Dänem. S. 167.
 Nr. 1. Uao v. Troil Reise nach Island
 S. 115. Lichtenbergs Magazin II. 3. S.

169. Meine N. G. Deutschlands II. S. 581.
 Nr. 1. — Dondorfs Zool. Beytr. II. S.
 694. Nr. 1. B.
 *) Von einigen rüthlich. Willughby. — Herr
 Pallas bemerkt, daß er sowohl die Farbe sei-
 nes Schnabels als Leibes verändere, nachdem er
 jung oder alt sey; denn anstatt daß ersterer bey
 den alten pommeranzengeln und letzterer schnee-
 weiß ist, so ist jener bey den Jungen bläulich-
 schwarz und dieser aschfarben. Hr. Beseke
 sagt, er sey nur im ersten Jahre auf den Flü-
 geln und Rücken grau, wenn er aber ein Jahr
 alt wäre, so sey er durchaus blendend weiß. B.

Diese Art, denn ich halte sie für eine eigene ^{a)}, ist ein Bewohner der nördlichen Gegenden, in England nur in strengen Wintern erscheint, wo man hin und wieder Flüge zu fünf oder sechs sieht ^{b)}. Inzwischen soll er im Oktober nach Lingen einer der westlichen Inseln, kommen, und bis zum März da bleiben, wo er dann wieder wegzieht. Einige wenige sind, wie ich bemerkt habe, beständig in Mainland, einer der Orkadischen Inseln, und brüten da; der größere Theil aber zieht den Sommer über wieder nach Norden zurück, wo sie sich in Island ^{c)}, Lapland, den Tatarischen Wüsteneyen und Siberien, bis nach Kamtschatka, vorfinden. Im Winter verbreiten sie sich gegen Süden, und man trifft sie dann um das Caspische Meer und Pontus Euxinus, in Griechenland ^{d)}, ja zuweilen bis in Egypten an ^{e)}; auf dieser Seite des Aequators hat man sie aber nur zwischen den Wendezirkeln und dem Arktischen Kreis bemerkt, welchen letzteren sie selten erreichen sollen ^{f)}. Ich zweifle nicht, daß dieß der Vogel sey, der Colum genannt, und um Surate, in Ostindien ^{g)}, angetroffen wird, wo sich die stumme Art (Nr. 2) gleichfalls findet; und wovon jener sich vor diesem durch die unten anzuführende, bewundernswürdige Umbeugung (circumvolution) seiner Luftröhre, sattsam auszeichnet. Man hat sie auch in Amerika angetroffen. Sie sind nicht selten auf Hudsons-Bay, wo sie Wapasseu heißen; sie werden bei ihrer Ankunft, zu Ende des Maies, von den Gänsen begleitet, sind aber nicht in großer Anzahl, obschon bisweilen ihrer neune in Einem Fluß sich befinden; hingegen sollen die gegen Süden gelegenen Seen einen Ueberfluß an diesen Vögeln haben. Die Einwohner schätzen sie sehr als Speise. Sie legen vier Eyer, und brüten

a) Dieß ist sie auch, denn sie unterscheidet sich von stummen Schwan in folgenden Stücken: 1) In der Größe. 2) In der Wachshaut, die bey diesem gelb, bey dem stummen schwarz ist. 3) Im Tragen des Halses, dieser trägt ihn gerade und jener gebogen. 4) In der Anzahl der Rippen; dieser hat auf jeder Seite 12 und jener nur 11. 5) Im Bau der Luftröhre. V.

x) Nach Thüringen kommt er in strengen Wintern auf die offenen Flüsse und Teiche; allein er ist immer eine Seltenheit. V.

y) Die Isländer bemerken, daß ihre Anzahl gegen den Winter hin sich vermehrt, woraus sie schließen, daß sie aus einer noch weiter gegen Norden gelegenen Gegend kommen, und im Frühjahr sieht man oft mehr, als hundert in Einem Flug, die, wie man vermuthet, aus Süden kommen. Dieß gilt von den Zugvögeln; denn der größte Theil der jungen Brut, bleibt das ganze Jahr hindurch da, besucht im Sommer die See, und zieht sich im Winter an die Seefüste zurück. von Troil Iceland p. 143.

z) Catesby Carol. App. p. 36. — Hist. Louis. vol. II. p. 78.

a) In Curland nistet er in so großer Menge, daß viele hunderte auf einmal einen großen See oder Sumpf einnehmen, besonders in der Gegend von Liebau auf den Pavensee und um Durben wo sie nach Johanni, jung und alt, wegen den Federn erschlagen werden. V.

b) Arct. Zool.

c) Fryers Trav. p. 119. 316. — Er bemerkt zuerst, daß sich der Colum, so wie der Seraus, eine Art des erstern, in Surate, vorfinde, und fährt dann fort: „die Luftröhre ist an beyden Seiten des Brustbeins, nach Art einer Trompete aufgebogen; wenn dieß nur einfach ist, so ist der Vogel ein Seraus, ist es doppelt, so ist er ein Colum, der ein noch größeres Geschrey macht, als die Rohrdommel, denn man hört ihn schon eine gute Weile vorher, ehe man ihn sieht, wenn er in ganzen Heeren in der Luft fliegt.“ Diesem fügt er noch bey, diese Vögel flögen, wenn das Zeichen des Widders eintritt, in die kalten Gegenden. p. 316.

brüten ihre Jungen im Junius aus ^{a)}. Man hat sie in Königs Georg Sund gesehen ^{c)}; von da bis nach Carolina ^{d)} und Louisiana, denn sie sind in der neuen, wie in der alten Welt Zugvögel. Die Indianer trogen die Häute mit den noch anhängenden Pflaumsfedern zusammengenäht, zu ihrer Bedeckung; und aus den größern Federn machen sie Diademe für ihre Anführer, so wie sie die kleinern an Fäden schnüren, und die Kleider, die nur von Damen vom höchsten Range getragen werden, damit bedecken ^{e)}.

Im August verlieren sie ihre Federn, und können nicht fliegen, wo denn die Isländer und Kamtschadalen sie mit Hunden jagen, die sie bey den Hälsen fangen. In Kamtschatka werden sie auch mit Knütteln erschlagen. Ihre Eyer werden für ein gutes Gericht gehalten, und ihr Fleisch wird von den Einwohnern sehr geschätzt, besonders das von jungen Vögeln; es wird so geschätzt, daß weder im Sommer noch im Winter, ein Gastmal ohne dasselbe angestellt werden soll ^{b)}. Der Gebrauch der Federn ist Jedermann bekannt; und die Haut des Körpers wird von den Einwohnern getragen; ausserdem wird auch noch die Haut an den Beinen ganz abgezogen, und zu Beuteln gebraucht, die chagrinartig aussehen.

Diese Art hat einen scharfen, lauten Schrey, den sie, besonders im Fliegen hören läßt, und den man sehr weit vernehmen kann, ja den man hört, wenn sie auch so hoch in der Luft fliegen, daß sie das Auge nicht mehr erreichen kann ^{f)}. Ihre Luftröhre ist von sonderbarem Bau; sie geht nämlich eine kleine Strecke in die Brust hinein, hierauf beugt sie sich in Form einer Trompete zurück, und geht dann zum zweytenmal in die Brust, wo sie sich in zwey Aeste theilt, und so mit den Lungen verbindet ^{g)}. Vielleicht rührt die starke Stimme des Vogels von dieser Struktur her; da bey der folgenden Art, die gemeiniglich der stumme Schwan genannt wird, die Luftröhre mit Einemmale in die Lunge eintritt, wovon die Folge ist, daß der stärkste laut, den sie hervorbringen kann, ein bloßes Zischen ist ^{h)}.

Dieser ^{m)} Vogel wiegt zuweilen fünf und zwanzig Pfund ⁿ⁾.

Die

a) Herr Hutchins.

c) Cooks last Voy. vol. I. p. 235.

f) Es soll zwey Arten geben; die größere heißt Trumpeter (Trompeter), die kleinere Hooper (Schreyer). — Lawson, Carol. p. 146. — Arct. Zool.

g) Hist. Louis. vol. II. 113.

h) Dies war der Fall nicht, als Capitain Cook dieses Land besuchte. Cooks last Voy. vol. III. p. 347.

i) Hist. Louis. vol. II. p. 113. — Die Schwäne fliegen so dicht aneinander, daß nur der Schnabel des Einen auf dem Schwanz des vorhergehenden ruht. Hist. de Lyon vol. I. p. 212.

k) Will. orn. p. 556. 57.

l) Der Singschwan giebt den hellen und lauten Ton Uugh, Uugh von sich, der in den langen und dunklen Winternächten, wenn man ihn über seinem Haupte hört und die Winde ihn moduliren, sehr angenehm klingt. Er ist die Art, von welcher die Alten die Fabel des Schwanenklodes gedichtet haben, das unsere Poetiker in ihren Begräbnißliedern den stummen Schwan zuschreiben. V.

m) Zus. aus den Suppl. S. 272.

n) Herr Voss.

Die Luftröhre geht in das Brustbein hinein; dessen keilförmiger (keellike) Fortsatz, der bey den meisten andern Vögeln platt und scharf zu seyn pflegt, bey dieser Art sehr groß (large) und hohl ist. In diese Vertiefung tritt die Luftröhre hinein, und nachdem sie eine Windung gemacht hat, kommt sie zur nämlichen Oeffnung wieder heraus *).

In Amerika sind diese Vögel nicht selten, besonders an den Ufern der obern See, wo sie in den kleinen Seen (lagoons) und sumpfigen Eingängen (inlets) brüten, und zu Anfang des Octobers, mit ihren Jungen, in unglaublicher Anzahl, nach den südlichen Provinzen wandern²⁾).

2. Der stumme Schwan. (Mute S.)

Anas Olor. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 501. No. 47. q)

— Cygnus, mansuetus. LIN. Syst. Nat. ed. XII. t. 1. p. 2. p. 194. No. 1. — Faun. Suec. No. 107 β. — BRÜNN. orn. No. 44. — KRAM. elench. p. 338. No. 2. β. — FRISCH av. tab. 152.

Le Cygne. BRISS. orn. VI. p. 288. No. 11. — BUFF. ois. IX. p. 3. pl. 1. — Pl. enlum. 913.

Tame Swan. RAU Syn. p. 136. A. 1. — WILL. orn. p. 355 pl. 69. — ALBIN Nat. Hist. vol. III. pl. 96. — EDW. Nat. Hist. pl. 150. (der Kopf) r) — Br. Zool. II. No. 265. pl. 60.

Mute Swan. Arct Zool. No. 470. s)

Br. Mus. Lev. Mus. 1)

Dieser unterscheidet sich von dem vorigen darin, daß er größer ist; sein Gewicht ist ohngefähr fünf und zwanzig Pfund. Sein Schnabel ist roth, die Spitze und die Seiten schwarz, und an der Wurzel, an der Stirn, ein schwüliger schwarzer Knopf; das Gefieder ist in allen Stücken das nämliche, wie bey dem vorigen.

Dieser findet sich wild *) in Rußland und Sibirien, am häufigsten in letzterm Lande. Er kommt später aus Süden an, und verbreitet sich nicht so weit gegen Norden *). Die am südlichen Theil der Caspischen See sind sehr groß, und werden als Speise auf den Tafeln geschätzt. Bey den Mahomedanern steht der Schwan in großer Verehrung *).

In

o) Dr. Heyssham.

p) Hauptmann Davies.

q) Latham Ind. orn. II. 834. n. 2. B.

r) Seltmanns Vögel V. Taf. 45. B.

s) Uebers. II. S. 505. Nr. 388. B.

t) Pallas nordische Beytr. III. S. 10. Meine N. G. Deutschlands II. S. 595. Nr. 1. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 701. Nr. 47. B.

u) Auch in Deutschland ist er im Sommer auf

Seen und Teichen wild anzutreffen, und zieht im Spätherbst weg, wenn der Winter gar zu rauh wird; sonst streicht er dann im Winter von einem offenen Fluß, See oder Teich zum andern, u. kommt im Frühjahr an dem Ort, wo er das vorige Jahr gebrütet hat, wieder an. Aus nördlichen Gegenden trifft man auch im Winter zuweilen ganze Flüge auf Teichen und Flüssen an. B.

x) Arct. Zool.

y) Decouy. Russ. vol. III. p. 77.

In England ist diese Art in jedes Gutsbesizers Garten, wo Wasser ist, sehr gemein, und wird zur Zierde gehalten. Sie legen gewöhnlich sechs bis acht große, weißliche Eyer, die sie fast zwey Monate bebrüten. An der Themse sieht man sie in ungeheurer Menge, wo sie für ein königliches Eigenthum angesehen werden, indem man es für einen Diebstahl (selong) erklärt, wenn ihre Eyer weggenommen werden; auf diese Art ist ihre Vermehrung gesichert, und sie geben dem Flusse in seiner ganzen Länge eine prächtige Zierde, von der Stelle an, wo der Handel der Hauptstadt aufhört, bis ganz an die Quelle desselben. Unter der Regierung Edwards IV. stunden sie in so großer Achtung, daß Niemand, „der ein freyes Leben von weniger, als fünf Mark jährlichen Einkommens besaß,“ erlaubt war, Schwäne zu halten. Am Fluß Trent sind sie auch in großer Menge; nirgends aber häufiger, als an den Salzwasser Eingängen der See bey Abbotsbury in Dorsetshire *).

Die jungen Schwäne, Cygnets genannt, wurden ehemals sehr geschätzt, und noch jetzt sollen sie zu Norwich, um Weihnachten, gemästet, und das Stück für eine Guinee verkauft werden a).

Ich will des Schwanengesangs und andere dergleichen schönen Dichtungen der Alten nicht erwähnen, da mein Freund, Herr Pennant, in seiner Britischen Zoologie diese Sachen vortreflich auseinandergelegt hat.

Nichts übertrifft die Schönheit und Pracht, womit der Schwan im Wasser rudert; er nimmt vor den Zuschauern die stolzesten Stellungen, die man sich denken kann, gleich als wünschte er bewundert zu werden. Er schwimmt in diesem Element geschwinder, als ein Mann gehen kann; dahingegen macht er zu Lande eben keine schöne Figur. Er ist sehr stark, und zuweilen außerordentlich wild; es ist nicht so gar selten, daß man ihn junge Leute von funfzehn oder sechzehn Jahren niederwerfen und mit Füßen treten sah; ja ein alter Schwan zerbricht mit einem Flügelschlag einem Menschen das Bein. Der Schwan soll sehr lang leben, und häufig das hundertste Jahr erreichen. Die Jungen bekommen ihr volles Gefieder nicht vor dem zweyten Jahr. Das erste Ey legt er im Februar, und fährt alle Tage damit fort, bis zu sechs, sieben oder acht Eyern; diese liegen auf einer Unterlage von Gras, am Wasser, und er sitzt sechs Wochen darüber. Er lebt von Fischen und Kräutern b). Das Fleisch der alten Schwäne ist hart und übel schmeckend; das der Jungen aber schätzt man, obschon in ältern Zeiten ungleich mehr, als jetzt.

3. Der schwarzhalsige Schwan. (Black-necked S.)

Anas nigricollis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 502. No. 48. c)

Black-necked Swan. BOUGAINV. Voy. p. 59. — PERRETT. Voy. vol. II. p. 26.

ch. 9. d)

C c c 2

Diese

z) Br. Zool.

a) Br. Zool.

b) Seine vorzüglichste Nahrung machen die großen Wasserkäfer aus. B.

c) Latham Ind. orn. II. 834. n. 3. B.

d) Hierher rechnet auch Hr. Latham im Ind. orn. I. c. den

Schwarz-

Diese Art soll einen rothen Schnabel haben; das Gefieder ist das nämliche, wie bey andern Schwänen, ausser daß der Hals sammettschwarz ist; die Füße sind fleischfarben.

Sie ist auf den Falklands-Inseln, Rio del Plata, und der Magellanischen Straße zu Hause. In Hawkesworth's Sammlung von Reisen III. B. S. 101. 117. wird auch eines Vogels erwähnt, der schwarz und weiß, viel größer, als ein Pelikan, und diesem ähnlich seyn soll. Vielleicht wird unter dieser kurzen Beschreibung obige Art gemeynnt.

4. Die kurzflügelige Gans. (Loggerhead Goose).

Anas cinerea. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 506. No. 60. e)

Oiseaux grises, ou Oies de plein. PERNETT. Voy. vol. II. ch. 19. p. 21.

Racehorse Duck. PERNETT. Journ. p. 213. 14.

Loggerhead. Philosoph. Transact. vol. LXVI. p. 104. — PENROSE Falkl. Isl. p. 35. — FORST. Voy. vol. II. p. 492. f)

Ihre Länge ist zwey und dreyßig Zoll;^{e)} der Schnabel ist drey Zoll lang, orangefarben, der Rücken der obern Kinnlade an der Wurzel braun, die Spitze schwarz; der Augenstern orangefarben, zuerst schwarz und dann wieder orangefarben eingefast; Kopf und Hals dunkel aschfarben; die obern Theile des Körpers fast eben so, der äußere Rand der kürzern Schwungfedern weiß; und dieß bildet ein Band von dieser Farbe an den Flügeln; die untern Theile des Körpers längs der Mitte herab dunkelbraun; über den Schenkeln aschblau; der After weiß; Schwungfedern und Schwanz schwarz, letzterer kurz, und zugespitzt; die Flügel sind ebenfalls sehr kurz und reichen nicht bis an den Steiß; am Flügelbug ist ein gelber Knopf, einen halben Zoll lang; die Füße sind bräunlich orangefarben, die Schwimmhäute dunkelbraun; die Klauen schwarz.

Sie ist auf den Falklands-Inseln, in Staaten-Land u. s. w. zu Hause, und läßt sich mehrertheils paarweise sehen, wiewohl man sie auch zuweilen in großen Flügen bemerkt hat. Wegen der Kürze ihrer Flügel können sie nicht fliegen; hingegen bedienen sie sich derselben im Wasser sehr gut, wo sie gleichsam zu laufen scheinen, wenigstens schwammen sie mit Beyhülfe ihrer Flügel, deren sie sich als Ruder bedienten, auf eine unglaubliche Art, so daß es äußerst schwer hielt, sie im Wasser zu schießen; um sie zu fangen, umzingeln die Matrosen einen Flug mit Booten, und treiben sie ans Ufer, wo sie, unfähig sich von der Erde zu erheben, sehr schnell laus-

Schwarzköpfigen Schwan.

Anas melanocephala. Guelin LIN.

Syst. I. 2. p. 502. n. 49.

Anas melancorypha. Molini Chil. p. 207.

Er ist dem stummen Schwan gleich, hat einen rothen Schnabel; schwarzen Kopf und weißen Leib. — Das Weibchen legt sechs Eier, und man sagt, daß es die Jungen mit sich auf

den Rücken herum trage, wenn es Nahrung suche. — Wohnt in Chitt. B.

e) *Anas brachyptera.* Latham Ind. orn. II. p. 834. n. 5 B.

f) Buffon IX. p. 414. III. B.

g) Einige unsrer Reisenden geben ihr Gewicht auf 19 bis 20 Pfund an; andere hingegen fanden es nicht unter 29 bis 30. s. Cook's Voy. vol. II. p. 204.

laufen, aber bald müde werden, sich dann niederkauern, um auszuruhen, und auf diese Art leicht einzuholen und todzuschlagen sind. Ihr Fleisch wurde zuweilen von den Matrosen, wenn es ihnen an Trapp-Gänsen (Nr. 5) fehlte, gegessen, es fand aber nicht viel Beyfall, weil es ranzig ist und nach Fischen schmeckt, und wurde besser für die Schweine gefunden, die es, in kupfernen Kesseln gekocht, begierig fraßen, und sehr fett davon wurden.

5. Die Trapp-Gans. (Bustard G.)

Anas leucoptera. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 505. No. 59. b)

L'Oie des Isle Malonines. BUFF. ois. IX. p. 69.

White-winged antarctic Goose. BROW's illustr. pl. 40.

Bustard Goose. BOUGAINO. Voy. p. 59.

Outarde. Hist. Louis. vol. II. p. 113?

Sea Goose. CLAYTON in Phil. Trans. vol. LXVI. p. 104.

Br. Mus.

Ihre Länge ist zwey und dreyßig bis vierzig Zoll. Der Schnabel ist kaum zwey Zoll lang, und schwarz; der Kopf, der Hals, die kleinern Deckfedern der Flügel und die untere Theile des Körpers sind weiß; der untere und hintere Theil des Halses, bis an die Mitte des Rückens ist mit zahlreichen, dunkelschwarzen Strichen durchzogen; die Seiten über den Schenkeln sind eben so; die größern Deckfedern der Flügel schwarz, mit weißen Spitzen, und dieß bildet einen weißen Streifen an den Flügeln; am Flügelbug ist ein stumpfer Knopf; die kürzern Schwungfedern sind theils schwarz, theils weiß; die großen dunkelschwarz; der Spiegel dunkelgrün; die zwey mittlern Schwanzfedern schwarz, die andern weiß; die Füße schwarz.

An einem andern Vogel dieser Art, im Brittischen Museum, ist fast der ganze Hals mit dunkelbraunen Strichen durchzogen, und die Flügel ohne Spiegel; ausserdem gleicht er dem ersten; ob es ein junger Vogel, oder eine Geschlechtsverschiedenheit ist, läßt sich nicht bestimmen i).

Sie ist auf den Falklands-Inseln zu Hause, wo sie Trapp-Gans (Bustard Goose) genannt wird. Sie steht sehr hoch auf den Beinen, welches ihr dazu dient, sich über das hohe Gras zu erheben, und durch Hülfe ihres langen Halses jede Gefahr zu wittern. Sie geht und fliegt mit großer Leichtigkeit, und hat auch das unangenehme Geschnatter, das den übrigen Arten dieser Gattung eigen ist. Sie legt gewöhnlich sechs Eier. Ihr Fleisch wird für gesund, nahrhaft und schmackhaft gehalten; und es traf sich selten, daß Mangel daran vorhanden war.

See 3

6. Die

b) Latham Ind. orn. II. 835. n. 9. B.

i) Herr Brugatville nennt das Weibchen gelb; und sagt, seine Flügel seyen mit Schillerfarben gezieret. Voy. p. 59. — Vielleicht meynt er meine Magellanische Art (Nr. 8).

— Er macht die Bemerkung, daß diese Gans der schwarze Schwan und andere Enten, in diesem Klima einen sehr weichen, groben, und sehr dicken Pflaum unter ihren Federn haben.

6. Die bunte Gans. (Variegated G.)

Anas variegata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 505. No. 58. ^{k)}

Von der Größe einer großen Ente. Ihr Schnabel ist anderthalb Zoll lang, an der Wurzel und an der Spitze schwarz; der Kopf, und der Hals, über die Hälfte seiner Länge weiß; der untere Theil des Halses und die Brust dunkelrothbraun, sehr artig schwarz und weiß gesprenkelt; der Rücken braunschwarz und weiß gesprenkelt; über den Schenkeln herrscht eben diese Farbe; alle untern Theile sind wie der untere Theile des Halses gezeichnet; Steiß und After rothfarben; die Deckfedern der Flügel weiß; die kürzern Schwungfedern grün, die großen und der Schwanz schwarz; die Füße ebenfalls schwarz.

Sie ist in Neuseeland zu Hause, und wird auf Duffn-Bay im April angetroffen, wo sie Pooa duggaher duggaher genannt wird. Aus den Gemälden des Herrn Jos. Banks.

Dies scheint der Vogel zu seyn, dessen Forster in seiner Reise (vol. I. p. 156.) erwähnt, und der so groß, als die Eidergans (Nr. 29) seyn soll; sein Gefieder ist schwärzlichbraun, sehr artig weiß gesprenkelt; Steiß und After rothfarben; die kürzern Schwungfedern grün; die großen und der Schwanz schwarz. Clapton erwähnt, in seiner Nachricht von den Falklands-Inseln eines Vogels unter den Namen der Berggans (Mountain Goose) ^{l)}, und sagt, sie sey größer, als die Bisamente (Nr. 31); das Gefieder auf dem Rücken ist braun und grünlich-schwarz gesprenkelt, und gegen den Hals hin wechselt es mit einer schönen, glänzenden Goldfarbe ab; die Brust ist wie bey einem Fasan gefärbt. Diese hält sich, wie er bemerkt, beständig auf den Gebürgen auf, ist angenehm von Geschmack, und andern Arten vorzuziehen; aber selten. Alle Gänse sind am besten im Herbst, wenn die Kauschbeeren ^{m)} (cranberries) reif sind, von welchen sie sich nähren.

Er spricht auch von einer andern, die so groß, als eine zahme Gans ist. Das Männchen schwarz und weiß gesprenkelt; das Weibchen fast wie die Berggans (Nr. 20) aber dunkler, und nicht so schön. Diese leben in den Thälern, von wilden Kauschbeeren (cranberries) und Gras, und geben überhaupt eine gute Speise ab, doch sind sie am besten und fettesten im Februar, März und April. Die erste von diesen beiden scheint meine jetzt beschriebene Art zu seyn; was die letzte betrifft, so kann ich, in Ermangelung einer hinlänglichen Beschreibung, nichts hierüber bestimmen.

7. Die Antarktische Gans. (Antarctic G.)

Anas antarctica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 505. No. 57. ⁿ⁾

Lev. Mus. (Das Weibchen).

Diese ist kleiner, als eine zahme Gans, vier und zwanzig bis sechs und zwanzig Zoll lang, und wiegt sechzehn Pfund. Ihr Schnabel ist schmal, kurz und schwarz; das ganze Gefieder blendend schneeweiß; am Flügelbug ein stumpfer Knopf; die Füße gelb.

Beym

^{k)} Latham Ind. orn. II. 836. n. 10. B.

^{l)} Phil. Trans. vol. LXVI. p. 101.

^{m)} *Empetrum nigrum*. L. B.

ⁿ⁾ Latham Ind. orn. II. p. 835. n. 8. B.

Beym Weibchen sind Schnabel und Füße wie beym Männchen, jener aber röthlich-fleischfarben; Kopf, Hals und Körper schwarz, mit weißen Querstichen durchzogen, wovon die am Kopf und Hals sehr klein sind, aber breiter werden, so wie sie weiter hinab kommen; die Mitte des Rückens einfarbig schwarz; die Deckfedern der Flügel weiß; am Flügelbug ein stumpfer Knopf; der Spiegel grün, auswärts weiß gerändert; die großen Schwungfedern schwarz; der Schwanz weiß; der After grünlichweiß; die Füße gelb ^e).

Sie ist in Weyhnachts- Sund, in Feuerland zu Hause ^f).

8. Die Magellanische Gans. (Magellanic G.)

Anas magellanica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 505. No. 56. ^g)

L'Oie des terres Magellaniques. BUFF. ois. IX. p. 68. — Pl. enlum. 1006.

Ihre Länge ist vier und zwanzig Zoll. Der Schnabel ist kurz, und schwarz, die obere Kinnlade am Ende ein wenig gebogen; Kopf und Hals rostbraun; der Anfang des Rückens, die Brust, und alle untern Theile bis zum After rostfarben, und schwarz gestreift; am After grau; der untere Theil des Rückens und der Schwanz dunkelbraun; die Deckfedern der Flügel weiß; die Schwungfedern dunkelbraun, die kürzern mit weißen Spitzen, und dieß bildet einen Streifen an den Flügeln; die Füße gelb; die Klauen schwarz ^r).

Sie findet sich in der Magellanischen Straße.

Ein Exemplar dieser Art ist in dem Museum des verstorbenen; Dr. W. Hunter. — Vielleicht ist obiger Vogel die gemalte Gans (Painted Goose), deren Byron erwähnt, und in der Magellanischen Straße angetroffen hat ^s), da er aber nichts weiter hierzu über sagt, so ist dieß eine bloße Vermuthung.

9. Die

^e) Im Ind. orn. wird die sogenannte Magellanische Gans, welche aber von der folgenden Art zu unterscheiden ist, im Mus. Carlson. Fasc. II. t. 37. als das Weibchen aufgeführt. Im Mus. Carls. heißt es: *A. magellanica* mit geflecktem Leibe, weißen Bauch, Steiß, After, Hüften und grünem Spiegel auf den Flügeln. B.

^f) Dr. Forster bemerkt, ihr Fleisch sey stinkend, und nicht essbar. Voy. vol. I. p. 495. 518. — Siehe auch Pernetty's Voy. vol. II. p. 13. — Cook's Voy vol. II p. 186.

^g) Latham Ind orn. II. 836 n. 11. B.

^r) Im Mus. Carl. Fasc. II. p. 37. ist das Weibchen abgebildet. Es heißt dort: Das Männchen ist etwas kleiner als eine Haus-

gans, ganz weiß, mit rothem Schnabel und gelben Füßen. Das Weibchen aber gleicht der Buffonschen Figur in pl. enlum. 1006. in einigen Stücken, geht aber doch in den meisten ab.

Der Schnabel ist aschgraugelb; der Scheitel aschgrau; die Seiten des Kopfs, die Kehle und der obere Theil des Halses sind bräunlichgrau; die Schultern, der Rücken und der Steiß dunkelbräunlich; die Gurgel, Brust, und der Bauch sind schwarz, jede Feder mit 4 Querverbinden bezeichnet; die vordern Schwungfedern schwarz, die hintern weiß; die vordern Deckfedern der Flügel weiß, die hintern entengrün und bilden einen Spiegel; Schwanz, After und Hüften weiß. B.

^s) Hawkesw. Voy. vol I. p. 47.

9. Die gemalte Gans. (Painted G.)

Anas picta. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 504. No. 55. 1)

Ihre Länge ist acht und zwanzig Zoll. Der Schnabel ist klein, nicht volle anderthalb Zoll lang, und schwarz; der Augenstern aschfarben; Kopf und Hals weiß, am Hinterkopf ins Aschfarbene spielend; die Farben an der Stirn laufen an beyden Seiten der obern Kinnlade etwas vor; der untere Theil des Halses und der Brust ist weiß, mit zahlreichen schmalen, schwarzen Strichen durchzogen; der Oberrücken ist hellgrau, eben so schwarz gestreift; der Unterrücken und die Schulterfedern dunkel aschfarben; die Deckfedern der Flügel weiß, am Flügelbug ein stumpfer Knopf; die kürzern Schwungfedern dunkelbraun mit hellen Rändern; die großen und der Schwanz schwarz; die Mitte des Bauchs, die Schenkel und der After weiß; über den Schenkeln dunkelbraun und weiß gestreift; die Füße schwarz 2).

Diese wurde in Staatenland, im Jänner, angetroffen. Aus Herrn Jos. Banks Gemälden. Sie scheint die gemalte Ente (Painted Duck) zu seyn, deren Capitain Cook *) erwähnt, und die die Größe der Bisam-Ente (Nr 31) haben soll. Ihr Gefieder ist sehr schön bunt. Kopf und Hals des Weibchens weiß; alle andern Federn aber, so wie Kopf und Hals des Männchens, von dunkel geschäcker (variegated) Farbe; beyde, Männchen und Weibchen, haben einen großen, weißen Flecken an den Flügeln.

Ich bin nicht ganz gewiß, in Rücksicht der fünf letzten Nummern, ob sie wirklich als Arten zu trennen sind, wie ich gethan habe; sehr wahrscheinlich sind sie es nicht, weil sie sehr ineinander zu laufen scheinen. Ich werde künftigen Reisenden für einen bessern Unterricht hierüber, sehr verbunden seyn.

10. Die Schneegans. (Snow G.)

Anas hyperborea. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 504. No. 54. 1)

Anser hyperboreus. PALLAS Spicileg. VI. p. 26. 2)

L'Oie de neige. BRISS. orn. VI. p. 288. No. 10.

White Brant. LAWSON Carol. p. 147. — Phil. Trans. vol. LXII. p. 413.

Snow Goose. Arct. Zool. No. 477. 3)

Sie hat die Größe einer gemeinen Gans; zwey Fuß, acht Zoll Länge, viertel Fuß Breite, und zwischen fünf und sechs Pfund Gewicht. Ihr Schnabel ist an den Rändern etwas gezähnt, die obere Kinnlade scharlachroth, die untere weißlich; der Augenstern röthlich; die

1) Latham Ind. orn. II. p. 836. n. 12. B.

2) Im Ind. orn. steht: Vielleicht ist diese Gans das Weibchen von der Magellantischen. B.

3) Voy. vol. I. p. 96.

4) Latham Ind. orn. II. p. 837. n. 14. B.

5) Dessen N. G. merkwürdiger Thiere. VI. S. 30. B.

6) Uebers. II. S. 519. Nr. 395. Meine N. G. Deutsch. II. S. 578. Nr. 7. Schwedische Abh. XLI. S. 24. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 706. Nr. 54. B.

die Stirn gelblich; die Hauptfarbe des Gefieders schneeweiß ^{b)}, die ersten zehn Schwungfedern ausgenommen, die schwarz sind, mit weißen Schäften; die untere Reihe der Deckfedern und die Bastardflügel, aschgrau, mit schwarzen Schäften; die Füße dunkelroth.

Die Jungen sind, bis sie ein Jahr alt werden, blau.

Diese Gänse sind auf Hudsons Bay sehr zahlreich, und werden von den Einwohnern Wap wan, und Wapa whe whe genannt. Sie besuchen im Mai den Severnstrom, und bleiben vierzehn Tage da; ziehen dann aber weiter nach Norden, um zu brüten; zu Anfang Septembers kommen sie wieder nach Fort Severn zurück, und bleiben bis zur Mitte des Octobers da, wo sie nach Süden ziehen, und in unzähligen Flügen, von ihren Jungen begleitet, bemerkt werden. Um diese Zeit werden viele Tausende von den Einwohnern erlegt, die sie abrupfen, ihnen die Eingeweide ausnehmen, und dann die Körper in ausgegrabne Höhlen in die Erde legen, welche sie wieder mit Erde bedecken, die dann über ihnen gefriert, und sie die ganze strenge Jahreszeit hindurch vollkommen frisch erhält; den Winter über haben sie dann weiter nichts zu thun, als bey Gelegenheit eine solche Vorrathskammer zu öffnen, wo sie die Vögel gut erhalten antreffen. Sie scheinen sich auch auf der westlichen Seite von Amerika aufzuhalten, da man sie in Unalascfa ^{c)}, so wie in Kamtschatka ^{d)} gesehen hat, ich glaube aber, sie sind weder in jenem, noch in diesem sehr gemein; in den Sommermonaten sind sie in Menge an der arktischen Küste von Sibirien, ziehen aber nicht über den 130sten Grad der Länge hinaus ^{e)}. Den Winter bringen sie vermuthlich in gemäßigtern Himmelsstrichen zu, weil man sie, in einer großen Höhe, über Schlesten fliegen gesehen hat; wahrscheinlich auf ihrem Zug in irgend ein anderes Land, weil es nicht scheint, als blieben sie für beständig dort ^{f)}, eben so bringen die Amerikanischen den Winter in Karolina zu. Die Sibirier fangen sie in Netzen, in die sie durch eine Person, die sich unter eine weiße Haut ^{g)} versteckt, und auf allen vierten kriecht, gelockt werden; während andere diese dummen Vögel treiben, die dann, aus Irrthum den ersten für ihren Führer ansehen, und ihm folgen, wo sie dann in die Netze verwickelt, oder in eine, zu diesem Endzweck errichtete Hütte geleitet werden ^{h)}.

II. Die

b) Herr Hutchins bemerkt, die Deckfedern der Flügel seyen lichtblau; vielleicht sind solche Vögel noch nicht völlig ausgewachsen?

c) Ellis's Nacrat. vol. II. p. 22.

d) Hist. Kamtsch.

e) Arct. Zool.

f) Den 13ten Jänner 1792. sah ich in Thüringen eine ungeheure Schaar von Ostern nach Westen über den Thüringer Wald ziehen. Sie machten ein sehr stumpfes Dreyeck, flogen schnell, waren ganz stumm, gewährten aber durch die schwarzen

Flügel Federn, die gleichsam den ganzen weißen Vogel einsoften, einen herrlichen Anblick. Es wurde eins davon geschossen. Denselben Winter habe ich mehrere Schaaren zuwellen von hundert und mehreren, aber weit höher über den Thüringer Wald fliegen sehen.

g) In die Haut eines weißen Rennthieres. B.

h) Arct. Zool. — Die Kamtschadalen bedienen sich einer ähnlichen Methode. Hist. Kamtsch. p. 158.

II. Die Riesen-Gans. (Great G.)

Anas grandis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 504 No. 53. f)
Great Goose. Arct. Zool. p. 570. A. k)

Diese ist sehr groß, und wiegt fast fünf und zwanzig oder dreßzig Russische Pfunde. Der Schnabel ist schwarz, die Wurzel lohgelb; der Körper dunkelbraun; die untern Theile weiß; die Füße scharlachroth.

Sie findet sich im östlichen Sibirien, von Lena bis nach Kamtschatka, und wird, in Gesellschaft der Rothhals-Gans (Nr. 17) in großer Menge auf Blöcken (glades), wie in England die Schnepfen, aber in größern Steigen (upon a larger Scale) gefangen.

12. Die Schwanen-Gans. (Chinese G.)

Anas cygnoides LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 502. No. 2. m)

Anas cygnoides, australis. LIN. Syst. Nat. ed. XII. t. 1. p. 2 p. 194. No. 2. n

— Faun. Suec. No. 108. — FRISCH av. tab. 153. 54. n)

L'Oie de Guinée. BRISS. orn. VI. p. 280. No. 2. — BUFF. ois. IX p. 72. pl. 3.

— Pl. enlum. 374.

Swan Goose. RAI. Syn. p. 138. No. 8. — WILL. orn p. 360. pl. 71. o)

Spanish Goose. ALBIN Nat. Hist. vol. I. pl. 91.

Chinese Goose. BROWN. Jam p. 480. — Arct. Zool. p. 571. B p)

Br. Mus. Lev. Mus. q)

Dies ist eine große Art, zwischen dem Schwan und der Gans das Mittelding, und über drey Fuß lang. Ihr Schnabel ist an der Wurzel orangefarben; an der Stirn ist eine große Erhabenheit von der nämlichen Farbe; der Augenstern ist rothbraun; unter der Kehle ist ein weiter Beutel, sparsam mit Federn bedeckt, und von dunkler Farbe; um die Wurzel des Schnabels ein weißer Ring; die obern Theile des Gefieders sind hell graulichbraun, zuweilen die Federn mit einer noch hellern Farbe gerändert; längs dem Hinterhals herunter, bis an den Rücken, läuft ein schwarzer Saum (list); der Vorderhals und die Brust sind gelbbraun; der Bauch weiß; die Seiten über den Schenkeln graubraun und weiß; die Füße orangefarben^{r)}; die Klauen schwarz.

12. Var.

i) Latham Ind. orn. II. 837. n. 15. B.

k) Uebers. II. S. 530. A. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 706. Nr. 53. B.

l) Arct. Zool. — Pallas Trav. vol II. p. 325.

m) Latham Ind. orn. II. 837. n. 16. B.

n) Meine N. & Deutschl. III. S. 686. B.

o) Diese Figur, obgleich der Index darauf hinweist

set, scheint eher die Canadische Gans (Nr. 14) vorzustellen.

p) Uebers. II. S. 531. B. B.

q) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 703. Nr. 2. B.

r) Bey einigen sind der Schnabel, der Knopf an der Wurzel desselben, und die Füße schwarz.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

391

12. Var. A. *Anas cygnoides, orientalis*. L. I. 2. p. 502. No. 2. β . 5)
 L'Oie de Muscovie. BRISS. orn. VI. p. 277. No. 6.
 Muscovy Gander. ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 91. 92.

Sie ist kleiner als die letztere, und drey Fuß sechs Zoll lang. Ihr Schnabel ist orange-farben; der Augenstern gelb; an der Stirn ist ein großer Knopf, wie bey der letztern, von schwarzer Farbe, und unter der Kehle ein Fleischlappen (a wattle); Kopf und Hals sind braun, am dunkelsten am Hintertheile; der Rücken die Flügel und der Schwanz eben so, aber dunkler, und mit einer hellern Farbe gerändert; Schwungfedern, Brust und Bauch weiß.

Das Weibchen ist kleiner als das Männchen. Kopf, Hals und Brust sind rothgelb, am obern Theil heller; Rücken, Flügel und Schwanz mattbraun, mit hellen Rändern; der Bauch weiß; außerdem kommt es mit dem Männchen überein, der Knopf über dem Schnabel aber, ist kleiner 1).

Dies ist Brisson's Beschreibung, der obige Vogel für verschieden hält; neuere Beobachtungen aber belehren mich, daß sie alle zu Einer Art gehören, deren charakteristisches Kennzeichen der Knopf über dem Schnabel, und die schlappe Haut unter dem Kinn sind. Ich bin auch geneigt zu glauben, daß der Vogel oft variiert 2), mit schwarzem Schnabel, Knopf und Füßen, weil der größere Theil derer, die mir zu Gesicht gekommen sind, diese Farbe hatte.

Der zuerst beschriebene soll von der Guineischen Küste kommen, der letztere im Russischen Gebiete zu Hause seyn; und ich bin ganz gewiß versichert worden, daß diese Art am See Baikal, im östlichen Sibirien und in Kamtschatka 3) wild angetroffen, auch in den meisten Gegenden des Russischen Reichs zahm gehalten werde 4). Auch sind eben diese Vögel in China zu Hause, und gemein auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung 5). Unfre letzten Reisenden haben sie, oder eine ihr sehr ähnliche Art, auch auf Owhyhee angetroffen 6).

Ddd 2

In

5) Latham I. c. 7. B.

1) Var. C. *Anser cygnoides (spontaneus)* Pall
 1as Reise III. S. 700.

Sie hat mit der andern einerley Heymath und ist häufig. Der Schnabel ist schwarz, gegen die Stirn zu rüchlich, aufsteigend und zwey winklich, keine höckerige Erhabenheit bildend; an der Kehle kein Fleischlappen; die Füße scharlachroth; die Farbe wie an der vorhergehenden. Ind. orn. β . B.

2) Dies thut er in seinem zahmen Zustande, wo er so häufig gehalten wird, und hierher gehört auch Scopoli's Schwanengans (Uebers. I. S. 61. Nr. 67.) Diese hat an der Wurzel einen dicken, etwas getheilten Knoten, der schwarz ist; der Schnabel ist gelb, mit schwarzer Spitze und

oben und unten eben so gerändert; die Farbe ist weiß. B.

3) Arct Zool.

4) Decouw. Russ. vol. I. p. 466. — Sie sind häufig in Astrachan.

5) Dies ist ohne Zweifel die Art, deren Kolbe erwähnt, und die Cap-Gans genannt wird; er sagt, die Matrosen machten Tabackbeutel, und Geldbeutel aus der Haut, die unter der Kehle hänge, weil sie sehr tauglich zu diesem Endzweck sey, und zwey Pfund Taback halte. Hist. Cap. vol. II. p. 139.

6) Eine der Chinesischen ähnliche Gans, auf Karakacooah. Van, in Owhyhee, ist ganz zahm, und wird selbst Ma-va genannt. Ellis's Narrat. vol. II. p. 143.

In England sind sie ziemlich gemein, und vermischen sich gern mit der gemeinen Gans, und die Brut vermischt sich wieder eben so gern, und fährt so gut fort fruchtbar zu seyn, als wenn keine solche Vermischung vorgegangen wäre. Sie sind viel lauter, als die gemeine Gans, und machen bey dem geringsten Geräusch Lärm; eben so lassen sie auch, ohne gestört zu werden, ihr heissherres und unangenehmes Geschrey den ganzen Tag hindurch hören. Sie gehen sehr aufrecht, den Hals hoch empor tragend; und da sie eine Scheidelinie zwischen dem Schwanz und der Gans ausmachen, so hat man sie nicht mit Unrecht Schwangänse (Swan Coose) genannt.

13. Die schwarzrückige Gans. (Black backed G.)

Anas melanotos. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 503. No. 52. b) — Zool. Ind. p. 21. tab. 11.

L'Oie bronzé. BUFF. ois. IX. p. 77.

— de la Cote de Coromandel. Pl. enlum. 937.

Black-backed Goose. Ind. Zool. p. 12. pl. 11. c)

Sie hat die Größe einer gemeinen Gans, ist aber von schlankerm Wuchs, und zwey Fuß, neun Zoll lang. Ihr Schnabel ist blaß, groß, an der Spitze abwärts gebogen, in der Mitte, über den Nasenlöchern, etwas weiter vorwärts, ist ein großer, abgerundeter, fleischiger Auswuchs, oder Knopf, von einerley Farbe mit dem Schnabel; der Kopf, und der Hals zur Hälfte, sind weiß, und voll von schwarzen Punkten, oder kurzen Streifen; die Federn dieser Theile scheinen gleichsam gekräuselt, oder umgebogen zu seyn; der übrige Hals, und die untere Theile sind weiß, an den Seiten grau angelaufen; Rücken, Flügel und Schwanz schwarz, grün bronzirt, und gegen den Schwanz hin ins Blaue ziehend; die Füße dunkelbraun d).

Diese Art ist auf der Insel Ceylon sehr gemein, und auch an der Küste von Coromandel zu Hause. Buffon vermuthet, es sey dieß die Gans, die den Namen Rassangue führt, einen rothen Federbusch auf den Kopf hat, und sich in Madagaskar vorfindet e). Was die Farbe des Federbusches oder Knopfes betrifft, so kann dieß kein Einwurf seyn; denn es ist möglich, daß dieser Theil bey'm lebenden Vogel roth ist, und erst nach dem Tode blaß wird.

Das f) Männchen unterscheidet sich von dem Weibchen durch den Auswuchs an der Wurzel des Schnabels, die so hervorragend und abgerundet ist, als bey der Königs-Ente (Nr. 30); auch ist sie auf dem Rücken eben so platt gedrückt; bey'm Weibchen hingegen beträchtlich

b) Latham Ind. orn. II. 839. n. 18. B.

c) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 705. Nr. 52. B.

d) In der Indischen Zoologie steht folgende Beschreibung: Sie ist nicht völlig so groß als eine wilde Gans; der Schnabel ist schwarz, an der Wurzel mit einem gedruckten halbrunden gleichförmigen Höcker besetzt, welcher an alten

Gänsen ansehnlich groß ist; Kopf und Hals sind weiß mit kleinen schwarzen Flecken bestreut; Brust und Bauch rein weiß; der Rücken und Flügel schwarz, die Spitzen der Schwungfedern mit einem schönen Glanzspiegel; der Schwanz gekielt und schwarz. B.

e) Flacourt Madagasc. p. 165.

f) Zuj. a. d. Suppl. S. 272. 73.

träheltlich kleiner; der Glanz des Gefieders spielt beym Männchen auch mehr ins Grün- und Blauschillernde. Beyde Geschlechter haben einen langen und gefährlichen Sporn an der Schulter des Flügels, der sie, da sie starke Vögel sind, zu furchtbaren Feinden macht. Sie finden sich gegen Norden am Ganges, sind aber nicht sehr gemein. Man kennt sie unter dem Namen Nuckdah. — Von Herrn Middleton mitgetheilt.

14. Die Canadische Gans. (Canada G.)

Anas canadensis. LIN. I. p. 198. No. 14. Ed. XIII. I. 2. p. 514. No. 14. g) — Phil. Trans. vol. LXII. p. 412.

L'Oie sauvage de Canada. BRISS. orn. VI. p. 272. No. 4. pl. 26. — Pl. enlum. 346.

L'Oie à cravate. BUFF. ois. IX. p. 82.

Canada Goose. RAI Syn. p. 139 No. 10. p. 191. No. 9. — WILL. orn. p. 361. pl. 70. h) — CATESBY Carol. vol. I. pl. 92. i) — SLOANE Jam. vol. II. p. 323. No. 6. — EDW. Nat. Hist. pl. 151. k) — Arct. Zool. No. 471. l).

Br. Mus. Lev. Mus. m)

Diese ist größer, als eine zahme Gans, mißt drey Fuß, sechs Zoll in der Länge, und wiegt neun Pfund. Ihr Schnabel ist dritthalb Zoll lang, und schwarz; der Augenfleck rufbraun; Kopf und Hals schwarz; unter der Kehle ist ein breites, weißes Band, wie ein Halbmond, dessen Hörner an beyden Seiten aufwärts nach dem Hinterkopfe hinsteigen; die Brust, der obere Theil des Bauches, der Rücken und die Deckfedern der Flügel sind dunkelbraun; der untere Theil des Halses und des Bauches, der After und die obern Deckfedern des Schwanzes weiß; Schwungfedern und Schwanz schwarz; die Füße dunkel bleifarben.

Sie ist in Nordamerika zu Hause. Den Sommer über findet sie sich in Hudsons-Bay und den jenseits gelegenen Gegenden ein, auch in Grönland²⁾; und in mehreren Ländern Nordamerikas, bis nach Carolina. Ein Theil brütet auf Hudsons-Bay, und legt sechs bis sieben Eyer; der größere Theil aber zieht sich weiter nordwärts zurück. Ihre erste Erscheinung in Hudsons-Bay ist von der Mitte des Aprils, bis zur Mitte des Males³⁾, wo die Einwohner ihnen mit großer Erwartung entgegen sehen, weil sie einen ihrer vornehmsten Nahrungszweige ausmachen; denn manches Jahr werden ihrer drey bis vier Tausende getödet, eingesalzen und in Fässer gepackt. Die Indianer, und oft auch die Bedienten der Engländer, errichten eine Reihe von Hütten, aus Zweigen geflochten, einen Büchsenchuß weit auseinander, über die Plätze, wo sie vorbeiziehen müssen; und so wie der Zug vorüberfliegt, ahmen sie ihr Geschrey so gut nach, daß sie die Gänse in ihrem Flug aufhalten; jezt feuert jeder, mit

Dod 3

zwey

g) Latham Ind. orn. II. p. 838. n. 17. B.

h) Wo sie tirtgerweise Schwangers (Swan-Goose) h. ist.

i) Seitzmanns Vögel IV. Taf. 84. B.

k) Seitzmanns Vögel V. Taf. 46. B.

l) Uebers. II. S. 505. Nr. 388. B.

m) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 735. Nr. 14. B.

n) Faun. Groenl.

o) Die Indianer nennen den Monat, in dem die Gänse ankomen, den Gänsemonat.

zwey Flinten versehen einmal, und unmittelbar darauf zum zweytenmal; auf diese Art hat ein guter Schütz oft in einem Tage ihrer zweyhundert erlegt. Bey dieser Jagd muß man sich sehr sorgfältig verstecken, denn die Vögel sind sehr scheu, und fliegen bey der geringsten Bewegung geradenweges davon ^{p)}. Auf ihrem Rückzug nach Süden, welcher von der Mitte des Augusts bis zur Mitte des Octobers statt findet, wird auch eine große Niederlage unter ihnen angerichtet; diese werden aber frisch, für den Wintervorrath aufbewahrt, indem sie, sammt den Federn und Allem, in eine große Grube in der Erde gelegt, und mit Mist bedeckt werden; auf diese Art bleiben sie, die ganze anhaltende kalte Witterung hindurch, frisch und gut. Die Indianer auf Hudsons-Bay nennen sie Opistifisch ^{q)}.

Diese Art ist jetzt, im zahmen Zustande, sehr gemein, sowohl auf dem festen Lande, als in England; am großen Canal, bey Versailles, sieht man sie zu hunderten, wo sie sich mit der größten Treuherzigkeit unter die Schwäne mischen; das nämliche ist auch zu Chantilly der Fall. Auch in England hält man sie für eine große Zierde auf dem Wasser bey vielen Landgütern, wo sie sehr zutraulich sind, und gern brüten. Das Fleisch der jungen Vögel wird für schmackhaft gehalten, und die Federn, den andern Gänsefedern gleich geschätzt, so daß sie ein Handelsartikel geworden sind, und den Gegenden wo sie zahlreich sind, großen Vortheil bringen.

15. Die spornflügelige Gans. (Spur-winged G.)

(S. die hundert und neunte Kupf. tafel.)

Anas gambensis. LIN 1 p. 195 3. Ed. XIII. 1. 2 p. 503. No. 3. ^{r)}

L'Oie de Gambie. BRISS. orn. VI p. 283. No. 8.

— armée. BUFF. ois. IX. p. 76?

Gambo Goose. RAN Syn. p. 138. No. 9. — WILL. orn. p. 360. ^{s)}

Lev. Mus.

Sie hat die Größe der gemeinen Gans, ist aber höher von Beinen. Ihr Schnabel ist über zwey Zoll lang roth, und an seiner Wurzel eine rothe Erhabenheit; Wangen und Kinn sind weiß; der Hals, die Seiten der Brust, der Rücken, der Steiß und der Schwanz schwarz, am Rücken ins Purpurfarbene spielend; die Mitte der Brust und alle untern Theile weiß; die äußern Deckfedern der Flügel, der Flügelbug und der innere Rand derselben, eben so; das Uebrige der Flügel aber schwarz; am Flügelbug ein starker, scharfer, anderthalb Zoll langer, hornfarbener Sporn; die Füße roth.

Sie ist in Gambia und andern Gegenden von Afrika zu Hause. In Senegal heißt sie Hitt ^{t)}.

Wüs-

p) Arct. Zool.

q) Die Franzosen nannten diese Gänse, so lange sie im Besitz von Canada waren, Outarde oder Trappe; dieser Name ist aber neuerlich einer, die auf den Falklands-Inseln

angetroffen wurde, gegeben worden. (S. Nr. 5.)

r) Latham Ind. orn. II. 839 n. 19. B.

s) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 705. Nr. 3. B.

t) Hist. des Ois.

Tab. 109.



Die Spornflügelige Gans ~



Büffon's Beschreibung dieses Vogels (wenn er nämlich den oben beschriebenen meynet) ist in einer sehr dunklen und unverständlichen Sprache abgefaßt. Ray's und Willughby's einfache Beschreibung, zeigt, daß sie die Einzigen sind, die sich eine richtige Vorstellung von dem Vogel gemacht haben; denn wenn man den Text in der Büffonschen Naturgeschichte der Vögel, mit den Platten in Planches enluminées *) vergleicht, so sieht man offenbar, daß sie bloß die Aegyptische Gans (Nr. 16) in verschiedenen Stufen ihres Alters, vorstellen. Ich gestehe daher, daß ich meine bessere Kenntniß dieses Vogels, einzig und allein einem Exemplar im Leverschen Museum verdanke, von dem meine Abbildung copirt ist; und vielleicht ist es nach meinen und meiner Freunde Beobachtungen das Einzige, das sich in unsern Cabinetten findet.

16. Die Aegyptische Gans. (Egyptian G.)

- Anas aegyptiaca. LIN. I. p. 197. 10. Ed. XIII. I. 2. p. 512. No. 10. *)
 L'Oie d'Egypt. BRISS. orn. VI. p. 284. No. 9 pl. 27. — BUFF. ois. IX. p. 79.
 pl. 4. — Pl. enlum. 379. 982. 83.
 Gambo Goose. WILL. orn. pl. 71. γ)
 The Ganser. ALBIN. Nat. Hist. vol. II. pl. 93. z)
 Lev. Mus.

Sie hat die Größe der gemeinen Gans, und ist zwey Fuß, drey Zoll lang. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang, und roth, die Nasenlöcher dunkelbraun, die Spitze schwarz; der Augenstern gelblichweiß; die Augenlider röthlich; an beyden Seiten des Kopfs ist ein großer, gelbroth-kastanienbrauner Fleck, in dessen Mitte die Augen liegen; der Scheitel und der übrige Kopf, nebst der Kehle, sind größtentheils weiß, letztere ein wenig kastanienbraun gefleckt; der Hals, ohngefähr zwey Dritttheile seiner Länge, hell kastanienbraun, das am untern Theile viel dunkler wird; der Oberücken und die Schulterfedern bräunlichroth, mit zahlreichen, schwärzlichen Strichen durchzogen; Rücken und Steiß schwarz, der untere und vordere Theil des Halses, die Brust, die Seiten und die Schenkel sehr hell gelbroth mit zahlreichen, schwärzlichen Strichen durchzogen; an der Brust ist ein großer, dunkel kastanienbrauner Fleck; der Bauch ist weiß; die untern Deckfedern des Schwanzes sind gelblichweiß; die Deckfedern der Flügel weiß; die größern, zunächst am Körper stehenden an den Enden schwarz durchzogen und die am weitesten vom Körper abstehenden, schwarz; die großen Schwungfedern schwarz, und, die fünf ersten ausgenommen, goldgrün gerändert; die kürzern kastanienbraun gerändert, am Flügelbug ist ein stumpfer, einen halben Zoll langer Sporn; der Schwanz wie die großen Schwungfedern; die Füße roth; die Klauen dunkelbraun.

Das

*) Pl. enlum. 982. 83. — Willughby's Figur stimmt auch keineswegs mit seiner Beschreibung des Vogels überein, s. Orn. pl. 71. worauf er sich bezieht.

z) Latham Ind. orn. II. p. 840 n. 21. B.

γ) Dieß ist offenbar die Aegyptische Gans, wie

wohl der Index auf die spornflügelige verweist, bey dieser sind aber die Knöpfe nicht halb so lang, als bey jener, und auch nicht scharf an den Spitzen.

z) Schweitsche Abh. XLI S. 24. — Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 728. Nr. 10. B

Das Weibchen weicht folgendermaßen ab: Der kastanienbraune Fleck um die Augen herum ist kleiner; das Kinn weiß; der kastanienbraune Fleck an der Brust ebenfalls kleiner, wenn er nicht ganz fehlt; die kleinern Deckfedern der Flügel weiß, die andern hellaschfarben mit schwärzlichen Rändern, die untere Reihe weiß eingefast, und dieß bildet einen Streifen an den Füßeln; die Schulterfedern und die kürzern Schwungfedern spielen stark ins Kastanienbraune; außerdem gleicht es dem Männchen.

Diese Art ist in Aegypten zu Hause so wie in andern Gegenden Afrikas, und ziemlich gemein am Vorgebürge der guten Hoffnung; woher eine nach England gebracht worden ist; und noch jetzt ist sie nicht selten in den Teichen der Gutsbesitzer, in vielen Gegenden dieses Königreiches, da es ein ansehnlicher und schöner Vogel ist.

16. Var. A. *Anas aegyptiaca*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 512. No. 10. β. a)
L'Oie sauvage du Cap de b. Esp. SONN Voy. Ind. vol. II. p. 220.

Diese hat die Größe der vorigen, von der sie eine Spielart zu seyn scheint. Ihr Schnabel ist graulich, an der Spitze schwarz angelassen; der Augenstern gelb; Kopf, Hals, Bauch und After grau; das Auge mit einer kahlen, kastanienbraunen Haut eingefast; an der Brust ein großer, schwarzer Fleck; Rücken, Flügel und Stelß kastanienbraun; am Flügelrand einige weiße Federn; der Schwanz schwarz; die Füße roth.

17. Die Rothhalsgans. (die rothbrüstige Gans: Red-breasted G.)

- Anas ruficollis*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 511 No. 67. b)
Anser ruficollis. PALLAS Spicil. VI. p. 21. tab. 4. c)
Red-breasted Goose. Arct. Zool p. 571. c. d)
Lev. Mus.

Sie hat die Größe der Canadischen Gans (Nr. 14), ist ein und zwanzig Zoll lang, drey Fuß, zehn Zoll breit, und wiegt drey Apothekerpfunde. Ihr Schnabel ist klein und braun, der Nagel schwarz; der Augenstern gelbbraun, die Augenkreise braun eingefast; der vordere Theil des Kopfs und der Scheitel schwarz, und dieß läuft nach hinten in einem schmalen Streifen bis zum Rücken hin; Stirn und Wangen sind weiß gesprenkelt; zwischen dem Schnabel und den Augen ist ein großer, eyrunder, weißer Fleck, der durch einen schwarzen Strich von dem Weißen an der Stirn getrennt ist; Kinn und Kehle sind schwarz; hinter den Augen ist die Farbe weiß, das an beyden Seiten des Halses herabläuft, und sich in eine Spitze endigt; die Mitte dieser weißen Stelle ist gelbroth; das übrige des Halses dunkelgelbroth; an der Brust ist ein schmales Band von weißen Federn mit schwarzen Enden, die ein weißes und zugleich

- a) Latham I. c. β. B.
b) Latham Ind. orn. II. 841. n. 23. B.
c) Dessen N. G. merkiv. Thiere. VI. S. 24.
Taf. 4. B.

- d) Uebers. II. S. 532. C. — Pallas Reise II. S. 476. Auch S. 12. Nr. 3. Dessen nordische Beytr. III. S. 21. Kriech Suppl. p. 157. die Mopsgans. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 727. Nr. 67. B.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

397

zugleich auch ein schwarzes Band bilden; der Bauch ist weiß; die Seiten sind schwarz gestreift; Rücken und Flügel schwarz, die letztern mit dem Schwanz von gleicher Länge; die größten Deckfedern der Flügel haben graue Spitzen; die obern und untern Deckfedern des Schwanzes sind weiß; die Füße schwarz.

Dies ist eine ungemein schöne Art, die in den nördlichen Gegenden Rußlands, vom Ob bis an die Lena, brütet, und im Herbst nach Süden zurückkehrt. Sie besucht auch das Caspische Meer, von wo aus sie sich, so wie der Sommer eintritt, in kleinen Flügen nach Norden zurückzieht^{c)}. Den Winter bringt sie vermutlich in Persien zu^{f)}. Eine Gans dieser Art wurde zu Anfang der strengen Kälte 1766 bey London geschossen; eine andere, ohngefähr um eben diese Zeit, in Yorkshire, bey Wycliffe, lebendig gefangen; diese wurde bald sehr zahm und zutraulich, und unter andern Enten in einem Teich gehalten; ob sie sich aber gleich freywillig mit dieser vermischte, und besonders für Eine derselben eine Vorliebe zu haben schien, so brachte sie doch keine Jungen hervor. Diese Nachricht erhielt ich von Herrn Tunstall, in dessen Nachbarschaft sie gefangen wurde, und in dessen Cabinet die erstere in guter Verwahrung ist; die letztere lebte bis auf gegenwärtiges Jahr (1786) wo sie durch einen Zufall ihr Leben verlor. Herr Tunstall erwähnt auch noch einer dritten, die in unserm Königreiche geschossen worden. — Diese Art wird sehr auf der Tafel geschätzt, weil sie ganz von allem Fischgeschmack frey ist^{e)}.

18. Die rothe Gans. (Ruddy G.)

Anas Casarca. LIX. III. append. p. 224. Ed. XIII. I. 2. p. 511. No. 46. b)

Anas rutila. Nov. Comment. Acad. Petrop. vol. XIV. p. 579. No. 4. tab. 22.

fig. 1. — GEORGI Reise p. 167.

Collared Duck. Gentlem. Magaz. vol. XLIII. p. 161. pl. ibid. ? i)

Sie ist größer, als die wilde Ente^{e)} und kommt fast der Bisamente (Nr. 31) bey; obschon sie auch größer zu seyn scheint, als sie wirklich ist, wegen der Länge ihrer Flügel, und hohen Beine. Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern gelblichbraun; die Augenlieder, und Augenkreise schwärzlich; Scheitel und Nacken weiß; Stirn, Wangen und Kehle gelblich; der Vorderhals rostfarben mit einem schwarzen Halsbände eingefasst, und an der Kehle ins dunkel gelbrothe spielend; Brust und Seiten hell gelbroth; der Bauch dunkel (obscure); der After dunkel gelbroth; der Anfang des Rückens blaß; der Unterrücken wellenförmig schimmelgrau und braun, nicht sehr deutlich; Steiß und Schwanz grünlichschwarz, letzterer abgerundet; die großen Schwungfedern schwarz, die kürzern violettgrün gerändert, und einige der Innern rostig-
roth

e) Decouv. Russ. vol. II. p. 19.

f) Man trifft sie dann auch in Deutschland an. B.

g) Arct. Zool.

h) Latham Ind. orn. II. p. 341. n. 24. B.

i) Pallas nordische Beytr. III. S. 12. IV. S.

9. Georgi Reise durch Rußland II. S. 482.

Lichtenbergs Magazin II. 1. S. 107.

Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 728. Nr.

46. B.

k) Mallard f. No. 43. A. Boschas L.

roth, die Deckfedern der Flügel der zweyten Reihe, und die ganze Wurzel (base) der Flügel, weiß; die Füße lang und schwarz.

Das Weibchen unterscheidet sich hauptsächlich durch den Mangel des schwarzen Halsbandes.

Diese Gans kommt der Egyptischen (Nr. 16) sehr nahe, ist aber eine wirklich' verschiedene Art, und findet sich in allen südlichen Gegenden Rußlands und Sibiriens in Menge. Selten sieht man sie weiter, als 55 Grad nördlich; immer aber in der größten Menge mehr gegen Süden. Im Winter zieht sie nach Indien, und kommt im Frühjahr wieder zurück ¹⁾. Ihr Nest macht sie an die steinigten Ufer der Wolga und anderer Flüsse, oder in die verlassenen Höhlen der Marmelthiere, nach Art der Brandgans ^{m)}, so wie sie auch, gleich diesem Vögel, Höhlen für sich selbst graben soll. Man weiß auch, daß sie ihre Eyer in einem hohlen Baum gelegt, und das Nest mit ihren eigenen Federn ausgefüttert hat. Sie lebt in Monogamie, und Männchen und Weibchen sitzen wechselseitig über den Eiern. Ihre Eyer gleichen denen der gemeinen Ente. Wenn die Jungen ausgekrochen sind, so trägt sie oft die Mutter mit dem Schnabel vom Heckplatze ins Wasser. Man hat versucht, sie zu Hausvögeln zu machen, indem man die Jungen unter zahmen Enten aufzog, aber ohne Erfolg; denn sie bleiben beständig wild, und suchen bey der ersten Gelegenheit zu entfliehen; und wenn die Alten eingefangen und eingesperrt werden, so legen sie ihre Eyer zerstreut, und bebrüten sie nicht ⁿ⁾. Ihre Stimme, wenn sie fliegen, ist dem Ton einer Clarinette nicht unähnlich; außerdem schreyen sie wie die Pfauen, besonders wenn man sie zahm hält; ja zuweilen glücken sie wie eine Henne. Sie sind sehr an ihren Gatten gewöhnt; denn wenn das Männchen getödet worden, so verläßt das Weibchen den Jäger nicht eher, als bis man ihn zwey, oder drey mal geschossen hat. Ihr Fleisch wird für eine sehr gute Speise gehalten.

Sie ^{o)} soll in der Krimmischen Tatarey gemein seyn. Baron von Tott bemerkt, in seinen Memoiren, unter verschiedenen Arten von Wasservögeln, die in Menge in der Krimm zu Hause sind, sey die merkwürdigste eine Art wilder Gänse, mit längern Beinen, als unsre, und einem Gefieder von lebhaften ziegelroth. Die Tatarer behaupten, ihr Fleisch sey äußerst gefährlich; „ich versuchte es, sagt er, „und fand es weiter nichts, als sehr unschmackhaft.“

19. Die grauköpfige Gans. (Grey-headed G.)

Anas cana. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 510. No. 66. p)

L'Oie sauvage à tete grise de la Cote de Coromandel. SONN. Voy. Ind. vol. II. p. 220?

Grey-headed Duck. BROUIN's illustr. pl. 41. 42.
Lev. Mus.

Kleiner

1) Decouv. Russ. vol. I. p. 417. — Man sieht sie immer paarweis. ibid. p. 464.

m) Sheldrake. f. No. 51. A. Tadorna L.

n) Decouv. Russ. I. c.

o) Zus. a. d. Suppl. S. 273.

p) Latham Ind. orn. II. 840. n. 22. B.

Kleiner als die Brentgans ⁷⁾. Ihr Schnabel ist schwärzlich; Kopf und Hals hellgrau; die Wangen weiß; Brust, Bauch und Rücken lebhaft rothfarben mit dunklern halbirkelförmigen Strichen bezeichnet; die Deckfedern der Flügel weiß; die kürzern Schwungfedern grün; die großen schwarz; der After orangefarben, mit einem schwarzen Band durchzogen; Schwanz und Füße schwarz.

Das Weibchen unterscheidet sich dadurch, daß es nichts weißes an den Wangen hat, und sein Gefieder überhaupt minder lebhaft ist. Eine dieser Art, im Leverschen Museum, hat durchaus einen dunkelashgrauen Kopf und Hals; auch giebt es noch zwey andre dort, bey keiner von beyden ist aber der rothfarbene Theil des Gefieders gestreift.

Sie ist auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung zu Hause, und (wenn sie eine und eben dieselbe mit der von Sonnerat beschriebenen ist), so wird sie auch an der Küste von Comorandel angetroffen ⁷⁾. Unter Herrn Jos. Banks Gemälden finde ich eine dieser ähnliche, wenn sie nicht die nämliche ist. Ihre Länge ist ohngefähr zwanzig Zoll; sie ist auf den Gebürgen des Caps zu Hause, und wird von den Holländern, Bergente genannt. — Obige Art scheint sehr nahe mit der vorigen verwandt zu seyn.

An ⁷⁷⁾ dem Exemplar im Leverschen Museum kann man, etwas unter dem Flügelbug, einen stumpfen Knopf bemerken.

20. Die Berggans. (Mountain G.)

Anas motana. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 510. No. 65. 5)

Hill- or Mountain Goose. KOLB. Cap. vol. II. p. 139. 2)

Sie ist größer als die zahme Gans. Die Flügsel Federn und die des Kopfs sind lebhaft rothschillernd grün.

Sie ist auf dem Vorgebürg der guten Hoffnung zu Hause, wo sie sich meistens auf den Hügeln aufhält, und von Gras und Kräutern lebt.

21. Die gemeine Gans.

A. Die wilde Gans. (Grey-lag G.)

Anas Anser ferus. LIN. I. p. 197. 9. Ed. XIII. I. 2. p. 510. No. 9. 2) —

Faun. Suec. No. 214. — BRÜNN. orn. No. 55. — MÜLLER Zool. No. 112.

Ecc 2

— KRAM

7) Brent G. f. No. 27. A. Bernicla. L.

77) Zus. a. d. Suppl. S. 273.

7) Er nennt sie ausdrücklich die grauköpfige Gans, wiewohl er sagt, der Kopf und die obere Theile seyen dunkel schmutzig gelbroth; Brust und Bauch eben so, aber heller; ein Theil der Flügel weiß; die Schwungfedern zur Hälfte ihrer Länge selbstgrün, das Uebrige schwarz.

5) Latham Ind. orn II. 841. n. 25. B.

2) Kolbe's Vorgeb. d. g. h. Ed. 4to S. 388. Nr. 5. B.

2) Anas Anser. Latham Ind. orn. II. p. 841. n. 26. B.

Neunte Ordnung. Schwimmvögel.

- KRAM. elench. p. 338. No. 4. α. — FRISCH av. tab. 155. — GEORGE Reise p. 166.
 L'Oie sauvage BRISS. orn. VI. p. 265. No. 2. — BUFF. ois. IX. p. 30. pl. 2.
 — Pl. enlum. 985.
 Wild Goose. RAU Syn. p. 136. A. 4. — WILL. orn. p. 358. No. 2. pl. 69.
 — ALBIN Nat Hist. vol. I. pl. 90.
 Grey-Lag-Goose. RAU Syn. p. 138. A. 3. — Br. Zool. II. No. 266. —
 Arct. Zool. No. 473. pl. 90. x)
 Lev. Mus.

Die wilde Gans (Grey-Lag) wiegt zehn Pfund; ihre Länge ist zehn Fuß, neun Zoll; ihre Breite fünf Fuß. Der Schnabel ist groß und erhaben, gelblichfleischfarben, mit einem weißen Nagel; Kopf und Hals sind aschgrau, mit schmutziggelb melirt; der Hals abwärts gestreift; der Rücken und die großen Schwungfedern dunkelbraun, letztere mit schwarzen Spitzen; die Schäfte weiß; die kürzern Schwungfedern schwarz, mit weißen Rändern; die kleinern Deckfedern dunkelbraun, mit weißen Rändern; Brust und Bauch weißlich, mit aschgrauem Gemölke; Steiß und After weiß; die mittlern Schwanzfedern dunkelbraun, mit weißen Spitzen und Rändern, die äußerste fast ganz weiß; die Füße fleischfarben; die Klauen schwarz y).

Diese Art ist in den Sümpfen (fens) von England zu Hause, und wandert, wie man glaubt, nicht, wie in vielen Gegenden des festen Landes, weil man sie nicht nur auch im Sommer antrifft, sondern man weiß, daß sie in Lincolnshire, Cambridgeshire und anderswärts, brütet. Sie hat sieben bis acht Junge, die oft gefangen werden, und leicht zu zähmen sind. Inzwischen versammeln sich diese Gänse doch zur Winterszeit in Flüge, weil man ihrer eine Menge beisammen antrifft. Auf dem festen Lande sind sie Zugvögel, und verändern ihren Wohnort in großen Flügen, oft zu fünf hundert und darüber. In diesem Falle ist der Flug dreieckig, vorn mit einer Spitze. Da nun die vorderste Gans zuerst müde wird, so sieht man, wie sie hinten hineinwischen, und eine andere an ihre Stelle tritt. Inzwischen hat man sie auch, in sehr kleinen Flügen, zuweilen Eine auf die Andere in einer geraden Linie folgen sehen.

Die Gänse scheinen allgemeine Bewohner der Erde zu seyn z); man trifft sie in Island an, und auf dem festen Lande, von Lapland bis ans Vorgebürge der guten Hoffnung y). Sie sind häufig in Arabien b), Persien und China, so wie sie auch in Japan einheimisch sind

x) Uebers. II. S. 507. Nr. 391. Meine N. S. Deutschl. II. S. 586. a. Cetti N. S. v. Sardinien II. S. 333. S. S. Smeltin Reise durch Rußl. I. S. 68. Pallas Reise II. S. 325. III. S. 61 616. Stellers Kamtschatka S. 187. 190. Georgi Rußland S. 482. Carroirs Reise durch Nordamerika S. 383. Pontoppidans N. S. Danemarks S. 167. Nr. 42. von Norweg. II. S. 139. Meine Naturgeschichte schädlicher Thiere S. 118. Nr. 1. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 718. Nr. 9. a. B.

y) Arct. Zool.

z) In Thärlingen findet man sie im Winter auf der grünen Saat in unzähligen Schaaren, die Wachten ausgestellt haben. Sie kommen oft schon in der ersten Hälfte des Septembers bey uns an, und bleiben bis zum März. Im September fallen sie auf die Haferstoppeln und fressen sich da satt. B.

a) Kolbe.

b) Forskal, descr. animal. p. 3. No. 6. wo sie Uás araki heißt.

sind ^{a)}; und auf dem festen Lande von Amerika, von der Hudsons-Bay bis nach Südcarolina ^{d)}. Unsere Reisenden haben sie auch in der Magellanischen Straße ^{e)}, Fort Egmont, auf den Falklands-Inseln ^{f)} und im Feuerland ^{g)} angetroffen. Auch in Neuhoolland, aber nicht in Neuseeland, denn ich finde, daß Captain Cook den Einwohnern daselbst ein Präsent mit einem Paar machte, damit es dort brüten sollte.

Ich glaube, es ist dieß die Art, die auf Hudsons-Bay, Wistuhay Nesscock, oder graue Gans, heißt; und ohngefähr neun Pfund wiegt. Sie brütet auf den Ebenen, längs der Küste; mausert sich im Julius, und wird von den Einwohnern todtgeschlagen, weil sie um diese Zeit nicht fliegen kann; wiewohl auch einige am Leben gelassen und mit Korn gefüttert werden. Im September zieht sie nach Süden ^{h)}.

B. Die zahme Gans. (Tame G)

Anas Anser. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 510. No. 9. β . ⁱ⁾

Anas domesticus. LIN. Syst. Nat. ed. XII. tom. I. P. I. p. 197. No. 9. β . —

Faun. Suec No. 114 β . — SCOP. ann. I. No. 69 ^{k)} — KRAM. elench. p. 338. No. 4. β . — FRISCH av. tab. 157. — BRÜNN. orn. No. 55.

L'Oie domestique. BRISS. orn. VI. p. 262 No. 1.

Tame Goose. RAI Syn. p. 136. A. 3. — WILL. orn. p. 358. No. 1. pl. 75. ^{l)}
Lev. Mus.

Dieß ist die wilde Gans im zahmen Zustande; von der sie zwar im Colorit abweicht, aber ungleich weniger, als die Ente oder der Hahn, da sie sters mehr oder weniger ins Graue spielt; wiewohl in allen Fällen die Weiße des Afters und der obern Deckfedern des Schwanzes kenntlich bleibt; oft findet sie sich ganz weiß, besonders die Männchen, und es ist der Zweifel entstanden, welche Farbe, in Rücksicht des bessern Fleisches, den Vorzug habe.

Die zahmen Gänse sieht man nirgends in so großer Menge, als in den Morästen von Lincolnshire, wo viele Leute nicht unter Tausende Brut-Gänse halten. Der Gebrauch der Kiele (quills) und Federn ist durch ganz Europa zu sehr bekannt ^{m)}, als daß einer be-
See 5 son-

c) Kämpfer.

d) Kalm Trav.

e) Hawkesw. Voy. vol. II. p. 31.

f) Hawkesw. I. c. p. 65.

g) Cook's Voy vol. IV. p. 43.

h) Es ist wahrscheinlich die Art, von der Kalm erzählt, daß die Amerikaner sie zahm machen, indem sie den Zeitpunkt abwarten, wo sie sie in den Flügel schließen können. Diese Gänse werden oft noch alt zahm, und sind zwölf Jahre lang gehalten worden; sie machen sich aber mit den zahmen nicht gemein; auch legen sie keine Eier Trav. vol. I. p. 209.

i) Latham I. c. β . B.

k) Ueberf. v. Gänther I. S. 62. Nr. 69. B.

l) Meine N. G. Deutschlands. II. S. 596. b. Cetti N. G. von Sardinien. II. S. 330 Georgi Reise d. Rußland S. 482. Kner Ceyl. S. 57. Kolbe Vorgeb. d. g. H. Ed. 4to S. 387. Fermín Besch. v. Surinam II. S. 138. Donndorfs Zool. Desir. II. S. 722. β . B.

m) In den an die Levante gränzenden Ländern, und durch ganz Asien, ist der Gebrauch der Gänsefedern gänzlich unbekannt; wir finden die Marragen, statt derselben, mit Wolle, Kaschelhaaren oder Baumwolle ausgestopft. Inzwischen erwähnt Plinius Federpolster, zum Ausruhen des Kopfs, die zu seiner Zeit Mode waren; ob sie aber auch jetzt noch hierzuhin verwandt werden, ist ungewiß.

sonders erwähnt werden müßte; deshalb werden diese Vögel schon bey Lebzeiten gerupft, der Kiele wegen Einmal, und der übrigen Federn wegen, nicht weniger als fünfmal des Jahrs; das erste Rupfen sowohl der Kiele, als der Federn geschieht um Mariä Verkündigung, die andern viermahle zwischen diesem Tag, und Michaelis bloß der Federn wegen; überhaupt haben diese Vögel nicht viel dabey zu leiden, wenn nicht kalte Witterung einfällt, wo ihrer dann viele nacheinander dahin sterben. Die Besitzer derselben, behandeln sie übrigens, die scheinbar grausame Gewohnheit sie zu rupfen ausgenommen, ziemlich gut, und beherbergen sie in Einem Zimmer mit sich selbst. Während der Brutzeit hat jeder Vogel seinen angewiesenen Raum, in Reihen von Weidenkörben (wicker-pens), deren Einer über dem Andern steht; und man sagt, die Person, die auf sie acht giebt, und Gänsehirt genannt wird), treibe die ganze Heerde des Tags zweymal ins Wasser, bringe sie dann wieder in ihr Quartier zurück, und stelle jeden Vogel in sein ihm gehöriges Nest, ohne einen Einzigen zu verlieren *).

Es ist kaum glaublich, welche Menge von Gänsen, aus den entfernten Provinzen nach London zu Markte gebracht wird; oft zwey bis drey Tausend in Einemtrieb *). Der gewöhnliche Preis der Gänse, in Wiltshire, richtet sich nach dem Preis des Schöpfensfleisches, indem beyde, ohne die Federn gleichviel kosten. Das gewöhnliche Gewicht einer pub-schen Gans ist funfzehn oder sechzehn Pfund; es ist aber kaum glaublich, wie sehr dieses vermehrt wird, wenn man sie mit Bohnenmehl und andern mästenden Dingen, fett macht. Die hierzu bestimmten Schlachtopfer werden von Einigen mit den Schwimmhäuten der Füße an den Boden angenagelt, das keine Schmerzen macht, und auch die geringste Möglichkeit einer Bewegung hindert; dazu setzen noch die Franzosen, wie man mir gesagt hat, das Augen auszustechen *); zu welchem Ende aber diese Grausamkeit dienen soll, ist schwer zu erröthen. Welches Gewicht sie in Frankreich bekommen, wird nicht gesagt; ich weiß aber ganz gewiß, daß ein Gewicht von 28 ja 30 Pfunden in England nichts Seltenes ist *).

Die Gans brütet gewöhnlich Einmal des Jahrs, doch legt sie auch oft zweymal, wenn sie gut gehalten wird *). Die Zeit des Bebrütens dauert ohngefähr 30 Tage. Sie legen auch so viele Eyer, als zu einer dreyfachen Brut hinreichend sind, wenn man sie ihnen nach und nach wegnimmt. Sie soll sehr lang leben, denn wir haben autorisirte Nachrichten, daß sie ein Alter von nicht weniger, als hundert Jahren erreicht hat *).

Mein

*) C. Tour in Scotland 8vo. p. 8. — Br. Zool. II. p. 572.

o) Ein Erieb von mehr als 5000 Gänse u zog durch Ehelmsford, auf dem Weg nach London, aus Suffolk S. St. James Chronicle 2. Sq. l. 1783.

p) In Frankreich werden sie mit einer Art von Fett der aus fettmachenden Dingen besteht, gemälet, und ihnen auch die Augen ausgestochen; wodurch sie in Zeit von 14 Tagen oder 3 Wo-

chen fett, und sehr schmackhaft werden. Salerne Orn. p. 407.

q) In Deutschland macht man gewöhnlich Mädeln von Gerstenschrot und stopft sie ihnen ein; davon werden sie außerordentlich fett; schmackhafter und gesünder aber von gelben Möhren und Hofer. B.

r) Sonst weiß ich es nicht, als wenn man ihr die ersten Eyer nimmt und verbraucht. B.

s) Willughby. Hist. des Ois. u. s. w.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

403

Mein *) Freund, Herr Jones, sagt mir, die Gänse machten auf ihrer Reise aus den entfernten Provinzen nach London, acht bis zehn Meilen in Einem Tag, indem sie von drey Uhr des Morgens, bis neun Uhr Abends marschiren; und wenn zuweilen Eine von den schwächern zu sehr dabey ermüdet; so wird sie dann mit Hafer, statt Gerste, dem gewöhnlichen Futter auf der Reise, gefüttert.

22. Die Bläffen-Gans. (White-fronted G.)

- Anas albifrons. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 509. No. 64. ^{u)}
 Anas erythropus. Faun. Suec. No. 116. (das Weibchen ^{x)}). BRÜNN. orn. No. 53. 54.
 — MÜLLER Zool. No. 113. — KRAM. elench. p. 339. No. 6. — GEORGI
 Reise p. 166.
 L'Oie sauvage du Nord. BRISS. orn. VI. p. 269. No. 3.
 L'Oie rieuse. BUFF. ois. IX. p. 81.
 Laughing Goose. EDW. Nat. Hist. pl. 153. ^{z)}
 White-fronted Goose. BR. Zool. II. No. 268. pl. 94. fig. 1. (der Kopf). — ARCT.
 Zool. No. 476. ^{a)}
 Lev. Mus.

Sie hat die Größe der wilden Gans (Nr. 21), ist zwey Fuß, vier Zoll lang, und wiegt fünf Pfund. Ihr Schnabel ist gelblichroth, an der Wurzel erhaben, der Nagel an der Spitze weiß; die Stirn und die Wurzel des Schnabels rings herum weiß; der Kopf, der Hals und die obern Theile mehrentheils dunkelbraun, mit einer kleinen Mischung von Aschfarbnen an den Flügeln; der Bauch und die untern Theile weiß, und dieß umgibt auch den Steiß; die zwey erstern, mit schwarzen Flecken bezeichnet; die Füße wie der Schnabel; die Klauen sehr blaß.

Diese Art findet sich in den sumpfigen Gegenden Englands, in kleinen Flügen, zur Winterszeit, zieht aber vor Ausgang des März weg. In Rücksicht auf unser Vaterland, ist sie nicht häufig.

Im Sommer bewohnt sie das nördliche Europa und Asien ^{b)}; zu Zeiten ist sie sehr häufig in Sibirien und dem östlichen Rußland ^{c)}. Im Sommer ist sie auch auf Hudsons-Bay gemein, wo sie Sasasque-petesque heißt; und sie ist, nebst andern Arten, sehr zahlreich dort ^{d)}.

23. Die

^{z)} Zus. a. d. Suppl. S. 273.

^{u)} Hier muß wohl nach der Beschreibung Gmelin Lin. Syst. I. 2. p. 512. No. 11. Anas erythropus. citirt werden sonst passen die übrigen Synonymen nicht. Ueberhaupt findet man hier eine Verwirrung derselben, die Herr Rath Donndorf in den Zool. Beytr. II. S. 715. Nr. 64. so viel möglich auseinander zu setzen gesucht hat. B.

^{x)} Anas albifrons. A. cinerea troata alba. Latham Ind. orn. II. 842. 27. B.

^{z)} Seltmanns Vögel V. T. f. 48. B.

^{a)} Ueber II. S. 599. Nr. 394. Meine N. S. Deutschlands. II. S. 576. Nr. 6. B.

^{b)} Sie kommt daher auch im Winter nach Deutschland. B.

^{c)} Arct. Zool.

^{d)} Herr Hutchins.

23. Die Bohnen-Gans. (Bean G.)

Anas segetum. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 512. No. 68. e)

Bean-Goose. Br. Zool. II. No. 267. — Arct. Zool. No. 462. f)

Lev. Mus.

Ihre Länge ist zwey Fuß, sieben Zoll, ihre Breite vier Fuß, elf Zoll, und ihr Gewicht siebenthalb Pfund. Der Schnabel ist klein, am Ende stark eingedrückt (compressed), weißlich, zuweilen in der Mitte hellroth. und an der Wurzel und am Nagel schwarz; Kopf und Hals aschbraun, mit rostfarben überlaufen; Brust und Bauch schmutzigweiß, mit aschgrauem Gemölke; die Seiten und Schulterfedern dunkel aschfarben, mit weißen Rändern; der Rücken einfarbig aschfarben; die Deckfedern des Schwanzes weiß; die kleinern Deckfedern der Flügel lichtgrau, beynahe weiß; die mittlern dunkler, mit weißen Spitzen; die großen wie die kürzern Schwungfedern grau, mit schwarzen Spitzen; Beine und Füße saffrangelb; die Klauen schwarz.

Obige sind die gewöhnlichen Farben und Ausmessungen der Bohnen-Gans, wie Herr Pennant sie beschrieben hat; aber ein Exemplar in meiner Sammlung variiert sowohl in der Größe, als am Gewicht, und weicht selbst im Gefieder in etwas ab. Die Länge meines Vogels ist volle drey Fuß; sein Gewicht sieben Pfund, fünf Unzen; der Schnabel, von den Nasenlöchern bis zum Nagel, dunkel bräunlich roth; die kleinern Deckfedern der Flügel grau, die größern eben so, mit weißen Spitzen; die kürzern Schwungfedern eben so, aber mit weißen Spitzen und Rändern; die großen Schwungfedern einfarbig dunkelschwarz; die Füße matt bräunlichroth; die Klauen schwarz; übrigens kommt er mit der Beschreibung in der Britischen Zoologie überein *).

Diese Art bewohnt England im Winter; nach Yorkshire und Lincolnshire kommt sie im Herbst ^{b)}, und zieht im May wieder weg. Sie gehen gern in die Kornfelder und lieben den grünen Weizen sehr. In Lewis, einer der Hebriden, brüten sie in großer Menge, und ohne Zweifel an solchen Orten, wo sich andre wilde Gänse vorfinden, da man sie erst ganz kürzlich von diesen getrennt hat. Mein Exemplar wurde aus Suffolk geschickt. Sie wird auch auf Hudsons-Bay beobachtet ^{c)}.

24. Die Beringsgans. (Bering G.)

Anas Beringii. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 508. No. 36. k)

Bering Goose. Arct. Zool. No. 475. l)

Von

e) Latham Ind. orn. II. 843. n. 28. B.

f) Uebers. II. S. 507. Nr. 390. Meine N. S. Deutschl. II. S. 620 Nr. 3. Donndorfs Zool. Beytr. II. 729. Nr. 68. B.

g) Ich habe diese Bohnengans auch in Deutschland im Winter angetroffen. Sie betragt sich aber in ihrer ganzen Lebensart wie die wilde Gans, sollten sie daher nicht zu derselben gehören? Die Farbe des Schnabels ist der einzige

wichtige Unterschied. Ich glaube es ist eine junge wilde Gans. B.

h) Unter diesen hat man einige ganz weisse bemerkt. Arct. Zool.

i) Arct. Zool.

k) Latham Ind. orn. II. 843. n. 29. B.

l) Uebers. II. S. 509. Nr. 393. Stellers Beschreibung v. Kamtschatka. S. 188. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 715. Nr. 63. B.

Von der Größe der wilden Gans. An der Wurzel des Schnabels ist ein gelber Auswuchs, der in der Mitte mit bläulich schwarzen Federn gestreift ist; um die Ohren herum ist eine grünlich weiße Stelle; die Augen sind schwarz, gelb eingefasst, und dieß wieder schwarz gestreift; Rücken, Vorderhals und Bauch weiß; die Flügel schwarz; der Hinterhals bläulich.

Diese Gans hat Steller im Julius auf der Berings-Insel bemerkt. Die Eingeborenen verfolgen sie in Booten und tödten sie, zur Zeit der Mauser; zur andern Zeit jagen sie sie zu Land mit Hunden, und nicht selten fangen sie sie in Gruben, die mit Gras bedeckt sind *).

25. Die Gulaund-Ente. (Gulaund Duck).

Anas borealis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 512. No. 69. n)

Gulaund Duck. Arct. Zool. p. 572. ? E. o)

Die Größe fällt zwischen der Gans und der Ente. Ihr Schnabel ist schmal; der Kopf Entenhalsig (mallard green); Brust und Bauch weiß.

Sie ist in den Norästen Islands zu Hause, legt sieben bis neun Eyer, und ist eine seltne Art. Die Isländer nennen sie Gulaund *).

26. Die Bernakelgans. (Bernacle).

Anas erythropus, LIN. I. p. 197. II. Ed. XIII. I. 2. p. 512. No. 11. q) — Faun.

Suec. No. 116 (des Männchen) — FRISCH av. tab. 189.

La Bernacle. BRISS. orn. VI. p. 300. No. 14. — BUFF. ois. IX. p. 93. pl. 5. — Pl. enlum. 855.

Bernacle, or Clakis. RAU Syn. p. 137. A. 5. — WILL. orn. p. 359. — Phil. Trans. vol. II. p. 853. — GERARD. Herb. p. 1587. — Br. Zool. II. No. 269. — Arct. Zool. No. 479. r)

Lev. Mus.

Ihre Länge ist zwey, ihre Breite vier Fuß. Der Schnabel ist sehr kurz, keine anderthalb Zoll lang, und schwarz, zu beyden Seiten mit einem fleischfarbenen Flecken durchzogen; der Augenstern braun; die Stirn, der halbe Scheitel, die Seiten des Kopfs, das Kinn und Kehle weiß; vom Schnabel zu den Augen läuft ein schwarzer Streifen; der übrige Kopf, der Hals, und

m) Descr. Kamtsch. p. 159.

n) Latham Ind. orn. II. 843. n. 30. B.

o) Uebers. II. S. 593. E. B.

p) Arct. Zool.

q) *Anas erythropus*. A. cinerea supra nigro alboque undulata, collo nigro, facie abdomineque albis. Latham Ind. orn. II. 843. n. 31. B.

r) Uebers. II. S. 513. Nr. 397. Meine N. S. Deutschl. II. S. 623. Pallas Reise Ausg. II. S. 6. III. S. 474. Dessen nord. Ventr. III. Nr. 11. Lepechin Tageb. d. Russ. Reis. III. S. 13. Georgi Russl. II. S. 482. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 730. Nr. 11. B.

und der Anfang des Rückens sind schwarz; die Brust und die untern Theile, die Seiten des Afters und die obern Deckfedern des Schwanzes weiß; die Schenkel dunkelbraun, und weiß gesprenkelt; das Knieband schwarz; der Rücken eben so, und die Enden der Federn weiß gerändert; die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern blaugrau, die Enden schwarz und an der Spitze weiß eingefasst; der Steiß einsärbig schwarz; die Schwungfedern eben so, und blaugrau gerändert, außer gegen das Ende hin; der Schwanz sechstehalb Zoll lang, und schwarz; die Füße dunkelschwarz.

Diese Art ist an vielen der nördlichen und westlichen Küsten unsers Königreiches nicht selten; selten hingegen in Süden, und nur zu rauher Jahreszeit sichtbar. Im Februar verläßt sie unsere Insel, und zieht nach Norden, um zu brüten; um diese Zeit besucht sie Rußland, Lapland, Norwegen und Island¹⁾. In Amerika trifft man sie zuweilen auf Hudsons-Bay an.

Dies ist die Art, deren Naturgeschichte uns so viele Schriftsteller, unter dem Namen der Baumgans oder Elakis (Tree Goose oder Clakis)²⁾ überliefert haben, in der Voraussetzung sie entstehe aus altem, abgestorbenen Holze, und käme aus der sogenannten Entennmuschel (Barnacle)³⁾, die man in altem Holz stecken findet; ja sie versichern ernstlich, den Schwanz der Jungen, der noch nicht zur vollkommenen Reife gediehen, könne man zur Schaale herausgucken sehen⁴⁾. Diese Meynung ist aber jetzt, gleich vielen andern alten Irrthümern, verworfen; denn man weiß wohl, daß dieser Vogel geheckt und ausgebrütet wird, wie andere Arten dieser Gattung⁵⁾.

27. Die Brentgans. (Brent).

Anas Bernicla. LIN. I. p. 198. No. 13. Ed. XIII. I. 2. p. 513. No. 23. 2) — Faun. Suec.

1) Sie wird unter den Schlesiſchen Vögeln aufgeführt. B.

2) S. Phil. Trans. — Gerard, Herball. — Camden, Britt. 1695. p. 941. — Will. orn. p. 359.

3) Lepas anatifera. L. Abbildungen dieser Muschel ſiehe man in Argeny., Conch. tab. 30. f. F. G. — Lister, Conch. tab. 440. fig. 283 — Gerarda, Herball. p. 1587. ch. 171. In diesem letztern Werke sind rohe Abbildungen sowohl von der Muschel, als von dem Vogel.

4) Dies erzählen die Schriftsteller noch ferner von einem gewissen Baum, dessen Blätter, wenn sie ans Land fallen, Vögel, ins Wasser aber, Fische werden ſ. Bauhin, Pinax p. 514. III.

5) Var. A. Die kleine Bernatelgans. Latham I. c. β.

Bernicla minor. BRISS. VI. p. 302. 15. Ind. 80. II. p. 442.

Brenthus, Raii Syn. p. 137. A. 7. — Id. 139. 11? Will. p. 276. t. 76.

Anser Brenta Klein Av. p. 130. 8. Rat Goose or Road Goose. Will. (Angl.) p. 361.

Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 730. 11. β.

Sie ist kleiner als die vorhergehende. Schnabel und Füße sind schwarz; die Hauptfarbe aschgrau, die Ränder der Federn weiß; der Unterleib und Steiß weiß; der Vorderkopf und die Gurgel gelbroth; der Scheitel und Nacken schwärzlich; der Unterhals und die Brust dunkelbraun; der Schwanz an den Seiten weiß. B.

2) Latham Ind. orn. II. p. 844. n. 32. B.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

407

Suec. No. 115. — Scop. ann. I. 84. a) — Brunn. orn. No. 52. — Frisch av. tab. 156. — Müller Zool. No. 115. — Faun. Groenl. No. 41. — Le Cravant. Briss. orn. VI. p. 304. No. 16. pl. 31. — Buff. ois. IX. p. 87. — Pl. enlum. 342. — Brent Goose. Raii Syn. p. 137. A. 6. — Will. orn. p. 360. pl. 69. — Albin Nat. Hist. vol. I. pl. 93. — Br. Zool. II. No. 270. — Arct. Zool. No. 478. b) — Lev. Mus.

Kleiner, als die vorhergehende. Ihr Schnabel ist anderthalb Zoll lang, und schwarz; der Augenstern nussbraun; der Kopf, der Hals und der obere Theil der Brust sind schwarz; an jeder Seite des Halses ist ein großer Fleck von schwarzer und weißer Farbe; der untere Theil der Brust, die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel sind aschfarben, mit einer dunklern Schattirung; der After und die obern und untern Deckfedern des Schwanzes weiß; der Schwanz dunkelschwarz, und ein wenig abgerundet; die Füße röthlichschwarz.

Das Weibchen unterscheidet sich durch ein minder lebhaftes Gefieder; und bey jungen Vögeln ist das Weiße an den Seiten des Halses gering, oder fehlt gänzlich c).

Diese Vögel besuchen, gleich den vorigen, unsere Küsten im Winter, und sind besonders zu Zeiten sehr häufig an den Küsten von Holland und Island d); wo sie in Netzen gefangen werden, die man quer über die Flüsse zieht e). Zu gewissen Jahreszeiten sind sie an den Küsten der Piccardie, in Frankreich, gekommen, und zwar in so ungeheuren Flügen, daß sie die Einwohner für eine Landplage gehalten haben, besonders im Winter des Jahrs 1740; wo diese Vögel alles Korn an den Seeküsten verheerten, indem sie es an den Wurzeln abnagten; daher wurde ihnen ein allgemeiner Krieg erklärt, und auch ernstlich gegen sie geführt, indem man sie mit Knütteln todtzuschlug; ihre Anzahl war aber so ungeheuer, daß dieß nur wenig half; auch wurden die Einwohner nicht eher von dieser Plage befreit, bis der Nordwind, der sie hergeführt hatte, zu wehen aufhörte, wo sie dann Abschied nahmen f).

Sie werden leicht zahm, und leicht gemacht hält man sie für eine gute Speise. Sie brüten sehr weit nördlich g), und kehren im Herbst nach Süden zurück. Sie fliegen in Form eines Keils, wie die wilden Gänse, mit großem Geschrey. In Schottland nennt man sie Horra-Gänse, weil sie sich in diesem Sund vorfinden h). Sie sind auch in Amerika gemein

Fff 2

a) Uebers. v. Gänther I. S. 73. Nr. 84. B.

b) Uebers. II. S. 512. Nr. 396. — Lapechin Tageb. d. Russ. Reise III. S. 13. Pontoypidan N. G. v. Dänemark S. 167. Nr. 5. Klassen Island. I. S. 292. Meine N. G. Deutschl. II. S. 621. Nr. 4. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 712. Nr. 13. B.

c) Von der Art ist Willughby's Rat - oder Road Goose. Orn. p. 361. pl. 76. — La petite Bernacle. Briss. orn. VI. p. 302. — (Ist im Ind. orn. abgeändert, und eine Bart-

etät der Vernakelgans geworden. S. 406. Note 7. B.)

d) Sie kommen im Winter auch nach Deutschland. B.

e) Br. Zool.

f) Hist. des Ois.

g) In Grönland, wo sie sich den Sommer über in den nördlichen Gegenden aufhalten, und im Winter in ganzen Flügen nach dem südlichen ziehen. Faun. Groenl.

h) Arct. Zool.

mein; häufig in der Hudsons-Bay; brüten auf den Inseln und längs der Küste, fliegen aber niemals ins Innere des Landes. Sie suchen ihre Nahrung am Ufer der hohen See; den Winter bringen sie in den südlichen Gegenden zu, wie in Europa. Ihre Nahrung besteht aus Pflanzen, als der kleinen Natterzunge ¹⁾, der Kauschbeere ²⁾; auch Seewürmern, Beeren u. d. gl. Eine, die ich öffnete, hatte den Magen voll Gras. Sie bekommen gern den Fischgeschmack, werden aber im Ganzen für eine gute Speise gehalten. Man hat von ihnen die nämliche Fabel, wie von der vorigen, erzählt, daß sie nämlich aus Bäumen entspründen. Auf Hudsons-Bay werden sie Wetha-way-pa-wew genannt.

28. Die blaüflügelige Gans. (Blue-winged G.)

Anas coerulescens. LIN. I. p. 198. Nro. 12. Ed. XIII. I. 2. p. 513. No. 12. ¹⁾

L'Oie sauvage de la Baye d'Hudson. BRISS. orn. VI. p. 275. No. 5.

L'Oie des Esquimaux. BUFF. ois IX. p. 80.

Blue-winged Goose. EDW. Nat. Hist. pl. 152. ^{m)} — Arct. Zool. No. 474. ⁿ⁾.

Lev. Mus.

Diese ist etwas kleiner, als die zahme Gans. Ihr Schnabel ist roth; der Augenstern dunkel schokoladbraun; der Scheitel gelblich, wie versengt; der übrige Kopf und Hals weiß, der letzte seiner ganzen Länge herab, am Hintertheile, schwarz gefleckt; der untere Theil des Halses, die Brust rings herum, die Seiten unter den Flügeln, und der Rücken dunkelbraun, am hellsten an der Brust; die Deckfedern der Flügel und des Schwanzes bläulich aschfarben; die Schulterfedern und der Schwanz weiß, und grau gestreift; die großen Schwungfedern dunkelbraun; Bauch, Schenkel und After weiß; die Füße roth.

Beim Weibchen ist die obere Kinnlade schwarz; die Wurzel der untern bleifarbig, mit einer schwarzen Spitze; die Stirn weiß; zwischen dem Schnabel und den Augen herrscht eine schwärzliche Farbe; die innere Hälfte jeder Schwanzfeder ist weiß, die äußere schwarz.

Diese Vögel sind in Amerika zu Hause, und man trifft sie in den südlichen Colonien der Hudsons-Bay an. Im Sommer sind sie äußerst zahlreich um Fort Albany. Sie wandern nach M. Hgabe der Jahreszeit, gleich vielen andern dieser Gattung. Man kennt sie dort unter dem Namen Cath catue We We ^{o)}.

29. Die

¹⁾ Polygonum viviparum. L.

²⁾ Empetrum nigrum. L.

³⁾ Latham Ind. orn. II. p. 836. n. 13. B.

^{m)} Seltmanns Vögel V. Taf. 47. B.

ⁿ⁾ Uebers. II. S. 508 Nr. 392. Donndorfs Zool. Beitr. II. S. 732. Nr. 12. B.

^{o)} Hr. Hutchins. — Hr. Latham führt im Ind. orn. hierbey noch zwey Varietäten an.

Var. A. Sie ist weiß; der Hinterhals und die Schulterfedern bleifarben; die Deckfedern der Flügel und des Schwanzes bläulich.

Var. B. Sie ist hellgrau und dunkelbraun gefleckt; Kopf und Oberhals weiß, hinten schwarz gefleckt; die Deckfedern der Flügel und des Schwanzes bläulich. B.

29. Die Eidergans. (Eiderente: Eider-Duck).

Anas mollissima. LIN. I. p. 198. 15. Ed. XIII. I. 2 p. 514. No. 15. p) — Faun. Suec No. 112 — BRÜNN. orn No 66. — Ejusd. Monograph. tab. 1. 2.

— MÜLLER Zool. No. 116. — Mus. Carlson. tab.

L'Oie à duvet, ou l'Eider. BRISS. orn. VI. p. 294. pl. 29. 30 — BUFF. ois. IX. p. 103. pl. 6. — Pl. enlum. 209. (das Männchen) 208. (das Weibchen).

Great black et white Duck. EDW. Nat. Hist. pl. 98. (Männchen und Weibchen. q)

Eider- or Cuthbert-Duck. RAN Syn. p. 141. A. 3. — WILL. orn. p. 362. § I. et II. pl. 76. — Br. Zool II. No. 271. pl. 95. — Arct. Zool. No. 480. r)

Tour in Scotland 8vo. p. 35.

Lev. Mus.

Sie ist kleiner, als eine Gans, und Einen Fuß, zehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang, und schwarz, die Federn zu beyden Seiten desselben laufen sehr weit vorwärts, fast bis an die Nasenlöcher; der Scheitel, mit Einschluß der Augen, ist schwarz, und dieß läuft zu beyden Seiten in einem Streifen von der nämlichen Farbe fort, wo die Federn an dem Schnabel hervorstehen; unter dem Nacken, an beyden Seiten des Halses ist die Farbe hell Erbsengrün; der übrige Kopf, der Hals, die Brust und der Rücken, die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern sind weiß, letztere an den Enden gebogen, und hängen über die Schwungfedern herüber, die, nebst dem Schwanz, und den untern Theilen, von der Brust an, schwarz sind; die Füße sind mattgrün.

Dieß ist die Beschreibung eines alten Männchens, das sein vollkommenes Gefieder nicht vor dem vierten Jahr bekommt.

Im ersten Jahr ist der Rücken weiß, und die gewöhnlichen Theile, den Scheitel ausgenommen, schwarz; der übrige Körper aber schwarz und weiß geschäckt.

Im zweyten Jahr sind Hals und Brust schwarz und weiß gefleckt, und der Scheitel schwarz y).

Im dritten sind die Farben fast so, als wenn es sein volles Gefieder hat, aber minder lebhaft, und noch einige wenige schwarze Flecken bleiben am Hals stehen; der Scheitel ist schwarz, und am Hinterteile gespalten.

Die ganz ausgewachsenen Männchen variiren auch ein wenig; bey Einigen sind die Wurzeln der Flügel und die Mitte des Rückens schwarz; Eines, mit diesem letzten Kennzeichen, besitze ich selbst.

p) Latham Ind. orn. II. 845 n 35. B.

q) Seeltamanns Vögel IV. Taf. 91. B.

r) Ueberf. II. S. 514 Nr. 398. Ballbauers Monogr Lübeck. 1778. Mus Carls Fasc. I t. b. Meine M. S. Deutschl. II. S. 625. Nr. 6. Uao von Frost Reise durch Island S. 116. Phillips Reise nach dem Nordpol. S. 97. Olafsen's Jsl. I. S. 33. 119. 293.

Sif 3

Das Eranz hist. v. Grönl. S. 115. Egede Beschr. von Grönl. S. 117. Fabricius Reise nach Nova. S. 294. Leem's Kappl. S. 140. Pontoppidan's Norweg. II. S. 132. Donndorfs Zool. Beytr. S. 736. Nr. 15. B.

y) Mus. Carls. Fasc. I. n. 6. B.

Das Weibchen wiegt viertelhalb Pfund. Sein Schnabel ist wie beim Männchen; die Hauptfarbe des Gefieders röthlichbraun, nach der Quere schwarz gestreift; der Hinterhals mit schwärzlichen Längsstreifen bezeichnet; an den Flügeln zwey weiße Streifen; der Bauch dunkelbraun, und undeutlich mit Schwarz bezeichnet; der Schwanz dunkelbraun; die Füße schwarz.

Auch dieses Geschlecht variiert, indem einige Exemplare verschiedene weiße Flecken am Körper, andere einen aschgrauen Hals und Bauch haben, und die Streifen an den Flügeln unscheinlich sind, ja einige wenige gar keine Spur mehr davon haben *).

Die Jungen beyder Geschlechter sind überein, und alle mit einer Art von haarigem Pflaum bedeckt; Kehle und Brust weißlich; und ein aschgrauer Strich läuft vom Schnabel zwischen den Augen durch nach dem Hinterkopf hin.

Diese Art bewohnt die nördlichen Gegenden, und zwar bis zur höchsten, bis jetzt entdeckten, Breite. Auf unsrer Insel trifft man sie selten an; sie findet sich aber auf den westlichen Inseln Schottlands und auf den Farn-Inseln *); hier brütet sie, und soll selten über fünf Eyer *) von hellgrüner Farbe, und glänzend auf die Erde legen. Das Weibchen schützt sie vor der Kälte in einem Bett von zartem Pflaumfedern, die es sich aus der Brust rupft. Diese Dunen sind von der leichtesten und wärmsten Natur, unter allen bis jetzt bekannten Dingen *). Die Ein,

*) Hr. Dr. Borkhausen beschreibt mir ein Paar Eidergänse, die aus der Gegend von Voston kamen, folgendergestalt: Beim Männchen sind die Wangen, die Seiten des Mittelkopfs und der Hinterkopf nebst dem Genick bläulichgrün; die Brust schneeweiß; ein breiter Strich auf dem Rücken, und der Steiß ist schwarz.

Das Weibchen ist ganz rostfarben, am Kopf und Halse schwarz gestrichelt, übrigens schwarz wellenförmig in die Quere gestreift; die größern Deckfedern sind schwärzlich und nur an den Rändern rostfarbig mit weißlichen Spitzen, wodurch zwey weißliche Querbänder auf den Flügeln entstehen; die Schwungfedern sind schwärzlich. Mit dem Männchen hat es gleiche Größe. B.

*) Im Decemb. 1788 habe ich ein Weibchen auf einer Wiese bey Schnepfenthal, das sich im Schnee vergraben hatte, geschossen. Der Magen war ganz leer, sonst war es gut bey Leibe, und der Braten schmeckte gut, etwas fischartig. B.

*) Sie müssen zuweilen bis auf acht legen; denn man hat nicht weniger, als sechzehn in Einem Nest gefunden, nebst zwey Weibchen, die sich besonders gut vertragen. v. Troil Iceland, p. 144.

y) Die Menge Dunen, die man in Einem Nest fand, war mehr als der Kopf eines Huts ausfüllt, obschon sie nicht über $\frac{3}{4}$ Unzen wog. Br Zool. — 3 Pfund dieser Pflaumfedern kann man in einem Raum zusammendrücken der kaum größer ist, als eine Faust, wiewohl er nachher so ausdehnbar ist, daß er ein fünf Fuß breites Polster ausfüllt. Salerne orn. p. 146. — Der, der sich in den Nestern vorfindet, wird am meisten geschätzt, und lebendiger Pflaum genannt; er ist viel elastischer, als der vom toten Vogel gepflückte, der in Island wenig geachtet wird. Die beste Sorte wird mit 45 Fischen (fünf bis sechs Mark Lübsch) des Pfund, bezahlt, wenn sie gereinigt ist, und unereinigt mit 16 Fischen (zwey bis sechzehn Schilling Lübsch). Es werden gewöhnlich jedes Jahr, auf Rechnung der Compagnie, 1500 oder 2000 Pfunden, von beyden Sorten, ausgeführt, ungerechnet das, was von den Besitzern noch besonders ausgeführt wird. Im Jahr 1750 bezahlte die Isländische Compagnie eine Summe die sich auf 3745 Bankothaler belief, für diese Artikel, ungerechnet das, was unmittelbar nach Glückstadt gesandt worden ist. v. Troil, Iceland p. 146.

Eingebohrnen, die den Werth desselben kennen, sind sehr sorgfältig im Berauben der Nester, und nehmen sowohl die Eyer, als den Pflaum, weg; worauf denn die Eidergans wieder legt, und eine zweyte Parthie Pflaum, ihren letzten Vorrath hergiebt; denn wenn sie zum zweytenmal beraubt wird, so muß das Männchen die warme Decke hergeben; geschieht aber ein dritter Diebstahl, so verläßt sie den Platz gänzlich.

In Amerika findet sich dieser Vogel bis Newyork. nördlich, und brütet auf den verwüsten Inseln von Neuengland; am gemeinsten ist er aber allenthalben gegen Norden. Man sagt, er besuche beständig Einen und ebendenselben Platz zum Brüten, und Ein Paar habe man Einerley Nest zwanzig Jahre nacheinander einnehmen gesehen. Ihre Nahrung sind Muscheln nach denen sie in eine beträchtliche Tiefe untertauchen. Sehr zahlreich sind sie im Lande der Eskimos; weniger aber in den mittleren Colonien. Von den Eskimos werden sie Metteß genannt; und in Grönland kennt man sie unter eben diesem Namen²⁾. Die Einwohner erlegen sie auf dem Wasser mit Wurfspiessen, indem sie sie in dem Augenblick, wo sie wieder herauf kommen, durchstoßen; die Stelle kennen sie an den vorher aufsteigenden Blasen. Ihr Fleisch soll sehr geschätzt seyn. Sie sollen ein sehr hohes Alter erreichen, und dann ganz grau werden³⁾.

30. Die Königsgans. (King D.)

Anas spectabilis. LIN. I. p. 195. n. 5. Ed. XIII. I. 2. p. 507. No. 5. b) — Faun Suec. No. 112. — Mus Adolph. Frider. vol. II. p. 25. — MÜLLER Zool No. 108.

Le canard de la Baye d'Hudson. BRISS. orn. VI. p. 365. No. 15.

Le Canard à tete grise. BUFF. ois IX. p. 253.

Grey-headed Duck. ENW. Nat. Hist. pl. 154. c)

Lev. Mus.

In Rücksicht der Größe steht sie zwischen der Gans und der Ente mitten inne, und ihre Länge ist fast zwey Fuß. Ihr Schnabel ist beynähe zwey Zoll lang und orangefarben, an der obern Kinnlade ist eine halbkugelförmige, ausgeschöhlte (ridged) Hervorragung, die an den Seiten eingedrückt, und auf dem Rücken flach ist, wo sie sich in zwey Theile theilt; die erhabenen Theile sind sammet schwarz, und laufen zu beyden Seiten in einem Strich nach den Augen hin; der Scheitel und der Nacken sind schön hell aschfarben; die Federn an der Wurzel der obern Kinnlade sind erbsengrün (bläßgrün) und dieß läuft zu beyden Seiten rückwärts nach dem Halße

2) Crantz, Greenland.

a) Arct. Zool. — In den Suppl. S. 274. steht noch der Zusatz: „Sie besuchen sehr selten den südlichen Theil unserer Insel; wiewohl wir Hr. Boys sagt, er besitze die Beschreibung eines Vogels, der im März 1736 auf der Insel Tharet geschossen worden, und der kein anderer, als das Männchen dieser Art seyn könne.“

b) Latham Ind. orn. II. 845 n. 36. B.

c) Seligmanns Vögel V. Taf. 49. B.

d) Ueberf. S. 515. Nr. 399. — Mus. Carls. Fasc. II tab. 39 Männchen. tab 40. Weibchen. Pallas N. G. merkw. Thiere. VI. S. 34. Schwedische Abb. XLI. S. 24. Donners Zool. Beytr. II. S. 711. Nr. 5. B.

Halte hin, und schließt die Augen zur Hälfte ein; unter diesen, und ums Kinn herum, ist die Farbe schmutzig weiß, das Grüne und Weiße aber vermischt sich untereinander, und das Letztere geht stufenweise in das erstere über; unter dem Kinn sind zwei schwarze Streifen, die sich auf dem obersten Theil in eine Spitze vereinigen, und, so wie sie weiter herabkommen, wieder auseinander gehen, gleich einem umgekehrten V; der übrige Hals und die Brust sind weißlich; die Mitte des Rückens, der ganze Bauch und der After schwarz; die Flügel dunkelbraun, an der Mitte der Deckfedern weiß; alle Schwungfedern schwarz; die kürzern krümmen sich herabwärts über die großen; die Schäfte sind dunkel rothfarben, an jeder Seite der äußern ist ein weißer Fleck; der Schwanz ist keilsförmig, kurz und schwarz; die Füße sind schwarzbraun.

Das Weibchen ist kleiner; der höckerige Theil des Schnabels nicht so groß, und auch nicht so hoch gefärbt; der Federrand (leathery ridge) aber auf dem Rücken breiter; die Farbe des Schnabels sowohl, als der Füße matter, und zieht ins Braune; das ganze Gefieder braun, die Mitte jeder Feder schwarz; Kopf und Hals am hellsten; die Kehle zieht sich stark ins Braune; der Bauch, die vierzehn ersten Schwungfedern, und die angränzenden Deckfedern, sind bräunlich; die sechs nächsten haben weiße Spitzen, woraus ein weißer Streifen an den Flügeln entsteht; der Schwanz ist wie die Schwungfedern *).

Die jungen Männchen, so wie die Weibchen, bekommen weder den eingedrückten Höcker auf dem Schnabel, noch die Farbe ihres Gefieders, vor den reifern Jahren.

Einer im Leverschen Museum, den ich für ein junges Männchen halte, hat einen dunkelrothen Schnabel, mit einem schwarzen Nagel; die Erhabenheit an der Wurzel desselben ist weit unbeträchtlicher; Kopf und Hals sind bräunlich aschfarben; der Schüttel am Hintertheil mit

e) Ich muß hier noch anführen, was Hr. Sparmann im Mus. Carl. über diese Vögel sagt:

Anas spectabilis.

Mas. Mus. Carls. II. n. 39.

Die Edwards'sche Figur, welche Linne citirt, ist der Natur wenig angemessen. Der Schnabelhöcker ist gelb mit einem schwarzen Federrand umgeben, und der Schnabel selbst ist röthlich schwarzbraun; der Scheitel ist bleifarben und himmelblau grau; die Augen sind mit einem kleinen schwarzen Feld umgeben; die Gegend unter den Augen ist blaugrün; die schwarze Kehle dehnt sich gegen den Nacken zweigabelig aus; Gurgel und Brust sind gelblichweiß; der Hinterhals, die Schultern und der Flügelbug weiß; der Steiß schwarz, an den Seiten weiß; die Deckfedern der Flügel schwarz, und eine davon steht auf jeder Seite gerade und löffelförmig in die Höhe; die Schwungfedern schwärzlich, die hintern vorwärts sichelförmig; der Schwanz kurz und rufifarben; die Füße röthlich.

Anas spectabilis.

Foemina. Mus. Carls. II. n. 40.

Die Jäger am Baltischen Meere an der Küste von Südermannien halten diesen Vogel für das Weibchen der *Anas spectabilis*.

Der Schnabel ist schwarz; die Augen umgiebt ein weißer Fleck; Kopf und Hals sind rothfarben; Brust, Schultern, Rücken und Steiß rothfarben, schwarz gefleckt; Bauch, Hüften und After rufigrothfarben; die Deckfedern aschgrau braun, die hintern großen an der Spitze weiß, wodurch vorn eine weiße Querlinie formirt wird; die vordern Schwungfedern an der Spitze aschgrau; die hintern schwärzlich, an der Spitze schmutzigweiß, wodurch hinten auf den Flügeln eine weiße Querlinie entsteht; der Schwanz aschgrau; die Füße schwarz.

„Ich halte diesen Vogel für das Weibchen der Tafelente.“ W.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

413

mit einigen wenigen weißen Strichen gestreift; Körper und Flügel mattschwarz; an der Mitte der Deckfedern der Flügel ist ein großer, weißer Fleck, wie bey'm Männchen, und ein anderer in die Mitte des Rückens; die Füße sind röthlichbraun.

Diese schöne Art findet sich in der Hudsons-Bay. Im Menge ist sie am Fluß Churhill im 59. Grad der nördlichen Breite, wo die Vögel so lange bleiben, als das Wasser nicht zugefroren ist. Selten sind sie in Fort York. Sie nisten an die Ufer der Teiche und Flüsse; ihr Nest besteht aus Reisig und Moos, und ist mit Federn aus der Brust gefüttert, wie bey der Eidergans (Nr. 29). Der Eyer sind vier bis fünf, weißlich, und so groß, wie Gänseeier. Die Jungen werden im Jullus flücker. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Würmern und Gras. Man kennt sie unter dem Namen *Mis se sheep* ^f). Im Winter trifft man sie zuweilen bis Newyork, südlich an. Sie sind in Grönland gemein, und scheinen sehr viel von den Eigenschaften der vorigen Art zu haben, indem sie eben so schätzbare Pflaumfedern geben und auch so ziemlich die Lebensart dieses Vogels zu besitzen scheinen. Ihr Fleisch hält man für vortreflich, und den rohen, höckerigen Theil des Schnabels für einen vorzüglichen Leckerbissen. Die Häute werden zusammen genäht, und geben warme Klöder. Die Einwohner erlegen sie mit Wurffspießen, und bedienen sich dabei folgender Methode: Eine Anzahl Leute auf Kanoes, die mit einem schwimmenden Zug dieser Vögel zugleich eintreffen, erheben plötzlich ein jauchzendes und so starkes Geschrey, als sie nur immer können; die Vögel hlerdurch zu sehr in Schrecken gesetzt, als daß sie wegschließen könnten, tauchen unter das Wasser; da aber die Stelle, wo sie wieder herauf kommen müssen, durch das Aufwerfen der Blasen auf der Oberfläche kenntlich ist, so folgen ihnen die Jäger so dichte, als es nur möglich ist; und wenn sie dieß drey oder viermal getrieben haben, so werden die Vögel so ermüdet, daß man sie leicht tödten kann ^g).

Diese Art findet sich auch an der Küste von Norwegen, und ist auf den Orkadischen Inseln erlegt worden ^h). Sehr häufig ist sie im nördlichen Sibirien und Kamtschatka.

31. Die Bisam-Ente. (Muscovy D.)

Anas moschata. LIN. I. p. 199. 16. Ed. XIII. I. 2. p. 575. No. 16. ⁱ) — Faun. Suec. No. 118. — Scop. ann. I. No. 85. ^k) — FRISCH av. tab. 180.

Anas sylvestris brasiliensis. RALL Syn. p. 148. No. 1. ^l)

Le Canard musqué. BRISS. orn. VI p. 313. No. 3. — BUFF. ois. IX. p. 162 pl. 9. (das Weibchen). — Pl. enlum. 989.

Ipeca

^f) Hr. Hutchins.

^g) Faun. Groenl.

^h) Arct Zool.

ⁱ) Latham Ind. orn. II. 846. n. 37. B.

^k) Uebers. v. Günther I. S. 74. Nr. 85. B.

^l) Ray's Vogel war ganz schwarz, mit grünem

Glanze, die Deckfedern der Flügel ausgenommen, die weiß waren: Ein solcher ist jetzt im Hinterschen Museum. Ich bemerkte an diesem Exemplar eine kurze, schwarze Hervorragung am Flügelbug. Dieser Vogel kam von Cayenne.

Neunte Ordnung. Schwimmvögel.

Ipeca guaca. RAI Syn. p. 149. No. 3. — WILL. orn. p. 383. pl. 62.

Muscovy Duck. RAI Syn. p. 150. No. 3. p. 191. No. 11.

Muscovy Duck, Cairo Duck, Guinea Duck, Indian Duck. WILL. orn. p. 381. 82. — ALBIN Nat. Hist. vol. III. pl. 97. 98 m).

Lev. Mus.

Sie ist größer, als die wilde Ente, und zwey Fuß lang. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang, und roth, ausser um die Nasenlöcher und an der Spitze, wo er braun ist; die Augen sind mit einer kahlen, mit Warzen besetzten, rothen Haut umgeben; der Scheitel ist schwarz; die Seiten des Kopfs, die Kehle und der Vorderhals sind weiß, mit schwarz melirt; der untere Theil des Halses, die Brust, die Seiten, der untere Theil des Bauchs und die Schenkel braun, ein wenig mit Weiß melirt; Rücken und Steiß auch braun, mit goldgrünem Glanze; der obere Theil des Bauchs weiß; die drey ersten Schwungfedern weiß; die vier nächsten dunkelbraun; die übrigen braun, mit goldgrünen äußern Rändern und Spitzen; der Schwanz hat zwanzig Federn; die äußerste ist an beyden Seiten weiß, die andern goldgrün; die Füße sind roth.

Das Weibchen ist kleiner, im Colorit aber nicht sehr verschieden; der fleischlappensförmiger Raum am Kopf ist viel kleiner und von minder lebhafter Farbe *).

Diese Art ist hinlänglich bekannt, da sie fast bey jeder Nation als Hausgeflügel sehr gemein ist. Woher sie ursprünglich stammt, ist nicht so leicht zu bestimmen; Einige vermuthen aus Brasilien^o), weil Markgraf und Andere sie als einen, diesem Welttheil eignen Vogel, beschrieben haben; so wie den nämlichen Vogel mit weißem Gefieder^o), der auch in unsern Menagerien so selten nicht ist, wo er sich stark vermehrt. Seine Eyer sind runder, als die der gemeinen Ente, und von jungen Vögeln spielen sie oft ins Grüne. Man schätzt diese Entenart, weil sie mehr Eyer legt, und öfter sitzt, als andere. Im Freyen macht sie ihr Nest auf alte Baumstrünke; und während der Tageshitze, sitzt sie auf den Zweigen solcher Bäume, die viel Laub haben. Diese Vögel sind sehr wilder Natur, wiewohl sie im zahmen Zustande auch sehr gelehrig sind; und das Männchen vermischt sich nicht selten mit den gemeinen Enten, und erzeugt mit ihnen eine Bastardbrut. Den Namen: Muscovy Duck, Russische oder Bisam-Ente, hat man ihnen in der Voraussetzung gegeben, daß sie in diesem Lande zu Hause seyen; wahrscheinlich aber hat man sie so genannt, weil sie einen Bisamgeruch von sich geben^o), der aus der Drüse, die, wie bey andern Vögeln, am Steiß liegt, herkommt. Ihr Fleisch wird für eine sehr gute Speise gehalten, und man sollte sie zum Brüten aufmuntern, weil mehr

Fleisch

m) Meine N. G. Deutschl. II. S. 636. Nr. 7.

Cetti N. G. von Sardinien II. S. 336.

Georgi Reise d. Russl. II. S. 482. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 739 Nr. 16. B.

n) Es giebt bey diesen, so wie bey den Hausenten mancherley Verschiedenheiten in Rücksicht der Farben; doch keine so abwechselnde, denn die

meisten sind nur schwarzblau, grauröthlich, weiß, gelb und weiß geschächt. B.

o) Man findet diese Vögel wild am See Vattak in Arien. Hr. Pennant.

p) Ipeca guaca. Raii. — Ein solcher ist im Levenschen Museum.

q) Ray.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

415

Fleisch an ihnen ist, als an den gemeinen Enten, und weil der Vogel zugleich stärker und abgehärteter ist, als irgend eine andere Art *).

32. Die rothhalsige Ente. (Rufous-necked D.)

Anas rufa. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 515. *)

Anas ruficollis. SCOP. ann. I. No. 81. †)

Sie hat die Größe der wilden Ente (Nr. 43). Ihr Schnabel ist schwarz; Kopf und Hals sind fuchsroth; die Brust schwarz; der Rücken mit braunen, abwärts laufenden Strichen besetzt. Die Flügel einsfarbig aschblau; der Schwanz kurz, und nicht länger, als die geschlossenen Flügel; die Füße schwarz.

Ihr Vaterland ist nicht angegeben.

33. Die weißköpfige Ente. (White headed D.)

Anas leucocephala. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 516. No. 72. *) — SCOP. ann. I. No. 79. x).

White-headed Duck. SHAW'S Trav. p. 254?

Von der Größe der wilden Ente. Ihr Schnabel ist breit, an der Wurzel gefurcht und hellblau; der Kopf weiß, der Scheitel schwarz; das Halsband eben so †); die Brust kastanienbraun, am untern Theil mit schwarzen Querstreichen besetzt; der Bauch grau, mit kleinen, schwarzen Flecken bezeichnet; der Rücken fuchsroth; die Flügel eben so, aber heller und mit braunen Linien und Punkten bezeichnet; Schwungfedern und Schwanz braun.

In dem Museum des Grafen Tzessin. Woher? ist unbekannt. Wenn es Shaw's oben citirter Vogel ist, so findet sie sich in der Barbarey.

Ggg 2

34. Die

*) Es geschieht dieß auch an mehreren Orten in Deutschland, namentlich in Thüringen, und man steckt einen Visamentenriß und zwey zahme Enten deßhalb zusammen. Die Bruten werden auf diese Art sehr stark, und das Fleisch dieser Bastarde hat einen außerordentlich guten Geschmack. B.

†) Latham Ind. orn. II. 863. n. 78. B.

*) Uebers. v. Günther I. S. 781. Nr. 2. Meine M. S. Deutschl. II. S. 659. Nr. 3. Ich halte sie, und dieß vermuthet auch Hr. Latham im Ind. orn. I. c. für eine Varietät der Tafelente Nr. 68. B.

*) *Anas leucocephala*. Latham Ind. orn. II. p. 858. n. 64.

Anas mersa. Gmelin Lin. I. 2. p. 520. n. 84. Pallas Reise II. S. 713. 29. t. tt. Dessen Ausz. II. Anh. S. 15. Nr. 29.

Im Ind. orn. hält Hr. Latham die Unzerrente, Nr. 59. (*Anas mersa*, L. Ural Duck) mit der weißköpfigen für eineley, und dieß hat denn auch seine Richtigkeit. Es scheint auch noch hierher zu gehören: *Anas hyemalis* var. Brun. No. 77? *Anas hyemalis* diversa. Die braunschneblige Ente. Wtrfing's Vögel. Vergleiche Bonnors's Zool. Beytr. II. S. 741. Nr. 72. S. 749. Nr. 84. B.

x) Uebers. v. Günther I. S. 70. Nr. 79. B.

y) Ich vermuthete, um den Hals; es wird aber nicht gesagt.

34. Die Georgische Ente. (Georgia D.)

Anas georgica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 516. No. 77. z)

Ihre Länge ist zwanzig Zoll. Der Schnabel ist zwey Zoll lang, und beugt sich am Ende etwas aufwärts, von Farbe ist er gelb, Ränder und Spitze aber sind schwarz; der Augenstern röthlichbraun; Kopf und Hals hell röthlich aschfarben, am lichtesten am vordern Theile; und ganz klein mit dunkelbraunen Streifen gestreift; die obern Theile des Körpers hell röthlich aschfarben, mit dunkelbraunen Flecken; die Schulterfedern eben so, aber dunkler von Farbe; die Deckfedern der Flügel hellaschfarben; der Spiegel auf den Flügeln hell grünpangrün, mit dunkelbraunen Rändern, und oben und unten mit einem weißen Streifen eingefasst; die Seiten hell aschgrau, mit Flecken von dunklerer Farbe; Schwungfedern und Schwanz dunkelbraun; die Füße grünlich aschfarben.

Diese wurde in Süd-Georgien, in der Mitte des Janners, angetroffen, und war ein Männchen; ihr Fleisch ließ sich gut essen. — Aus den Gemälden des Hrn. Jos. Banks.

Eine andere, dieser einigermaßen ähnliche, wurde auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung angetroffen. Die Hauptfarbe war dunkel aschgrau, an der Brust weiß gesprenkelt.

35. Die Brillen-Ente. (Schwarze Ente: Black D.)

Anas perspicillata. LIN. I. p. 201. 25. Ed. XIII. I. 2. p. 524. No. 25. a) — Phil. Trans. vol. LXII. p. 417.

La grande Macreuse de la Bay d'Hudson. BRISS. orn. VI. p. 425. No. 30.

La Macreuse à large bec. BUFF. ois. IX. p. 244.

Canard du Nord, appelé le Marchand. Pl. enlum. 995.

Great black Duck from Hudson's Bay. EDW. Nat. Hist. pl. 155. b)

Br. Mus. Lev. Mus.

Sie hat die Größe der Sammet-Ente (Nr. 37), ist ein und zwanzig Zoll lang und wiegt zwey Pfund und zwey Unzen. Ihr Schnabel ist auf den Seiten eingedrückt; die Wurzel der obern Kinnlade erhebt sich in einen Knopf von gelblicher Farbe, mit einem schwarzen Fleck an jeder Seite; der übrige Schnabel ist orangefarben; der Nagel roth; die Seiten desselben, rings herum, schwarz; das Gefieder ist matt schwarz, einen großen, weißen Fleck an der Stirn, und einen andern von eben dieser Farbe am Hinterhals ausgenommen; die Füße sind roth; die Schwimmhäute dunkelbraun.

Das Weibchen ist kleiner, von rußschwarzer Farbe, und ohne den weißen Fleck am Hinterkopf; die Wangen aber sind mit zwey matt weißen Flecken bezeichnet c).

Dief

z) Latham Ind. orn. II. 847. n. 42. B.

a) Latham Ind. orn. II. p. 847. n. 42. B.

b) Seligmanns Vögel V. Taf. 50. Arct.

II. n. 483. Uebers. II. S. 516. Nr. 401. c) Arct. Zool.

Meine N. S. Deutschlands S. 475. Nr. 5.

Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 756. Nr. 25.

B.

Dies ist bloß eine Amerikanische Art ^{a)}, die längs den Küsten der Hudsons-Bay brühet, und von Gras lebt; eben daraus banet sie ihr Nest, und legt es mit Federn aus; sie legt vier bis sechs weiße Eyer, und heckt zu Ende des Julius. Die Einwohner nennen sie *Misse qua gu ta wow*. Im Winter geht sie südlich bis Südkarolina herunter, und läßt sich auch oft in Neuport sehen, wo sie von Einigen Wasserhuhn (Coot) genannt wird. Unsere letzten Seereisenden haben sie in Prinz Wilhelms Sund angetroffen ^{e)}.

36. Die Trauer-Ente. (Scoter D.)

Anas nigra. LIN. I. p. 196. 7. Ed. XIII. I. 2. p. 508. No. 7. f) — Faun. Suec. No. 110. — MÜLLER Zool. No. 110.

La Macreuse. BRUSS. orn. VI. p. 420. No. 28. pl. 38. fig. 2. — BUFF. pois. IX. p. 234. pl. 16. — Pl. enlum. 978.

Scoter, or Black Diver. RAI Syn. p. 141. A. No. 5. — WILL. orn. p. 366. pl. 74. — Br. Zool. II. No. 273. — Arct. Zool. No. 484. g)

Lev. Mus.

Diese ist etwas kleiner als die Sammet-Ente. Ihre Länge beträgt zwey und zwanzig Zoll, und ihr Gewicht zwey Pfund, neun Unzen. Die Wurzel des Schnabels ist mit einem Knopf, wie bey der vorigen, versehen, der roth, und längs der Mitte durch einen gelben Streifen getheilt ist; die Farbe des Schnabels ist oben gelb, schwarz eingefasst, und die untere Kinnlade ganz schwarz; die Augenlieder sind gelb; die Augen schwarz; das Gefieder über und über schwarz; Kopf und Hals glänzend; die untern Theile matt; die Füße braun ^{b)}.

Das Weibchen hat keinen Knopf an der obern Kinnlade; seine Farben sind matt; am Kinn und in der Mitte der Brust sind einige aschfarbene Federn unter die schwarzen gemischt; außerdem ist es wie das Männchen ^{c)}.

Diese Art findet sich im Winter an den nördlichen Küsten von England und Schottland ^{d)}, nirgends aber so häufig, als an den Französischen Küsten, wo man sie vom November bis in den März, in ungeheurer Menge sieht, besonders wenn Nord- oder Nord-West-Wind weht. Ihre hauptsächlichste Nahrung ist eine glänzende zweyschalige, fast einen Zoll lange, Muschel, die von den Franzosen *Vaimeaux* genannt wird; nach dieser taucht sie beständig unter, oft auf einige Klaftern tief; und dieß giebt zu der gewöhnlichen Methode, sie zu fangen.

U 93 3

a) Sie muß auch im nördlichen Europa angetroffen werden, da man sie an den deutschen Küsten der Ostsee bemerkt hat. B.

e) Gook's last. Voy vol. II. p. 378.

f) Latham Ind. orn. II. 848. n. 43. B.

g) Uebers. II. S. 517. Nr. 402. Meine N. S. Deutschl. II. S. 373. Nr. 4. Besetzte Vögel Eurlands S. 41. Nr. 70. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 714. Nr. 7. B.

b) Das Männchen hatte kein Labyrinth an seiner Luftröhre. Willughby.

i) Willughby (orn. p. 367.) giebt die Beschreibung eines ihm zugeschickten Weibchens, dessen „Kopf und Hals, an beyden Seiten, bis zu den Augen, weiß war.“

k) Nach Deutschland kommt sie im Winter nebst andern Entenarten auf die unbeseyten Teiche. B.

zu fangen, Unlaß, indem man nämlich Netze unter das Wasser stellt, an Orte, wo diese Muscheln am häufigsten angetroffen werden; und auf diese Art werden dreyßig bis vierzig Duzend auf Einen Zug gefangen. Diese Vögel scheinen den Tag bloß durch Tauchen, und auf kleine Entfernungen über das Wasser zu fliegen, zuzubringen, und zwar fliegen sie so niedrig, daß sie oft die Füße ins Wasser tauchen. Sie verschlingen ihre Nahrung ganz, und verdauen die Schalen bald, die man ganz zu Staub zerrieben unter den Excrementen findet. Man hat sie einige Zeit lang zahm gehalten, und kann sie mit eingeweichten Brod füttern. Ihr Fleisch hat einen außerordentlichen Fischgeschmack, und ist deswegen bey den Römisch-Katholischen an Fasttagen und zur eigentlichen Fastenzeit zu essen erlaubt; und dazu gehört in der That schon eine hinlängliche Selbstverläugnung.

Diese Vögel sind in allen nördlichen Gegenden des festen Landes, in Lapland, Schweden, Norwegen und Rußland, in Menge zu Hause, auch finden sie sich in großer Zahl an den großen Seen und Strömen des nördlichen und östlichen Sibiriens, so wie an den See Küsten. Sie sind auch in Nordamerika zu Hause; denn man hat sie in Newyork angetroffen ¹⁾; und aller Wahrscheinlichkeit nach, sind sie auch noch weiter gegen Norden dieses Landes und Asiens. Osbeck ^{m)} hat sie im 30sten und 34sten Grad S. Br. zwischen den Inseln Java und St. Paul im Junius angetroffen.

37. Die Sammet-Ente. (Velvet D.)

- Anas fusca. LIN. I. p. 196. 6. Ed. XIII. 1. 2. p. 507. No. 6. n) — Faun. Suec. No. 109. — Scop. ann. 1. No. 68. o) — BRÜNN. orn. No. 48. — MÜLLER Zool. No. 109. — FRISCH av. tab. 165. — GEORGI Reise p. 166.
Turpan. Nov. Comment. Acad. Petrop. vol. IV. p. 420.
La grande Macreuse. BRISS. orn. VI. p. 422. No. 29. — Pl. enlum. 956.
La double Macreuse. BUFF. ois. IX. p. 242.
Great black Duck. BAI Syn. p. 141. A. No. 4. — WILL. orn. p. 363. pl. 70.
Velvet Duck. Br. Zool. II. No. 272. pl. 96. — Arct. Zool. No. 482. p)
Lev. Mus.

Sie ist etwas größer, als die wilde Ente, und etwas über zwanzig Zoll lang. Ihr Schnabel erhebt sich an der Wurzel in einem Knopf, hinter den Nasenlöchern, wo er schwarz ist; der übrige Schnabel ist gelb, am Ende mit einem rothen Nagel; die Ränder, ringsher um schwarz; das Gefieder überhaupt schwarz, am Bauch und After ins Braune ziehend; unter jedem Augenlied ist ein weißer Fleck, der in einem Streifen hinter die Augen hinzieht; und quer über die Mitte der Flügel läuft ein weißes Band; die Füße sind roth; die Klauen schwarz.

Das

1) Arct. Zool.

n) Voy. vol. I. p. 120.

m) Latham Ind. orn. II. p. 848. n. 44. B.

o) Uebers. v. Günther I. S. 62. Nr. 68. B.

p) Uebers. II. S. 712. Nr. 6. Meine N. S. Deutschlands II. S. 568. Nr. 2. Lepechin

Tageb. der Rinf. Reise III. S. 14, Naturforscher XXV. S. 10, Nr. 14 Neue Schwedische Abb. VI. S. 189. Pontoppo dan N. S. v. Norweg. II. S. 143. Danksdorfs Zool. Beytr. II. S. 712. Nr. 6. B.

Das Weibchen ist da braun, wo das Männchen schwarz ist, und die Erhabenheit an der Wurzel des Schnabels fehlt.

Herr Hutchins hat mir die Beschreibung eines Vogels mitgetheilt, den ich für eine Spielart von obigem halte: Seine Länge ist sechzehn, seine Breite sieben und zwanzig Zoll, und sein Gewicht ein und zwanzig Unzen. Der Augenstern ist schmutzig weiß; die Stirn dunkelbraun; der Scheitel schwarz; unter jedem Auge ein großer weißer Fleck; der Hals rostigbraun; die Schulterfedern und die obern Deckfedern des Schwanzes schwarz; die Brust schwarz schattirt; der Bauch weiß; bey jungen Vögeln schwarz.

Sie ist im Sommer in der Hudsons-Bay zu Hause, wo sie brütet. Ihr Nest besteht aus Gras; der Eyer sind vier bis sechs, und von weißer Farbe; sie heckt im Julius. Ihre Nahrung ist Gras. Man kennt sie unter dem Namen *Eus Ust qua tum*. Im Winter zieht sie nach Süden. Um diese Zeit sieht man sie häufig bis Newyork gegen Süden; und unsere letzten Weltumsegler haben sie auf Unalasccha angetroffen ¹⁾).

Hin und wieder sieht man sie auch an den Küsten von England, sie ist aber nicht gemein. Häufiger ist sie auf dem festen Lande, und in Dänemark und Rußland zu Hause; in einigen Gegenden Sibiriens ist sie sehr gemein, und steht auch unter der Liste von Vögeln, die sich in Kamtschatka vorfinden. Zur Brütezeit geht sie sehr weit ins Innere des Landes, um Eyer zu legen, deren acht bis zehn sind, und deren Farbe weiß ist. Nach Ablauf dieser Zeit, sollen die Männchen wegziehen; die Weibchen aber bleiben noch da, bis die Jungen flücke sind, wo dann beyde miteinander fortziehen, wohin aber ²⁾), weiß man nicht genau ³⁾). Ich glaube sie wird in Kamtschatka, Turpan genannt; wiewohl sie in größerer Menge zu Ochotska ist, besonders zur Tag- und Nachtgleiche. Funzig oder noch mehr von den Eingebornen steigen in Boote, umringen den ganzen Flug und treiben ihn, zur Zeit der Flut, den Fluß Ochotska hinauf; sobald nun die Ebbe eintritt, so fällt die ganze Gesellschaft auf Einmal mit Prüekeln über sie her, und schlägt ihrer oft so viele tod, daß jeder Mann zwanzig oder dreyßig auf seinen Theil bekommt ⁴⁾).

Die ¹⁾ Trauer- (Nr. 36) und die Sammet-Ente (Nr. 37) sind einander im Gefieder sehr ähnlich; die letzte unterscheidet sich hauptsächlich durch das weiße Zeichen unter dem Auge, und ein Band von eben dieser Farbe über die Flügel; im Innern aber sind sie sehr verschieden; Das Männchen der Trauer-Ente hat gar kein Labrynth, oder eine Erweiterung der Luftröhre an irgend einer Stelle; die Sammet-Ente hingegen hat einen sehr auffallenden Geschwulst (swelling), von rundlicher Form, ohngefähr von der Größe einer kleinen Wallnuß, und ohngefähr zwey Drittheile so lang; wiewohl an dem Eingang in die Lungen kein eigentliches Labrynth, sondern nur eine Erweiterung ist.

38. Die

¹⁾ Ellis's Narrat. vol. II. p. 43.

²⁾ Im Winter hat man sie in Oesterreich angetroffen. B.

³⁾ Nov. Comm. Petrop. vol. IV. p. 421. — Arct. Zool.

⁴⁾ Hist. Kamtsch. p. 160.

⁵⁾ Zus. a. d. Suppl. S. 274.

Neunte Ordnung. Schwimmvögel.¹

38. a. Die Kragen-Ente. (Harlequin D.)

Das Männchen.

Anas histrionica. LIX. I. p. 204. 35. Ed. XIII. I. 2. p. 534. No. 35. *) — BRÜNN.
orn. No. 84. 85. — MÜLLER Zool. No. 127. — Faun. Groenl. No. 46. —
GEORGI Reise p. 166. — Phil. Trans. vol. LXII. p. 417. — FRISCH av.
tab. 157.

Brimond OLAFSEN Iceland. vol. II. tab. 34.

Le canard à collier du Terre Neuve. BRISS orn. VI. p. 362. No. 14. — BUFF.
ois. IX. p. 250. — Pl enlum. 798.

Stone Duck. Hist. Kamtsch. p. 160.

Dusky et Spotted Duck. Edw. Nat. Hist. pl. 99. y)

Harlequin Duck. Arct. Zool. No. 490. z)

Br. Mus. Lev. Mus.

Sie hat die Größe der Pfeif-Ente *). Ihre Länge ist Ein Fuß, fünf Zoll; ihre Breite sechs und zwanzig Zoll und ihr Gewicht achtzehn und drey Viertel Unzen, Apothekergewicht. Ihr Schnabel ist anderthalb Zoll lang, und schwarz; der Augenstern rußbraun; die Stelle zwischen dem Schnabel und den Augen weiß, bey Einigen gelblich, oder saffranfarben ^{b)}, und erstreckt sich etwas über die Augen hinauf und über sie hinaus; der Scheitel ist schwarz, und mit einem röhrlchen Streifen eingefast; zu beyden Seiten des Halses ist eine weiße Perpendikular-Linie, und über dieser ein weißer Fleck; ausserdem ist der ganze Hals schwarz; um die Brust läuft ein weißes Brustband, das hinten am breitesten, mit schwarzen Tupfeln bezeichnet, und mit einem schwarzen Bande eingefast ist; zwischen diesem und den Flügeln ist ein quere stehendes, weißes Zeichen; die Brust unter dem Brustband, ist bläulich aschfarben; der Rücken dunkelbraun, ins Purpurfarbene ziehend; der Steiß dunkel blauschwarz; Bauch und Schenkel schwarz; die Seiten matt orangefarben; an beyden Seiten des Schwanzes ein weißer Fleck; die großen Schwungfedern dunkel aschfarben, einige mit weißen Spitzen; der Schwanz braun; die Füße bläulich schwarz. Bey Einem dieser Vögel fanden sich zwey schwarze Strelchen am Nagel zu Ende des Schnabels, die gleich dem Buchstaben V auseinander giengen, den Winkel gegen die Spitze gekehrt ^{c)}.

38. b. Die Kragen-Ente. (Harlequin D.)

Das Weibchen.

Anas minuta LIX. I. p. 204. 36. Ed. XIII. I. 2. p. 534. No. 36. d) — BRÜNN.
orn. No. 86. — Faun. Groenl. No. 46.

La

- | | |
|--|--|
| a) <i>Anas histrionica</i> . (mas.). Latham Ind. orn. II. p. 849. n. 45. B. | a) Wigeon s. unten Nr. 63. u. f. A. Penelope etc. L. |
| y) Seltmanns Vögel IV. Taf. 93. B. | b) Müller. |
| z) Uebers. II. S. 520. Nr. 408. Egede Besch. | c) Brännich. |
| 9. Grönl. S. 122. Meine N. G. Deutschl. II. S. 672. Nr. 9. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 775. Nr. 35. B. | d) <i>Anas Histrionica</i> (femina) Latham I. c. B. |

Zwey und neunzigste Gattung. Ente:

421

La Sarcelle de la Baye d'Hudson. BRISS. orn. VI. p. 469. No. 41.

Le Canard brun. BUFF. ois. IX. p. 252. — Pl. enlum. 1007.

— — et blanche. BUFF. l. c. p. 287. — Pl. enlum. 799.

Little brown et white Duck. EDW. Nat. Hist. pl. 157. c) — GATESY Carol. vol. I pl. 98.

Lev. Mus.

Ihre Länge ist dreyzehn und ein halber Zoll. Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern außbraun; die Stirn und die Stelle zwischen Schnabel und Augen, weiß; am Ohr ist ein Fleck von der nämlichen Farbe; Kopf, Hals und Rücken sind braun, am hellsten der Vorderhals; der obere Theil der Brust und der Steiß gelbrothbraun; der untere Theil der Brust und der Bauch hellgelbroth und weiß gestreift; der untere Theil des Bauchs aber, und die Schenkel gelbroth und braun gestreift; die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel gelbrothbraun; die äußere, größere, schwärzlich; Schwungfedern und Schwanz dunkelbraun, letzterer ins Gelbrothe ziehend; die Füße dunkelbraun.

Die zwey hier beschriebenen Arten sind Männchen und Weibchen, und finden sich beyde in der alten, und in der neuen Welt; in jener sieht man sie gegen Süden, bis an den See Baikal, und von da an bis nach Kamtschatka, besonders auf dem Fluß Schotska; auch in Island und bis nach Sandmor herab f). In Amerika, von Carolina bis Neufundland g) und Hudsons-Bay; auch in Grönland; hier besucht sie den Sommer hindurch die Buchten und Flüsse, besonders die Mündungen derselben, aber nicht in großer Menge, und ist ein sehr lauter Vogel. Sie liebt schattige Plätze, und baut ihr Nest an die Küste unter Gesträuch. Ihre Nahrung sind kleine Schaalthiere, Roggen der Fische, und besonders die Mücken-Larven. Im Winter sieht man sie auf den benachbarten Seen. Sie schwimmt gut, selbst in den reißendsten Strömen, und taucht zur Verwunderung unter h); auch fliegt sie schnell, und sehr hoch, deswegen ist sie nicht leicht zu fangen. Unsere letzten Weltumsegler haben sie auf Unalaska angetroffen i).

Sie ist sehr häufig auf den kleinen Flüssen der Hudsons-Bay, ohngefähr neunzig Meilen landeinwärts; selten auf großen Flüssen. Sie hat eine pfeifende Stimme. Sie legt zehn oder mehr weiße Eyer, wie die Laubeneyer, ins Gras. Die Jungen sind sehr artig gesprengelt. Im

e) Seeltgmanns Vogel V. Taf. 52. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 776. Nr. 36. Meine N. G. Deutschlands. II. S. 673. Nr. 20. Da ich sie im December immer allein auf den Thüringischen Teichen angetroffen habe, so habe ich sie für eine besondere Art gehalten; denn das Männchen der Krageente kommt, wie ich weiß, bloß an die Deutschen Küsten. - D.

f) Arct. Zool.

g) Die Fischer dieses Landes nennen sie den Lorb. Edwards.

h) Die Einwohner von Kamtschatka machen sich dieß zu Nutzen; denn da diese Vögel nicht im Angesicht der Leute aufsteigen, so folgen sie ihnen dicht bis ans Wasser; und wenn sie sie denn ermüdet haben, so schlagen sie sie ohne Schwierigkeit mit Prügeln todt. Hist. Kamtsch.

i) Ellis's Narrat. vol. II. p. 43 — Sie wird daselbst die gemalte Ente genannt.

Im Herbst zieht sie nach Süden. Ihr Name, in der Algonguinschen Sprache, ist Powissic ou sheep ^{k)}).

39. Die braune Ente. (Brown D.)

Anas fuscescens. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 534. No. 104. l)

Brown Duck. Arct. Zool. No. 499. m)

Ihre Länge ist sechzehn Zoll. Ihr Schnabel ist groß, an der Wurzel dick, bläulich, mit einer schwarzen Spitze; die Nasenlöcher stehen am Ende desselben; Kopf und Hals sind sehr hellbraun; der untere Theil des Halses und die Brust eben so, mit rostfarbenen Rändern; die Flügel aschgrau; der Spiegel blau, mit weißen Spitzen; Schwanz und Füße dunkelbraun.

Sie ist in Neufundland zu Hause.

40. Die buntschnäblige Ente. (Spotted-billed D.)

Anas poeilorhyncha. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 535. No. 105. n) — Zool. Ind. p. 23. tab. 13. o)

Ihre Größe ist nicht angegeben. Ihr Schnabel ist lang und schwarz, und an der Wurzel zu beiden Seiten mit einem rothen Flecken bezeichnet; die Spitze weiß; vom Schnabel zwischen den Augen hindurch läuft ein schwarzer Streifen; die Wangen, das Kinn und der angrenzende obere Theil des Halses sind aschgräulich weiß; der Scheitel, der Nacken, der Hinterhals, der Rücken, die Deckfedern der Flügel, die großen Schwungfedern und der Schwanz schwarz, mit aschfarbenen Rändern; die kürzern Schwungfedern weiß; der Spiegel grün, und die Federn weiß gerändert ^{p)}; der After schwarz; die Füße rothgelb.

Sie ist in Ceylon, in Ostindien, zu Hause, wo sie ein gemeiner Vogel ist.

41. Die Damiatische Ente. (Damiatta D.)

Anas damiatica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 535. No. 106. q)

Anas

k) Herr Hutchins.

Var. A. Die Ente mit dem Halsbande.

Anas torquata. Gmel. Lin. Syst. I. p. 514 No. 70. S. & Gmelins Reise II. S. 180. Taf. 14.

Anas histrionica varietas maris. Latham Ind. orn. I. c. β.

Sie ist schw. 13; Schläfe, ein Streifen über und unter den Augen und das Halsband weiß; die Seiten des Halses kastanienbraun. Sie ist eine Varietät des Männchens der Kragente,

und unterscheidet sich bloß durch den weißen Streif. Sie wohnt am Caspischen Meere. B.

l) Latham Ind. orn. II. 849. n. 46. B.

m) Uebers. II. S. 526. Nr. 417. B.

n) Latham Ind. orn. II. p. 487 n. 40. B.

o) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 777. Nr. 105. B.

p) Eigentlich oben mit Weiß und unten mit Schwarz und Weiß eingefärbt. B.

q) Latham Ind. orn. II. 850. n. 48. B.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

423

Anas domiatica grisea, rostro apice plano lato rotundo. HASSELQ. Voy. p. 264. r) Black-headed Duck. SHAW's Trav. p. 254?

Sie ist etwas größer als die wilde Ente. Der Kopf, der Hals zur Hälfte, die Schultern und die Schwanzspitzen sind schwarz; der übrige, vordere Hals, die Brust, der Bauch, die Seiten und der Schwanz weiß; am untern Theil des Halses, zunächst am Rücken, ist ein rostfarbener halber Mond; und die Enden der Flügel sind von der nämlichen Farbe am Rücken; die Schwungfedern grünlich schwarz; die hintere Klaue sehr stumpf.

Sie ist an den Küsten von Egypten zu Hause; am häufigsten an jenen am Mittelländischen Meere, vorzüglich in der Bucht bey Damietta, und zwischen Alexandrien und Sossetta, wo man sie in Netzen fängt. Sehr wahrscheinlich ist sie auch ein Bewohner der Barbaren, weil sie dem von Shaw beschriebenen Vogel nicht sehr unähnlich, wo nicht der nämliche, ist.

42. Die Nil-Ente. (Nilotik D.)

Anas nilotica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 508. No. 62. s) — HASSELQ. Voy. p. 365. No. 36. t)

An Größe steht sie zwischen der spitzschwänzigen Ente (Nr. 22) und der gemeinen Gans mitten innen, ist aber höher von Beinen. Der Nagel des Schnabels ist schimmelgrau; der Rand des Schnabels mit einem Callus eingefast, der etwas erhoben, gleich und purpurblutroth von Farbe ist; ein zweyter umgiebt die Wurzel, der auch etwas erhoben, matt purpurfarben, und mit vier Warzen, an jeder Seite zwey, versehen ist; der Augenstern gelb; die Kehle, die Seiten des Halses, der Scheitel und ein Strich hinter den Augen, sind weißlich, mit schimmelgrauen oder aschgrauen Flecken; Brust, Bauch und Schenkel weißlichbraun, mit dunkelbraunen Querstichen durchzogen; die Seiten der Brust und des Bauchs mit länglichen, schimmelgrauen Strichen bezeichnet; der Schwanz etwas lang und abgerundet; die Füße roth; die Klauen schwarz.

Sie ist auf dem Nil, in Ober-Egypten, zu Hause, sonst aber nirgends, außer vielleicht an den Buchten des rothen Meeres. Die Araber nennen sie Bah^u). Sie ist leicht zu zähmen, und lebt unter anderm Hausgeflügel in Egypten. — Obiger Vogel scheint mit der Bisam-Ente (Nr. 31) verwandt zu seyn.

H h h 2

43. Die

r) Dessen Reise nach Paläst. S. 318. Nr. 35. B.

s) Latham Ind. orn. II. 750. n. 60. B.

t) Dessen Reise nach Palästina. S. 919. Nr. 36. B.

u) Ohne Zweifel ist dieß die Art, die Poccocke, Bauk, nennt, und die, wie er sagt, nach England verschickt, unter dem Namen der Baw Gans bekannt ist. Trav. vol. I. p. 210.

43. Die gemeine Ente. (Mallard).

a. Die wilde Ente.

- Anas Boschas. LIN. I. p. 205. 40. Ed. XIII. I. 2. p. 538. No. 40. *) — FAUN. Suec. No. 131. — Phil. Trans. vol. LXII. p. 419. — SCOP. ann. I. No. 77. y) — BRÜNN. orn. No. 87. — MÜLLER Zool. No. 128. — KRAM elench. p. 341. No. 11. — FRISCH av. tab. 158. 59. — GEORGI Reise p. 166. — FAUN. Groenl. No. 47. — FAUN. Arab. p. 3. No. 9.
 Le Canard sauvage. BRISS. orn. VI. p. 318. No. 4. — BUFF. ois. IX. p. 115. pl. 7. 8. — Pl. enlum. 776. 77. — FERMIN. Surin. vol. II. p. 156.
 Wild Duck. RAI Syn. p. 145. A. z. p. 150. 1. — WILL. orn. p. 308. pl. 72. 75. — ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 10. (das Männchen) vol. I. pl. 99. (das Weibchen). — Br. Zool. II. p. 279. pl. 97. — Arct. Zool. No. 494. z)
 Br. Mus. Lev. Mus.

Diese Art ist, sowohl im wilden, als im zahmen Stande, bekannt genug; daher ist es hinlänglich, wenn ich nur sage, daß die wilde fast zwey Fuß lang, und dritthalb Pfund *) schwer ist. Ihr Schnabel ist grünlichgelb, Kopf und Hals sind glänzend schillernd grün; am untern Theil des Halses ist ein weißes Halsband, das fast rings um den Hals herum geht; die Schulterfedern sind weiß, und mit kleinen, braunen Strichen gestreift oder vielmehr wellenförmig durchzogen; der Rücken ist braun; der Steiß schwarz, mit grünem Glanze; an den Deckfedern der Flügel ist ein weißer Querstreifen, der mit einem zweiten, schwarzen, eingefast ist, und unter diesem der Spiegel, oder der große, violettgrüne, glänzende Fleck; der untere Theil des Halses und der Brust ist kastanienbraun; der Bauch hellgrau, mit zahlreichen, dunkelbraunen Querstichen durchzogen; der Schwanz besteht aus zwanzig Federn, und ist zugespitzt; die zwey mittlern sind grünlich schwarz, und krümmen sich beträchtlich aufwärts; die andern sind wie gewöhnlich, und von graubrauner Farbe, mit weißen Rändern; die Füße orangefarben.

Das Weibchen ist sehr einfach; die Grundfarbe des Gefieders ist hell röthlichbraun, mit schwarzen Flecken; der Spiegel an den Flügeln eben so; aber die Schwanzfedern nicht gekrümmt, wie bey dem Männchen.

Die wilden Enten halten sich an sumpfigen Plätzen in vielen Gegenden unsers Königreiches auf, nirgends aber in größerer Menge, als in Lincolnshire, wo jährlich eine ungeheure Menge auf unsern Entenheerden gefangen ^{b)} werden; denn jeder Heerd zählt von fünf bis

*) Latham Ind. orn. II. p. 850. n. 49. S.

y) Uebers. v. Günther I. S. 68. Nr. 77. B.

z) Uebers. II. S. 524. Nr. 412. Meine N.

S. Deutschl. II. S. 682, Nr. 1. a. Cers

st N. S. v. Sardin. II. S. 334. Fermin

Beschr. v. Surin. II. S. 136. Pallas Reis

se III. S. 91 — 93. Dessen nord. Beytr.

III. S. 10. Stellers Kamtschatk. S. 190.

Pontoppidan N. S. von Danemark. S.

168. Nr. 18. Donndorfs Zool. Beytr.

II. S. 785 Nr. 40. B.

a) Dies ist das gewöhnliche Gewicht; aber in Ehtlesford der Entenheerd (decoy, in Suffolk, sind im Jahr 1781 wilde Enten gefangen worden, die 3 1/2 Pfund wog n.

b) Nur in zehn Entenheerden, in der Nachbarschaft von Watnfleet, sind in Einem Jahr 31,200 gefangen worden, Br. Zool.

bis zu zwanzig Pfunden jährliche Renten ^{c)}. Sie paaren sich im Frühjahr, und legen zehn bis sechzehn Eyer; was aber England betrifft, so brütet wohl nur ein kleiner Theil da; denn die ungeheure Menge Enten, die man im Winter sieht, im Vergleich mit denen, die man im Sommer antrifft, läßt vermuthen, daß der größere Theil eine nördlichere Gegend um diese Zeit ausucht. Bey uns paaren sie sich, wie gesagt, im Frühjahr, und brüten auf jedem niedrigen sumpfigen Boden; legen zehn bis sechzehn Eyer, und die Jungen gehen ins Wasser, sobald sie ausgebrütet sind. Es ist ein sehr künstlicher Vogel, und er bauet sein Nest nicht immer dicht ans Wasser, sondern nicht selten in einer ziemlichen Entfernung ^{d)} davon, und in diesem Fall nimmt die Ente ihre Jungen in den Schnabel, oder zwischen die Beine ^{e)}. Man weiß, daß sie zuweilen ihre Eyer auf einem hohen Baum, in ein verlassenes Eistern- oder Krähenest legen ^{f)}; und man hat mir auch einen Fall erzählt, wo man eine Ente, zu Etchingham, in Suffex, auf einer Eiche, fünf und zwanzig Fuß hoch vom Boden, über ihren Eyern sitzend, gefunden hat; die Eyer waren durch kreuzweis übereinander gelegte, kleine Zweige unterstützt ^{g)}.

In Frankreich läßt sich diese Art nicht oft sehen, außer im Winter; sie erscheint im October, und zieht im Frühjahr nach Norden. Man fängt sie da auf verschiedenen Arten, worunter auch der in England gebräuchliche Heerdfang gehört. Der hauptsächlichste Platz hierzu ist die Piccardie ^{h)}, wo eine ungeheure Menge gefangen wird, besonders am Flusse Somme. Es ist auch daselbst gebräuchlich, den Flügen aufzupassen; die über gewisse Plätze wegziehen, und alsdann läßt der Jäger, mit einem von Weiden geflochtenen Käfig versehen, worin eine gewisse Zahl zahmer Vögel enthalten ist, Einen davon, zu einem schicklichen Zeitpunkt, los, der dann die vorüberziehenden in den Schuß lockt; und auf diese Art werden von einem geschickten Jäger oft fünf oder sechs auf Einmal erlegt. Hin und wieder werden sie auch mit einer Angel, die mit einem Stückchen Schöpsentalg befördert ist, gefangen; dieser schwimmt auf dem Wasser, der Vogel verschlingt den Köder, und zugleich die Angel mit. Gewissen Vögellern sind noch verschiedene andere Methoden, Enten und Gänse zu fangen, eigen, wovon Eine, ihrer Sonderbarkeit wegen, angeführt zu werden verdient: Ein Mann, der Enten zu fangen wünscht, wadet bis ans Kinn ins Wasser, und den Kopf mit einem hohlen

Hhh 3

Kürbis

c) In Sommersetshire hat Einmal Einer bis zu dreißig Pfund bezahlt. Br. Zool. — Die Einrichtung dieser Enten-Heerden, und die Behandlungsart derselben, kann man ausführlich in Willughby's Ornithologie (S. 372 73) sehen. S. auch Br. Zool Art Mallard — In der Biblioth. Topogr. Galean No. II. part. 1. p. 359 finde ich einen Auszug aus der Antiq. Society of Spalding, der den Entenfang betrifft, und folgendermaßen lautet:

„Beim Entenfangen am letzten Donnerstag, wurden 174 Duzend wilde Enten, oder Entenche (Drakes) im Waufern. gefangen; und am Montag 46 und 1/2 Duzend; in Allem 2646 Vögel.“

d) In Thüringen zuweilen mitten im Walde weit vom Wasser entfernt. B.

e) Dieß habe ich nie gesehen, wohl aber begeben sie einem mitten im Walde, wo sie dann die Wege aussuchen, und so noch dem Wasser gehen. Nur wenn sie auf einen hohen Baum brüten, nehmen sie die Jungen im Schnabel und tragen eines nach dem andern ins Wasser; steht der Baum aber in dem Wasser, so stoßen sie sie auch wohl heraus, daß sie hinein fallen. B.

f) Salerne Orn. p. 428.

g) Herr Linnæus.

h) Zu Einem Heere brauchte man für 3000 Thiers Neger. Hist. des Ois. vol. IX. p. 128.

Kürbis bedeckt, nähert er sich dem Orte, wo die Enten sind; diese, auf einem Gegenstand dieser Art gar nicht achtend, lassen ihn gerne unter sich mischen; alsdann hat er nichts weiter zu thun, als eine nach der andern bey den Beinen unter das Wasser zu ziehen, bis er genug hat; hierauf geht er, ohne Argwohn bey den übrigen zu erregen, wieder zurück, als wenn er zum Erstenmale unter sie käme. Diese Methode wird häufig am Ganges angewandt indem man sich der irdenen Geschirre der Hindus, statt der Kürbisse bedient; es sind dieß nämlich diejenigen Gefäße in denen die Hindus ihren Reiß kochen, und die Rutharee Töpfe (Kutcharée pots) genannt werden (sie machen auch eine Schüssel auf ihren Tafeln daraus, die den nämlichen Namen führt) wenn diese nun Einmal gebraucht sind, so betrachten sie sie als besetzt, und werfen sie gewöhnlich als unnütz in den Fluß; die Entenfänger finden sie bequem zu ihrem Zweck, weil die Enten, die diese Gefäße beständig den Strom herab schwimmen sehen, sie für einen eben so unbedeutenden Gegenstand halten, als einen Kürbis. Obige, oder eine ähnliche Methode, wird auch in China angewandt ⁱ⁾, so wie in Indien; auch auf der Insel Ceylon ^{k)}. Auf die nämliche Art werden auch die wilden Gänse in Südamerika gefangen ^{l)}. Einige Schriftsteller sagen, sie bedienten sich eines hohlen hölzernen Gefäßes, mit Löchern zum durchsehen, das sie auf den Kopf setzen ^{m)}.

Die Chineser machen starken Gebrauch von den Enten, ziehen aber die wilde Art nicht vor, da sie gemeiniglich sehr große Liebhaber von den zahmen sind; und man sagt, der größere Theil derselben, würde durch künstliche Wärme ausgebrütet; die Eyer würden nämlich, in mit Sand angefüllten Kisten, auf einem Ziegelheerd gesetzt, dem während der zum Ausbrüten nöthigen Zeit, eine angemessene Wärme gegeben wird. Die jungen Enten werden mit kleinen Bachkrebßen und Krabben, die gesotten, klein geschnitten, und hernach mit gekochtem Reis vermengt werden, fett gemacht; und in Zeit von vierzehn Tagen versorgen sie sich selbst, wo sie dann die Chineser mit einer alten Stiefmutter versehen, die sie dahin führt, wo sie Nahrung für sich finden können; sie werden nämlich zuerst an dem Bord einer Sampane (Sampane) oder eines Boots gesetzt, das zu ihrer Wohnung bestimmt ist, und von da aus geht der ganze Zug, oft zu drey bis vier Hunderten, nach Fütterung aus, und kommt auf das Commando-Wort wieder zurück. Diese Methode wird neun Monate hindurch befolgt, (denn in den kältern Monaten thut sie nicht gut) und ist so gewöhnlich, daß man sie überall sehen kann; besonders aber zu der Zeit, wenn der Reiß geschnitten und das Korn eingesammelt wird, wo dann die Besitzer der Enten-Sampanen den Strom auf und ab rudern, bis sie Gelegenheit finden Futter einzusammeln, das sich zur Zeit der Ebbe an den Reisplantagen, welche dann vom hohen Wasser überschwemmt sind, in Menge findet. Es ist sonderbar anzusehen, wie die

i) du Halde. Hist. Chin. vol. II. p. 142. pl. in p. 162.

k) M. S. im Britischen Museum, 3324.

l) Zu Carthagena, gegen Osten vom Monte de la Popa, in einem großen See, mit Namen Cirurpa de Tesco, wo die wilden Gänse in einem Abend in großen Flügen ankomen. Ulloa's Voy. vol. I. p. 53.

m) Sympson Voy. to the East-Ind. — G. Naval Chron. vol. II. p. 473. mit einer Kupferplatte dieses Inhalts. Auch: Ind. Zool. p. 12. und Zool. Ind. p. 21. — Ponce erwähnt dieses Umstandes, scheint ihm aber keinem Glauben beyzumessen. Trav. vol. I. p. 210.

die Enten ihrem Herrn gehorchen; denn einige Tausende, die zu den verschiedenen Booten gehören, fressen im Freyen auf Einem Plage, und auf ein gegebenes Zeichen folgen sie ihrem Führer zu den ihnen zugehörigen Sampanen, ohne daß man einen Ueberläufer unter ihnen antrifftⁿ⁾. Noch außerordentlicher ist dieß, wenn wir die Menge der bewohnten Sampanen^{o)} am Tigris betrachten, deren, wie man annehmen darf, nicht weniger, als vierzig Tausend, sind, die in Reihen dicht aneinander vor Anker liegen, mit einem schmalen Zwischenraum, für die Boote die den Strom auf und abpassiren. Der Tigris, zu Canton, ist etwas breiter, als die Themse zu London, und der ganze Strom ist, wenigstens auf eine Meile breit, auf diese Art bedeckt^{p)}.

Ich habe obige Nachricht unter dem Artikel: wilde Ente (Mallard), eingeschaltet, in der Voraussetzung, daß dieß die Art ist, welche so gemein ist. Osbeck erwähnt zweyer mit Namen, nämlich Einer die Hina-a, und einer andern die Koogo-o genannt wird; letztere beschreibt er aber nicht, weil er sie nicht gesehen hat, wiewohl er bemerkt, es fänden sich gewisse wilde Enten daselbst in solcher Menge, daß sie die Fischer im Hernausnehmen der Fische aus den Netzen, sehr beunruhigen^{q)}.

43. b. Die zahme Ente. (Tame D.)

Anas domestica. LIN. I. p. 206. 40. β Ed. XIII. I. 2. p. 538. No. 113. r)

Le Canard domestique. BRISS. orn. VI. p. 308. No. 1.

Common tame Duck. RAII Syn. p. 150. No. 1. p. 191. No. 10. — WILL. orn. p. 180. pl 75. — BROWN jam. p. 480. — SLOANE jam. p. 323. No. 7. —

ALBIN Nat. Hist. vol. III. pl 99.

Br. Mus. Lev. Mus. s)

Unter obigem Namen wird die wilde (Mallard) und die gemeine Ente (Duck), als Hausgeflügel verstanden; wovon keine regelmäßige Beschreibung gegeben werden kann, weil die

n) Dieß ist mir verschiedenumale versichert worden. Es wird auch von vielen Schriftstellern erzählt, worunter nachzusehen: Osbeck Voy. vol I. p. 194 — Toreen Voy. vol. II. p. 255.

o) Sampane ist der gemeinschaftliche Name für die Boote; von den bewohnten enthält jede eine eigene Kammer, deren einzige Wohnung sie ist; und sehr viele Chineser bringen fast ihre ganze Lebenszeit auf dem Wasser zu.

p) Cook's last Voy. vol III. p. 433.

q) „Ich war erstaunt zu sehen, sagt er, wie die Chineser, die ihre Netze ins Wasser gelegt hatten, beständig schossen, ohne auf irrend et was zu zielen; bey dem Nachfragen aber erzählte man mir, sie müßten ihre Fischereyen beständig bewachen und die Enten hinwegscheuchen, welche ausserdem die Netze eher aus-

leeren würden, als die Fischer es könnten. „Ich habe nie dergleichen furchtlose und zahlreiche Flüge von Enten gesehen, als hier; „Ein Flug nach dem Andern kam, trotz des Lärms, der auf allen Seiten gemacht wurde, „und wollte sich bey den Netzen niederlassen; sie wurden aber beständig auf obige Art davon verhindert.“ Osbeck Voy. vol. II. p. 33. — Ob dieß die Sampane-Enten waren, oder nicht, wird nicht gesagt; er sagt aber ausdrücklich, sie seyen unsern Enten nicht ähnlich gewesen.

r) Latham Ind. orn. II. 851. n 49. β B.

s) Meine N. G. Deutsch II. S. 705. Nr. 1. b Donndorffs Zool. Beytr. II. S. 782. Nr. 113. B.

die Spielarten ins Unendliche gehen, fast eben so, wie bey dem zahmen Hühnervieh. Da sie ohnehin uns allen beständig vor den Augen ist, so würde ich kaum im Stande seyn etwas mehr zu sagen, was nicht jede Hausfrau auf dem Lande, oder die unterste Magd, in diesem Punkte, oder in der Lebensart dieses so bekannten Vogels, schon wüßte *).

43. Var. A. Die Stör-Ente.

Anas Boschas, major. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 538. No. 40. d. u)
Le grand Canard sauvage. BRISS. orn. VI. p. 326. A. x)

Diese unterscheidet sich von der gemeinen dadurch, daß sie größer, und zwey Fuß, sechs Zoll in die Länge, und drey Fuß, neun Zoll in der Breite mißt. Sie ist im Gefieder wie die vorige, den Rücken ausgenommen, der rußfarben ist. Wo ich nicht irre, so wird diese Spielart von Einigen die rothschimmelige Ente (Roan Duck) genannt.

43. Var. B. Die Schmal-Ente.

Anas Boschas, grisea. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 538. No. 40. 2. y)
Le grand Canard sauvage gris. BRISS. orn. VI. p. 326. B. z)

Sie hat die Größe der letztern, ihr Gefieder aber ist aschfarben, der Schnabel und die Füße schwarz.

43. Var. C. Die Roß-Ente.

Anas Boschas, naevia. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 538. No. 40. 2. a)
Le grand Canard sauvage tacheté. BRISS. orn. VI. p. 327. C. b)

Diese ist wie die gemeine, wilde Ente, unterscheidet sich aber von ihr, durch einen schwarzen, röthlich gefleckten Rücken.

43. Var. D. Die Krummschnäblige Haus-Ente. (Hook-billed D.)

Anas adunca. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 538. No. 41. c)
Le Canard à bec courbé. BRISS. orn. VI. p. 311. No. 2.
Hook-billed Duck. RAN. Syn. p. 150. No. 2. — WILL. orn. p. 381. pl. 75. —
ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 96. 97. — vol. III. pl. 100. d)

Diese

*) Noch ist zu bemerken, daß es sehr viele Hausentzen giebt, die in allen Stücken der wilden Stammart gleich sehen.

z) Latham I. c. 7. B.

x) Meine N. G. Deutsch. a. a. O. S. 704. Var. 1. B.

y) Latham I. c. p. 851. 2. B.

z) Meine N. G. Deutsch. a. a. O. Nr. 2. B.

a) Latham I. c. 2. B.

b) Meine N. G. Deutsch. a. a. O. Nr. 2. B.

c) Latham I. c. 2. B.

d) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 781. Nr. 41. Meine N. G. Deutsch. II. S. 719. Nr. 2. B.

Diese ist im Gefieder, im Bau und in der Größe nicht verschieden von den gemeinen, wilden Enten, und kommt auch in allen Spielarten, die die zahme Ente macht, vor; sie unterscheidet sich aber durch den Schnabel, der etwas länger und abwärts gebogen ist.

Dies scheint eine bloße Spielart der gemeinen Ente zu seyn, und sie brütet eben so gut, im zahmen Zustande. In England scheint man sie bloß der Seltenheit wegen zu halten; man hat mir aber gesagt, sie sey in einigen Gegenden Deutschlands sehr gemein, und ihre Zucht vertreibe fast die gemeine Ente *). Bankroft erwähnt, in seiner Geschichte von Guiana (S. 170), einer wilden Ente, die größer, als die zahme, und ihr ähnlich ist, den Schnabel ausgenommen, der schwarz, und am Ende gekrümmt ist; Beine und Füße sind aschfarben. Sie findet sich, sagt er, zur Regenzeit in Menge an den Ufern der Flüsse, nicht weit von der See vor.

Es ließen sich auch noch andere Spielarten anführen, als: Enten mit Federbüschen auf den Köpfen; andre, bey denen einige Schwungfedern der zweyten Reihe aufwärts gebogen sind, und die vierflügeligen Enten *) genannt werden; auch fehlen nicht selten einer oder zweyen von einer Brut die Schwimmhäute zwischen den Zehen, da andere von der nämlichen Brut sie vollständig haben **).

44. Die Krummschnäblige Ente. (Curve-billed D.)

Anas curvirostra. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 537. No. 112. b) — PALLAS Spicil. VI. p. 33. i)

Sie hat die Größe der wilden Ente, wenn sie nicht größer ist. Ihr Schnabel ist wie bey dieser, aber abwärts gebogen; der Augenstern rothgelb; die Hauptfarbe des Gefieders schwarz, matter an den Schwungfedern und untern Theilen; Kopf, Hals und Steiß glänzend grau überlaufen; an der Kehle ein eyrunder, weißer Fleck; die fünf äußern Schwungfedern weiß

e) Ich glaube eben so, wie Hr. Latham, daß dieß bloß eine ausgezeichnete Spielart der gemeinen Ente sey, sonst müßte sie nach Pallas zur folgenden Art gehören. Allein mir scheint, wie wenn die Krummschnäblige Ente (Nr. 44) des Hrn. Pallas auch weiter nichts als eine hierher gehörige Varietät der gemeinen sey. Die Zeichnung des Gefieders macht keinen Unterschied. Da diese Varietät in Thüringen sehr häufig ist, und wegen ihrer Schönheit, (da sie meist gelbweiß ist), und Wohlgeschmacks geschätzt wird, so habe ich sie lange beobachtet, allein in der Lebensart nicht eine Spur entdecken können, die sie als besondere Art recht fertigte. B.

f) Eine Gans dieser Art s. in Gentl. Magaz. vol. XXV. pl. opposite fig. 2.

g) Hierher gehört auch die Bemerkung, daß es Bastarde mit der Bisamente, krummschnäbligen Hausente und den Haushühnern, giebt, welche die gemischten Kennzeichen von beyderley Stammeltern haben. Da letztere einen sehr ungestalteten Schnabel bekommen, so können sie nur von großen Haufen fressen. B.

h) Latham Ind. orn. II. p. 852. n. 50. B.

i) Pallas N. S. merkwürdiger Thiere VI. S. 39. Dondorfs Zool. Voyt. II. S. 790 Nr. 112. B.

weiß, die andern schwarz, die äußerste der zweyten Reihe am äußern Rand, am Ende, weiß eingefasst, die äußern Ränder überhaupt aber haben einen blauschwarzen Glanz, der einen Spiegel von dieser Farbe an den Flügeln bildet; der Schwanz ist wie bey der wilden Ente, mit den zwey zurückgebogenen Federn in der Mitte.

Obige Beschreibung war von einem Exemplar im ehemaligen Museum des Herrn Broeg, das jetzt zerstreut ist, und in dem Museum des Prinzen von Oranien. Herr Palz las hält sie für keine Spielart von der wilden Ente mit dem krummen Schnabel, sondern für eine eigene Art ^{k)}.

45. Die Ente mit weißen Augenbraunen. (Supercilious D.)

Anas superciliosa. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 537. No. 111. ^{l)}

Sie hat fast die Größe der wilden Ente, und ein und zwanzig Zoll Länge. Ihr Schnabel ist dritthalb Zoll lang, bleifarbig mit einer schwarzen Spitze; die Hauptfarbe des Gefieders ist aschbraun, die Ränder der Federn sehr blaß; über den Augen ein weißer Streifen; unter diesem ein zweyter, der breiter ist, als der erste; Kinn und Vorderhals sind schmutzigweiß; der Spiegel an den Flügeln bläulichgrün, und in einem schwarzen Strich eingeschlossen; die Füße dunkel aschfarben.

Sie ist in Neu-Seeland zu Hause, und findet sich sowohl in Charlotten-Sund, als in Duffy-Bay vor. Man kennt sie dort unter dem Namen He-turvera. — Aus den Gemälden des Hrn. Jos. Banks.

46. Die schädfige Ente. (Pied D.)

Anas labradoria. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 537. No. 110. ^{m)}
Pied Duck. Arct. Zool. No. 488. ⁿ⁾

Sie hat die Größe der wilden Ente, und ist neunzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist zwey und ein Viertel Zoll lang, an der Wurzel und um die Nasenlöcher, ohngefähr ein Drittel seiner Länge, orangefarben, die untere Kinnlade schwärzlich; Kopf und Hals gelbrochlich weiß, die Federn auf dem Scheitel erheben sich in eine schmale Schärfe (ridge), über deren Rücken ein schmaler, schwarzer Streifen bis zum Nacken herabläuft; um die Mitte des Halses läuft ein schwarzes Halsband, das längs der Mitte, am Hinterhalse, bis an den Rücken herabsteigt; die Schulterfedern sind weiß; einige der innern haben schwarze Ränder, und krümmen sich über die Flügel herab; Rücken und Schwanz sind braun; die kürzern Schwanzfedern weiß; die größern schwärzlich; an der Brust ist ein weißes Band; der Bauch ist wie der Rücken, aber heller; die Füße sind gelb; die Schwimmhäute braun.

Das

^{k)} Siehe meine Anmerkung zu Nr. 43. Var. D. ^{m)} Latham Ind. orn. II. 859. n. 67. ^{B.}

ⁿ⁾ Uebers. II. S. 519. Nr. 406. ^{B.}

^{l)} Latham Ind. orn. II. 852. n. 51. ^{B.}

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

431

Das Weibchen hat den Schnabel wie das Männchen; das Gefieder an den obern Theilen ist schmutzig gesprenkelt braun; an den Flügeln ist ein weißer Fleck, der von den Spitzgen der kürzern Schwungfedern herrührt, die diese Farbe haben; die untern Theile sind schmutzigweiß; die Füße schwarz.

Sie ist an der Küste von Labrador zu Hause, woher ein Paar in die Sammlung des Herrn Jos. Banks kam. Die in der Arktischen Zoologie beschriebene kam aus Connecticut in Neuengland. Herr Pennant vermutet, diese Art sey Eine und ebendieselbe mit den kleinen, geschächten Enten, die im Flug, oder beim Fressen, pfeiffen, und die Laysen.) in ganzen Flügen am westlichen Arm der Bucht bey Cap. Fear angetroffen hat.

47. Die Herbst-Ente. (Rothschnäblige Pfeif-Ente. Red-billed Whistling D.

Anas autumnalis. LIN. I. p. 205. 39. Ed. XIII. I. 2. p. 537. No. 39. p) — JACQUIN's Beytr. p. 6. No. 4.

Le Canard Siffleur d'Amerique. BRISS. orn. VI. p. 400. No. 23. pl. 38. fig. 1.

Le Siffleur à bec rouge et narines jaunes. BUFF. ois. IX. p. 183. — Pl. enlum. 826.

Red-billed whistling Duck. EDW. Nat. Hist. pl. 194. q)
Lev. Mus.

Sie hat die Größe der Pfeif-Ente, und ist ein und zwanzig Zoll lang. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang, roth, mit einem schwarzen Nagel; der Augenstern rufbraun; der Scheitel kastanienbraun; der Nacken kastanienbraun gestreift; die Seiten des Kopfs und die Kehle schmutzig weiß; der untere Theil des Halses gelbroth kastanienbraun; die Brust und die Stelle zwischen den Schultern gelblich aschfarben, am hellsten aber an der Brust; alle Federn der beyden letzten Theile haben gelbliche Ränder; Rücken und Schulterfedern sind kastanienbraun; die innern Deckfedern der Flügel aschfarben, ins Gelbrothe ziehend; die größern Deckfedern aschfarben; die Schwungfedern schwarz, die mehrsten aber an der Wurzel weiß, wodurch ein schiefer Streifen von dieser Farbe, an den Flügeln, entsteht; der Unterrücken, der Stelß, der Schwanz, der Bauch, und die Stelle unter den Flügeln, sind schwarz; die untern Deckfedern des Schwanzes schwarz und weiß gesprenkelt; die Füße gelb; die Klauen schwarz; die Hinterzehe sehr lang.

Sie ist in Westindien zu Hause. Ich habe auch ein Exemplar gesehen, das aus Capenne kam. Sie ist lebendig nach England gebracht worden.

Der *) Schnabel ist bey jungen Vögeln schwarz. — Diese Art ist zu Neugranada, in Südamerika, sehr gemein, und wird zwischen den Wendezißeln häufig zahm auf den Hühnerhöfen gehalten, sie ist aber sehr zankstüchtig, und fliegt oft davon. Die Spanier nennen sie *Pilefic*, wegen ihrer Stimme; die Engländer. Haupt-Ente (Main Duck). Sie wird häufig nach Europa gebracht, und hat sich in einem Vogelhause zu Schönbrunn in Schweden, fortgepflanzt.

Zii 2

48. Die

o) Hist. Carol. p. 148.

q) Seligmanns Vogel VI. Taf. 89. B.

p) Latham Ind. orn. II. p. 852. n. 52. B.

r) Zup. a. d. Suppl. S. 274.

48. Die Baum-Ente. (Die Schwarzschnäblige Pfeifente. Black billed wh. D.)

Anas arborea. LIN. I. p. 207. 44. Ed. XIII. I. 2. p. 540. No. 44. rr)

Le Canard Siffleur de la Jamaïque. BRISS. orn. VI. p. 403. No. 24. — Pl. en-
lum. 804.

Le Siffleur à bec noir. BUFF. ois. IX. p. 185.

Black-billed whistling Duck. EDW. Nat. Hist. pl. 193. s) — RAN Syn. p. 192.
No. 12. — SLOANE Jam. p. 324. tab. 272. — BROWN Jam. p. 480. — Arct.
Zool. No. 49. r).

Br. Mus. Lev. Mus.

Diese Ente ist kleiner, als die wilde, und steht sehr hoch auf den Beinen; ihr Hals ist auch lang und dünn. Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern rußbraun; der Scheitel schwärzlich, am rothbraunen Hintertheil mit einem kleinen Fede busche versehen; der Hinterhals braun; Rücken und Schulterfedern eben so, die Federn aber gelbroth gerändert; der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes dunkler; die Seiten des Kopfs und die Kehle weiß; der Vorderhals weiß, mit schwarzen Flecken; die Brust hell gelbroth, und ebenfalls schwarz gefleckt; Bauch, Schenkel und After so ziemlich wie der Vorderhals, aber mit kleinern Flecken, und am zahlreichsten an den Seiten; die Deckfedern der Flügel gelbroth, mit schwarzen Flecken; Schwungfedern und Schwanz schwärzlich; die Füße bleifarben; die Klauen schwarz.

Sie ist in Jamaika zu Hause, wo sie wegen ihres Pfeifens merkwürdig ist. Sie soll auf Bäume nisten. Zu gewissen Jahreszeiten zieht sie nach Guiana. Man hält sie für eine sehr gute Speise. Ich habe eine Ente dieser Art aus Jamaika erhalten, und einige Zeit lang in meinem Garten ernährt; sie war aber im höchsten Grade wild, und wollte auf keine Weise vertraut werden. Vermuthlich besucht sie im Winter Carolina, wenigstens haben Lawson *) und Catesby **) eine Ente gleiches Namens an diesen Küsten angetroffen. Zuverlässig ist sie nicht das andere Geschlecht von der vorigen Art. Eine, im Britischen Museum, führte den Namen: Opana Ente (Opano Duck); welchen Namen man ihr, wie mir gesagt worden, in Guiana beylegt.

49. Die Bergente. (Scaup D.)

Anas Marila. LIN. I. p. 196. 8. Ed. XIII. I. 2. p. 509. No. 8. — Faun. Suec.
No. 111. — Phil. Trans. vol. LXII. p. 413. — BRÜNN. orn. No. 50. 51.

— MÜLLER Zool. No. 111. — FRISCH av. tab. 193. — GEORGI Reise p. 166.

Anas subterranea. SCOP. ann. I. No. 83? z)

Le petit Morillon rayé. BRISS. orn. VI. p. 416. No. 26. A.

Scaup

rr) Latham Ind. orn. II. 852. n. 53. B.

s) Seligmanns Vögel VI. Taf. 88. B.

z) Uebers. II. S. 522. Nr. 410. Bantroft

Beschreibung von Guiana. S. 102. Donn

vorfs Zool. Beytr. II. S. 792. Nr. 44. B.

*) Hist. Carol. p. 149.

*) Hist. Carol. Append. p. 37. — Arct. Zool.

7) Latham Ind. orn. II. 853 54. B.

z) Uebers. v. Günther I. S. 72. Nr. 83. B.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

433

Scaup Duck. RAI Syn. p. 142. A. 6. — WILL. orn. p. 365. — Br. Zool. II. No. 275. pl. 100. — Arct. Zool. No. 498. a)
 Lev. Mus.

Die Länge dieser Art ist achtzehn Zoll, die Breite neun und zwanzig, und das Gewicht ein Pfund, sieben Unzen. Der Schnabel ist zwey Zoll lang, am Ende am breitesten, bleifarben, an der Wurzel am hellsten, der Nagel schwarz; der Augenstern schön goldfarben, der Kopf dicht befiedert, und nebst dem Hals, mit grünem Glanz; der untere Theil des Halses und die Brust schwarz; Rücken und Schulterfedern hellgrau, mit sehr artigen, zahlreichen, wellenförmigen, schwarzen Querstichen; der Unterrücken, der Steiß und der After schwarz; die Deckfedern der Flügel mit artigen, abwechselnden schwärzlichen und weißen wellenförmigen Strichen gestreift, und zwar so zart, daß sie in einiger Entfernung mit diesen beyden Farben bestäubt zu seyn scheinen; die zehn großen Schwungfedern graulich aschfarben, die vier äußern an den äußern Fahnen dunkelschwarz; die sechs andern graulich weiß, die Enden von allen aber schwarz, von der eilften bis zur zwanzigsten sind sie weiß, mit dunklen Enden, und dieß bildet einen breiten, weißen Streifen an den Flügeln; die fünf zunächst am Körper stehenden sind dunkelbraun, und dieß ist auch die Farbe des Schwanzes; die untern Theile des Körpers, von der Brust an, sind weiß, zwischen den Beinen und an den Seiten über den Schenkeln dunkelbraun bestäubt; die Füße hell bleifarben; Schwimmhäute und Klauen schwarz. Diese Vögel sollen in der Farbe sehr variiren, besonders am Kopf und Hals ¹⁾.

Das Weibchen wiegt bey zwey Unzen mehr, als das Männchen ²⁾, und hat einen schmutziggelben Augenstern ³⁾.

Sie sind in Island, so wie in den mehr nördlich gelegenen Gegenden des festen Landes von Europa, als in Lapland, Schweden, Norwegen und Rußland zu Hause ⁴⁾. Sehr häufig am Fluß Ob. Sie brüten im Norden, und ziehen im Winter nach Süden. In Amerika sind sie bis zur Hudsons-Bay zu Hause, wohin sie im May kommen und im October

III 3

ber

- a) Uebers. II. S. 526. Nr. 6. Meine N. G. Deutschlands II. S. 649. Nr. 8 Taf. 23. Pontoppidan N. G. v. Dänemark. S. 167. Nr. 3. *Anas fraenata*. Museum Carls. II. tab. 38. Das Weibchen. Ray's Lettres p. 61. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 717. Nr. 8. B.

- b) Besonders an Kopf und Hals, so daß man unter einem Haufen von 40 oder 50 kaum zwey vollkommen übereinfindet. Willughby.

- c) Arct. Zool.

- d) Die Zaunente.

Anas fraenata. Mus. Carls. II No. 38.

Sie ist 15 Zoll lang. Der Schnabel ist schwarz, etwas breit; der Kopf braun, an der Schnauze mit einem Zaun oder einer weißen Binde umgeben; der Hals rothfarben; die

Schultern, der Rücken, und der Schwanz sind bräunlichrothfarben; die Seiten der Brust und die Wangen mit kleinen weißlichen Punkten besetzt; die Brust ist von dunkelbraun und weiß gemischt; der Bauch ist von seidenvortigem weiß, hinten schmutzig bräunlichweiß; die zehn ersten Schwungfedern schwarz, die andern weiß, an der Wurzel mit den schwarzen Deckfedern bedeckt, daher ein kleiner weißer Spiegel entsteht; der Schwanz ist zugerundet; die Füße sind schwarz.

Man trifft sie im Aland an, und sie wird von einigen Jägern für das Weibchen der Berg-Ente gehalten. B.

- e) Ich habe sie in Deutschland geschossen, und die Jäger kennen sie unter dem Namen *Morante*, sehr gut. B.

ber wieder weg. In England finden sie sich im Winter, in kleinen Flügen, vor. — Ich habe sie von der Küste von Suffolk bekommen. Sie sollen von Schaalthieren leben, die Scaup heißen, daher ihr Name f).

Wenn Scopoli's f). oben angeführter Vogel der nämliche ist, so sind sie in Krain sehr gemein, am Zirchnicher See, wo sie ihre Nester in unterirdische Höhlen ans Ufer machen; der nämliche Schriftsteller bemerkt, sie würden von den Landleuten oft in erstaunlicher Menge mit Prügelein erlegt; man treibt sie nämlich bey hellem Sonnenschein, um Mittag, aus ihren Höhlen, wodurch sie so geblendet werden, daß sie weder Widerstand leisten, noch davon fliegen können.

49. Var. A. *Anas Marila*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 509. No. 8. f. b)
Le Millouinan. BUFF. ois. IX. p. 221. — Pl. enlum. 1002.

Sie hat die Größe der letzten, und ist ein und zwanzig Zell lang. Ihr Schnabel ist bläulichschwarz; Kopf, Hals und Brust sind schwarz mit grünem Bronzeglanze, das um die Augen herum ins kupferfarbene spielt; der untere Theil der Brust und der Bauch weiß; der Rücken, die Schulterfedern, die kleinen Deckfedern der Flügel und die Stelle zwischen den Beinen, mit artigen schwarzen und schmutzigweißen Querstichen gestreift; der Unterrücken, der Afters und der Schwanz schwarz; die größern Deckfedern der Flügel halb schwarz, halb weiß; die kürzern Schwungfedern so ziemlich eben so, die großen schwärzlich; die Füße schwarz.

Diese wurde in Frankreich, an der Küste der Piccardie, erlegt. Buffon erwähnt noch einer zweiten, die er aus Louisiana erhalten hat, die aber etwas kleiner ist. Der Abbildung nach scheint sie bloß eine Spielart der Berg-Ente zu seyn.

50. a. Die Bläßen-Ente. (White faced D.)

Das Männchen.

Anas discors. LIN. I. p. 205. 36. Ed. XIII. I. 2. p. 535. No. 37. f)

La Sarcelle d'Amerique. BRISS. orn. VI. p. 452. No. 35.

— — Soucrourou BUFF. ois. IX. p. 279. — Pl. enlum. 966. Das Männchen.

White-faced Teal. CATESBY CAROL, vol. I. pl. 100. h) — BROWN, Jam. p. 481.
— Arct. Zool. No. 503. i)

LEV. Mus.

Ste

f) Willughby.

g) Sein Vogel ist kleiner, als die wilde Ente; der Schnabel braun; das Gefieder oben braun; unten weiß; der Schwanz weiß, mit braunen Spitzen; die Schwungfedern an der innern Seite weiß; die Füße braun. Er vergleicht ihn mit

der Berg-Ente, wiewohl er sagt, er sey nicht völlig der nämliche Vogel.

h) Latham I. c. f. B

i) Latham Ind. orn. II. 854. n. 55. B.

k) Seltsamanns Vögel IV. Taf. 100. B.

l) Uebers. II. S. 529. Nr. 426. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 777. Nr. 37. B.

Sie hat die Größe zwischen der Kriek. ^{m)} und Pfeif-Ente ⁿ⁾, und ihre Länge ist funfzehn und ein Viertel Zoll. Ihr Schnabel ist schwarz; der Scheitel eben so; die Wurzel des Schnabels schwarz eingefasst; zwischen dem Schnabel und den Augen ein weißer Streifen, der sich zu beiden Seiten des Kinns endigt; der übrige Kopf und Hals sind glänzend grün, ins Violette spielend; der Rücken braun, mit unregelmäßigen, grauen Querstichen wellenförmig gezeichnet; der untere und vordere Theil des Halses, die Brust und der Bauch hell gelbroth, mit dunkeln Flecken; der After schwarz; die Deckfedern der Flügel blau, unter diesen ein weißes Band; der Spiegel grün; Schwungfedern und Schwanz braun; die Füße gelb.

50. b. Die Bläffen-Ente. (White-faced D.)

Das Weibchen.

Anas discors. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 535. No. 37. ^{o)}
 La Sarcelle de Virginie. BRISS. orn. VI. p. 455. No. 36. ^{p)}
 La Sarcelle de Soucrourette. BUFF. ois. IX. p. 280.
 La Sarcelle de Cayenne. PL. enlum. 403.
 Blue-winged Teal. CATESBY Carol. vol. I. pl. 99. ^{q)}
 Lev. Mus.

Das Weibchen ist etwas kleiner, als das Männchen. Sein Schnabel ist der nämliche; Kopf und Hals sind braun, mit hellgrau melirt; der Rücken von dunklerem Braun, und die Federn weißgelblich gerändert; Brust und Seiten eben so, aber heller; Bauch und After hellgelblich braun; die Schulterfedern dunkelschwarz; die Deckfedern der Flügel hellblau, der Spiegel grün, zwischen denselben ein schmaler, weißer Streifen; Schwungfedern und Schwanz schwärzlich; die Füße dunkelgelb.

Diese Vögel sind auf dem festen Lande Amerikas zu Hause ^{r)}, aber nicht weiter nördlich, als bis Newyork. Catesby bemerkt, sie kämen im August nach Carolina, lebten von Reis, und blieben bis zum Oktober da; und wenn es an Reis fehlte, so fielen sie auf den wilden Hafer; und besuchten die Teiche und die frischen Wasser. Ihr Fleisch wird für delikates gehalten, weil es mehrentheils sehr fett ist. — Sie finden sich auch in Guiana und Cayenne.

50. Var.

^{m)} Teal s. unten No. 88-99.

ⁿ⁾ Wigeon s. unten No. 63 — 65. A. Penelope etc. L.

^{o)} Latham l. c. ^{g.} B.

^{p)} Da Brisson von seiner Sarcelle d'Amerique und Virginie das Weibchen kannte, so ist noch nicht ganz ausgemacht, ob die beiden hier Nr. 50. a und 50 b beschriebene Vögel bloß als Geschlechtsverschiedenheiten angesehen werden müssen. Wären es verschiedene Arten, so schlägt Hr. Vorkhausen, der mir einen

Vogel (Nr. 50 b) aus den Darmstädtschen Cabinette beschreibt, den Namen Anas dissinis vor. Dieser Vogel war oben grünbraun, unten trübweiß und graubraun gefleckt; der Spiegel grün, oben her zwischen dem Spiegel und dem blauen Felde, eine weiße Binde. B.

^{q)} Seligmanns Vögel II. Taf. 98. B.

^{r)} Die Amerikanische Brandgans (Shell Drake) und Blaßflügel (Blue wing), übertreffen alle andern Arten von Enten; und diese sind in ungeheurer Menge dort. BORN. Trav. p. 16.

50. Var. A. *Anas discors*. L. I. 2. p. 535. No. 37. y. 1)

Ihre Länge ist vierzehn, ihre Breite zwey und zwanzig Zoll, und ihr Gewicht vierzehn Unzen. Ihr Schnabel ist Einen Zoll lang, schmal und schwarz; der Augenstern blau; Stirn und Scheitel glänzend schwarz, die Federn etwas lang; an den Ohren sind schmutzigweiße Flecken; der Hinterhals ist braun; die Schulterfedern und die kleinen Deckfedern der Flügel dunkelblau, die größern blau, mit einem weißen Flecken an den Enden; die großen Schwungfedern dunkelblau, die kürzern außen weiß, inwendig dunkelblau; Kehle und Bauch weiß; Brust und After blau; der Schwanz schwarz; die Füße blau.

Obige Spielart kommt im Junius nach Hudsons Bay, und zieht im Oktober weg. Sie legt zehn kleine, weiße Eyer auf Baumstrünke, an Teichen; und baut kein Nest, sondern macht bloß ein Loch in das faule Holz; sie brütet im Julius; die Jungen werden von der Mutter im Schnabel, wenn sie ausgekrochen sind, ins Wasser getragen. Sie leben von Gras im Grunde der Teiche; und fliegen oft gerade über der Oberfläche. Man kennt sie unter dem Namen *Wam pew ne way se pis*, oder geschäckte Ente 1).

51. Die Brand-Ente. (Shioldrake). 2)

Anas Tadorna. LIN. I. p. 195. 4. Ed. XIII. I. 2. p. 506. No. 4. *) — Faun. Suec. No. 113. — BRÜNN. orn. No. 47. — MÜLLER Zool. No. 107. — FRISCH av. tab. 166. — GEORGI Reise p. 165.

La Tardorne. BRISS. orn. VI. p. 344. No. 9. pl. 33. fig. 2. — BUFF. ois. IX. p. 205. pl. 14. — PL. enlum. 53.

Sheldrake, or Burrough Duck. RAI Syn. p. 140. A. c. — WILL. orn. p. 363. pl. 70. 71. — ALBIN Nat. Hist. vol. I. pl. 94. — Br. Zool. II. No. 278. — Arct. Zool. p. 572. D. y)

Br. Mus. Lev. Mus.

Sie hat die Größe der wilden Ente, ist zwey Fuß lang, und zwey Pfund, zwey Unzen schwer. Ihr Schnabel ist am Ende stark aufwärts gebogen, sehr breit, und roth; an der Wurzel ein erhabener Knopf; die Nasenlöcher, und der Nagel am Ende des Schnabels, schwarz; Kopf, Kehle und Vorderhals grünlichschwarz; der übrige Hals, der Rücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes weiß; an der Brust ist ein gelbroth-faustanbraunes Band, das, indem es schmaler wird, unter die Flügel hinläuft, und rings um den Oberrücken herum; die Mitte der Brust, der Bauch und der After sind schwärzlich und weiß mellt; die Seiten

1) Latham l. c. β. B.

2) Hr. Hut chins.

*) Man nennt sie gewöhnlich Brandgans; ihre Gestalt hat aber mehr Aehnlichkeit mit einer Ente. B.

*) Latham Ind. orn. II. 854. n. 56. B.

y) Uebers. II. S. 532. D. Lapechin Tageb. I. S. 189. Pallas Reise Auszug II. S.

271. III. S. 373. Dessen nordische Beytr. III. S. 12. IV. S. 22. Dessen N. S. merkw. Thiere VI. S. 8. 42. Pontoppidans N. S. von Dänemark. S. 167. Nr. 2. Dessen N. S. von Norwegen II. S. 141. Schriften der Berliner naturf. Gesellsch. III. S. 373. T. 7. Fig. 3. 4. Meine N. S. Deutschl. II. S. 570. Nr. 3. B.

Seiten der zwey letzten weiß; die Schulterfedern schwarz; die Deckfedern der Flügel weiß; einige der äußern, die Aferflügel und die Schwungfedern schwarz; einige Schwungfedern zum Theil schwarz, zum Theil weiß; der Spiegel goldgrün, mit Kupferglanze; der Schwanz weiß, die äußerste Feder auf jeder Seite ausgenommen, die schwarze Spitzen hat; die Füße roth.

Das Weibchen ist kleiner, als das Männchen, im Gefieder aber nicht wesentlich verschieden, außer daß die Farben nicht so lebhaft sind.

Diese Art ist in vielen Gegenden Englands, in der Nähe der See, gemein, und hält sich das ganze Jahr bey uns auf ²⁾. Sie brütet in verlassenem Kaninchenhöhlen, oder nimmt sie in Abwesenheit der Eigentümer in Besitz, die, statt einen Versuch zu machen, die ungebetenen Gäste herauszutreiben, andre Höhlen bauen; wiewohl diese Vögel auch, in Ermangelung eines fertigen Aufenthalts sich selbst Höhlen graben. Das Weibchen legt funfzehn bis sechzehn ³⁾ rundliche, weiße Eyer, ans vordere Ende der Höhle, bedeckt sie mit Pflaumsfedern, die es sich aus der Brust ausrußt und brütet ohngefähr dreißig Tage. Die Jungen gehen, sobald sie ausgekrochen sind, ins Wasser, und schwimmen zum Bewundern gut. Die Mutter ist sehr besorgt für sie, bedient sich mancher List, damit sie entweichen können, wenn sie in Gefahr sind, und trägt sie oft im Schnabel von einem Orte zum andern; dieß letztere weiß ich gewiß, weil einmal ein Junges einem erfahrenen Freund von mir, unverletzt vor die Füße gefallen ist, während die Mutter über seinen Kopf wegflog. Die jungen Vögel bekommen ihr volles Gefieder nicht vor dem zweyten Jahre. Man kann ihre Eyer einer zahmen Ente ausbrüten lassen, und die Jungen sehr leicht aufbringen, aber sie bekommen nach einigen Jahren gern die Oberhand über das andere Hausgeflügel, und ich habe einige gesehen, die so böse wurden, daß sie alles anfielen, was ihnen in den Weg kam. Im Stande der Natur scheint ihre Nahrung hauptsächlich aus kleinen Fischen, See-Insekten, und Muscheln zu bestehen; auch hat man Vegetabilien in ihrem Magen gefunden. Im zahmen Zustande fressen sie Brod, Körner, und Gartengewächse (greens). Ihrer nicht gemeinen Schönheit wegen, sollte man versuchen, diese Race zum Hausgeflügel zu machen; es gelingt aber nicht ganz, außer in der Nähe von Salzwasser, das einigermaßen zu ihrem Wohlbefinden nothwendig zu seyn scheint; auch ist ihr Fleisch ranzig und unschmackhaft, wiewohl ihre Eyer zu allen Zeiten für eine gute Speise gehalten worden sind.

Diese Art findet sich auch bis Island, nördlich. Im Winter besucht sie Schweden und die Orkadischen Inseln, und kehrt im Frühjahr zurück. Sie findet sich in Asien am Caspischen Meere, und auf allen Salzseen der Tatarischen und Sibirischen Wüsten ⁴⁾, so

²⁾ Nach Deutschland kommt sie im Winter. B.

³⁾ Die jüngern Vögel legen nur zwölf. Hist. des Ois.

⁴⁾ Hr. Lapechin hat, im Frühjahr, zwischen Syran und Symbyrsk, die Brandente (Shieldrake Nr. 51), Spießente (Pin-

tail, Nr. 72), Löffel-Ente (Shoveler, Nr. 55.), und andere Entenarten, in solcher Menge angetroffen, daß er sich die Ohren vor ihrem Geschrey zstopfen mußte. — Decouv. Russ. vol. I. p. 472.

so wie in Kamtschatka ^{c)}. Unsrer Reisenden, wenn sie sich nicht in der Art betrogen haben, haben sie auch auf den Falklands-Inseln ^{d)} und in Van Diemens Land ^{e)} angetroffen ^{f)}.

52. Die rothschnäblige Ente. (Crimson billed D.)

Anas erythrorhyncha. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 517. No. 79. g)

Ihre Länge ist funfzehn Zoll. Der Schnabel ist zwey Zoll lang, am Ende etwas aufwärtsgebogen, und schön dunkelfarminroth; der Augenstern roth; das Gefieder an den obern Theilen dunkelbraun, am hellsten an der Stirn; die Federn auf dem Rücken an den Rändern sehr hell; das Kinn, die Seiten des Kopfs unter den Augen, und die übrigen untern Theile weiß; die Seiten der Brust aber unregelmäßig braun gefleckt; über die Schenkel laufen schöne, braune Querstiche; an den Flügeln ist ein schmales, weißes Querband, unter diesem ein anderes, gelblichweißes; der Schwanz ist dunkelschwarz; die Füße eben so.

Sie ist auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung zu Hause.

53. Die Bahamische Ente. (Mathera D.)

Anas bahamensis. LIN. I. p. 199. 17. Ed. XIII. I. 2. p. 516. No. 17. b)

Le Canard de Bahama. BRINS. orn. VI. p. 358. No. 12.

Le Marec. BUFF. ois. IX. p. 256.

Mareca prima Marcgravii. RAN Syn. p. 149 No. 4.

The first *Mareca* of Marcgraf. WILL. orn. p. 379. § 11.

Mathera Duck. CATESBY Carol. vol. I. pl. 93. — i) — Arct. Zool. No. 495. k)

Sie hat die Größe der gemeinen Ente, und ihre Länge ist siebenzehn Zoll. Ihr Schnabel ist bleifarben, und zu beyden Seiten an der Wurzel mit einem dreieckigen, orangefarbenen Fleck bezeichnet; der Scheitel gelbrothgrau; der Hals, der Rücken, die Schulterfedern, und der Steiß gelbrothbraun; Wangen, Kehle und Vorderhals weiß; Brust, Bauch und Schenkel gelbrothgrau, mit schwarzen Flecken; die untern Deckfedern des Schwanzes einfärbig; die kleinern Deckfedern der Flügel dunkelbraun; die größern grün, mit schwarzen Spitzen; die kürzern Schwungfedern mattgelb; die großen dunkelbraun; die Füße bleifarbig.

Sie

c) Arct. Zool.

d) „Die Brandenten (Sheldrakes) schwärmen so sehr auf den Falklands-Inseln herum, daß wir, während unsre Boote unter den Felsen wegsegelten, hunderte mit unsern Ruder und Boothacken tödten.“ Perrose Voy. p. 34.

e) Cook's Voy. vol. I. p. 229.

f) In den Suppl. S. 275 steht noch der Zusatz: „Hr. Daubenton (Encyclop. method.

„vol. I. p. 341.) spricht von einer Bastardbrut zwischen der Brandente und der gemeinen Ente; sagt aber, die Produkte davon waren nicht fruchtbar.

g) Latham Ind. orn. II. p. 855. n. 57.

h) Latham Ind. orn. II. p. 855. n. 58. B.

i) Seltmann's Vögel IV. Taf. 86. B.

k) Uebers. II. S. 524. Nr. 413. Donnersdorfs Zool. Beytr. II. S. 743. Nr. 17. B.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

439

Sie ist in Brasilien zu Hause, und auch auf den Bahamischen Inseln, besonders auf einer, Namens Flathera, angetroffen worden; aber nicht häufig. Sie soll auf Bäumen sitzen und darauf übernachten; auch zieht sie nicht gegen Norden um zu brüten ¹⁾.

54. Die Brasilische Ente. (Mareca D.)

Anas brasiliensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 517. No. 78. ^{m)}

Le Canard du Bresil. BRISS. orn. VI. p. 360. No. 13.

Le Mareca. BUFF. ois. IX. p. 256.

Mareca secunda Marcgravii. RAU Syn. p. 149. No. 5.

The second Mareca of Marcgraf. WILL. orn. p. 379. § 12. ⁿ⁾

Der Schnabel ist schwarz und glänzend; der Scheitel, der obere Theil des Halses und der Rücken sind ochterfarben; zu beyden Seiten des Kopfs, zwischen dem Schnabel und den Augen, ist ein runder gelblichweißer Fleck; das Kinn ist weiß; der Vorderhals und die untern Theile sind dunkelgrau, mit einer Mischung von Goldfarbe; die obern Deckfedern der Flügel lebhaft braun, mit grünlichem Glanze; die größern braun, mit blaugrünen, äußern Rändern, und schwarzen Spitzen, wodurch zwey Bänder von diesen Farben gebildet werden; die Schwungfedern braun, mit weißen Spitzen; der Schwanz schwarz, und keilsförmig; die Füße roth.

Sie ist in Brasilien zu Hause, und scheint eine, von der vorigen nicht sehr verschiedene, Art zu seyn, weil beyde von den Brasilianern, Mareca genannt werden.

55. Die gemeine Löffel-Ente. (Shoveler.)

Anas clypeata. LIN. I. p. 200. 19. Ed. XIII. I. 2. p. 518. No. 19. ^{o)} — Faun.

Suec. No. 119. — Scop. ann. I. No. 70. ^{p)} — BRÜNN. orn. No. 77. 78. —

MÜLLER Zool. No. 117. — KRAM. elench. p. 442. No. 15. — FRISCH av. tab. 161. 163. — GEORGI Reise p. 166.]

Le Souchet. BRISS. orn. VI. p. 329. No. 6. pl. 32. fig. 1. — BUFF. ois. IX. p. 191. — Pl. enlum. 971. (das Männchen) 972. (das Weibchen).

Shoveler. RAU Syn. p. 143. A. 9. (das Männchen) p. 144. No. 13. (das Weibchen).

WILL. orn. p. 370. No. 15. (das Männchen) p. 371. No. 16. 17. (das Weibchen).

ALBIN Nat. Hist. vol. I. pl. 97. 98. — CATESBY Carol. vol. I. pl. 96. (das Weibchen) ^{q)} — Br. Zool. No. 280. — Arct. Zool. No. 485. ^{r)}

Br. Mus. Lev. Mus. ^{s)}

Rff 2

Ihre

^{l)} Arct. Zool.

^{m)} Latham Ind. orn. II. 856. n. 59. B.

ⁿ⁾ Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 744. Nr. 78. B.

^{o)} Latham Ind. orn. II. 856. n. 60. B.

^{p)} Uebers. v. Günther I. S. 63. Nr. 70. B.

^{q)} Seligm anns Vögel. IV. Taf. 92. B.

^{r)} Uebers. II. S. 517. Nr. 403. B.

^{s)} Meine N. G. Deutschl. II. S. 775. Nr. 21. Wallas nord. Beytr. IV. S. 10. Lepechin Tageb. I. S. 189, III. S. 14. Pontoppidan N. G. von Dänemark S. 168. Nr. 7. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 745. Nr. 19. B.

Ihre Länge ist ein und zwanzig Zoll, und ihr Gewicht zwey und zwanzig Unzen. Ihr Schnabel ist beynahe drey Zoll lang, und am Ende beträchtlich brekt, seine Ränder stark gezähnt, die Farbe schwarz; der Augenstern schön dunkelgelb; Kopf und Hals glänzend grün, ins Violette spielend *); der untere Theil des Halses und die Brust weiß, mit einigen wenigen Halbmondförmigen Flecken; die Schulterfedern weiß; der Rücken braun; der Bauch kastanienbraun; der Aster schwarz; die erste und zweyte Deckfeder der Flügel hellblau, die größern braun, mit weißen Spitzen, und dieß bildet ein Band an den Flügeln; die Schwungfedern braun; einige der mittlern grün gerändert, wodurch ein grüner Fleck entsteht; der Schwanz braun, mehr oder minder weiß gerändert, die äußerste Feder ganz weiß, an Gestalt keilförmig; die Füße orangefarben; die Klauen grau.

Das Weibchen ist ein wenig kleiner, aber sein Gefieder weicht stark ab; die Flügel sind fast eben so gezeichnet, aber minder lebhaft; das übrige Gefieder nähert sich dem der wilden Ente sehr; im ersten Jahr aber sind die Flügel wie der übrige Körper.

Beide Geschlechter pflegen in Rücksicht der Farbe sehr zu variiren; auch unterscheidet sich das Männchen, in seinem innern Bau vom Weibchen, indem es, gerade über der Zertheilung der Luftröhre, wo sie in die Lungen hinabsteiget, eine Erweiterung, oder wie es einige nennen, ein Labyrinth hat.

Man trifft diesen Vogel zuweilen in England, aber nicht in großer Menge an; *) Willughby erwähnt eines, der zu Crowland, in Lincolnshire, gefunden worden; und mir ist ein Männchen von dem Londner Markt geschickt worden. Ich kann nicht erfahren, ob er in England brüet; nach Frankreich aber soll er im Februar kommen *), und einige den Sommer hindurch da bleiben *). Er legt zehn bis zwölf gelbrothe Eyer, auf eine Lage von Winsen, in den nämlichen Orten mit der Sommer-Kriekente (Nr. 89), und zieht im September weg, wenigstens der größere Theil; denn im Winter sieht man selten einen. Seine hauptsächlichste Nahrung sind Insekten, nach denen er im Wasser beständig mit dem Schnabel herumstört. Er soll auch sehr geschickt die Fliegen fangen, die ihm über dem Wasser in den Weg kommen. Kleine Flußkrebse (Shrimps) hat man, nebst andern Dingen, bey der Zergliederung auch in seinem Magen gefunden.

Diese Art findet sich auch in den mehrsten Gegenden Deutschlands; im ganzen Russischen Gebiete, bis nach Kamtschatka, und in Nordamerika, den Winter hindurch, in New-York und Carolina. Bey uns rechnet man sie unter die guten Gerichte. — Ein diesem ähnlicher Vogel, wo nicht der nämliche, kommt, wie man bemerkt hat, im Frühjahr nach Hudsons-Bay, und macht ein pfeifendes Geschrey. Man kennt ihn dort unter dem Namen Minenewick.

55. Var.

*) Bey Einigen blau. Willughby.

*) Hist. des Ois.

*) Nach Deutschland kommt er im November und bleibts da bis die Teiche und Flüsse zufrieren.

y) Salerne orn. p. 421.

55. Var. A. Die Fliegen-Ente.

Anas clypeata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 518. No. 19. β 2)Anas muscaria. LIN. Syst. Nat. Ed. XII. t. 1. p. 200. No. 19. β . — RAI Syn. p. 146. — WILL. orn. p. 375. — FRISCH av. tab. 162.

Le Souchet à ventre blanc. BRISS. orn. VI. p. 337. A.

Diese unterscheidet sich von der vorigen bloß durch einen weißen Bauch, und ist eine bloße Spielart von ihr.

55. Var. B. Die Tempatlahoac-Ente.

Anas clypeata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 518. No. 19. γ .

Le Canard sauvage du Mexique. BRISS. orn. VI. p. 327. No. 5.

Tempatlahoac. RAI Syn. p. 176.

Broad-billed Bird, or Tempatlahoac. WILL. orn. p. 387.

Sie hat die Größe einer zahmen Ente. Ihr Schnabel ist breit, lang und schwarz; die Zunge weiß; Kopf und Hals grün, mit purpurfarbenem und schwarzem Glanz; der Augenstern blaß; die Brust weiß; der übrige Körper unten rothgelb, mit zwey weißen Flecken zu beiden Seiten, nahe am Schwanz; oben mit gewissen Halbcirkeln, schön gezeichnet, deren Umfang vom Weißen ins Braune spielt; und der mittlere oder innere Theil vom schwarzen ins Glänzendgrüne; die Flügel sind an ihrem Ursprunge blau, hierauf weiß, und zuletzt glänzendgrün; wiewohl ihre Endspitzen an der Einen Seite rothgelb, und an der andern glänzendgrün sind; der Umfang des Schwanzes oben und unten ist weiß; ausserdem ist er unten schwarz, und oben Pfauenfarbig.

Sie ist in Mexico zu Hause, wohin sie aus andern Ländern kommt. Ihr Fleisch ist wie das von andern Sumpfvögeln.

56. Die Mexikanische Löffel-Ente. (Mexican Sh.)

Anas mexicana. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 519. No. 81. a)

Le Souchet du Mexique. BRISS. orn. VI. p. 337. No. 7.

Yacatlahoac. RAI Syn. p. 176.

Kleiner, als die gemeine Ente. Ihr Schnabel ist sehr breit, und bräunlichroth; der Kopf, der Hals und die obern Theile sind abwechselnd rothgelb, schwarz und weiß gestreift; die kleinern Deckfedern der Flügel weiß; die größern, am weitesten vom Körper abstehenden, braun; die zunächst am Körper, goldgrün, wodurch ein breiter Fleck von dieser Farbe an den Flügeln gebildet wird; die Schwungfedern braun; der Bauch, die Schenkel und die untern

Kfl 3

Deck.

2) Anas platyrhynchos macula alari purpurea utriusque nigra alboque pectore rufescente. LIN. Syst. X. 1. p. 125. Latham

1. c β . Hierher scheint auch Anas rubens N. 57 mit falschem Schwanz zu gehören. 3) Latham Ind. orn. II. 857. n. 61. 6.

Deckfedern des Schwanzes rothgelb; der Schwanz wie die obern Theile gebändert; die Füße hellroth.

Sie ist in Mexico zu Hause.

57. Die rothbrüstige Löffel-Ente. (Red-breasted Sh.)

Anas rubens. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 519. No. 82. b)

Red-breasted Shoveler. Br Zool. II. No. 281. c)

Sie hat die Größe der gemeinen Ente. Ihr Schnabel ist groß, an den Seiten gezähnt, und durchaus von bräunlichgelber Farbe; der Kopf groß; die Augen klein; der Augenstern gelb; Brust und Kehle röthlichbraun; der Rücken braun, und dieß wird gegen die Seiten hin heller; die Spitzen der Flügel grün; die Schwungfedern braun; das Uebrige gräulichbraun; der Spiegel, oder der Fleck auf den Flügeln, purpurfarben, mit weißen Rändern; der Schwanz kurz und weiß; der After lebhaft braun, mit dunklern Flecken; die Beine kurz und dünn; die Füße klein, und röthlichbraun.

Beim Weibchen sind alle Farben matter, und der Spiegel auf den Flügeln blau.

Diese Art wird zuweilen in den Entensängen von Lincolnshire gefangen. Shaw erwähnt eines Vogels, unter dem Namen: Löffelente aus der Barbarey, der obigem sehr ähnlich zu seyn scheint, wenn er nicht der nämliche ist; aber bey Shaw's Vogel war der Spiegel blau, weiß und grün ^{d)}.

58. Die Jamaikaische Löffel-Ente. (Jamaica Sh.)

Anas jamaicensis. LIN. I. 2. p. 519. No. 83.

Sie hat die Größe der dickköpfigen Ente ^{e)}, und ist sechzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist sieben Viertel Zoll lang, sehr breit, und am Ende etwas aufwärts gebogen; die Hauptfarbe der obern Kinnlade blau; die Stelle aber, wo die Nasenlöcher sitzen, die Seiten und die ganze untere Kinnlade orangefarben; die Augen stehen sehr hoch oben im Kopf; der Augenstern ist braun; der Schüttel, mit Einschluß der Augen, schwarz; die Seiten unten, das Kinn, und die Kehle weiß, mit schwärzlichen Flecken untermengt; der obere Theil des Halses braun; der untere rings herum, die Brust und der Bauch dunkelbraun und dunkel rothfarben, ins Saffranfarbene ziehend, gestreift; der untere Theil des Bauchs, der After und der Steiß dunkelbraun und schmutzig gelbrothlichweiß gestreift; die untern Deckfedern des Schwanzes schmutzig weiß; Rücken und Schulterfedern braun, ein wenig mit ganz kleinen, gelblichen Punkten marmorirt, Flügel und Schwanz einfarbig dunkelbraun: letzterer keilsförmig und etwas lang: die Füße orangefarben.

Diese

b) Latham Ind. orn. II. p. 857. n. 62. S.

c) Gmelins Reise I. S. 69. S.

d) Trav. p. 254.

e) Russel headed D. f. unten No. 75. A. bucephala und Albecla. L.

Diese scheint einigermaßen mit der vorigen verwandt, ist aber zuverlässig eine verschiedene Art. Ich habe sie, nebst andern Vögeln, aus Jamaika erhalten, wo sie zuerst im Oktober und November erscheint, bis zum März da bleibt, und dann mit verschiedenen andern Arten wieder nach Norden zieht. Bancroft erwähnt in seiner Geschichte von Guiana (S. 170) einer Kriekente (Teal), die etwas größer ist, als die gemeine. Ihr Schnabel ist breit und schwarz; die Kopffedern weißlichbraun; die Federn des Halses, des Rückens und der Flügel graubraun, mit kastanienbraunen Flecken und Streifen melirt; Brust und Bauch matt weiß. Ich vermuthete, dieß sey der nämliche Vogel. Bancroft sagt, er halte sich an Flüssen auf, wie die wilde Ente von Guiana, und zur nämlichen Jahreszeit.

59. Die Ruder-Ente. (Ural D.)

Anas mersa. L. I. 2. p. 520. No. 84. f) — PALLAS Trav. vol. II. p. 713. No. 29. tab. H. g)

Diese ist ein wenig größer, als die gemeine Kriekente (Nr. 63). Ihr Schnabel ist groß, breit, über den Nasenlöchern sehr aufgetrieben, bey erwachsenen Vögeln zwengespalten, und das Ende mit auseinanderlaufenden (diverging) Streifen bezeichnet, die Farbe blau; der Kopf und ein Theil des Halses weiß; auf dem Scheitel ein großer, schwarzer Fleck; die Augenlider schwarz; die Mitte des Halses eben so; die vordern Theile des Körpers gelblichbraun, mit schwarzen Wellen; der Rücken mit aschgrauem und hellgelben Gewölke, und braun bestäubt; die untern Theile des Körpers und der Steiß gräulichbraun, bey manchem Lichte glänzend grau scheinend; die Flügel klein, und kein Spiegel auf ihnen sichtbar; der Schwanz etwas lang, keilsförmig, und schwarz; die Füße braun, an der vordern Seite bläulich, und stehn sehr weit rückwärts, wie bey der Gattung Taucher.

Bey dem Weibchen und bey jungen Vögeln ist der Schnabel nicht so aufgetrieben an der Wurzel, und durchaus braun; der Kopf braun; die Kehle weiß, das sich gegen den Nacken hin ausbreitet.

Diese Art ist auf den großen Seen der Ural-Gebürge, und an den Flüssen Ob und Irtysh nicht selten. Auf der Erde sieht man sie nicht, weil sie wegen der Stellung ihrer Füße nicht gehen kann; hingegen schwimmt sie sehr gut und schnell, wobey der Schwanz bis zum Steiß ins Wasser getaucht ist, und ihr statt eines Ruders dient, gegen die gewöhnliche Art zu schwimmen bey den Enten. Ihr Nest ist aus Binsen geflochten und schwimmt hin und her, fast wie das der Taucher (Grebe). Der Beschreibung nach scheint dieser und der letzte Vogel im Gefieder einander nicht unähnlich zu seyn.

60. Die

f) *Anas leucocephala*. Latham Ind. orn. II. p. 858. n. 64. Sie ist nämlich nach Herrn Latham, wie oben schon erwähnt worden mit

der weißköpfigen Ente (Nr. 33) einerley. B.

g) Pallas Reis. Ausz. II. Anh. S. 15. Nr. 29. Taf. H. B.

60. Die Lapmärkische Ente. (Lapmark D.)

Anas scandiaca. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 520. No. 85. *b*)

Anas latirostra. BRÜNN. orn. No. 91.

Anas skoora. MÜLLER Zool. No. 130.

Lapmark Duck; Arct. Zool. p. 576. M. *i*)

Von der Größe der wilden Ente. Der Schnabel ist breit, und schwarz; Kopf, Hals und Brust kastanienbraun; die Stelle an der Wurzel des Schnabels hell, und ins Gelbe ziehend; Rücken, Flügel und Schwanz schwarz; die kürzern Schwungfedern weiß, mit schwarzen Spitzzen, das einen weißen Strich an den Flügeln vorstellt; Brust und Bauch weiß; der untere Theil des Leibes aschfarben; die Seiten, unter den Flügeln rothfarben; die Füße schwarz.

Sie ist in Dänemark zu Hause, gemein um Christianstadt, auch in Lapmark, und hält sich sowohl zur See, als in süßen Wassern auf.

61. Die Schnatter-Ente, (Gadwall)

Anas strepera. LIN. I. p. 200. 20. Ed. XIII. I. 2. p. 520. No. 20. *k*) — Faun.

Suec. No. 121. — BRÜNN. orn. No. 91. — MÜLLER Zool. No. 118. —

FRISCH av. tab. 168. — GEORGI Reise p. 166.

Le Chipeau. BRISS. orn. VI. p. 339. No. 8. pl. 33. fig. 1. — BUFF. ois. IX. p. 187. pl. 12 (das Weibchen). — Pl. enlum. 958.

Gadwall, or Gray. RAII Syn. vol. I p. 145. A. 2. — WILT. orn. p. 374. pl. 72. — Br. Zool. No. 288. — Arct. Zool. p. 575. L. *l*)

Lev. Mus.

Sie hat die Größe der Pfeif-Ente, und neunzehn Zoll Länge. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang, und schwarz; der Kopf, und der größte Theil des Halses, sind braun, mit Gelbroth und Schwarz mेलirt und gefleckt; die Seiten des Kopfs, die Kehle und der Vorderhals gelbröthlichweiß, mit braunen Flecken, die am Kopf am hellsten sind; der untere Theil des Halses, der Anfang des Rückens, und der Brust braun, mit krummen oder wellenförmigen weißen Strichen bezeichnet; der untere Theil des Rückens schwarzbraun; der Steiß und die obern und untern Deckfedern des Schwanzes schwarz; Brust und Bauch weiß, mit grauen Flecken; der untere Theil des Bauchs, die Seiten und die Schenkel mit weißlichen und graubraunen Streichen gestreift; der After schwärzlich; an den Flügeln sind drey Flecken von verschiedenen Farben, nämlich, weiß, schwarz und roth; der Schwanz ist aschfarben, mit weißen Rändern; die Füße orangefarben.

Das

b) Latham Ind. orn. II. 859. n. 68. *B*.

i) Uebers. II. S. 536. M. Leem's Lapmark S. 266. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 749. Nr. 85. *B*.

k) Latham Ind. orn. II. 859. n. 69. *B*.

l) Uebers. II. S. 536. L. Meine N. G. Deutschlands. II. S. 642. Nr. 9. Cetti N. G. von Gardinen, II. 338. Nr. 8. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 749. Nr. 20. *B*.

Das Weibchen unterscheidet sich durch mattere Farben an den Flügeln, wiewohl sie eben so gezeichnet sind, als beim Männchen; die Brust ist röthlichbraun, mit schwarzen Flecken; die Federn am Hals und Rücken sind hellroth gerändert; der Steiß ist statt schwarz, eben so; und die artigen, halbkreisförmigen Striche am Hals und Brust fehlen gänzlich.

Diese Art ist im Winter in England einheimisch, und findet sich auch zur nämlichen Zeit in verschiedenen Gegenden Frankreichs und Italiens ^{m)}; so wie der Sommer herbeykommt, zieht sie bis nach Schweden, um zu brüten; sie findet sich durch ganz Rußland und Sibirien vor, die östlichen Theile des letztern Landes, und Kamtschatka, ausgenommen. Sie ist ein sehr fertiger Taucher, so daß sie schwer zu schießen ist. Ihrer Nahrung geht sie nur Morgens und Abends nach; denn den Tag über versteckt sie sich unter Binsen und Rohr. Ihr Geschrey ist dem der wilden Ente nicht unähnlich, aber lauter. Ihr Fleisch ist gut.

62. Die Sichel-Ente. (Falcated D.)

Anas falcaria. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 521. No. 86. n) — PALLAS Reise III. p. 701. o)

Anas falcata. GEORGI Reise. p. 168.

Falcated Duck. Arct. Zool. p. 574. I. pl. 23. p)

Sie hat die Größe einer Pfeif-Ente, ist einen Fuß sechs Zoll lang, und fünf und zwanzig Unzen, sechs Quentchen schwer. Ihr Schnabel ist anderthalb Zoll lang und schwarz; die Federn am Hinterkopf und eine kleine Strecke am Hals herunter, sind lang, und bilden einen Busch; Stirn und Scheitel matt rothfarben; in der Mitte, über der Wurzel des Schnabels, ist ein weißer Fleck; die Augenkreise, der Hinterkopf und der Federbusch sind glänzendgrün mit Kupferglanz melirt, besonders an den Schläfen; das Kinn ist weiß; unter diesem sind zwey Halsbänder, das Eine graulichschwarz, und dieß entsteht aus dem Federbusch; das Andere weiß; der übrige Hals und die Brust sind aschgrau, mit braunen Wellenlinien; der Rücken grau, und der obere Theil desselben undeutlich mit hellerer Farbe gestreift; der Bauch grau und weiß getipfelt; der After schwarz; die Seiten desselben weiß, und durch ein schwarzes Band quer durchschnitten; die Schultern grau, und etwas wellenförmig gestreift; die Schulterfedern auch grau, und an den Enden rückwärts gebogen; der Spiegel schön blaugrün, über demselben ein weißes Band; die Flügel so lang, als der Schwanz; die Füße bleifarben.

Diese Art findet sich im östlichen Sibirien, vom Jenisey bis zur Lena, und jenseits des Sees Baikal; aber nicht im westlichen. Sie ist auch in Kamtschatka, aber selten. Wahrscheinlich überwintert sie in den Mongolischen Wüsteneyen und in China; zuverlässig wird sie in letzterm Lande angetroffen, denn ich besitze ein Exemplar von daher, das lebendig nach Eng-

m) In Deutschland ist sie im Winter und wird schon im Herbst in den Entenfängen gefangen. — Man hat sie gern zur Locke, weil sie viel Lärm machen und dadurch vorüberfliegende Enten auf den Gang bringen. B.

n) Latham Ind. orn. II. p. 860. n. 70. B.

o) Pallas Reise Ausz. III. Anh. S. 12. Nr. 34. B.

p) Uebers. II. S. 534. I. Taf. 23. untere Figur. B.

England gebracht wurde, wo es einige Zeitlang unter anderm Geflügel lebte, und sehr zahm war; nach seinem Tode wurde es mir in meine Sammlung verehrt.

62. War. A. *Anas falcaria* L. I. 2. p. 521. No. 86. β. 7)
Sarcelle de Java. BUFF. ois. IX. p. 275. — Pl. enlum. 930.

Diese unterscheidet sich von der vorigen dadurch, daß sie nur einen ganz kleinen Federbusch auf dem Scheitel hat, indem blos die Federn am Nacken etwas länger sind; auch fallen keine sichelförmigen Federn über die Schwingen herüber; sie hat nichts Weißes an dem Afters, oder an den Seiten desselben, und statt dessen sind diese Theile, so wie der Rücken, braun; die Schenkel sind weiß; ausserdem ist sie der vorigen sehr ähnlich, und ich vermuthete, sie sey bloß das Weibchen, oder ein junger Vogel dieser schönen Art. Auch bemerke ich noch eine andere, dieser sehr ähnliche, unter einigen Chinesischen Gemälden, daher ich sie für einen Chinesischen Vogel halte.

63. Die gemeine Pfeif. Ente. (Common Wigeon.)

- Anas Penelope*. LIN. I. p. 202. 27. Ed. XIII. I. 2. p. 527. No. 27. 1) — Faun. Suec. No. 124. — BRÜNN. orn. No. 72. — MÜLLER Zool. No. 121. — KRAM. elench. p. 342. No. 16. — GEORGI Reise p. 166.
Anas Kogolha. Nov. Comment. Acad. Petrop. vol. XV. p. 468. No. 15. tab. 21?
Le Canard siffleur. BRISS. orn VI. p. 391. No. 21. pl. 35. fig. 2. — BUFF. ois. IX. p. 169. pl. 10. 11. — Pl. enlum. 825.
The Wigeon, Whewer, or Whim. RAI Syn. p. 146. A. 3. — WILL. orn. p. 375. pl. 72. — ALBIN Nat Hist. vol. II. pl. 99. — Br. Zool. II. No. 286. — Arct. Zool. p. 574. k. 5)
Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre Länge ist zwanzig Zoll, und ihr Gewicht drey und zwanzig Unzen. Der Schnabel ist schmal, anderthalb Zoll lang, und bläulich bleyfarben, die Spitze schwarz; der Scheitel gelblichweiß, ein wenig mit dunklen Flecken gesprenkelt; über dem Schnabel fast weiß; Kopf und Hals lebhaft kastanienroth, mit dunkeln Flecken; der untere und hintere Theil des Halses, und die Brust weinröthlich (vinaceous) 1); Rücken und Schulterfedern mit ganz kleinen, schwarzen und weißen, wellenförmigen Strichen gestreift; die Seiten des Körpers eben so, aber heller; die Deckfedern der Flügel braun, mehr oder weniger mit Weiß untermengt 2); die Schwungfedern dunkelbraun, einige derselben weiß gebändert; die äußern Fahnen der mittlern grün, und das bildet einen Spiegel oder Flecken, der oben und unten schwarz eingefasst ist; der Bauch ist weiß; der Afters schwarz; die Füße sind dunkel bleyfarben.

Das

1) Latham I. c. β. B.

2) Latham Ind. orn. II. 860. n. 71. B.

3) Uebers. II. S. 535. k. — Pallas nord. Beytr. IV. S. 14. — Cetti N. G. v. Sars dinten II. S. 339. — Pontoppidan N. G. v. Dänemark. S. 168. Nr. 11. Lepeschin Tas

gebuch I. S. 89. Nr. 14. Meine N. G. Deutschlands II. S. 648. Nr. 11. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 759. Nr. 27. B.

4) Zuweilen, wiewohl selten, mit runden, schwarzen Flecken bezeichnet Br. Zool.

5) Bey Einigen ganz weiß.

Das Weibchen ist braun, die Mitte der Federn am dunkelsten; Vorderhals und Brust heller; die Schulterfedern dunkelbraun, mit hellern Rändern; Flügel und Brust wie bey den Männchen.

Diese Art ist sehr gemein in den meisten Ländern der alten Welt *), wo sie, wie man mir versichert, bis nach Egypten wandert; denn sie ist daselbst, von der Mitte bis zu Ende Novembers, mit Netzen in den Moräften, vor Ablauf des Wassers gefangen worden. Den Winter hindurch findet sie sich auch in Menge in Aleppo. Auch hat man sie am Caspischen Meere, und in der Nachbarschaft desselben bemerkt; und in den mehrsten Ländern Europens bis nach Schweden. Während den Wintermonaten ist sie in England sehr gemein, und wird um diese Zeit, nebst andern Enten, in den Gehägen gefangen. In Frankreich soll sie nicht brüten, auch weiß ich nicht gewiß, ob sie es in England thut.

Beide Geschlechter sind bis zum nächsten Frühjahr nach der Hecke einander gleich, wo dann das Männchen, ohngefähr im März, sein volles Gefieder bekommt, man hat aber bemerkt, daß es dieß zu Ende des Julius wieder verliert †), und zugleich einigermassen seine Stimme, die dem Flörenton sehr ähnlich geschägt wird. Ihr Fleisch wird sehr geachtet ‡).

64. Die Capsche Pfeif-Ente. (Cape W.)

Anas capensis. LIN Ed. XIII. I. 2. p. 527. No. 98. a).

Sie hat die Größe der vorigen, und ist funfzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang und roth, um die Wurzel herum schwarz; der Kopf heubläulich- aschfarben, mit ganz kleinen schwärzlichen Fleckchen bezeichnet, wie bey der vorigen; der untere Theil des Halses und die Brust bläulich- aschfarben, die Federn aschfarben gerändert; der Rücken röthlichbraun, mit bläulich-weißen Rändern; die Schwungfedern dunkel aschfarben, der Spiegel auf den Flügeln hellgrünlichblau, oben und unten weiß eingefäßt; die Füße hellroth; die Schwimmhäute dunkelbraun; die Klauen schwarz.

Sie ist auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung zu Hause. — Aus den Gemälden des Hrn. Joseph Banks.

III 2

65. Die

- x) In Deutschland kommt sie im October in Menge an, und bleibt da, so lange die Wasser offen sind. Man hört sie oft im December und Jänner in der dunkelsten Nacht durch ihren pfeisenden Ton über den Thüringerwald streichen. B.
- y) Hist. des Ois. — Ich erinnere mich einstens einen solchen verschiedenfarbigen Vogel gesehen zu haben, der halb ein Männchen, und halb ein Weibchen zu seyn schien; ohne Zweifel bey seinem Wechsel.
- z) Im Ind. orn. wird als Varietät angeführt: Var. A. Die Kogolka. *Anas Kogolka* N. C. Petrop. XV. p. 468. 15 21. — Schriften der Berl. Naturf. Gesellsch. VII S. 458. Sie ist am Vorderhals aschgrau gewellt und der Spiegel auf den Flügeln ist silberfarben. B.
- a) Latham Ind. orn. II. p. 861. n. 73. B.

65. Die Amerikanische Pfeif-Ente. (American W.)

Anas americana. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 526. No. 97. b)

Le Canard Jensen BUFF. ois IX. p. 174. — Pl. enlum. 955.

American Wigeon. Arct. Zool. No. 502. c)

Lev. Mus.

Etwas größer, als unsere Pfeif-Ente (Nr. 63), und eben so lang. Der Schnabel ist bleifarben, die Spitze schwarz; Scheitel und Seiten gelblichweiß; der Hinterkopf und der Hinterhals schwarz und weiß gesprenkelt; hinter den Augen ist ein schwarzes Fleck, das bey gewissem Lichte ins Grüne spielt; Rücken und Schulterfedern sind hell rostfarben, mit schwarzen wellenförmigen Querstichen; in der Mitte der Deckfedern der Flügel ist ein großer, weißer Fleck (bed); Schwungfedern und Schwanz sind dunkelbraun; der After beynahe schwarz; die Füße dunkelbraun d).

Sie ist in Nordamerika, von Carolina bis zur Hudsons-Bay zu Hause, aber nirgends ein gemeiner Vogel. In Newyork wird sie Fasanen-Ente (Pheasant Duck) genannt e). In größerer Menge ist sie in St. Domingo und Cayenne, wo sie Wigeon oder Gingeon heißt. In Martinique fliegen oft große Züge in kurzen Flügen von Einer Reisplantage zur andern, wo sie große Verheerungen anrichten, besonders zur Regenzeit. Sie sollen sich auch auf die Bäume setzen. Sie fressen in Gesellschaft, und stellen eine Schildwache aus, wie einige andere Vögel. Selten sieht man sie bey Tage, wo sie an von der Sonne beschatteten Orten versteckt liegen; sobald aber dieses Licht verschwindet, so kommen sie aus ihren Schlupfwinkeln hervor, um zu fressen; und während dessen machen sie eine eigene Art von Geschrey, so daß sie den Jäger, der sie aufsucht, gleichsam leiten, und sich oft selbst verrathen, da sie ausserdem unter dem Schutze der Nacht, ihr Stillschweigen schätzen würde; zur andern Zeit ist ihre Stimme ein sanftes Pfeifen, das oft nachgeahmt wird, um sie zum Schuß zu locken. Sie brüten im Jänner, und im März sieht man die Jungen herumlaufen. Sie legen viele Eyer, die man zuweilen den Hühnern unterlegt; die daraus entspringenden Vögel sind, so lange sie noch jung sind, zahm, wenn sie aber aufwachsen, so beißen sie sich außerordentlich mit andern Enten herum. Da man weiß, daß sie, wenn sie zur Reise gelangt sind,

b) Latham Ind. orn. II. p. 861. n. 74. B.

c) Uebers. II. S. 528. Nr. 420. B.

d) Herr Assessor Vorkhausen beschreibt mir aus dem Darmstädtschen Museum einen hierher gehörigen Vogel aus Canada als eine Varietät der Europäischen Pfeifente: Stirn und Schtettel sind weiß; die Schläfe schwarz, und weiß gestrichelt und gefleckt; Wangen, Kehle und der ganze obere Hals weiß und schwarz gestrichelt und gewellt; der Rücken im Grunde schmutziggelb, sehr dicht mit schwarzen wellenförmigen Querstichen durchzogen; der Unterrücken aschgrau, etwas lichter gewässert, ge-

gen den weißen Stelf hin heller, mit dichten braunen Wellenlinien nach der Quere durchzogen; die Brust weinröthlich, sehr schwach aschgrau überlaufen; der Bauch schneeweiß; die Seiten weinröthlich, wie die Brust; die Flügel wie an der Europäischen Pfeifente; der Schwanz schwarzbraun. — Hr. D Vorkhausen meyn, daß der gleiche Bau des Schwanzes und die gleiche Zeichnung der Flügel bewiesen, daß dieser Vogel nur eine Varietät der Anas Penelope und keine besondere Art sey. B.

e) Arct. Zool.

sind, selbst brüten, so ist sehr zu wünschen, daß diese Vögel zum Hausgeflügel gemacht würden, weil ihr Fleisch ganz vortreflich ist, besonders von denen, die man zahm aufgezogen hat. — An den Küsten der Hudsons-Bay erscheinen sie im May, sobald als das Thauwetter einfällt, mehrentheils Paarweise; sie legen daselbst nur sechs bis acht Eyer, leben von Fliegen und Würmern in den Sümpfen, und ziehen im Herbst in ganzen Flügen wieder weg. Man kennt sie dort unter dem Namen: *Atheikimo Ascheep^{ee}*.

66. Die gluckende Ente. (Die zweyfleckige Ente: Bimaculated D.)

Anas gloritans. L. Ed. XIII. I. 2. p. 526. No. 96. f) — Art. Holm. Vol. XL. p. 33. pl. 1. g)

Bimaculated Duck. Br. Zool. II. No. 287. — Arct. Zool. p. 575. h)

Ihre Länge ist zwanzig Zoll. Ihr Schnabel ist dunkel bleifarben, der Nagel schwarz; der Augenstern braun; der Scheitel braun, ins Grüne schillernd, und endigt sich in einen braunen Streifen am Hinterkopf, mit einem kleinen Federbusch; zwischen dem Schnabel und den Augen, und hinter jedem Ohr sind rostfarbene Flecken, jene rund, diese länglich und groß; die Kehle ist schön dunkel purpurfarben; der übrige Kopf lebhaft grün, und dieß läuft in Streifen den Hals herab; die Brust ist licht rostigrothbraun, mit schwarzen Flecken; Hinterhals und Rücken dunkelbraun, mit schwarzen Wellenlinien: die Deckfedern der Flügel aschfarben; die untern Deckfedern rostfarben gestreift; die Schulterfedern aschgrau; die Schwungfedern eben so, ins Braune ziehend, die der zweyten Reihe schön grün, und endigen sich in eine schwarze Schattirung, die weiß eingefaßt ist; die Deckfedern des Schwanzes dunkelschillernd grün; im Schwanz sind zwölf Federn; die zwey mittelfsten schwarz, die andern braun, mit weißen Rändern; der Bauch dunkelbraun und artig geförnt (granulated); die Füße klein und gelb; die Schwimmhäute dunkelbraun.

Sie ist in einem Entengehäge in England gefangen worden. Auch hat man sie längs dem Lena, und um den See Baikal angetroffen. Sie hat eine sonderbare, dem Klucken ähnliche Stimme ⁱ⁾.

67. Die weichschnäblige Ente. (Soft-billed D.)

Anas melacorhynchus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 526. No. 95. k)

Blue-grey Duck. with a soft bill. Cook's Voy. vol. I. p. 72. 97. — Forst. Voy. vol. I. p. 157.

Von der Größe der Pfeif-Ente, und achtzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist fünf Viertel Zoll lang, und hell aschfarben, das Ende desselben weich, häutig, und schwarz; der Scheitel

^{ee}) Hr. Hutchins.

f) Latham Ind. orn. II. 862. n. 75. B.

g) Schwed. Abh. XLI. S. 22. B.

h) Uebers. II. S. 535. zu k. Dounborfs Zool. Ventr. II. S. 759. Nr. 96. B.

i) Arct. Zool.

k) Latham Ind. orn. II. p. 862. n. 76. B.

tel graulich aschfarben; der Körper überhaupt hellbläulich bleyfarben; quer über die Flügel ein weißer Fleck; an der Brust eine Mischung von Rostfarbe; die Füße dunkel bleyfarben.

Sie ist in Neu-Seeland zu Hause, wo man sie im April, auf Dusky-Bay angetroffen hat. Sie ist wegen des so biegsamen und weichen Endes ihres Schnabels merkwürdig. Man darf annehmen, daß sie sich durch Saugen nähre, indem sie die Würmer u. dgl. aus dem Schlamm herausucht, wenn die Flut von den Gestaden zurückfließt. Sie soll pfeifen, wie die Pfeif-Ente. In Neu-Seeland wird sie He-weego genannt.

68. Die Tafel-Ente. (Pochard D.)

Anas ferina. LIN. I p. 203. 31. Ed. XIII. I. 2. p. 530. No. 31. ¹⁾ — Faun. Suec.

No. 127. — BRÜNN orn. No. 80. — MÜLLER Zool. No. 124.

Anas erythrocephala, GMELIN in Nov. Comment. Acad. Petrop. vol. XV. p. 465. No. 14. pl. 20.

Le Millouin. BRISS. orn. VI. p. 384. No. 19. pl. 35. fig. 1. — BUFF. ois. IX. p. 216. — Pl. enlum. 803.

Pochard, Pocker, or great red-headed Wigeon. RAH Syn. p. 143. A. 10.

— WILL. orn. p. 367. pl. 72. — Br. Zool. II. No. 284. — Arct. Zool. No. 491. ^{m)}

Br. Mus. Lev. Mus.

Sie hat die Größe der Pfeif-Ente, neunzehn Zoll Länge, und ein Pfund, zwölf Unzen Gewicht. Ihr Schnabel ist breiter, als bey der Pfeif-Ente, dunkelblau, mit einer schwarzen Spitze; der Augenstern orangefarben; Kopf und Hals dunkel kastanienbraun; der untere Theil des Halses und die Brust, und der obere Theil des Rückens dunkelschwarz; die Schulterfedern und die zunächst am Körper stehenden Deckfedern der Flügel bläulichweiß, mit ganz kleinen dunkelschwarzen Streifen; die äußern Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern dunkelbraun; der Bauch schmutzigweiß mit zahlreichen, dunkeln Strichen an den Seiten; der Schwanz dunkelgrau; die Füße bleyfarben.

Das Weibchen hat einen hellröthlichbraunen Kopf; die Brust eben so, aber dunkler; die Deckfedern der Flügel und der Bauch aschgrau; der Rücken wie bey dem Männchen ⁿ⁾.

Diese

¹⁾ Latham Ind. orn. II. 862. n. 77. V.

^{m)} Uebers. II. S. 521. Nr. 409. Zorns Pettenoth. II. S. 410. Pontoppidans N. S. v. Dänemark S. 168. Nr. 14. von Norwegen II. S. 127. Veseke Vögel Eurlands. S. 48. Nr. 83. 84. Meine N. S. Deutschlands. II. S. 656. Nr. 14. Frisch Taf. 165. Blochs Schr. der Verh. naturf. Freunde III. S. 374. Taf. 8. Fig. 1. IV. S. 603. T. 17. S. 5. 6. Bonndorfs Zool. Beytr. II. S. 767. Nr. 31. V.

ⁿ⁾ Die mehesten Weibchen, die ich gesehen habe, sahen so aus: Kopf und Hals sind rostigbraun und schwarz gefleckt; die Brust dunkelbraun und schmutzig rostgelb gewölbt; die Deckfedern der Flügel dunkel aschgrau, weiß eingefast; der Rücken dunkelbraun, röthlichgrau eingefast; der Bauch weiß; die Seiten rostigbraun; Steiß und Schwanz tief grau, weiß eingefast; der After weiß mit großen kastanienbraunen Flecken; die Flügel wie bey dem Männchen. V.

Zwey und neunzigste Gattung. Ente.

451

Diese Art ist, wie die Spies-Ente (Nr. 72) und einige andere, sowohl in der alten, als in der neuen Welt zu Hause ¹⁾. Bey uns besucht sie im Winter die Moräste, und wird zuweilen in beträchtlicher Menge auf die Londenr Märkte gebracht, wo man sie unter dem Namen der braunen Vögel (Dun Birds) ²⁾ kennt, und für eine vortreffliche Speise hält. Im Winter zieht sie sehr weit nach Süden, denn sie findet sich in Aegypten ³⁾, um Cairo, vor. Nach Frankreich kommt sie zu Ende Oktobers in kleinen Zügen von zwanzig bis dreßzig. Man weiß nicht gewiß, ob sie in England brütet; in Frankreich ist aber Eine im Julius geschossen worden. Sie lebt von kleinen Fischen und Muscheln, und hat eine zischende Stimme. Ihr Flug ist reißend und stark; sie beobachten in ihren Zügen keine besondere Form, sondern fliegen ohne Unterschied. Nach Catesby finden sie sich im Winter in Carolina.

68. Var. A. Die Sumpf-Ente.

Anas ferina. L. I. 2. p. 530. No. 31. β.

Le Millouin noir. Briss. orn. VI. p. 389 A.

Diese weicht von der vorzigen in einigen Stücken ab. Der Schnabel ist schwarz, mit einer blauen Wurzel; der Augenstern gelb; Kopf und Hals kastanienbraun; der untere Theil des Halses an den Seiten aschfarben, und vorne schwärzlich; Rücken, Steiß und Schwanz von letzterer Farbe. Brust und Bauch braun, mit einer Mischung von dunkelbraun und aschfarben; die Flügel schwarz und weiß mellt; die Füße olivengrün; Schwimmhäute und Klauen schwarz ⁴⁾.

68. h. Die goldgelbe Ente. (Die Mexikanische Tafel-Ente. Mexican P.)

Anas fulva. L. I. 2. p. 530. No. 100. γ)

Le Millouin du Mexique. Briss. orn. VI. p. 390. No. 20.

Quapachnauhtli. Rau Syn. p. 177.

Der

1) In Deutschland ist sie im Sommer einzeln auf Seen und Klüssen; im Herbst aber in Menge daselbst, bis sie zufrieren. Sie hat bey uns den Namen Tafelente wegen ihres Wohlgeschmacks. B.

2) Das Weibchen der Pfeifente wird auch so genannt.

3) Faun. Arab.

4) Hierher gehört meiner Einsicht nach noch als Varietät:

B. Die rothköpfige Ente.

Brissou orn. II. p. 463. n. 19.

Der Kopf ist braun; Rücken und Steiß dunkelbraun; Flügel aschgrau und weiß; Hals und

Bauch weiß; Seiten braun und schwarz gefleckt; Schwungfedern und Schwanz schwärzlich. Ein noch nicht ganz vollkommen ausgefedertes Männchen.

Var C. Die rothhalsige Ente.

Roufous-necked. Duck. oben Nr. 32.

5) Latham Ind. orn. II. 863. n. 79. Hier wird sie, so wie in Gmelins Linneischen System für eine besondere Art gehalten. Herr Latham scheint sie in der Synopsis für eine Varietät der Tafelente zu nehmen, denn er hat keine besondere Nummer vorgesezt, es ist aber auch nicht Var. B. davor befindlich. Wir nehmen sie also als eigene Art auf. B.

Der Schnabel ist dunkelashfarben; die Augen sind schwarz; der Kopf, Hals, die Brust, der Bauch, die Schenkel und untern Deckfedern des Schwanzes goldgelb; der Rücken, die Schulterfedern, die Deckfedern der Flügel und der Steiß nach der Quere goldgelb und braun gestreift; die Schwungfedern fast eben so; der Schwanz schwarz und weiß; die Füße wie der Schnabel; die Klauen schwarz.

Sie ist in Mexico zu Hause.

69. Die Spanische Ente. (Spanisch D.)

Anas viduata LIN. I. p. 205. 38. Ed. XIII. I. 2. p. 536. No. 38. r) — JACQUIN'S Beytr. p. 3. t. 1.

Le Canard à face blanche. BUFF. ois. IX. p. 255.

Le Canard du Maragnon. Pl. enlum. 805.

Spanish Duck. PENNANT Gen. of. Birds p. 65. p. 13.

Sie ist ein wenig kleiner, als die Herbst-Ente (Nr. 47). Schnabel und Augen sind schwarz, Stirn, Wangen, Kinn und Hinterkopf rein weiß; der Scheitel schwarz; um den Hals läuft ein schwarzes Halsband; Rücken und Brust sind lebhaft rostigroth, und mit schmalen, dunklen Strichen durchzogen; die Flügel hellbraun, und ohne Spiegel; der Bauch weißlichbraun, mit schwarzen Flecken; der Schwanz keilförmig, und schwarz; die Füße bläulich.

Dies ist eine schöne Art, die eine pfeifende Stimme hat, und von den Spaniern Vindita genannt wird. Sie findet sich in Spanien und in der Barbarey ¹⁾, und soll die See von Carthagena besuchen ²⁾.

Diese ¹⁾ Art ist in Carthagena, in Südamerika, zu Hause. Das Wort Vindila, wie es Linne' schreibt, ist gewiß ein Druckfehler; es hätte Vindita heißen sollen, das eine kleine Wittve bedeutet, und der Vogel ist absichtlich so genannt worden. ²⁾.

Man hat die Bemerkung gegen mich geäußert, daß Scopoli's Weißköpfige Ente ³⁾, und Pallas's Ural-Ente ⁴⁾, mit diesem Vogel eine und ebendieselbe seyen, ohnerachtet obige Schriftsteller sie als eine neue Art betrachten ⁵⁾. Die Spanische Ente wurde von Linne' zuerst beschrieben, und ich muß gestehen, daß die Beschreibungen dieser drey vorbenannten Vögel, außerordentlich miteinander übereinstimmen ⁶⁾.

70. Die

r) Latham Ind. orn. II. p. 858. n. 65. B.

a) Gen. of Birds.

b) Linne'. — Ob in Alt- oder Neuspanien, sagt er nicht; wiewohl er letzteres zu meynen scheint, weil er sich Jacquins Autorität in seiner Beschreibung bedient.

y) Zus. a. d. Suppl. S. 275.

z) JACQUIN.

a) Ann. I. No. 79. s. oben Nr. 33.

b) Trav. vol. II. p. 713. s. oben No. 59.

c) Herr Pennant.

d) Im Ind. orn. steht noch eine Varietät:

Var. A. A. viduata β.

Canard à face blanche de Maragnon, BUFF. IX. p. 255. — Pl. enlum. 808.

Sie ist röthlich und schwärzlich wellenförmig gefleckt; Kopf und Hals sind vorn zur Hälfte weiß; die Brust fuchseroth; der Nacken, ein Halsband unter der Kehle, Flügel und Schwanz schwarz. B.

Zwey und neunzigste Gattung. Entel

453

70. Die Dominikaner-Ente. (Dominican D.)

Anas dominicana. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 536. No. 109. e)

Le Canard Dominiquain du Cap de b. E. SONN. Voy. Ind. vol. II. p. 22.

Von der Größe der wilden Ente. Ihr Schnabel ist schwarz; Gesicht und Kehle weiß; zwischen den Augen, vom Schnabel an, läuft ein schwarzer Streifen, der sich hinten in einen Winkel endigt; der Hinterkopf, der Hals, und die Brust sind schwarz; der Rücken und die kleinen Deckfedern der Flügel dunkel aschgrau, und mit zwey sehr hellgrauen Bändern durchzogen; Bauch und After hellgrau; die Füße schwarz.

Sie ist auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung zu Hause.

71. Die rothbraune Ente. (Ferruginous D.)

Anas ferruginea. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 528. No. 99. f)

Anas rutila. Faun. Suec. No. 134.

Ferruginous Duck. Br. Zool. No. 285. pl. 99. — Arct. Zool. p. 576. N. g)

Ihr Gewicht ist zwanzig Unzen. Der Schnabel ist lang und plattgedrückt, an der Wurzel etwas abgerundet, längs den Rändern beyder Kinnladen gezähnt, und am Ende der obern mit einem Nagel versehen, von Farbe hellblau; der Kopf, der Hals und alle obern Theile des Körpers, angenehm röthlichbraun; Kehle, Brust und Bauch eben so, aber heller; die Füße hellblau; die Schwimmhäute schwarz.

Ein Vogel dieser Art wurde in Lincolnshire erlegt. Er findet sich auf den Schwedischen Flüssen, aber selten. Herr Pennant hat ihn auch aus Dänemark erhalten ^{b)}.

72. Die Spieß-Ente. (Pintail D.)

Anas acuta. LIN. I. p. 202. n. 28. Ed. XIII. I. 2. p. 528. No. 28. i) — Faun.

Suec. No. 126 — Scop. ann. I. No. 73. b) — BRÜNN. orn. Append. —

MÜLLER Zool. No. 122. — KRAM. elench. p. 340. No. 9. — FRISCH av.

tab. 160. — GEORGI Reise p. 166.

Le Canard à longue queue. BRISS. orn. VI. p. 369. No. 16. pl. 34. fig. 1. 2. —

BUFF. ois. IX. p. 199. pl. 13. — Pl. enlum. 954.

Sea Pheasant, or Cracker. RAI Syn. p. 147. A. 5. — WILL. orn. p. 376. pl. 73.

— ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 94. 95.

Pentail

e) Latham Ind. orn. II. p. 859. n. 66. B.

f) Latham Ind. orn. II. p. 866. n. 84. B.

g) Uebers. II S. 536. N. B.

h) Herr Latham vermuthet im Ind. orn. daß

die rothbraune Ente das Weibchen von der Stellers-Ente Nr. 74 sey. B.

i) Latham Ind. orn. II. p. 864. n. 81. B.

k) Uebers. v. Günther I. S. 65. Nr. 73. B.

Pentail. Br. Zool. II. No. 282. — Arct. Zool. No. 500. ¹⁾
Br. Mus. Lev. Mus.

Kleiner, als die wilde Ente, acht und zwanzig Zoll lang, und vier und zwanzig Unzen schwer. Der Schnabel lang und schwarz, an den Seiten bläulich; der Kopf und der Vorderhals eines Zolls breit, rostig purpurbraun; der Nacken dunkelbraun; der Vorderhals und die Seiten des Halses weiß, ein wenig mit schwärzlicher Farbe gesprenkelt, und das Weiße steigt hinauf an beyden Seiten, am Hintertelle, in einem schmalen Streifen gegen den Hinterkopf hin; der Hinterhals und der Rücken sind graulichweiß, und schön schwarz gestreift; die Seiten des Körpers eben so, aber heller; die Schulterfedern schwarz, lang, spitzig, und sehr hell gelblichweiß (cream-colour) gerändert; die Flügel bloß dunkelbraun; über diese zuerst ein hell gelbrother Streifen, dann ein breiter, dunkel kupferfarbener und schwarz eingefasster; und unter diesem ein schmaler, weißer; die zwey mittlern Schwanzfedern schwarz, und über drey Zoll länger, als die übrigen, die andern dunkelbraun, mit weißen Rändern; die untern Theile des Körpers weiß; der After schwarz, die Seiten desselben weiß; die Füße bleifarben ^{m)}.

Das Weibchen ist kleiner; Kopf und Hals sind dunkelbraun mit ganz kleinen, braunen Streifen; der Rücken braun, die Federn hellröthlichweiß gerändert; die Schulterfedern mit hellgelbrothen Rändern; die Deckfedern der Flügel wie der Rücken, aber tiefer hinein weiß gerändert; über die Flügel läuft ein bläulichweißer Streifen, der oben und unten weiß eingefast ist; der Schwanz wie bey dem Männchen, die zwey mittlern Federn aber nicht länger, als die übrigen.

Die jungen Männchen bleiben bis in dem Februar graulichbraun, den Weibchen nicht sehr unähnlich, und dann bekommen sie erst das ihrem Geschlecht eigene Gefieder.

Das Männchen ist mit einem Labyrinth versehen.

Dies ist eine sehr gemeine Art; doch in England nicht in solcher Menge, als in vielen Gegenden des festen Landes, in dessen nördlichen Ländern sie brütet ⁿ⁾. Sie ist gemein in dem Russischen Gebiete ^{o)} bis nach Kamtschatka. In Schweden und Dänemark im Frühling; und am weißen Meere brütet sie ^{p)}. Unser Königreich ^{q)}, und die Länder die in demselben gegen Süden liegen, besucht sie im Winter, und um diese Zeit ist sie auch in Frankreich, Oesterreich,

¹⁾ Uebers. II. S. 527. Nr. 418. Neue Schwed. Abh. I. S. 129. Lapechin Tageb. I. S. 189. III. S. 14. Meine N. S. Deutschl. II. S. 651. Nr. 12. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 761. Nr. 28. B.

^{m)} Zwey aus der Gegend von Boston kommende Männchen im Darmstädtschen Cabinette weichen wenig ab. Die Kehle ist nicht weiß, sondern ganz einsärbig rostfarben; die obern Deckfedern des Schwanzes sind nicht ganz schwarz,

sondern weiß und jede ist nur in der Mitte ein wenig schwärzlich. B.

ⁿ⁾ In Deutschland nur als Zugvogel im Herbst. B.

^{o)} In Haufen zu Hunderten an den Ufern des Don. Decouv. Russ. vol. I. p. 162.

^{p)} Arct. Zool.

^{q)} Sie besucht die Orkadischen Inseln, im Winter in großen Flügen. Ebend. — In großer Menge ist sie in Connaught, in Irland, aber nur im Februar. Br. Zool.

reich, *) und Italien *) gemein. In Menge ist sie am See Baikal. In Asien *); und oft sieht man sie zu ganzen Flügen an den Küsten von China, wo sie die Chineser in Schlingen fangen. In Amerika ist sie nicht selten, und in Menge in Newyork, wo sie Blauschnabel (Blue-bill) genannt wird *); von da an gegen Norden wenigstens bis zur Hudsons-Bay, wo sie vermuthlich brütet, und woher ich ein Exemplar erhalten habe. Ihr Fleisch ist sehr wohl-schmeckend und zart.

73. a Die Winter-Ente. (Die langgeschwänzte Ente. Long-tailed D.)

Das alte Männchen.

- Anas glacialis. LIN. I. p. 203. 20. Ed. XIII. I. 2. p. 529. No. 30. x) — Faun. Suec. No. 125. — SCOP. Ann. I. No. 74. y) — BRÜNN. orn. No. 75. 76. — MÜLLER Zool. No. 123. — Phil. Trans. vol. LXII. p. 418.
 Le Canard à longue queue de Terre Neuve. BRISS. orn. VI. p. 382. No. 18. — BUFF. ois. IX. p. 202.
 Canard de Miclon. Pl. enlum. 1008.
 Swallow-tailed Sheldrake. RAI Syn. p. 145. A. 14. — WILL. orn. p. 364. §. 6.
 Long-tailed Duck. EDW. Nat. Hist. pl. 280. z) — Br. Zool. II. No. 283. — Arct. Zool. No. 501. a)
 Lev. Mus.

Sie hat die Größe der Pfeif-Ente. Ihre Länge ist zwey und zwanzig, und ihre Breite, neun und zwanzig Zoll, ihr Gewicht vier und zwanzig und eine halbe Unze Apothekergewicht. Der Schnabel ist anderthalb Zoll lang, und schwarz, längs der Mitte herab, und über die Spitze herüber, orangefarben; der Augenkern roth; der Vorderkopf und die Seiten des Kopfs röthlichgrau; an beyden Seiten des Halses, gerade unter dem Kopf, ist ein eyrunder schwarzer Fleck; der Hinterkopf, die Kehle und das Uebrige des Halses und der Brust weiß; Rücken und Steiß schwarz; die Seiten der obern Deckfedern des Schwanzes weiß, die Mitte schwarz; der untere Theil der Brust und der obere Theil des Bauchs dunkelbraun, und dieß läuft an beyden Seiten der Brust aufwärts, nach dem Rücken hin; der untere Theil des Bauchs und der After sind weiß; die Schulterfedern auch weiß, und lang und an den Enden spizig; die Flügel größtentheils schwarz, mit einer Mischung von Kastanienbraunem; die vier mittlern Schwanzfedern schwarz, die übrigen weiß; die zwey mittlern schmal, und um vierthalb Zoll länger, als die andern; die Füße mattroth; die Klauen schwarz b).

M m m 2

Diese

*) Kramer.

*) Um Rom, wo sie Coda lancea heißt. Willughby.

z) Georgi.

*) Trav. vol. I. p. 137.

*) Anas glacialis. (Mas adultus. Latham Ind. orn. II. p. 864. n. 82. B.

y) Uebers. v. Günther I. S. 66. Nr. 74. B.

z) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 70. B.

a) Uebers. II. S. 527. Nr. 419. Meine R. G. Deutsch. II. S. 654. Nr. 13. Dornsdorfs Zool. Beytr. II. S. 766. Nr. 30. B.

b) Ein Pärchen aus Boston gekommene Winter-
ter;

Diese Art variiert; bey Einigen ist das Gefieder da, wo es bey andern schwarz ist, mehr oder minder braun oder schokolatfarben, und der Fleck an jeder Seite des Halses nimmt die Hälfte desselben ein; die zwey mittlern Schwanzfedern sind oft so lang, als der ganze übrige Vogel; und die Füße haben bey verschiedenen Vögeln alle Schattirungen von Rothem. Inzwischen ist der Schnabel ein beständiges Kennzeichen, wiewohl er bey jungen Vögeln am breitesten ist *).

73. b. Die Winter-Ente. (Long-tailed D.)

Das junge Männchen.

Anas hyemalis. LIN. I. p. 202. 29. Ed. XIII. I. 2. p. 529 No. 29. d) — Faun. Groenl. No. 45.

Le Canard à longue queue d'Islande. BRISS. orn. VI. p. 379. No. 17.

Sharp-tailed Duck, called Havelda. WILL. orn. p. 364. § 5.

Long-tailed Duck. EDW. Nat. Hist. pl. 156. e)

Der Schnabel ist wie bey der vorigen; die Seiten des Kopfs sind weiß; der Hinterkopf aschgrau; der übrige Kopf, der Hals, die Brust und der Rücken tiefschwarz; der untere Theil der Brust und die Schulterfedern kastanienbraun; der Bauch weiß; die obern Deckfedern des Schwanzes und die Flügel so ziemlich wie bey dem Männchen; die Füße dunkelröthlichbraun.

Einige Individuen dieses Geschlechts haben braune Federn, mit rostigrothen Rändern, andere nicht. Ich habe auch an Einigen einen weißen Flecken zu beyden Seiten des untern Theils des Halses bemerkt. Die mittlern Schwanzfedern sind bey einigen Vögeln viel kürzer, als bey den andern; und in Rücksicht des Weibchens bin ich nicht so glücklich gewesen, Eines aufzutreiben, das sie besessen hätte; vielleicht sieht man sie nicht, ausser bey alten Vögeln, oder sie verlieren sie in der Mauser schon vor den andern Federn.

Zusatz

enten im Darmstädter Cabinette sehen folgendergestalt aus. Männchen: der Schnabel ist schwarz mit einem breiten gelben Band in der Mitte; die Stirn, Wangen, der obere Theil der Schläfe, die Kehle und die untere Seite des Oberhalses aschgrau; der untere Theil der Schläfe nebst einem Theil der Seiten des Halses tief schwarz; der Scheitel, Hinterkopf, übrige Hals, Oberrücken, die Schulterfedern, von denen die untersten sehr lang sind, die Seiten des Hürzels, der hintere Theil des Bauchs, der Steiß und die untern Deckfedern des Schwanzes sind weiß; alles übrige tief schwarz; die beyden mittlern Schwanzfedern sehr lang.

Weibchen: der Schnabel ist ganz braun; im Gesicht nichts Graues; das Kinn matt

schwarz; der Kopf matt schwarz gefleckt, und ein großer mattschwarzer Fleck steht auf den Schläfen; der Hals, der untere Theil der Brust, der ganze Bauch, die Schultern, Seiten des Hürzels, untere Deckfedern des Schwanzes sind weiß; der Steiß grau; alles übrige mattschwarz; der Schwanz zugerundet und nicht zugespitzt. B.

c) Pallas Spicileg. V. p. 28. Note (a).

d) *Anas glacialis* (Junior mas). Latham Ind. orn. II. p. 865. B.

e) Seligmanns Vögel V. Taf. 51. Meine N. G. Deutschl. a. a. O. Pennants Arkt. Zool. a. a. O. Leem's Nachricht von den Lapp. S. 145. Pontoppidans N. G. von Dänemark S. 168. Bonndorfs Zool. Beytr. II. S. 764. Nr. 29. B.

Z u s a t z.

73. c. Die Winter-Ente.

Das Weibchen.

Anas glacialis. A. cauda cuneata, corpore nigricante rufo et griseo vario, dorso nigro, collari abdomineque imo albis. (Femina). LATHAM Ind. orn. I. c. γ.

Longtailed Duck, female. Arct. Zool. II. App. p. 76.

Der Schnabel ist schwarz oder mit einem blassen Cirkel umgeben; der Scheitel und die Seiten des Halses sind zum Theil schwarz; ein Halsband und der Unterbauch weiß; der Rücken und Steiß schwarz, in die Queere grau gestreift; der Schwanz kurz und keilsförmig.

Am jungen Weibchen sind Scheitel und Hals schwarz, weiß gesprenkt; die Augenkreise sind aschgrau; Kehle, Unterbrust und Bauch weiß; der Rücken dunkelgrau; der Schwanz schwärzlich, an den Seiten weiß. B.

Diese Art ist in den nördlichen Ländern zu Hause, und kommt hin und wieder, in strengen Wintern, nach England, aber nie in Menge f). Auf den Orkadischen Inseln hat man sie in beträchtlichen Flügen, vom Oktober bis zum April angetroffen g). Auf dem festen Lande besuchte sie Schweden, Lappland und Rußland; oft ist sie in der Nähe von Petersburg. Man hat sie auch in Kamtschatka angetroffen. Sie findet sich in Hudsons-Bay, und von da an bis nach Newyork. In Hudsons-Bay, Grönland, und zwischen den Inseln, bleibt sie das ganze Jahr hindurch. Sie soll ihr Nest unter das Gras, an der See, machen, wie die Eidergans; und um die Mitte des Junius fünf h) bläulichweiße Eyer, von der Größe der Hühnereyer, legen. Wenn die Jungen ausgekrochen sind, so trägt sie die Mutter im Schnabel ins Wasser. Sie schwimmt und taucht gut, fliegt geschwind, und ist ein listiger Vogel. Ihr Nest legt sie mit Federn aus der Brust aus, wie die Eidergans; auch sind ihre Pflaumfedern von gleichem Werth, wenn man sie nur in eben der Menge haben könnte. Sie hat ein lautes und sonderbares Geschrey, dem Wort: a=a=glick nicht unähnlich, woran vermuthlich der Bau ihres Luftröhrenkopfs Schuld ist i). Sie lebt von kleinen Schaalthieren, die sie im Untertauchen fängt, und die vermuthlich einen großen Theil ihrer Nahrung ausmachen k). In Hudsons-Bay heißt sie Hahawey, und erscheint in großen Flügen; ihr Flug ist kurz, und an der Oberfläche des Wassers weg.

Mmm 3

73. Var.

f) Eben so in Deutschland. B.

g) Arct. Zool.

h) Selten weniger, als zehn, und oft vierzehn bis fünfzehn. Herr Lichtenst.

i) Dieser soll drey, mit einer dünnen Haut bedeckte Öffnungen haben. Descr. Kamtsch. p. 498.

k) Eine Art ist der *Mytilus discors*. L.

73. Var. A. Die Ferroë-Kriekente.

Anas hyemalis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 529. No. 29. *β.* ¹⁾La Sarcelle de Ferröe. BRISS. orn. VI. p. 460. No. 40. pl. 40. fig. 2. — BUFF.
ois. IX. p. 278. — PL. enlum. 999. *m*)

Ihre Länge ist ein Fuß, vier und ein Viertel Zoll. Ihr Schnabel ist dunkelbraun, an der Wurzel der obern Kinnlade ist ein hellgrauer Fleck, und von da an läuft ein schwarzer Streifen längs der Mitte des Scheitels nach dem Hinterkopfe hin; die Seiten des Kopfs sind hellgrau, ins Gelbe ziehend; und gerade um die Augen herum, weiß; der Hinterkopf und Hinterhals dunkelbraun und weiß melirt; die Seiten des Halses dunkelbraun; Kehle und Vorderhals weiß, mit ganz kleinen, braunen Flecken; der Rücken, die Flügel, der Steiß, und die obern Deckfedern des Schwanzes braun, letztere an den Seiten weiß; die Schulterfedern lang, und braun, mit gelbrothen Rändern; Brust und Bauch weiß; der Schwanz spitzig, seine vier mittlern Federn graubraun, die fünfte zu beyden Seiten hellgrau, mit weißlichen Rändern; die Füße bräunlich bleifarben.

Sie ist auf den Ferroë-Inseln zu Hause, wo sie D'Edel genannt wird. Vermuthlich eine Spielart der Winter-Ente ²⁾).

74. Die Stellers-Ente. (Western D.)

Anas Stelleri. LIN. Ed. XIII I. 2. p. 518. *o*) — PALLAS Spicileg. VI. p. 35. tab. 5.

Anas dispar, M. et Fem. SPARRM. Mus. Carlson. iab. 7.

Western Duck. ARCT. Zool. No. 497. pl. 23. *p*)

Bonberl Größe der Pfeif-Ente, und siebenzehn Zoll lang. Der Schnabel ist im Bau dem der Pfeif-Ente nicht unähnlich, und schwarz; der Augenstern graubraun; der Scheitel und die Seiten des Kopfs und des Halses, und der Hinterhals zur Hälfte, weiß; quer über die Stirn, von einem Auge zum andern, läuft ein Erbsengrünes Band, am Nacken ist ein anderes von der nämlichen Farbe, aber viel dunkler, und an dem untern Winkel desselben, zu beyden Seiten, ein runder, schwarzer Fleck von der Größe einer Erbse; am untern Winkel des Auges, nach hinten, ein anderer von der nämlichen Farbe, aber von unregelmäßiger Form; Kinn, Kehle und Vorderhals sind schwarz, und dieß vereinigt sich mit einem Halsbände von der nämlichen Farbe, das den Hals in seiner Mitte umgiebt; vom hintern Theil desselben läuft das Schwarze über den Rücken bis zum Schwanz herab; Brust und Seiten sind hellrostigroth, das

¹⁾ Latham Ind. orn. I. c. *Δ*. *B*.^{m)} Pennants Arct. Zool. II. S. 528. zu Nr. 419. *B*.ⁿ⁾ Vielleicht ein Junger Vogel. Latham in Ind. orn. *B*.^{o)} Anas dispar. LATHAM Ind. orn. II. p. 866. n. 83. GMELIN LIN. I. 2. p. 535. n. 107. Mus. Carl. Fasc. I. t. 7. 8. *B*.^{p)} Uebers. II. S. 525. Taf. 23. obere Figur. Donndorfs Zool. Beytr II. S. 745. Nr. 80. S. 777. Nr. 107. Im Ind. orn. zieht Hr. Latham mit Recht die von Gmelin im Linnischen System getrennte Arten, die Stellers-Ente (*Anas Stelleri*) und die ostrogothische Ente (*A. dispar*) in eine Art zusammen. *B*.

das in der Mitte kastanienbraun, und, so wie es an den After hinkommt, noch dunkler wird, wo es schwarz ist; die Deckfedern der Flügel sind weiß; die großen Schwungfedern tief schwarz, die kürzern sechs Zoll lang, und abwärts gebogen, theils weiß, theils schwarz, die Farben an jeder Feder schief abgeschnitten; die Schulterfedern auch lang, und sehr artig über die größern Deckfedern herabgebogen, wie bey der Knäck-Ente 1); bey jeder dieser Federn ist die Fahne zunächst am Körper kaum breiter, als der Schaft selbst, und beyde weiß; die andere Fahne sehr breit, und schwarz; der Schwanz spizig, und braun; die Füße schwarz.

Obige Beschreibung ist nach einem Exemplar im Leyerschen Museum abgefaßt, bey dem von Pallas erwähnten, soll der Kopf einen kleinen Federbusch haben; der grüne Fleck vor den Augen vereinigt sich nicht über den Kopf herüber, und ist breiter, als bey oben beschriebenen; der schwarze Fleck an den Winkeln des grünen Bands am Nacken, ist nicht angegeben; ausserdem paßt Eine Beschreibung auf beyde.

Dies ist eine seltene und sehr schöne Art, die sich an den Seefüsten von Kamtschatka vorfindet, und unter den unzugänglichen Klippen daselbst brütet. Sie zieht in ganzen Flügen, und besucht auch die westliche Seite von Amerika.

Das 1) Männchen ist oben beschrieben worden. Das Weibchen hat ein über und über aus Braun und Rostigroth melirtes Gefieder, fast wie eine Schnepfe. Die Schwungfedern sind alle gerad, und von dunkler Farbe; von den kürzern haben einige weiße Spitzen, und dieß bildet einen Flecken an den Flügeln. Einige Deckfedern der Flügel haben auch weiße Spitzen, und dieß bildet vorne einen großen, weißen Flecken; die Füße sind schwarz.

Ein Paar dieser Vögel ist auf einmal an einem Flusse in Ostrogothen, in Schweden, geschossen worden.

75.. a Die dickköpfige Ente. (Buffel-headed D.)

Das Männchen.

Anas bucephala. LIN. I. 200. 21. Ed. XIII. I. 2. p. 521. No. 21. 1)

Anas Albeola. LIN. I. p. 199. No. 18. Ed. XIII. I. 2. p. 521. No. 18. — Phil. Trans. vol. LXII. p. 416.

La Sarcelle de la Louisiane. BRISS. orn. VI. p. 461. pl. 41. fig. 1.

— — blanche et noir, ou la Religieuse. BUFF. ois. IX. p. 284. — Pl. enlum. 948.

Le Canard d'hyver. BRISS. l. c. p. 349. No. 10.

Le petit Canard à grosse tête. BUFF. l. c. p. 249.

Little black et white Duck. EDW. Nat. Hist. pl. 160. 2)

Le

1) Garganey. s. unten No. 87. A. Querquedula. L.

2) Zsf. a. d. Suppl. S. 275. 76.

3) Anas albeola. A. alba, dorso remigibus-

que nigris, capite colloque caerulescente sericio nitente, occipite albo. (Mas). Latham Ind. orn. II. p. 866. n. 86. B.

2) Seligmanns Vögel IV. Taf. 90. 95. B.

Spirit Duck. Arct. Zool. No. 47. u)

Buffel-headed Duck. Arct. Zool. No. 489. x) — CATESBY Carol. vol. 1. pl. 95. y)
Br. Mus. Lev. Mus. .

Sie ist etwas größer, als eine Krick-Ente, und sechzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist beynahe anderthalb Zoll lang, und schwarz; Kopf und Hals sind goldgrün, mit violetttem Glanz bey gewissem Lichte; von der Stelle hinter jedem Auge an sind die Federn weiß, und dieß läuft in einem großen Flecken nach dem Hinterkopf hin; der untere Theil des Halses ringsherum, die Brust und die untern Theile sind weiß; die äußern Schulterfedern weiß, und dieß bildet ein längliches Band an jeder Seite des Rückens, das, nebst den übrigen Schulterfedern, schwarz ist, die kleinern Deckfedern der Flügel sind dunkelbraun mit weißen Rändern; die mittlern weiß; die größern, längs der Mitte der Flügel herab, auch weiß, aber die zu beyden Seiten schwarz; die Schwungfedern tiefschwarz; einige der innern an den innern Fohnen weiß bezeichnet; der Schwanz aschgrau; seine drey äußern Federn auswärts weiß gerandet, und seine Gestalt keilsförmig; die Füße orangefarben; die Klauen schwarz z).

75. b. Die dickköpfige Ente. (Buffel-headed D.)

Das Weibchen.

Anas Albeola. LIN. I. 2. p. 517. No. 18. a).

Anas rustica. LIN. Syst. Nat. Ed. 12. t. 1. p. 201. No. 24. GMELIN LIN. I. 2. p. 524. n. 24. b)

La Sarcelle de la Caroline. BRISS. orn. VI. p. 464. No. 39. — BUFF. ois. IX. p. 286.

Little brown Duck. CATESBY Carol. I. pl. 98. c)

Kleiner, als letztere, vierzehn Zoll lang, und Ein Pfund schwer. Der Schnabel schwarz; der Augenstern rufbraun; der Kopf und die obern Theile dunkelbraun, hinter den Augen

u) Uebers. II. S. 519. Nr. 407. B.

x) Uebers. II. S. 520. Nr. 407. B.

y) Vergl. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 744. Nr. 18. S. 751. Nr. 21. B.

z) Eine kurze Beschreibung von beyden Geschlechtern ist diese. Männchen: Weiß; Rücken und Schwungfedern schwarz; der Kopf ins dunkelpurpurfarbige, dunkelgrüne und dunkelblaue spielend mit einem breiten weißen Bande, das sich von einem Auge zum andern zieht und den ganzen Hinterkopf deckt; auf den Flügeln ein großes weißes rings um schwarz eingefasstes Feld; der Bürzel mattschwarz und zu beyden Seiten weiß.

Weibchen: Oben mattschwarz; der Kopf braunschwarz mit einem weißen Fleck hinter den Augen; auf den Flügeln ein weißer Spiegel,

ebenso die mittlern Schwungfedern weiß; Brust und Stels aschgrau. Etwas kleiner als das Männchen. B.

a) Hier wird im System das Weibchen ordentlich beschrieben, es ist also unter dem Namen Anas rustica vergeblich noch einmal als besondere Art aufgeführt. Der ganz eigene Kopfbau zeigt deutlich, daß beyde Vögel zu einer Art gehören und nur dem Geschlecht nach verschieden sind. B.

b) Anas albeola. A. fusco cinerea, macula aurium alarumque alba. (femina). Latham l. c. B.

c) Seeligmanns Vögel IV. Taf. 96. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 756. Nr. 24. B.

Augen ein eyrunder, weißer Fleck; die Kehle und die untern Theile hellrau; die großen Schwungfedern dunkelbraun; die kleinern eben so, aber auswärts weiß gerändert, wodurch ein Fleck an den Flügeln entsteht; der Schwanz braun; die Füße schwarz *).

Diese Vögel sind in Amerika zu Hause, und finden sich im Winter in Newyork, ziehen auch bis nach Carolina, und kehren im Sommer nach Süden zurück, um zu brüten. Nach Hudsons-Bay, am Severnstrom, kommen sie im Junius, und machen ihr Nest auf Bäume in den Wäldern, nahe an Teichen. Sie tauchen oft unter, und kommen in einer großen Entfernung wieder herauf, daher sie von Eingigen Gespenst-Ente (Spirit-Duck) genannt werden *).

Die dickköpfige und die Gespenst-Ente der Schriftsteller können nichts anders, als Eine und ebendieselbe Art seyn, denn sie weichen bloß in der Dichtigkeit des Gefieders am Kopf von einander ab; in allen andern Stücken kommen sie genau miteinander überein. Catesby's Vogel ist nach der Natur gezeichnet, und einer von denen, wovon ich verschiedene Exemplare im Cabinette gesehen, so wie in meiner eigenen Sammlung habe; das im Brittischen Museum ausgenommen, das einen glatten Kopf hat, und dem ähnlich ist, wovon Edwards seine Abbildung genommen hat. Da diese Vögel nicht selten sind, so habe ich sie miteinander verglichen, und kann bis jetzt kein anderes Resultat ziehen. Inzwischen kann ich leicht diese oder eine andere Meynung, die gegen die gewöhnliche läuft, zurücknehmen, wenn hinlängliche Erfahrungen angeführt werden können, um den Gegenstand aufzuklären.

76. Die Quack-Ente. (Die goldäugige Ente. Golden-eye D.)

Anas Clangula. LIN. I. p. 201. 23. Ed. XIII. I. 2. p. 523. No. 23. f) — Faun.

Suec. No. 122. — Scop. ann. I. No. 71. g) — BRÜNN. orn. No. 70. 71. —

MÜLLER Zool. No. 119. — KRAM. elench. p. 341. No. 13. — FRUSCH av. tab. 183. 84 — GEORGI Reise p. 166. — Faun. Groenl. No. 43.

Le Garrot. BRISS orn. VI. p. 416. No. 27. pl. 37. fig. 2. — BUFF. ois. IX. p. 222. — Pl. enlum. 802.

Smalles reddish-headed Duck. RAI Syn. p. 143. No. 11. (das Weibchen). — WILL. orn. p. 369.

Golden-eye. RAI l. c. p. 142. A. 8. — WILL. l. c. p. 368. pl. 73. — ALBIN Nat. Hist. Vol. I. pl. 96. — Br. Zool. II. No. 276. — Arct. Zool. No. 486 b)

Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre

d) Daß diese drey Vögel *Anas bucephala*, *albeola* et *rustica*, nicht als Arten getrennt werden dürfen, lehrt sogar der Augenschein, auch bey Abbildungen, wenn man sie gleich nicht selbst in der Natur gesehen hat. B.

e) Dieß ist von dem Männchen gesagt. Edwards.

f) Latham Ind. orn. II. p. 867. n. 87. B.

g) Uebers. v. Günther I. S. 64. Nr. 71. B.

h) Uebers. II. S. 518. Nr. 507. Bloch's Schrift. der Berlin. Gesellsch. IV. S. 479. 9. t. 17. f. 1. 2. Pallas nord. Beytr. IV. S. 14. *Pontoptila* N. S. v. Norweg. II. S. 126. v. Dänemark. S. 168. Lapechin Tagebuch II. S. 14. Meine N. S. Deutschlands II. S. 645. Nr. 10. Doandorfs Zool. Beytr. II. S. 754. Nr. 23. B.

Lathams allgem. Uebers. der Vögel. III. Band 2. Th.

N n n

Ihre Länge ist neunzehn Zoll, und ihr Gewicht sieben Viertel Pfund. Der Schnabel ist nicht ganz zwey Zoll lang und schwarz; der Augenstern goldfarben; der Kopf und der Hals zur Hälfte schwarz, mit grünem und violettem Glanze; an den Mundwinkeln, zwischen dem Schnabel und den Augen, ist ein breiter, weißer Fleck; der untere Theil des Halses, die Brust und die untern Theile sind weiß; einige Federn an den Seiten haben weiße Spitzen. Der Rücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes sind schwarz; die Schulterfedern schwarz und weiß; die Deckfedern der Flügel schwarz, und mit zwey weißen Flecken bezeichnet, der Eine an den kleinern, der Andre an den größern; die Schwungfedern sind schwarz, sieben von den mittlern ausgenommen, die weiß sind; die Füße orangefarben. Dieser Vogel ist mit einem Labyrinth versehen ¹⁾.

Das Weibchen wiegt ein Pfund, oder auch wohl darüber; sein Kopf ist dunkel röthlich-braun; der Hals grau; Brust und Bauch weiß; die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern dunkelbraun und aschgrau; die mittlern Schwungfedern weiß; die übrigen und der Schwanz schwarz; die Füße dunkelbraun.

Diese Art ist nicht selten an unsern Seeküsten im Winter, und kommt in kleinen Flügen; zieht aber im Frühling nach Norden, um zu brüten. Den Sommer über ist sie in Schweden und Norwegen zu Hause ²⁾. Sie ist ein vortrefflicher Taucher, und lebt von kleinen Muscheln. Man sieht sie mehrentheils im Wasser, weil sie nicht gut zu Fuße ist. Auch hat man den Versuch gemacht sie zu zähmen; sie scheint aber zu Lande außer ihrem Element zu seyn; nur mit großer Schwierigkeit ist sie dazu zu bringen, etwas anders, als Brod zu fressen; und ihre Füße werden gleich beschädigt, welches sie wenigstens im Gehen hindert. Ihr Fleisch wird sehr geschätzt, und man sieht diese Vögel zu gewissen Jahreszeiten oft auf den Märkten. Im Winter findet sie sich auch in Amerika bis Newyork herab; in Sommer in Hudsons-Bay, wo sie die Süßwasser-See besucht, und ein rundes Nest aus Gras macht ³⁾, das mit Federn aus ihrer Brust ausgelegt ist; sie legt sieben bis zehn weiße Eier. In Hudsons-Bay heißt sie *Miste pe squa pe wew* ⁴⁾. Sie ist auch ein Bewohner Grönlands, aber kein gemeiner Vogel daselbst.

77. Die Spatel-Ente. (Morillon D.)

Anas Glacion: L. l. 2. p. 525. No. 26. — Faun. Suec No. 123. — Scop. ann. 1. No. 72. — MÜLLER Zool. No. 120.

Le Morillon. BRISS. orn. VI. p. 406. No. 25. pl. 26. fig. 1. 2.

Grey-headed Duck. Br. Zool. ed. 2 vol. II. p. 470.

Glaucium, or Morillon of Belon. RAU Syn. p. 144. — WILL. orn. p. 368. —

Br. Zool. II. No. 277. — Arct. Zool. p. 473. F.

LEV. Mus.

¹⁾ „Die Luftröhre hatte ein Labyrinth an ihrer Zerstelung; und ausserdem ist sie nach oben in einen Bauch, oder in eine blasenähnliche Höhle aufgetrieben.“ Willughby. Eine Abbildung der Luftröhre s. auf der Platte.

²⁾ Im Herbst trifft man sie in kleinen Flügen auf den Teichen in Deutschland an. B.

³⁾ In hohle Bäume. Faun. Suec.

⁴⁾ Hr. Hutchins.

Briffon beschreibt sie etwas kleiner, als die Quack-Ente (Nr. 76), und beynahe funfzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist breit und bleifarbig; der Augenstern goldgelb; der Kopf hat einen kleinen Federbusch, und ist, nebst den größten Theil des Halses, schwarz, mit violettem Glanze; der untere Theil des Halses gelbrothbraun; der Rücken, die Schulterfedern und der Steiß glänzend schwärzlichbraun, mit einem geringen Anstrich von Violett; die Brustfedern braun, und sehr tief hinein weiß gerändert; der Bauch weiß; am After mit Braun melirt; die Deckfedern der Flügel schwärzlichbraun, die mehrsten von den innern mit einem Anstrich von Grünem; die zehn ersten Schwungfedern schwärzlichbraun, und von der vierten bis zur zehnten, in der Mitte, an der äußern Fahne, nicht weit vom Schaft, mehr oder weniger grau bezeichnet, die elfte und zwölfte hellgrau, mit braunen Spitzen, die acht folgenden weiß, und wie die vorigen überlaufen, die innern derselben an der innern Fahne braun, die sechs zunächst am Körper stehenden dunkelbraun, und die äußerste von ihnen hat einen weißen Flecken an der äußern Fahne; der Schwanz ist violettbraun; die Füße sind bleifarben; die Klauen schwarz.

Beym Weibchen sind Kopf und Hals braun, vornen schwärzlich melirt; Rücken und Schulterfedern lebhaft braun, mit ganz kleinen, grauen Punkten gestüpelt; der Unterrücken und der Steiß dunkel grünlichbraun; die Seiten graubraun; die untern Deckfedern des Schwanzes weiß, mit schwarzen Bändern; außerdem ist es wie das Männchen, nur daß dieses ein Labyrinth, beim Eintritt der Luftröhre in die Lungen hat, das jenem fehlt.

Die Beschreibung in der Britischen Zoologie weicht etwas ab. Der Schnabel ist gelblichbraun; der Kopf dunkel rothfarben um den obern Theil des Halses läuft ein weißes Halsband; unter diesem ist ein breiteres, graues; Rücken und Deckfedern sind dunkelbraun, mit einigen wenigen weißen Strichen; die größern Deckfedern auch dunkelbraun, mit einigen wenigen weißen Flecken; die großen Schwungfedern schwarz; die kürzern, die Brust und der Bauch weiß; die Seiten über den Schenkeln schwarz; der Schwanz dunkelbraun; die Füße gelb.

Keiner der bisher beschriebenen Vögel hat mehr Ungewißheit über die Identität der Art, bey mir veranlaßt, als dieser; ich befürchte aber, die von Briffon beschriebenen sind mir nicht zu Gesicht gekommen, zum wenigsten nie Männchen. Vor einigen Jahren ist mir ein Paar unter dem Namen: Spatel-Ente (Morillons) geschickt worden, die bloß darin voneinander abweichen, daß der Kopf und der Hals des vermeintlichen Männchens, um vieles dunkler waren, als die des Weibchens; beyde aber waren dem Weibchen der Quack-Ente (Nr. 76) so ähnlich, daß ich darüber ersaunte; es waren trockene Exemplare, und man konnte daher den innern Bau der Luftröhre u. s. w. nicht entdecken. Willughby *) scheint in großer Verlegenheit gewesen zu seyn, wie er die von ihm beschriebenen Vögel, die sich im Gefieder so sehr ähnlich waren, für verschiedene Arten angeben sollte, als er bey Einigen, die er für Weibchen gehalten hatte, ein Labyrinth fand, das nur dem Männchen eigen ist; dieß läßt sich aber wohl miteinander vereinigen, wenn man etwas auf den Zustand des Gefieders bey Vögeln in ver-

Ann 2

schie.

*) Orn. p. 367 — 369. Sect. XII — XIV.

schledenen Perioden des Lebens rechnet; und daß, obschon die Federn bey jungen Vögeln nicht die nämlichen waren, wie bey Erwachsenen, doch das Labyrinth in jeder Periode zu sehen war; daher dieser Umstand, der mit dem Alter nichts gemein hat, bloß das Geschlecht bestimmen kann.

Ich habe die Quack-Ente in allen Stücken vollkommen gesehen, bloß den weißen Fleck an den Mundwinkeln ausgenommen; und im Brittischen Museum kann man Eine sehen, mit den weißen Flecken so groß, als gewöhnlich, aber nur so weit zur Vollkommenheit gediehen, daß sie noch sehr von dunkeln Flecken verdunkelt werden; welches zum Beweis des Fortschreitens der Natur zur Vollkommenheit der Charakteristischen Kennzeichen bey erwachsenen Vögeln, dienen kann.

78. Die Mexikanische Ente. (Mexican D.)

Anas novae Hispaniae. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 525. No. 94. o)

La Sarcelle du Mexique. BRISS. orn. VI. p. 458. — BUFF. ois. IX. p. 285.

Toltecocolotli, seu Metzcanahtli. RAI Syn. p. 175.

Sarcelle. FERMIN Surin, vol. II. p. 158. p)

Sie hat die Größe unserer Krick-Ente (Nr. 88). Die obere Kinnlade (des Schnabels) ist blau, die untere schwarz; der Augenstern schwarz ¹⁾; der Kopf rothgelb, mit einer Mischung von Schwärzlichem und glänzend Grünlichblauem; zwischen dem Schnabel und den Augen ist ein großer, weißer Fleck; Hals und Körper weiß, mit schwarzen Tüpfeln gesprenkelt, die an der Brust am zahlreichsten sind; die Schulterfedern und die obern Deckfedern des Schwanzes eben so, die untern Deckfedern blau; die Deckfedern der Flügel blau, und über dieselbe läuft ein weißes Band, die größern, am weitesten vom Körper abstehenden, schwärzlich; die Schwungfedern schwarz, einige der mittlern auswärts grün, und mit rothgelben Spitzen, wodurch ein Band von dieser Farbe über die Flügel an diesem Theil entsteht, die zunächst am Körper stehenden aber sind weiß, mit schwarzen Punkten; der Schwanz ist dunkelschwarz, mit weißen Rändern; die Füße sind hellroth.

Das Weibchen unterscheidet sich durch einen schwarzen Kopf, Hinterhals, Rücken, Schulterfedern, Deckfedern der Flügel und Steiß, wovon einige Federn rothgelb — die andern weiß gerändert sind; die Kehle, der Vorderhals, die Brust und die untern Theile sind schwarz und weiß melirt; die großen Schwungfedern schwarz, auswärts weiß gerändert, die nächsten an den äußern Fahnen grün, und an den innern schwarz; und die zunächst am Körper stehenden schwarz und auswärts weiß bandirt; der Schwanz wie beym Männchen; die Füße aschfarben.

Sie ist in den Seen von Mexiko zu Hause, wo sie eine sehr schmutzige Nahrung zu sich nehmen soll, indem sie beständig mit dem Schnabel im Schlamme nach Würmern, todtten Fischen

o) Latham Ind. orn. II. p. 868. n. 89. B.

p) Bonndorfs Zool. Beytr. II. S. 758. Nr.

94. B.

q) Fermin sagt, Augensterne und Augenlider seyen gelb.

Fischen u. dgl. herumstört; sie liebt auch Frösche, und überhaupt alle Arten von Unflath; diesen ungeachtet hält man ihr Fleisch für vortreflich. Sie findet sich auch in Surinam und soll drey große Eyer legen.

79. Die Hauben-Ente. (Tufted D)

Anas fuligula. LIN. I. p. 207. 45. Ed. XIII. I. 2. p. 543. No. 45. r) — Faun. Suec. No. 132. — SCOP. ann. I. No. 78 s) — BRÜNN. orn. No. 90. — MÜLLER Zool. No. 129. — KRAM. elench. p. 341. No. 12. — FRISCH av. tab. 171. — GEORGI Reise p. 167.

Le petit Morillon. BAISS. orn. VI. p. 411. No. 26. pl. 37. fig. 1.

Le Morillon. BUFF. ois. IX. p. 227. 231. pl. 15. — Pl. enlum. 1001.

Tufted Duck. RAH Syn. p. 142. A. 7. — WILL. orn. p. 365. pl. 73. — ALBIN Nat. Hist. vol. I. pl. 95. — Br. Zool. II. No. 274. — Arct. Zool. p. 573. G. 1)

Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre Länge ist sechzehn Zoll; ihr Gewicht zwey Pfund. Der Schnabel ist breit, und blaugrau; die Spitze schwarz; der Augenstern goldfarben; die Kopffedern lang, und bilden einen herabhängenden Federbusch; Kopf, Hals und Brust sind schwarz; der Kopf mit grünem Glanze; die Schulterfedern dunkel schwärzlichbraun, mit ganz kleinen, gelblichweißen Punkten gesprenkelt, die aber auf einige Entfernung nicht sichtbar sind; die Flügel sind dunkelbraun, über sie läuft ein schmaler, weißer Streifen; Bauch und After sind weiß, dieser mit schwärzlichen Farben melirt; die Füße dunkelblau; die Schwimmhäute schwarz.

Das Weibchen ist wie das Männchen; aber der Federbusch fehlt ihm, und die schwarze Farbe zieht sich ins Braune.

Diese Art findet sich in Europa, bis Norwegen *). In den Wintermonaten ist sie nicht selten in England, wo man sie um diese Zeit auf den Märkten antrifft, und sehr schätzt *). Sie ist auch durch ganz Rußland zu Hause, und zieht nach Norden, um zu brüten. Auch in Kamtschatka ist sie häufig *).

79. Var. A. Die Nyroko-Ente.

Anas Nyroca. GÜLDENSTAEDT in Nov. Comm. Acad. Petrop. vol. XIV. p. 403.

— — L. I. 2. p. 542. No. 119. 2)

N n n 3

Ihre

r) Latham Ind. orn. II. p. 869 n. 90. B.

s) Uebers. v. Günther I. S. 69. Nr. 78. B.

t) Uebers. II. S. 534. G. Meine N. G. Deutschlands II. S. 721. Nr. 1. Cetti N. G. v. Sardinien II. S. 341. Pallas nord. Beytr. IV. S. 10. Lepechin's Tagebuch I. S. 189. III. S. 14. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 795. Nr. 45. B.

u) Im Herbst und Frühjahr trifft man sie einzeln in Deutschland an: B.

x) Die Franzosen lassen diese Art an Fasttagen und zur Fastenzeit essen; so wie die Trauer-Ente (Nr. 36), allein obgleich das Fleisch dieser letzten zuweilen erträglich ist, so ist doch das der Hauben-Ente stets vortreflicher.

y) Arct. Zool.

z) *Anas Nyroca*. Latham Ind. orn. II. p. 869. n. 91. Hier ist sie als Art getrennt, doch nicht mit Gewißheit. B.

Ihre Länge ist sechzehn Zoll, und acht Linien. Der Schnabel ist zwey Zoll lang, schwarz, und an den Seiten gezähnt; der Augenstern weißlich; der Kopf an den Seiten eingedrückt, und dunkel glänzend kastanienbraun; Hals, Brust und Seiten eben so; der untere und hintere Theil des Halses, der Rücken und der Steiß olivenschwarz; Bauch und Aiter weiß; die Seiten der Lektorn braun; die Flügel kürzer, als der Schwanz, einige Schwungfedern mit olivenschwarzen Rändern, andere mit eben solchen Spizen, von der siebenten bis zur zwölften weiß, die Enden ausgenommen, die schwarz sind. und bey geschlossenen Flügeln, einen aroßen Flecken oder Spiegel bilden; der Schwanz spizig, und schwarzbraun; die Füße dunkel bleifarben; die Klauen schwarz.

Das Weibchen ist kleiner, und da, wo das Männchen kastanienbraun ist, schmutzig rothfarben; der Bauch weißlich, gewölkt; die Gegend des Asters heller braun; der Rücken ins Gelbrothe ziehend; übrigens ist es wie das Männchen.

Diese Art ist in Rußland zu Hause, und häufig am Donstrom. Männchen und Weibchen findet man immer zusammen. Sie legt sechs bis acht weißliche Eyer, in eine Höhle auf einem erhabenen Boden, im May. Wenn das Weibchen brütet, so treibt es das Männchen weg, weil es sonst die Eyer zerbrechen würde, wie Erfahrungen bezeugen. Sie leben hauptsächlich von Vegetabilien und Saamen, selten von Fischen. Ihr Fleisch ist wohl schmeckend, und zart.

Herr Gildenstädt, von dem obige Nachrichten sind, hält diese für eine, von der Hauben-Ente, verschiedene Art, worin ich ihm nicht geradezu widersprechen kann. Inzwischen muß man erwägen, daß die Hauben-Ente außerordentlich variiert, und vor dem zweyten Jahr ihr volles Gefieder nicht erhält.

Bei jungen Vögeln *) sind Kopf, Hals und Oberbrust kastanienbraun, und der Kopf hat nur einen ganz kleinen Federbusch; die Federn an der Wurzel des Schnabels sind hellgelb; Rücken, Flügel und Schwanz schwarz; Brust und Bauch weiß; und ein Streifen von dieser Farbe läuft über die Flügel.

Scopoli hat auch drey Spielarten angemerkt, die soviel an Größe, als im Gefieder verschieden sind.

Die Erste ^{b)} ist kleiner, als die wilde Ente, und hat einen schwarzen, mit violet überlaufenen Kopf; der Federbusch ist so lang, als ein Finger; der Körper braun; der Steiß rußbraun und weiß melirt.

Die Zweyte ^{c)} hat die Größe der wilden Ente. Ihr Schnabel ist gelblich; der Kopf und der Anfang des Halses sind gelbroth; der Federbusch kurz; der übrige Hals, die Brust, der Bauch und der Steiß schwarz; der Rücken braun; die Flügel aschbraun, mit weißen Rändern; die Schwungfedern weiß; an der Wurzel jedes Flügels ist ein weißes, fegelförmiges Band; die Schenkel sind braun.

Die

a) A. latirostra. Brünn. I. c. p. 21. No. 90.

Latham I. c. p. 5.

b) A. Fuligula L. I. 2. p. 543. No. 45. p.

c) A. Fuligula L. I. 2. p. 543. No. 45. p.

Latham I. c. p. 5.

Die Dritte ^{a)} hat die Größe der Ersten. Kopf und Federbusch sind kastanienbraun; die Schläfe glänzend grün; die Brust weißlich, mit schwarzen Flecken; der Bauch rein weiß; unter dem Schwanz ist sie schwarz; die Wurzel der Flügel braun; unter dieser ist ein gelbrothes Band, dann sein glänzendes, grünes, und zuletzt ein schwarzes; die Schwungfedern sind braun.

Nach den obigen Beobachtungen der Schriftsteller, in Verbindung mit meinen eigenen, in Rücksicht der jungen Vögel, wovon ich jetzt ein Exemplar vor mir habe, sind sehr viele Gründe vorhanden, zu glauben, daß alle, hier unter dem Artikel der Hauben-Ente aufgeführten Vögel, entweder Spielarten, oder Geschlechtsverschiedenheiten sind, wenn sie sich nicht in den fortschreitenden Stufen zur Vollkommenheit befinden.

50. Die Neuseeländische Ente. (Neu-Zealand D.)

Anas novae Seelandiae. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 541. No. 117. ^{c)}

Sie hat die Größe einer Krick-Ente, und funfzehn Zoll Länge. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang, und etwas stark, seine Farbe bläulichweiß, der Nagel an der Spitze schwarz; der Augenkern goldfarben; Kopf und Hals schwarz, die hintere Seite mit Purpurglanz, bey gewissem Licht ins Blaueschillernd; die obere Theile des Körpers und die Flügel schwarz, mit grünem Glanze; die untern Theile hellaschfarben, die Schwungfedern dunkel aschfarben; an den Füßern ist ein weißer Streifen; der Schwanz ist kurz, und schmutzig grün; die Füße sind hellaschfarben.

Sie ist in Duff's-Bay, in Neuseeland ^{d)} zu Hause, wo sie He-patek heißt. Aus den Gemälden des Hrn. Joseph Banks. Capitain Cook ^{e)} erwähnt auch einer, die größer, als eine Krick-Ente und über und über schwarz ist, das Männchen ausgenommen, das etwas Weißes an den Flügeln hat; und bemerkt, man trafe sie nirgends an, als an der Spitze der Bucht. Obige Art scheint sehr viele Verwandtschaft mit der Hauben-Ente (Nr. 79) zu haben.

81. Die Straußente. (Crested D.)

Anas cristata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 546. No. 114. ^{b)}

Sie hat die Größe der wilden Ente und ist acht und zwanzig Zoll lang. Ihr Schnabel ist zwey Zoll lang, schwarz, und am Ende aufwärts gebogen, die Ränder der untern Kinnlade gelblich, der Augenkern roth; der Scheitel dunkelbraun, und verlängert sich in einem Federbusch am Hinterkopf; die Stirn, die Seiten unter den Augen, und der Hals hellaschfarben; Kinn und Vorderhals hell milchbläulich, nach der Quere um den untern Theil des Halses herum, dunkel,

^{a)} A. Fuligula L. I. 2. p. 543. No. 45. ^{d)} Latham I. c. ^{d)}

^{e)} Latham Ind. orn. II. p. 870. n. 92. ^{e)}

^{f)} Forst. Voy. vol. I. p. 468.

^{g)} Voy. vol. I. p. 72

^{h)} Latham Ind. orn. II. p. 870. n. 93. ^{h)}

dunkelbraun und rothfarben gefleckt; der Rücken und die Deckfedern der Flügel dunkel aschfarben; der Unterrücken und der Steiß hell gelbroth aschfarben; der Spiegel auf den Flügeln schön blau, und unten weiß eingefast ¹⁾; Schwungfedern und Schwanz schwarz; letzterer spitzig, und länger als die Flügel.

Sie ist in Staatenland zu Hause. Aus den Gemälden des Herrn Joseph Banks.

82. Die Kolben-Ente. (Red-crested D.)

Anas rufina. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 541. No. 118. k) — PALLAS Reise vol. II. p. 713. No. 28.

Anas capite rufio major. RAI Syn. p. 140. No. 2.

Le Canard Siffleur huppé. BRISS. orn. VI. p. 398. No. 22. — BUFF. ois. IX. p. 182. — Pl enlum 928.

The great red-headed Duck. WILL. orn. p. 464.

Barbary Shoveler. SHAW'S Trav. p. 254. l)

Lev. Mus.

Sie wiegt drey Pfund, oder noch mehr, und ist zwey Fuß lang. Ihr Schnabel ist zinnoberroth; der Augenstern braun; der obere Theil des Kopfs und Halses dunkel ziegelroth; der Scheitel hellgelbroth; die Federn desselben sind dicht gepflanzt, erheben sich, und bilden einen sehr großen, kugelförmigen (globular) Federbusch; der Körper ist im Allgemeinen schwarz, die untern Theile aber ziehen sich ins dunkelbraune; der Ursprung des Rückens zwischen den Flügeln, graubraun; die Ackerflügel sind heller; an der Wurzel derselben ist ein querstehendes, mondförmiges, weißes Zeichen; die Flügel sind schwärzlichbraun, der Spiegel weiß, schwarz eingefast; die untern Theile derselben, und die Ränder, weiß; der Schwanz kurz, und braun; die Ränder der Federn weißlich; die Füße braun, vornen röthlich.

Das Weibchen ist braun, und von hellerem Colorit; der Schnabel röthlich; und der Kopf ohne Federbusch.

Sie sind am Caspischen See, und an den großen Seen in den Tatarischen Wüsten, zu Hause, wo sie einsam leben. Zuweilen sieht man sie in den großen Seen an der Ostseite der Uralischen Gebirgskette, aber nicht im übrigen Sibirien. Gegen Süden finden sie sich bis nach Italien vor, denn Willughby hat sie in Rom angetroffen; und wenn sie mit Shaw's rothhalsiger Löffel-Ente (Red-necked-Shoveler) einerley sind, so sind sie auch in der Barbarey ^{m)}.

83. Die

i) In der Zeichnung schien eine Hervorragung am Flügelbug zu seyn; da aber im Manuscript keine Meldung davon geschah, so bleibt dieser Umstand ungewiß.

k) Latham Ind. orn. II. p. 870. n. 94. B.

l) Pallas Reise Auszug II. S. 240. Anh. S. 15. Nr. 28. Dessen nordische Beytr. III. S. 12.

IV. S. 14. Dessen N. G. merkw. Thiere, VI. S. 40. Taf. 5. Donndorfs Zool. Beyträge II. S. 793. Nr. 118. B.

m) Auch trifft man sie in Oestreich (Kramer, Austr. p. 339. No. 8.) und in Schlesien Schwenkfeld, av. Siles. p. 201.) an. B.

83. Die Isländische Ente. (Iceland D.)

Anas islandica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 541. No. 116. n)

Hrafn-ond. MÜLLER Zool. p. 16. No. 131. — Isländ. Reise Sect. 688. o) —

Arct. Zool. p. 574. H. p)

Die Hauptfarbe ist schwarz; der Kopf mit einem Federbüsch versehen; Vorderhals, Brust und Bauch weiß; die Füße saffrangelb.

Sie ist in Island zu Hause, wo sie Hrafn-ond genannt wird.

84. Die dunkelbraune Ente. (Dusky D.)

Anas obscura. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 541. No. 115. q)

Dusky Duck. Arct. Zool. No. 496. r)

Ihre Länge ist zwey Fuß. Der Schnabel ist lang, schmal, und dunkelbraun, mit Blau überlaufen; der Scheitel dunkelbraun; der Hals hellbraun, abwärts mit dunkelbraunen Streichen gestreift; der Rücken und die Deckfedern der Flügel dunkelbraun; Brust und Bauch ebenso, mit schmutziggelben Rändern; die großen Schwungfedern dunkelbraun; der Spiegel schön blau, und schwarz eingefasst; der Schwanz keilförmig, und dunkelbraun mit weißen Rändern; die Füße dunkelbraun oder gelb.

Sie ist in der Provinz Newyork zu Hause.

85. Die Sommer-Ente. (Summer D.)

Anas sponsa. LIN. I. p. 207. 33. Ed. XIII. I. 2. p. 539. No. 43. s)

Le Canard d'Été. BRISS. orn. VI p. 351. No. 11. pl. 32. fig. 2.

Le beau Canard huppé. BUFF. ois. IX. p. 245. — Pl. enlum. 980. 81.

Ytzaetzon Yayauhqui r) RAU Syn. p. 176. — WILL. orn. p. 387.

American Wood Duck. BROWN Jam. p. 481.

Summer Duck. CATESBY Carol. vol. I. pl. 97. u) — EDW. Nat. Hist. pl. 101. —

Arct. Zool. No. 493. x).

Br. Mus. Lev. Mus.

Sie hat die Größe einer Pfeif-Ente, und ist neunzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist roth, zunächst an der Wurzel der obern Kinnlade gelb, Spitze und Rücken desselben schwarz; der Augenstern nußbraun; die Augenlieder karminroth; der Hinterkopf mit einem großen Federbüsch gezieret,

n) Latham Ind. orn. II. p. 871. n. 95. B.

o) Olaffen Island. I. S. 292. B.

p) Uebers. II. S. 534. H. B.

q) Latham Ind. orn. II. p. 871. n. 96. B.

r) Uebers. II. S. 525. Str. 414. B.

s) Latham Ind. orn. II. p. 871. n. 97. B.

t) Der Vogel mit buntem Kopf.

u) Seligmann's Vögel. IV. Taf. 90. 94. B.

x) Uebers. II. S. 523. Str. 411. Donnerdors

Zool. Beytr. II. S. 791. Str. 43. B.

zert, dessen Federn sehr lang sind, und den Hals herab hängen; Kopf und Federbusch sind glänzendgrün, das bey gewissem Lichte purpurroth zu seyn scheint; von den Nasenlöchern läuft ein weißer Strich zu beyden Seiten über die Augen nach dem Hinterkopf hin, und von dem hintern Theil der Augen ein zweyter, eben dahin; der Hinterkopf selbst, unter dem Federbusch, ist schwarz; Rinn und Kehle sind weiß, und dieß bildet eine schmale, krumme Linie nach oben um die Kinns-lade herum, die sich hinten an den Augen in eine Spitze endigt; unter dieser ist eine zweyte krumme Linie, die nach dem Nacken hingehet; der Hals, unter dem Federbusch, und die Brust, sind röthlich weingelb (*rudy vinaceous*), hinten ins Braune ziehend, die Brust ist mit dreyeckigen, weißen Flecken bezeichnet; von da an bis an den After ist die Farbe weiß; die Federn, die über die Flügel herüberfallen, sind schwarz und weiß gestreift; der Rücken ist glänzend braun; die Schulterfedern haben einen blaugrünen Glanz, und die kürzern Schwungfedern einen blauen; die Seiten des Körpers sind artlg dunkelbraun und gelblichweiß gestreift; die Federn über den Schenkeln an den Enden schwarz und weiß durchzogen; die Seiten des Afters purpurkastanienbraun; die Füße orangefarben.

Das Weibchen ist kleiner.¹⁾ Die Federn um die Wurzel des Schnabels herum sind weiß; die Augenkresse eben so, und dieß läuft rückwärts in einen Streifen, wo es sich in eine Spitze endigt; Rinn und Kehle sind weiß; Vorderhals und Brust braun, mit dreyeckigen, weißen Flecken bezeichnet, wie beym Männchen, aber ungleich weniger deutlich; Rücken und Schwanz braun; die Flügel eben so, an den Deckfedern und Schwungfedern der zweyten Reihe mit blau-grün untermischt; über die Flügel, gerade über den Schwungfedern, läuft ein schmaler, weißer Streifen; die Schwungfedern sind dunkelbraun, an den Enden grau- und inwendig grün gerändert; der Bauch weiß; die Füße wie beym Männchen²⁾.

Diese ungemein schöne Art ist in Mexiko und auf einigen Inseln Westindiens zu Hause, und zieht im Sommer bis zum 40sten Grad gegen Norden, auch wohl ein wenig darüber. In Newyork sieht man sie zeitig im Frühjahr, und sie brütet dort; ihr Nest bauet sie in die Höhlen abgestorbener Bäume, oder in solche, die die Spechte gemacht haben, und oft zwischen die Gabeln der Zweige: daher sie von einigen Sommer-Ente und Baum-Ente (*Tree-Duck*) genannt wird. Wenn die Jungen ausgefrochen sind, so trägt sie die Alte auf ihrem Rücken ins Wasser. Man sieht sie oft zahm in unsern Menagerien, wo sie auch brütet. Die Amerikaner schätzen ihr Fleisch hoch. Dieß ist die Art, mit deren Halse die Eingebornen auf Louisiana ihre Pfeifen oder Friedenszeichen (*calumets of peace*)²⁾ schmücken; und in letztem Lande ist sie das ganze Jahr hindurch anzutreffen.

86. Die

1) Ein im Darmstädtschen Cabinette befindliches Weibchen unterscheidet sich bloß in folgenden Stücken vom Männchen: 1) das Gefieder ist minder lebhaft; 2) der Federbusch fehlt; 3) der Scheitel ist schwarz statt glänzend dun-

kelgrün; 4) die Wangen, das Rinn und die Kopflinten, welche beym Männchen schneeweiß sind, sehen grau aus. V.

2) Hist. Louis. vol. II. p. 115. — S. auch Allg. Uebers. d. B. I. B. I. Th. S. 34. Note *).

86. Die Chinesische Ente. (Chinese D.)

Anas galericulata. LIN. I. p. 206. 42. Ed. XIII. I. 2. p. 539. No. 42. a)
 La Sarcelle de la Chine. BRISS. orn. VI. p. 450. No. 34. — BUFF. ois. IX. p.
 276. pl. 19. — Pl. enlum. 805. 6.
 Chinese Teal. EDW. Nat. Hist. pl. 102. b) — KAEMPFER Japan. p. 129 pl. 10.
 Lev. Mus. c)

Diese ist etwas kleiner als eine Pfeif-Ente. Ihr Schnabel ist mattroth; der Augenstern nußbraun; der Hinterkopf und ein Theil des Halses dicht mit Federn besetzt, und in einen etwas flachen Federbusch verlängert; der Scheitel, längs der Mitte des Kopfs, grünlich schwarz; zwischen Schnabel und Augen hellgelbroth, hinter den Augen weiß, und dieß läuft nach hinten, in den Federbusch hinein, der dunkel glänzend grün ist; die Federn um den obern Theil des Halses herum sind lang und spizig, wie bey'm Hahn, und matt orangefarben; der untere Theil des Halses und der obere Theil der Brust kastanienbraun; am Flügelbug sind drey schwarze und zwey weiße Querstreifen, die miteinander abwechseln; die Schulterfedern schwarz, mit weißen Rändern; Rücken und Steiß dunkelbraun, an gewissen Stellen mit blaugrünem Glanze; an den Flügeln ist ein Spiegel, oder ein glänzender, blaugrüner Fleck, der unten weiß eingefasst ist; die Schwungfedern sind dunkelbraun, an den Enden hellgrau eingefasst; Eine der Schwungfedern der zweyten Reihe ist an einer Fahne viel breiter als an der andern, und krümmt sich sehr lartig aufwärts, so daß sie, bey geschlossenen Flügeln, aufrecht steht; diese breitere Fahne ist schön hellbräunlich roth, mit schwarzer Spitze; die untere, oder schmalere, dunkelschwarz; der Schwanz zugespizt, dunkelbraun, mit blaugrüner Einfassung; die Seiten des Körpers bräunlichgelb, mit schönen, schwarzen Querstreifen durchzogen; die Federn über den Schenkeln, an den Enden schwarz und weiß gestreift; der untere Theil der Brust und des Bauches weiß; die Füße orangefarben.

Das Weibchen ist der Sommer-Ente (Nr. 85) nicht unähnlich, hat aber zwey Streifen an den Flügeln; die Brust scheint mehr braun gewölkt zu seyn, und ihre Flecken sind nicht dreyeckig, wie bey der Sommer-Ente, sondern rund; inzwischen ist ein so geringer Unterschied zwischen einigen Exemplaren von Weibchen dieser beyden Arten, daß man eine sehr genaue Kenntniß von ihrer Gestalt und Form besitzen muß, um nicht eine mit der andern zu verwechseln.

Sie ist in China und Japan zu Hause, und ein ganz eigener schöner Vogel und die Einwohner halten sie dieser ihrer Schönheit halber. Ich finde nicht, daß sie so gemein in China wäre, als viele andere Arten, vielleicht aber machen sie sie aus politischen Gründen den Europäischen Nachforschern nur so selten. — Zu Canton werden sie häufig in Käfigen zum Verkauf ausgestellt, und der gewöhnliche Preis ist sechs bis zehn Thaler für das Paar. Zuweilen werden sie auch lebendig nach England gebracht; sie verlangen aber viel Aufsicht, da sie viel zärtlicher zu seyn scheinen, als unsre Arten. Man hat auch bey uns Versuche gemacht, sie zum Brüten zu bringen, aber ohne Erfolg, ob sie gleich zahm genug sind. Bey dieser Gelegenheit muß ich erinnern,

Doo 2

a) Latham Ind. orn. II. p. 871. n. 98. B. c) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 761. Nr. 42. B.
 b) Seligmanns Vogel IV. Taf. 99. B.

innern, daß man zu dieser Absicht sich bemühen muß, beyde Geschlechter von Chinesischer Race zu bekommen; denn das Weibchen der Sommer-Ente aus Amerika, ist dem der Chinesischen so ähnlich, daß es häufig mit ihm verwechselt wird. In Japan kennt man den Vogel unter dem Namen Kimmodui; die Engländer in China nennen ihn Mandarin-Ente (Mandarin Duck).

87. Die Knack-Ente. (Garganey).

- Anas Querquedula. LIN. I. p. 203. 32. Ed. XIII. I. 2. p. 531. No. 32. a) — Faun. Suec. No. 128. — SCOP. ann. I. No. 75. c) — BRÜNN. orn. No. 81. — MÜLLER Zool. No. 125. — KRAM. elench. p. 343. No. 18. — FRISCH av. tab. 176.
Le Sarcelle. BRISS. orn. VI. p. 427. No. 31. pl. 39. fig. 1. 2. — BUFF. ois. IX. p. 260. — Pl. enlum. 946. (Das Männchen).
Garganey. RAU Syn. p. 148. No. 8. — WILL. orn. p. 377. § 7. pl. 74. — BR. Zool. No. 289. pl. 101. — ARCT. Zool. p. 576. O. f)
Br. Mus. Lev. Mus. g)

Sie ist etwas größer, als die gleich folgende Kriekente, siebenzehn Zoll lang, und acht und zwanzig Zoll breit. Ihr Schnabel ist schwarz; Scheitel und Hinterkopf sind dunkelbraun; von den Augen läuft ein weißer Streifen nach dem Hinterkopf hin; am Kinn ist ein großer, schwarzer Fleck; die Wangen und der Oberhals sind hell purpurroth, mit ganz kleinen, länglichen, abwärts gehenden, weißen Strichen bezeichnet; die Brust lichtbraun, mit halbkreisförmigen, schwarzen Streifen; der Bauch weiß; der untere Theil desselben und den After, mit kleinen dunkeln Flecken gesprenkelt; die Deckfedern der Flügel grau, die untersten aber haben weiße Spitzen; die großen Schwungfedern aschfarben; die äußern Fahnen der in der Mitte stehenden grau; die Schulterfedern lang und schmal, und sehr artig aschfarben, weiß und schwarz gestreift; der Schwanz dunkelbraun; die Füße bleifarben, dieses Geschlecht hat ein Labyrinth.

Das Weibchen hat ein undeutliches, weißes Zeichen über den Augen; sein übriges Gefieder ist bräunlich aschfarben, dem der weiblichen Kriek-Ente nicht unähnlich; die Flügel aber haben keinen grünen Flecken, wodurch sich diese Vögel hinlänglich auszeichnen.

Diese Art findet sich im Winter in England, und zu eben der Zeit sieht man sie auch in Frankreich, wo sie im April wieder wegzieht ^{b)}. So wie der Sommer herbeykommt, zieht sie nach Norden, um zu brüten.

In

- a) Latham Ind. orn. II. p. 872. n. 99. B.
b) Uebers. v. Günther I. S. 67. Nr. 75. B.
c) Uebers. II. S. 537. O. B.
d) Metne N. S. Deutschlands. II. S. 662. Nr. 16. Lepich in Tageb. der Russ. Reise III. S. 14. Pontoppidan Dänemark S. 168. Nr.

15. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 769. Nr. 32. B.

b) Eben so in Deutschland; doch brütet sie auch hier an den Flüssen und Seen, die Nebendämpfel bilden. B.

In Europa ist sie bis nach Schweden bekannt, und durch ganz Rußland und Sibirien, so wie in Kamtschatka, gemein, in welchem letztern Lande sie sehr häufig ist.

88. Die gemeine Kriek - Ente. (Common Teal.)

Anas Crecca. LIN. I. p. 204. 33. Ed. XIII. I. 2. p. 532. No. 33. i) — Faun. Suec. No. 129. — BRÜNN. orn. No. 82. 83. — MÜLLER Zool. No. 126. — KRAM. elench. p. 343. No. 19. — FRISCH av. tab. 174. — GEORGI Reise No. 166. — SEPP. Vog. pl. in p. 147. (Männchen und Weibchen).

La petite Sarcelle. BRISS. orn. VI. p. 436. No. 32. pl. 40. fig. 1. — BUFF. ois. IX. p. 265. pl. 17. 18. — PL. enlum. 947.

Common Teal. RAI Syn. p. 147. A. 6. — WILL. orn. p. 377. §. 6. pl. 74. — ALBIN Nat. Hist. vol. I. pl. 100. — BR. Zool. II. No. 290. — Arct. Zool. p. 577. P. k)

Br. Mus. Lev. Mus. l)

Sie ist nicht groß, vierzehn Zoll lang, und zwölf Unzen schwer. Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern rußbraun; Kopf und Hals röthlich kastanienbraun; die Seiten des Kopfs, hinter den Augen grün, und dleß läuft bis an den Nacken hinter; und ist am untern Theil mit einem weißen Strich eingefast ^{m)}; der untere und hintere Theil des Halses, der Anfang des Rückens, die Schulterfedern und die Seiten des Körpers sind weiß, und mit schönen, schwarzen Querstichen bezeichnet; Vorderhals und Brust schmutzigweiß, mit rundlichen, schwarzen Flecken; der Bauch weiß; die Mitte des Afters schwarz; die Deckfedern der Flügel braun; die Schwungfedern dunkelbraun; der Spiegel grün, oben nach einer schiefen Richtung schwarz eingefast, und weiß gerändert; der Schwanz keilsförmig, und braun, mit weißen Rändern; die Füße braun. Am Eintritt der Luftröhre in die Lungen ist ein Labyrinth.

Beym Weibchen sind Kopf und Hals schmutzigweiß und braun mellt; der untere Theil des Halses und die Seiten über den Flügeln braun, mit schmutzigweißen Rändern; die Flügel, wie beym Männchen; der Bauch weiß; der After eben so, nicht schwarz ⁿ⁾).

Doc 3

Wir

n) Latham Ind. orn. II. p. 372. n. 100. B.

k) Uebers. II. S. 537. P. B.

l) Meine N. S. Deutschlands II. S. 666. Nr. 17. Pallas Nord. Beytr. I. S. 8. Cett N. S. von Sardinien II. S. 340. Pontoppidan Dänemark S. 168. Nr. 16. Schriften der Berl. Gesellschaft VII. S. 456. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 771. Nr. 33. B.

m) Die weiße Linie über und unter den Augen ist nicht so stundhaft, daß sie in der Diagnose als Charakter angeführt werden könnte. Bey einigen fehlen beyde Linien, bey andern ist nur eine von beyden vorhanden. Bey einem Exemplar

im Darmstädtschen Cabinet, erstreckt sich eine undeutliche weiße Linie vom Schnabel bis an die Augenbraunen, und eine andere läuft von dem hintern Augenwinkel an dem untern Rande der grünen Schläfe her und scheidet diese von der braunen Farbe. Solche Abweichungen giebt es sowohl bey den Europäischen als Amerikanischen Exemplaren. B.

n) Varietäten: 1) Mit goldgrünem sichelförmigen Streifen von den Augen bis in den Nacken, und ohne die beyden breiten Augenstreifen.

2) Mit einem weißen Streifen unter den Augen, und braunen Backen. B.

Wir sehen die Kriek-Ente häufig in Gesellschaft der wilden Ente im Winter auf und fern Märkten; ob sie aber bey uns brütet, ist mir nicht bekannt. In Frankreich bleibt sie das ganze Jahr hindurch ^{o)}, und bauet im April ein Nest unter das Rohr, an den Ufern der Teiche; es besteht aus den zartesten Rohrhalmen, nebst dem Mark (pith) derselben, und einer Menge Federn. Es ist sehr groß und liegt im Wasser, so daß es sich mit ihm hebt und fällt. Die Eyer sind so groß, wie Taubeneyer, schmutzigweiß, mit kleinen rußbraunen Flecken ^{p)}. Sie soll von Gras und Wassermoss (weeds) leben, das an den Ufern der Teiche, an denen sie sich aufhält, wächst, so wie von dem Saamen des Rohrs; auch frist sie kleine Fische ^{q)}. Ihr Fleisch ist gut. Sie findet sich gegen Norden bis nach Island vor; und gegen Süden wird sie als ein Bewohner des Caspischen Meeres angegeben. Ich zweifle auch nicht, daß sie sich bis nach China verbreitet, weil ich eine Abbildung von ihr unter einigen schönen Gemälden von Vögeln aus diesem Welttheil gesehen habe.

Beide ^{r)} sowohl die vorige, als diese Art, sind im Winter an den Küsten von Kent zu sehen ^{s)}, und von der Kriek-Ente weiß man jetzt, daß sie in dem Moos um Carlisle in Cumberland brütet ^{t)}. Beide verbreiten sich bis nach Indien, denn ich habe sie in Gemälden von daher gesehen. Ich finde auch, daß die wilde Ente, Löffel-Ente und Schnatter-Ente (Gadwal Nr. 61) an den Küsten von Coromandel, und ohne Zweifel auch in andern Ländern Indiens zu Hause sind.

88. Die Sommer-Kriekente. (Summer T.)

Anas Circia. LIN. I p. 204. 34. Ed. XIII. I. 2. p. 533. No. 34 ¹⁾ — Faun. Suec.

No. 130. — SCOP. ann. I. No. 70. ²⁾ — BRÜNN. orn. No. 83.

La Sarcelle d'Été. BRINS. orn. VI. p. 445 No. 33. — BUFF. ois. IX. p. 268.

Summer Teal. RAN. Syn. p. 148. No. 7. — WILL. orn. p. 378. pl. 76. — ALBIN

Nat. Hist. vol. II. pl. 103. 104. ³⁾

Diese soll kleiner, als die gemeine Kriek-Ente, und dreyzehn, einen halben Zoll lang seyn. Ihr Schnabel ist dunkelbraun; die obere Theile, von der Stirn bis zum Steiß, sind grau:

^{o)} Eben so in Deutschland. Nur im Herbst und Winter ziehen sie von einem offenen Wasser zum andern. B.

^{p)} Die Ruck-Ente (Garganey) und die Kriek-Ente sollen beyde sechs bis sieben Eyer in ein von ihnen selbst gegrabenes Loch legen. DECOUV. Russ. vol. I. p. 102.

^{q)} Hist. des Ois.

^{r)} Zus. a. d. Suppl. S. 276.

^{s)} Hr. BOYS.

^{ss)} D. HEYSHAM.

^{t)} Anas crecca. β . A. Speculo alarum varii coloris, unica alba superciliari, rostro pe-

dibusque cinereis. Latham Ind. orn. II. p. 873. n. 100. Hiernach wäre sie eine Varietät von der Kriek-Ente. Es müßte dann ein junger Vogel seyn. Ich kann nicht entscheiden, habe sie aber immer für eine besondere Art gehalten, da sie zusammen fliegen. B.

^{u)} Uebers. I. S. 68. Nr. 76. B.

^{x)} Pallas nordische Beytr. IV. S. 14. Schriften der Berl. Gesellsch. VII. S. 457. Nr. 30. Meine N. G. Deutschlands II. S. 669. Nr. 18. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 774. Nr. 34. B.

graulichbraun, am Rücken weiß gerändert; über jedem Auge ist ein weißer Streifen; Wangen und Kehle sind kastanienbraun; der Vorderhals gelbroth, mit braunen Rändern, die untern Theile des Körpers gelbröthlichweiß, am Bauch schwarz gefleckt; die Schulterfedern wie der Rücken; die größern längs der Mitte herab weiß; die Deckfedern der Flügel aschgrau; über die Flügel läuft ein weißer Streifen; die Schwungfedern braun; der Spiegel grün mit schwarzen Rändern, und unten weiß eingefast; der Schwanz braun; die Füße bläulich.

Das Weibchen ist kleiner. Die obern Theile sind aschbraun; der Rücken gelbroth gerändert; die Wangen, die Kehle, und die untern Theile gelbröthlichweiß; über den Augen ein weißer Streifen, wie bey dem Männchen; die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel, graubraun, mit gelbrothen Rändern; das Uebrige der Flügel so ziemlich wie bey dem Männchen, aber nichts Schwarzes im Spiegel.

Diesen so vollständig beschriebenen Vogel, halten einige für eine zweifelhafte Art, und wahrscheinlich ist es das Weibchen der gemeinen Krick-Ente. Ich halte es indessen für gut, die gewöhnlichen Synonymen dieses Vogels, gleichsam zum Wegweiser für künftige Systematiker, beizubehalten¹⁾. Unter andern ist Buffon zweifelhaft, ob sie eine verschiedene Art sey; wiewohl er umständlich erzählt, daß sie den ganzen Sommer hindurch in Frankreich bleibe und dort brüte; auch berichtet er uns, daß sie zu Anfang des März dort ankomme, wo sie sich dann an der Küste vertheile. Ohngefähr im April trägt sie eine Menge Winen und Gras zusammen, und macht ein bedecktes Nest, dessen Oeffnung mehrentheils gegen Süden gerichtet ist; in dieses Nest legt sie zehn bis vierzehn schmutzigweiße Eyer, von der Größe der Hühnereyer, und sitzt zwanzig bis drey und zwanzig Tage darüber. Der nämliche Schriftsteller bemerkt auch, daß das Männchen, wenn die Brütezeit vorüber ist, sein Charakteristisches Gefieder verliere, und dann dem Weibchen so ähnlich werde, daß man es kaum von ihm unterscheiden kann, es aber nach dem Januar wieder bekomme. Auch fügt er noch bey, der Vogel könne keine Kälte ertragen, und besuche die nördlichen Länder nicht²⁾.

90. Die

1) Im Ind. orn. hat er sich für die Varietät von der Krickente bestimmt erklärt. Allein wie gesagt, ich kann mich noch nicht bestimmt erklären, ob ich gleich beyde Vögel kenne. B.

2) Hist. des Ois. — Im Ind. orn. l. c. werden folgende Varietäten angegeben:

A. Anas Crecca. γ. Die Ränder der Rückensfedern sind gelbroth; Kehle, Gurgel und Unterleib gelbrothweiß; der Spiegel ohne Schwärze.

B. Anas Crecca. δ. Die Balbul-Ente. Anas Balbul. A. rostro nigro, speculo alarum supra oblique viridi, in-

fra oblique nigro. Gmelin Lin. I. 2. p. 124. Forsk. Faun. Arab. p. 4. n. 12.

Der Schnabel ist schwarz; die Beine aschfarben; der Leib aschgrau, weiß gewellt; unten weiß; der Kopf braun mit einem großen, langen, grünröthlichen Fleck an beyden Seiten bis zu den Schläfen; am Hals hinten ein schwarzblauer Fleck, der die grünen vereinigt; an der Wurzel des Schnabels unten ein schwarzes Fleck; der grüne Spiegel vorn und hinten weiß, unten schwarz eingefast; der Schwanz keilsförmig.

Am Weibchen ist der Kopf aschgrau gewellt. Bey Castor gemein. B.

90. Die Amerikanische Kriek-Ente. (American T.)

Anas carolinensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 533. No. 103. a) — BRÜNN. orn. No. 130.

American Teal. Arct. Zool No. 504. b) — Phil. Tras. vol. LXII. p. 419.
Lev. Mus.

Der Kopf und die obere Theile sind schön dunkelkastanienbraun; von jedem Auge, nach dem Hinterkopf hin läuft ein breiter, schillernd grüner Streifen; unter den Augen ist ein matt weißer Strich; Vorderhals und Brust sind schwarz gefleckt; über jeder Schulter ist ein mond-förmiger, weißer Strich. Der Rücken hat schwarze und weiße Wellenlinien, und zieht sich am Steiß ins Braune; die Deckfedern der Flügel sind braun; der Spiegel grün; die Füße dunkel-braun.

Das Weibchen ist röthlich aschbraun, mit schwarzen Flecken; die Flügel sind wie beim Männchen.

Diese Art findet sich in Amerika, von Carolina bis zur Hudsons-Bay, wo sie fünf bis sieben Junge auf Einmal ausbrütet. Sie findet sich in den Wäldern an kleinen Teichen. Im Herbst zieht sie nach Süden. Herr Pennant scheint sie der Sommer-Kriekente des Willughby *) sehr ähnlich, wo nicht für Eine und ebendieselbe mit ihr, zu halten.

91. Die Kriek-Ente von St. Domingo. (St. Domingo T.)

Anas dominica. LIN. I. p. 261. 22. Ed. XIII. I. 2. p. 521. No. 22. d)

La Sarcelle de St. Domingue. BRÜNN. orn. VI. p. 472. No. 42. pl. 41. fig. 2.

La Sarcelle rousse à longue queue. BUFF. ois. IX. p. 283.

La Sarcelle de la Gouadaloupe. PL. enlum. 968.

Chilcanauthli. RAU Syn. p. 177.

Colianauthli. ibid. p. 176. (das Weibchen?) e)

Dies ist eine kleine Art, die unter zwölf Zoll lang ist. Ihr Schnabel ist kaum anderthalb Zoll lang, und schwarz; der vordere Theil des Kopfs und die Kehle sind rußfarben; der Hinterkopf und der Hals gelbroth; der Rücken, die Schulterfedern, der Steiß, die oberen Deckfedern des Schwanzes und die Seiten eben so, die Mitte der Federn schwärzlich, Brust und Bauch graubraun, mit Weiß melirt; der untere Theil des Bauchs, die Schenkel und die unteren Deckfedern des Schwanzes hell gelbroth, mit Graubraun untermengt; die Deckfedern der Flügel von letzter erwähneter Farbe, mit Weiß melirt, und Einige der größeren ganz weiß; die Schwungfedern braun; sechs von den mittleren zur Hälfte von der Wurzel an weiß, oder auch bei Einigen zwei Dritttheile ihrer Länge, und dies bildet einen Flecken von dieser Farbe an den Flügeln.

a) Latham Ind. orn. II. p. 874. n. 101. B.

b) Uebers. II. S. 570. Nr. 422. B.

c) Orn. 378.

d) Latham Ind. orn. II. p. 874. n. 102. B.

e) Daubendorfs Zool. Beytr. II. S. 752. Nr.

22. B.

Flügeln; der Schwanz ist dunkelbraun, und kellsförmig; die Federn an den Enden zugespitzt und die Schäfte schwarz; die Füße braun.

Sie ist in St. Domingo und Guadeloupe zu Hause.

92. Die spitzschwänzige Kriek-Ente. (Spinous-tailed T.)

Anas spinosa. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 522. No. 87. f)

La Sarcelle à queue epineuse. BUFF. ois. IX. p. 282. — Pl. enlum. 967.

Ihre Länge ist eils bis zwölf Zoll. Der Schnabel ist blau; der Scheitel schwarz, zwischen den Augen ein schwarzer Streifen; unter diesem ein zweyter von der nämlichen Farbe; zwischen diesem ist die Farbe weiß; die Hauptfarbe des übrigen Gefieders dunkelbraun, mit einer Mischung von noch tiefern Braun; unten ist die Farbe heller; das Kinn am hellsten; die Flügel sind wie der übrige Körper, mit einer geringen Mischung von Weißem an den äußern Deckfedern; der Schwanz wie die Flügel und kurz, jede seiner Federn aber am Ende fahnenlos, und in eine scharfe Spitze auslaufend; die Füße gelblich fleischfarben.

Sie ist in Cayenne und Guiana zu Hause.

93. Die Afrikanische Kriek-Ente. (African T.)

Anas africana. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 522. No. 88. g)

La Sarcelle d'Egypte. BUFF. ois. IX. p. 283. — Pl. enlum. 1000.

Etwas größer, als die Knäck-Ente (Nr. 87), und mit einem längern und größeren Schnabel; ihre Länge ist sechzehn Zoll. Kopf, Hals, Brust und Bauch sind dunkel gelbrothbraun, aber lebhaft; am untern Theile der Brust ist ein weißer Fleck; das übrige Gefieder oben schwarz; über die Flügel ein weißer Streifen.

Das Weibchen ist fast eben so gefärbt, wie das Männchen, die Farben aber minder distinct, und matter; das Weiße an der Brust hat braune Wellenlinien.

Sie ist in Aegypten zu Hause.

94. Die Madagaskarische Kriek-Ente. (Madagascar T.)

Anas madagascariensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 522. No. 89. b)

La Sarcelle mâle de Madagascar. BUFF. ois. IX. p. 274. — Pl. enlum. 770.

Sie hat die Größe der gemeinen Kriek-Ente, und ohngefähr zwölf Zoll Länge. Ihr Schnabel ist einen Zoll lang, und gelb, mit einer schwarzen Spitze; der oberste Theil des Kopfs bis

f) Latham Ind. orn. II. p. 874. n. 103. B.

g) Latham Ind. orn. II. p. 875. n. 104. B.

b) Latham Ind. orn. II. p. 875. n. 105. B.

Latham's allgem. Uebers. der Vögel. III. Band. 2. Th.

bis zum Scheitel, der vordere Theil desselben, und der Hals sind weiß, und dieß läuft an den Seiten hinter die Augen, wo es sich in eine Spitze endigt; ein Theil des Kopfs und Halses aber ist dunkel grünlich schwarz; in der Mitte desselben, unter den Ohren, ist ein eyrunder, hellgrüner Fleck; der untere Theil des Halses und die Brust sind hellrothfarben, mit dunkeln, wellenförmigen Strichen, und hinten in ein Halsband auslaufend; die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz sind sehr dunkelgrün; die Seiten mit rostigrothem Gewölke; die Mitte des Bauchs und der After weiß; die Schwungfedern dunkelbraun; an den Flügeln ein weißer Streifen; die Füße dunkelbraun.

Sie ist in Madagaskar zu Hause.

95. Die Krick-Ente von Coromandel. (Coromandel T.)

Anas coromandeliensis. LIN. Ed. XIII. 1. 2. p. 522. No. 90. ¹⁾

La Sarcelle de Coromandel. BUFF. ois. IX. p. 274. — Pl. enlum. 949. 50.

Diese Art ist um ein Viertheil kleiner als die Knack-Ente. Ihr Schnabel ist dunkelbraun; der Scheitel schwarz; der übrige Kopf und der Hals weiß, mit dunkelschwarzen kleinen Sprenkeln; der untere Theil des Halses nach der Quere mit schönen Streifen von der nämlichen Farbe gestreift; die obern Theile des Körpers und die Flügel braun, mit grünem und röthlichem Glanze; Brust und Bauch weiß; die Seiten des Afters ziehen ins Rostigrothe; die Füße sind schwarz.

Das Weibchen unterscheidet sich durch eine Mischung von Grauem auf dem Weißen der untern Theile, und die Streife am untern Theil des Halses sind breiter, und nicht so distinct; überhaupt ist das ganze Gefieder nicht so schön, als beim Männchen.

Sie ist an der Küste von Coromandel zu Hause.

96. Die Manillische Krick-Ente. (Manille T.)

Anas manillensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. 523. No. 91. ^{k)}

La Sarcelle de l'Isle de Luçon. SONN. Voy. p. 91. tab. 54.

Kleiner als die gemeine Krick-Ente. Der Schnabel schwarz; der obere Theil, nebst den Seiten des Kopfs, und die Kehle weiß; Hals, Brust und Deckfedern der Flügel röthlichbraun; der Rücken mit gelben Federn bedeckt, und schwarz gerändert; die des Bauchs hingegen sind weiß, mit schwarzen Rändern; Schwungfedern und Schwanz schiefer schwarz; die Füße schwärzlich.

Sie ist auf der Insel Manilla zu Hause.

97. Die

¹⁾ Latham Ind. orn. p. II. 875. n. 106. B.

^{k)} Latham Ind. orn. II. p. 875. n. 107. B

97. Die Kriek-Ente vom See Baikal. (Baikal D.)

Anas formosa. LEX. Ed. XIII. I. 2. p. 523, No. 92. 1) — GEORGI Reise vol. I. p. 168.

Sie hat die Größe der gemeinen Kriek-Ente funfzehn Zoll Länge, und achtzehn Unzen Gewicht. Ihr Schnabel ist schwarz; der Scheitel eben so, und zu beyden Seiten weiß eingefast; von den Augen bis zur Kehle, auf beyden Seiten läuft ein krummer, schwarzer Streifen, der hinten mit einem hellen, und darauf mit einem grünen eingefast ist; der Nacken und die Seiten des Halses sind wellenförmig gestreift (undulated); die Kehle ist hell gelbroth, mit schwarzen Punkten; der Rücken braun; die Bastardflügel rostigroth, weiß und schwarz gestreift; der äußere Rand derselben wellenförmig; der Spiegel schwarz, vornen nach einer schiefen Richtung glänzend grün bezeichnet, und muschelfarbig gerändert; der After schwarz, an beyden Seiten rostigroth gefleckt, und mit einem weißen Band durchzogen; der Schwanz etwas spitzig und braun, seine mittlern Federn weißlich; die Füße mattroth; die Klauen grau.

Sie ist in Rußland, am See Baikal zu Hause.

Var. A. m)

Ich glaube, sie verbreitet sich auch bis China, weil ich Eine, ihr sehr ähnliche, von dorten gesehen habe. Bey dieser waren die Seiten des Kopfs gelblich sehmischlederfarben; hinter den Augen grün; der Scheitel schwarz; der krumme Streifen von den Augen nach der Kehle umgab jenen; außerdem kam sie ziemlich mit oben beschriebener überein.

98. Die Hina-Kriekente. (Hina T.)

Anas Hina. LEX. Ed. XIII. I. 2. p. 523. No. 93. n)

Anas (chinensis) regione ocalorum (maris) viridi. OSBECK Voy. vol. II p. 33.

Ihre Größe ist nicht angegeben. Der Schnabel ist schwärzlichgrau, und weich; Kopf und Kinn braun; unter den Augen läuft ein weißer Strich hin; über den Augen ist alles grün; Hals und Oberrücken weiß, mit schwarzen Flecken; Unterrücken und Steiß aschfarben; der Oberhals weiß, mit schwarzen Flecken; Brust und Bauch weiß, nach hinten schwarz gefleckt; die Steißfedern weiß gerändert; Beine und Füße aschfarben.

Beim Weibchen ist der Kopf und die ganze Stelle um die Augen herum weißlichgrau; das Kinn weiß, oben schwarz, und an manchen Stellen röthlichweiß; unten weiß, mit schwarzen Flecken.

Sie ist in China zu Hause, wo sie Hina-a genannt wird. Obige unvollkommene Beschreibung kann die Art wohl nicht charakterisiren, ob sie der vorigen ähnlich ist, oder nicht, wie.

P p p 2

n) Latham Ind. orn. II. p. 876. n. 108.

W. n) Latham Ind. orn. II. 876. n. 109. W.

m) Latham l. c. β W.

wiewohl ich es sehr vermuthe. Osbeck erwähnt noch einer andern, die sich in Canton vorfindet, und Konga-o heißt; da er aber den Vogel nicht gesehen hat, so sagt er nichts weiter von ihm.

99. °) Die rothköpfige Ente. (Pink-headed D. p)

(s. die hundert und zehnte Kupfertafel.)

Sie hat die Größe der Baum-Ente (Nr. 48), und ist ein und zwanzig Zoll lang. Ihr Schnabel ist anderthalb Zoll lang, und an der Spitze etwas gebogen; seine Farbe, so wie des ganzen Kopfs und des Halses zur Hälfte schön Roth (pink); und so weit sich diese Farbe erstreckt, sind die Federn kurz und pflaumartig; der Augenstern ist roth; der untere Theil des Halses und das übrige Gefieder dunkel schokolatbraun, eine Art von Spiegel ausgenommen, der aus drey oder vier Schwungfedern gebildet wird, die hellroth, oder rostfarben sind; einige der untern Deckfedern der Flügel sind an den Enden abwärts gebogen, wie bey dem Männchen der Stellers-Ente (Nr. 74); der Schwanz ist zwey Zoll lang, und die Flügel erreichen beynahe ein Drittheil desselben; die Füße sind blaugrau, und etwas länger, als bey vielen andern dieser Gattung. Das Weibchen ist kaum vom Männchen verschieden.

Sie ist in verschiedenen Gegenden Indiens zu Hause, am häufigsten in der Provinz Oude. Man sieht sie selten in großen Flügen, sondern immer nur zwey besammen. Sie wird oft zahm gehalten °).

100. Die streifköpfige Gans. (Barred-headed G. r)

Von der Größe einer zahmen Gans, und sechs und zwanzig Zoll lang. Der Schnabel zwey Zoll lang, und lebhaft gelb; der Nagel schwarz; Kopf, Kehle und Hinterhals weiß; am hintern Theil des Kopfs, unter den Augen, ist ein schwarzer Halbmond, dessen Hörner aufwärts, gegen die Augen hin gekrümmt sind; unter diesem ein zweyter; und unter diesem ist der größte Theil des Hinterhalses auch schwarz; der Rücken schön hellgrau, die Ränder der Federn am hellsten; die Flügel hell aschfarben; die Ränder der größern Schwungfedern dunkelbraun; der untere und vordere Theil des Halses, die Brust und der obere Theil des Bauches sind äußerst schön hell aschfarben, mit weißen Rändern; der untere Theil des Bauches dunkelbraun, mit weißen Rändern; Steiß und After schneeweiß; der Schwanz schön lichtgrau, mit weißen Spitzen; die Füße röthlichgelb.

Sie ist auch in Indien zu Hause. Man hat mir gesagt, daß man diese Art in den Wintermonaten, oft in Flügen zu Hunderten antreffe, und daß sie dem Getralde sehr großen Schaden thue. Sie kommt vermuthlich aus Thibet, und andern nördlichen Ländern, weil sie bey Annäherung des Sommers wieder wegzieht. Ihr Fleisch wird sehr geschätzt °).

Zu.

o) Diese und die folgende sind in den Suppl. S. 276. 77. hinzugekommen.

p) *Anas caryophyllacea*. Latham Ind. orn. II. p. 866. n. 85. B.

q) Herr Middleton.

r) *Anas indica*. Latham Ind. orn. II. p. 839. n. 20. B.

s) Major Roberts.



Die rothköpfige Ente

Z u s a t z e.

101. Die Alandsche Ente.

Anas Alandica. Mus. Carls. III. n. 60.

Anas Sparrmanni. LATHAM Ind. orn. II. p. 876. n. 110.

Sie ist einen Fuß sieben Zoll lang; der Scheitel und die Füße sind schwarz; der Kopf ist rostfarben, schwarz gefleckt; die Seiten des Kopfs, der Nacken, die Kehle und Gurgel sind aschgrau, mit dunkelbraunen Punkten bestreut; der untere Theil der Gurgel ist rostfarben und schwarz gefleckt; Brust und Bauch sind schmutzigweiß; Schultern- und einige Weichensfedern schwarz, mit rostfarbenem Rande, und auf dem Spiegel zwey rostweiße Bänder, die gegen die Spitze in einen Winkel zusammen stoßen; Ober- und Unterdeckfedern der Flügel rußbraun mit weißlichem Rande; von den vordern Schwungfedern ist die erste schmutzigweiß mit dunkelbrauner Spitze, die übrigen an der äußern Seite und an der Spitze braunschwärzlich und an der innern bräunlichweiß; der Steiß rostfarben und weiß mit schwarzen Flecken; die langen Astersfedern weiß; der Schwanz rostfarben mit schwarzen unterbrochenen Binden.

Sie ist in Aland, um Abou herum zu Hause, und heißt bey den Schweden Sjo-And. Dem äußern Ansehen und der Farbe nach ist es ein Weibchen.

102. Die Caspische Ente.

Anas lurida. GMELIN LIN. I. 2. p. 531. n. 101.

Anas Gmelini. LATHAM Ind. orn. II. p. 876. n. 111.

S. G. Gmelin's Reise I. S. 70. II. 182. Taf. 16.

Sie ist größer als die gemeine Kriek-Ente; schwarz; der Kopf kastanienbraun; hinter den Ohren ein weißer Fleck; die Brust mit rothen Querlinien; der Bauch weißlich, schwärzlich gefleckt; die Seiten und der After weiß; die vier ersten Schwungfedern außen schwarz, innenwendig aschgrau; die sechs folgenden auf beyden Seiten aschgrau; die eilfte bis neunzehnte weiß; die zwanzigste von vornen theils weiß, theils schwarz, hinten aschgrau, alle an der Spitze schwarz; die ein und zwanzigste bis fünf und zwanzigste mit den Deckfedern ganz schwarz, so wie der Schwanz.

Hält sich im Caspischen Meere und in dem übrigen östlichen Rußland auf.

103. Die Kekuschka-Ente.

Anas Kekuschka. GMELIN LIN. I. 2. p. 531. n. 102. — LATHAM Ind. orn. II. p. 877. n. 112. — S. G. Gmelin's Reise III. S. 249. Taf. 26. 27. — Pallas nord. Beytr. IV. S. 8.

Sie ist ocherfarben, unten weiß; auf dem Rücken aschgrau; Steiß und Schwanz glänzend schwarz; die funfzehnte bis neunzehnte Schwungfeder an den Spitzen weiß; die Länge neunzehn Zoll.

Wohnt am Caspischen Meere. Das Fleisch schmeckt ranzig.

104. Die Arabische Ente.

Anas arabica. GMELIN LIN. I. 2. p. 542. n. 120. — LATHAM Ind. orn. II. p. 877. n. 113.

Anas Sharchir. FORSK. Faun. Arab. p. 3. 7.

Der Schnabel ist gelb, in der Mitte schwarz; die Füße sind aschgraugelb; die Schwimmhäute dunkelbraun; der Leib grau gefleckt; unten und am Steiß weiß mit aschgrauen Flecken; der Spiegel schwarz, vorn und hinten weiß.

Wohnt in Arabien.

105. Die Alexandrinische Ente.

Anas alexandrina. GMELIN LIN. I. 2. p. 542. n. 121. — LATHAM Ind. orn. II. p. 877. n. 114.

Anas Sau Sarai. FORSK. Faun. Arab. p. 3. 8.

Der Schnabel schwarz; die Füße aschgraugelb; die Schwimmhäute dunkelbraun; der Steiß schwarz; der Hals aschgrau mit weißen Halbkreisen; der Bauch weißlich.

Wohnt bey Alexandrien in Aegypten.

106. Die Gattair-Ente.

Anas Gattair. GMELIN LIN. I. 2. p. 442. n. 122. — LATHAM Ind. orn. II. p. 877. n. 115. — FORSK. Faun. Arb. p. 3. 10.

Der Schnabel ist dunkelbraun, unten schwarz; die Kehle schwarz; der Leib dunkelbraun; die Flügel schwarz, unten weiß, am Rande dunkelbraun; die vierte bis zwanzigste Schwungfeder in der Mitte weiß; der Bauch und die Deckfedern des Schwanzes weiß; die Füße bläulich-ashgrau.

In Alexandrien.

107. Die Sirsair-Ente.

Anas Sirsair. GMELIN LIN. I. 2. p. 542. n. 123. — LATHAM Ind. orn. II. p. 877. n. 116. — FORSK. Arab. p. 3. 11.

Der Schnabel ist bleifarben, unten gelb; die Kehle weiß; der Scheitel dunkelbraun; der Rücken dunkelblau, die Federränder weißlich; der Bauch weißlich; die Füße grau; der Spiegel schief getheilt, oben glänzend grün, unten schwarz, vorn und hinten weiß.

Wohnt in Arabien.

108. Der schwarze Schwan.

Anas atrata. LATHAM Ind. orn. II. p. 834. n. 4.
Black Swan. PHILLIP Voy. Bol. Bay. p. 98.

Er ist größer als ein Singschwan; ganz schwarz; der Flügelrand weiß; der Schnabel röthlich.

Bewohnt die Neuholändischen Seen. Cook gedenkt derselben auch auf den Freundschaftlichen Inseln.

109. Die Bastardgans.

Anas hybrida. MOLINA hist. nat. Chili. p. 213. — GMELIN LIN. I. 2. p. 503. n. 50.
LATHAM Ind. orn. II. p. 835. n. 6.

Wie eine Gans; nur ist der Hals kürzer, die Flügel und Füße aber sind länger; der Schnabel ist halbwalzenförmig, die Wachshaut roth; das Männchen ganz weiß; Schnabel und Füße gelb; das Weibchen schwarz, einige Federn weiß gerändert; Schnabel und Füße roth. Der Schwanz etwas zugespitzt.

Wohnt im Meere, bey Chiloe; lebt paarweise, und das Weibchen legt acht Eyer in den Sand, worin es sich eine Grube scharrt.

110. Die Coscoroba-Gans.

Anas Coscoroba. MOL. Chili. p. 207. — GMELIN LIN. I. 2. p. 503. n. 51. —
LATHAM Ind. orn. II. p. 835. n. 7.

Es ist eine große Art; der Schnabel ist an der Spitze erweitert und abgerundet; die Farbe desselben roth, so wie die Füße; die Augen schwarz; der Körper weiß.

Wohnt in Chili; läßt sich leicht zähmen.

III. Die schwarznackige Ente.

Branta torrida. SCOPOLI Ann. I. n. 86. — Uebers. I. S. 75. Nr. 86.
Anas torrida. GMELIN LIN. I. 2. p. 516. n. 75. — LATHAM Ind. orn. II. p. 845.
n. 33. — Meine M. & Deutschlands II. S. 681. Nr. 4.

Sie hat die Größe der Hauben-Ente; der Kopf ist weiß; Hals und Nacken sind schwarz, ersterer von unten kastanienbraun; der Schnabel schmal wie bey der Bismar-Ente.

112. Die weißstirnige Ente.

Anas albicans. GMELIN LIN. I. 2. p. 516. n. 76. — LATHAM Ind. orn. II. p. 845.
n. 34.
Branta albifrons. SCOPOLI Arn. I. n. 86. — Uebers. I. S. 75. Nr. 87. — Meine
M. & Deutschl. II. S. 681. Nr. 5.

Sie hat die Größe eines Haushahns. Die Stirn ist weiß; Kopf und Hals sind braunroth; der Schnabel wie an der Wisam-Ente; die obere Gegend der Brust mit aschgrauen Federn bedeckt, die einen blaßrothfarbenen Rand und unter der Spitze einen rothen Querstreifen haben, Rücken und Flügel braungrau; Schwungfedern eben so, ihre innere Seite aber nebst der Spitze weiß; Steiß und After weißlich.

Wie es scheint, so sind diese beyden letztern Arten Farbenvarietäten der Wisam-Ente oder gar Bastarde von der gemeinen und Wisam-Ente.

113. Die Kronen-Ente.

Anas regia. MOLIN. Chili. p. 206. GMELIN LIN. I. 2. p. 508. n. 61. — LATHAM Ind. orn. II. p. 847. n. 39.

Sie ist größer als die gemeine Ente. Auf der Stirn steht eine zusammengedruckte große, rothe Fleischhaut (*caruncula*); der Leib ist oben blau; unten grau; um den Hals geht ein weißes Halsband.

Bewohnt Chili.

114. Die Mönchs-Ente.

Anas Monacha. SCOPOLI An. I. p. 86. — Hebers. I. S. 71. Nr. 80. — GMELIN LIN. I. 2. p. 516. n. 73. — LATHAM Ind. orn. II. p. 847. n. 40. — Meine N. S. Deutschlands. II. S. 680. Nr. 2.

Sie ist größer als die gemeine Ente; der Schnabel gelblich mit einem schwarzen Nagel; der Körper weiß und schwarzbunt; auf jedem Flügel ein schöner grün und violetglänzender Spiegel; der Oberleib weiß und schwarzbunt; vom Schnabel bis zu den Augen ein grauer Streifen; Kopf und Anfang der Brust mit schwarzen Flecken; die vordern Schwungfedern weiß und an den Spitzen braungraubunt; die Schwanzfedern weiß, an der Spitze mit sechs mittelmäßig zugespitzten weißen Flecken bezeichnet.

Scheint eine gemeine Ente zu seyn. Man trifft oft so gefärbte Haus-Enten an.

115. Die schwarzschwänzige Ente.

Anas melanura. SCOPOLI Ann. I. p. 82. — GMELIN LIN. I. p. 516. n. 74. — LATHAM Ind. orn. II. p. 861. n. 72. — Meine N. S. Deutschl. II. S. 681. Nr. 3.

Sie ist etwas kleiner als die zahme Ente. Der Scheitel fuchsroth; die Schläfe sind aschgraulich; die Kehle aschgrau; die Brust aschgrau, röthlich überlaufen; der Rücken fuchsroth; der Steiß schwarz und weiß gefleckt; Schwung- und Schwanzfedern schwarz; Schnabel und Beine ziegelfarben.

Dies scheint ein junges Männchen der gemeinen Pfeif-Ente zu seyn.

116. Die

116. Die Jacquins-Ente.

ANAS JACQUINI. Gmelin Lin. I. 2. p. 536. n. 108. — Jacquins Beitr. I. S. 5.
Nr. 3. Latham Ind. orn. II. p. 863. n. 80.

Sie hat die Größe der Spanischen Ente (Nr. 79); ist kastanienbraun; der Rücken schwärzlich; Schnabel und Füße schwarz.

Auf der Insel St. Domingo. Sie hat eine scharfe Stimme. B.

Drey und neunzigste Gattung. Penguin.

Der Schnabel ist stark, gerade, gegen die Spitze hin mehr oder weniger gebogen, und an dem Seiten gesurcht. Die Nasenlöcher sind linsenförmig, und sitzen in den Furchen. Die Zunge ist mit starken, rückwärts gekehrten Stacheln besetzt. Die Flügel sind klein, mehr Flossfedern ähnlich, mit nicht längern Federn bedeckt, als der übrige Körper hat, und zum Flug untauglich. Der Körper ist mit dichten, kurzen Federn bedeckt, die breite Schäfte haben, und so dicht wie Schuppen aufeinander sitzen. Die Beine sind kurz und dick, und stehen sehr nahe am After. Der Zehen sind vier, die alle vorwärts stehen; die innere ist frey, die übrigen sind mit einer Schwimmhaut versehen. Der Schwanz ist sehr steif, und besteht aus breiten, fast fahnenlosen Schäften.

Diese Gattung von Vögeln scheint die nämliche Stelle in dem südlichen Theile der Erde einzunehmen, die die Papageytauher in dem nördlichen einnehmen, und sie dürfen keineswegs miteinander verwechselt werden, obschon die Schriftsteller verschiedener Meinung hierüber seyn mögen. Die Penguins sieht man nur in der gemäßigten und kalten Zone, jener Seite des Aequators, auf der sie sich aufhalten; das nämliche bemerkt man von den Papageytauher in den entgegengesetzten Breiten; und keine von beyden Gattungen hat man bisher innerhalb der Wendekreise bemerkt).

Der Papageytauher hat wahre Flügel und Schwänze, wiewohl klein, der Penguin hingegen fast bloße Flossen, statt der Flügel. Dieser hat vier Zehen an jedem Fuß, jener nur drey. Der Penguin sinkt im Schwimmen bis über die Brust ins Wasser, nur Kopf und Hals ragen hervor, indem sich der Vogel mit seinen flossenähnlichen Flügeln, wie mit Rudern fortstößt; da hingegen der Papageytauher, wie die meisten andern Vögel, auf der Oberfläche schwimmt.

*) Einer wurde zum erstenmale in der Breite von 48 Gr. S. gesehen. Forst. Voy. vol. I. p. 92. — Man hat sie nicht näher als 40 Gr. S.

angetroffen. Ibid. Intr. Disc. on Penguins, in Comment. Gott. vol. III.

che schwimmt. Ich könnte noch verschiedene andere, jeder von beyden Gattungen eigenthümlichen Umstände anführen, glaube aber, daß das bisherige hinlänglich sey, diese Gattung zu charakterisiren.

Der Körper der Penguins ist gewöhnlich so gut und dicht mit Federn bekleidet, daß keine Feuchtigkeith durchdringen kann; und da sie überhaupt außerordentlich fett sind, so schützen sie diese beyden Umstände zusammen vor der Kälte. Man hat sie oft über 700 Meilen vom Lande angetroffen, und häufig auf den Eisbergen, die sie ohne Schwierigkeit zu bestiegen scheinen, weil ihre Fußsohlen sehr rauh und zu diesem Zweck eingerichtet sind *).

1. Der gehäubte Penguin. (Crested Penguin).

Aptenodytes chrysocome. LIN. Ed. XIII. l. 2. p. 555. No. 1. x) — FORSTER in Comment. Gott. vol. III. p. 135. tab. 1.

Le Manchot Sauteur. BUFF. ois. IX. p. 409.

Le Manchot huppé de Sibirie. Pl. enlum. 984.

Hopping Pinguin. BOUGAINV. Voy. p. 64. 65. — Phil. Transact. vol. LXVI. p. 1. Br. Mus. y)

Diese schöne Art mißt drey und zwanzig Zoll in der Länge. Ihr Schnabel ist drey Zoll lang, von Farbe roth, mit einer dunkeln Furche, die an jeder Seite bis zur Spitze hinläuft, die obere Kinnlade ist am Ende gebogen, die untere stumpf; der Augenstern mattroth; Kopf, Hals, Rücken und Seiten sind schwarz; über jedem Auge ist ein Streifen von hellgelben Federn, der sich hinten in einen Federbusch von beynabe vier Zoll Länge ausdehnt; die Federn an beyden Seiten des Kopfs über diesem Streifen, sind länger, als die übrigen, und stehen aufrecht, da hingegen die im Federbusch niederliegen, aber zu beyden Seiten nach Willkühr aufgerichtet werden können *); die Flügel, oder vielmehr die Flossen, sind an der Außenseite schwarz, mit weißen Rändern, an der innern Seite weiß; die Brust und alle untern Theile weiß; die Füße orangefarben; die Klauen dunkelbraun.

Das Weibchen hat auch einen hellgelben Streifen über den Augen, er verlängert sich aber nicht in einem Federbusch, wie beym Männchen.

Sie ist auf den Falklands Inseln zu Hause, und auch in Kerguelens Land, oder Isle of Desolation, so wie in Van Diemens Land und Neuhollland, besonders auf Adventure Bay angetroffen werden. *) Man nennt sie hüpfende Penguins (Hopping Pinguins) oder springende Hanse (Jumping Jacks), weil sie, bey dem geringsten Hinderniß, das sie antreffen, wenigstens auf drey bis vier Fuß ganz aus dem Wasser herausspringen; und in der That thun sie dieses, ohne scheinbare Ursache, oft, so daß sie auf diese Art hauptsächlich vorwärts zu kommen

1) Forster a. a. O.

x) Latham Ind. orn. II. p. 878. n. 1. B.

y) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 826. Nr. 1. B.

z) Cooks last Voy. vol. I. p. 88.

a) Das im Fürstl. Naturalienkabinette zu Darmstadt befindliche Exemplar ist an der Küste von Carolina geschossen worden. Oben ist es graublau, unten trübweiß, seidnartig glänzend. B.

Kommen scheinen. Diese Art scheint mehr Lebhaftigkeit zu besitzen, als die andern, ob sie gleich ein so dummer Vogel ist, daß sie sich zu Lande mit Prügeln todtzuschlagen läßt ^{b)}. Wenn sie erzürnt wird, so richtet sie ihren Federbusch sehr artig in die Höhe.

Diese Vögel sollen ihre Nester unter der Pelikane ihre, mit denen sie in guter Eintracht leben, machen; sie legen selten mehr als Ein Ey, das weiß, und größer als ein Enten-Ey ist. Man sieht sie mehrentheils bloß unter sich, selten vermischen sie sich mit andern Penguins, und oft trifft man sie in großer Menge an den äußern Küsten an, wo sie ausgebrütet worden sind. Sie sind oft so unachtsam, daß sie sich mit der Hand fangen lassen ^{c)}. Die Weibchen dieser Art legen ihre Eier in Höhlen, die sie sehr leicht selbst mit ihren Schnäbeln ausgraben, und die Erde mit den Füßen herauswerfen. In diesen Höhlen liegen die Eier auf der bloßen Erde. Die gewöhnliche Brütezeit ist im Oktober; einige Arten aber, besonders in den kältern Gegenden brüten, nicht vor dem December, ja selbst erst im Jänner. Wie lange sie brüten, ist unbekannt ^{d)}.

2. Der Riesen-Penguin. (Patagonian P.)

Aptenodytes patagonica, LIN. Ed. XIII. l. 2. p. 556. No. 2. e) — FORSTER in Comment. Gott. vol. III. p. 137. tab. 2. — MÜLLERS illustr. tab. 20.

Le grand Manchot. BUFF. ois. IX. p. 399. pl. 30.

Manchot des Isles Malouines. PL. enlum. 975.

Manchot de la Nouvelle Guinée. SONN. Voy. p. 179. pl. 113. f)

First Class of Penguins. BOUGAINV. Voy. p. 64.

Patagonian Pinguin. Phil. Trans. vol. LXVIII. p. 91. tab. 5. — Gen. of Birds p. 66. pl. 14. — Gentl. Magaz. vol. XXXIX. pl. in p. 489.

Br. Mus. Lev. Mus. g)

Dies ist der größte dieser Gattung, so viel man bis jetzt weiß, denn er ist vier Fuß, drey Zoll lang, wenn er aufrecht steht wenigstens drey Fuß hoch, und wiegt vierzig Pfund. Sein Schnabel ist fünfhalb Zoll lang, verhältnismäßig dünner als bey irgend einem andern dieser Gattung, und gegen die Spitze hin gebogen; seine Farbe zwey Dritteile seiner Länge schwarz, und von da an bis zur Spitze gelblich; die untere Kinnlade an der Wurzel orangefarben, und an der Spitze schwarz; die Zunge ist halb so lang, als der Schnabel, und an beyden Seiten mit rückwärts gekehrten Spitzen bewaffnet; der Augenstern nußbraun; Kopf, Kehle und Hinterhals sind dunkelbraun; der Rücken dunkel aschfarben, jede Feder an der Spitze bläulich; die untern Theile rein weiß; an jeder Seite des Kopfs, unter den Augen und hinter ihnen, ist ein breiter Streifen von schönem Gelb; dieser zieht sich vorwärts, so wie er den Hals herab kommt,

299 2

wo

b) Diese waren schwer zu töden, und wenn sie gekelt wurden, so liefen sie haufenweise auf die Matrosen los, pickten sie in die Füße, und verdarben ihre Kleider. Forst. Voy.

c) Cooks last Voy. vol. I. p. 88.

d) Disc. on Ping. Comm. Gott.

e) Latham Ind. orn. II. p. 378. n. 2. B.

f) Sonnerats Reise nach Neugutnea! S. 64. m. m. Fig. B.

g) Naturforscher I. S. 258. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 826. Nr. 2. B.

wo er schmaler und heller wird, und vermischt sich zuletzt mit dem Weißen an der Brust; inzwischen ist dieser Streifen nur bey ausgestrecktem Halse sichtbar, denn gewöhnlich trägt ihn der Vogel mit dem Kopf zwischen die Schultern versteckt, wo dann das Geiße wie ein dem Hals umgebendes Halsband erscheint; die Flügel sind so ziemlich, wie bey den übrigen Arten, scheitlen aber verhältnißmäßig länger zu seyn; die Füße sind schuppig und schwarz.

Einige Vögel dieser Art sind viel heller von Gefieder, und das Gelbe minder lebhaft, als bey andern, und dieß sind vielleicht Weibchen, wo nicht junge Vögel.

Diese Art wurde zuerst auf den Falklands-Inseln angetroffen, und ist auch in Kerguelens-Land, Neugeorgien und Neuguinea gesehen worden ^{b)}. Herr Bougainville fieng Einen, der bald so zahm wurde, daß er der Person, die für ihn sorgte, folgte und sie kannte. Er lebte von Fleisch, Fischen und Brod; nach einiger Zeit aber wurde er matt, abgezehrt, und starb. Ihr hauptsächlichstes Futter im Freyen ist, wie man glaubt, Fische; deren Ueberbleibsel, so wie die von Krebsen, Scheelfischen und Seewürmern (molluscae) man in ihrem Magen gefunden hat. Diese Art ist die fetteste ihrer Gattung, besonders im Jänner, wo sie mausert. Man vermuthet, sie lege und brüte ihre Eyer im Oktober. Man hat sie an den wüsten Plätzen angetroffen. Ihr Fleisch ist schwarz, aber nicht sehr unschmackhaft. Man hat sie sonst für einen einsam lebenden Vogel gehalten ^{c)}, er ist aber nachher hier und da in beträchtlichen Heerden angetroffen worden ^{d)}.

Man findet ihn an einerley Orten, mit dem Papus-Penguin (Nr. 3.), und nicht selten in Gesellschaft mit ihm. Am liebsten aber hält er sich zu seines Gleichen.

3. Der Papus-Penguin. (Papuan P.)

Aptenodytes Papua. LIN. Ed. XIII. I. 2, p 556. No. 3. ^{a)} — FORSTER in COMM. Gott. vol. III. p. 143 tab. 3.

Le Manchot Papou. SONN. Voy. p. 181. tab. 115. ^{m)}

Etwas größer als der Capsche Penguin (Nr. 5), und dritthalb Fuß lang. Sein Schnabel ist vier Zoll lang, und roth; die obere Kinnlade an der Spitze etwas gebogen; die untere mäßig spizig; der Augenstern gelb, oder hellroth; der Kopf, und der Hals zur Hälfte dunkelschwarz, ins Blaue ziehend; an beyden Seiten des Kopfs über den Augen, ist ein großer, weißer Fleck, der nach hinten hingehet, aber das Auge unten nicht ganz umgiebt; quer über den Scheitel läuft ein schmaler, weißer Streifen, der sich mit den Flecken zu beyden Seiten vereinigt; die untere Theile vom Hals an sind auch weiß; die obern bläulichschwarz; die

^{b)} Sonnerat. — Forst. Voy. vol. II. p. 214. 528.

^{c)} Bougainville.

^{d)} Cook's last Voy. vol. I. p. 87. — Die Penguins wurden zu Tausenden auf der Neujahrs-Insel, bey Staatenland,

gesehen, wovon über 500 von der Schiffskompanie zur Speise erhalten wurden.

^{e)} Latham Ind. orn. II. p. 879. n. 3. B.

^{m)} Sonnerats Reise nach Neuguinea. S. 64. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 826. Nr. 3. B.

die Flügel oben schwarz, die Spitzen, der untere Rand und die innere Seite weiß; der Schwanz keilförmig, die mittlern Federn sieben Zoll lang; die Füße roth, bey Einigen gelb; die Schwimmhäute dunkelbraun; die Klauen schwarz.

Er ist auf der Insel Pampus, in Neuguinea, zu Hause, wird aber auch auf den Falklands-Inseln, und in Kenguelens-Land angetroffen worden *). Er findet sich häufig unter dem letztbeschriebenen.

4. Der Antarktische Penguin. (Antarctic P.)

Aptenodytes antarctica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 557. (No. 4. o) — FORSTER COMM. Gott. vol. III. p. 141. tab. 4. p)

Seine Länge ist fünf und zwanzig Zoll, und sein Gewicht zwölfthalb Pfund. Der Schnabel ist über zwey und drey Viertel Zoll lang und schwarz, die untere Kinnlade etwas abgestumpft; der Augenstern hellgelb; die obere Theile des Körpers sind schwarz; die untern glänzend weiß; unter dem Kinn ist ein schmaler, schwärzlicher Streifen, der gegen den Hinterkopf zuläuft, und um die Gegend der Ohren etwas gebogen ist; die Flügel sind wie bey den vorigen Arten, oben schwarz, der untere Rand und die innere Seite weiß, die Spitzen schwarz; der Schwanz keilförmig, seine Federn, oder vielmehr Borsten, aus denen er besteht, schwarz, und zwey und dreyßig an der Zahl; die Füße fleischfarben; die Sohlen schwarz.

Diese Art ist in der Südsee vom 48sten Grad, bis zum antarktischen Kreis, zu Hause; und findet sich häufig auf den Eisbergen und Inseln, die sie bestiegt. Sie ist sehr zahlreich *). Unsere letzten Reisenden fanden sie in Menge auf der Insel Desolation, und man bemerkt, daß auf einer angränzenden, nicht weit entfernten, Insel, die Felsen fast ganz mit Penguins und Wasserraben *) bedeckt waren; jene sehr wahrscheinlich von dieser Art *).

5. Der Capsche Penguin. (Cape P.)

Aptenodytes demersa. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 557. No. 6. r) — FORSTER COMM. Gott. vol. III. p. 144. No. 2.

Diomedea demersa. LIN. Syst. Nat. XII. 1. I. p. 214.

Le Manchot. BAISS. orn. VI. p. 97. — Pl enlum 382.

Magellanic Goose of Clusius. WILL. orn. p. 322?

Penguin. KOLBE Cap. vol. II. p. 144.

Lesser Penguin. Philosoph. Transact. vol. LIII. p. 97.

Black-footed Penguin. EDW. Nat. Hist. pl. 94. u)

Br. Mus. Lev. Mus. x)

299 3

Er

n) Cook's last Voy. vol. I. p. 88.

o) Latham Ind. orn. II. p. 879. n. 4. B.

p) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 826. Nr. 4. B.

q) Forst. Voy. vol. I. p. 98.

r) Shags. S. die folgende Gattung: Pelikan.

s) Ellis Voy. vol. I. p. 6.

t) Latham Ind. orn. II. p. 879. n. 5. B.

u) Seligmanns Vögel IV. Taf. 83. B.

x) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 827. Nr. 6. B.

Er hat die Größe einer großen Ente, und ist ein und zwanzig Zoll lang. Sein Schnabel ist schwärzlich, an der Spitze mit einem gelblichen Querbänd durchzogen, die obere Kinnlade gekrümmt, von der Wurzel an ohngefähr bis zur Hälfte des Schnabels läuft eine Furche, in der die Nasenlöcher liegen; die untere Kinnlade ist am Ende abgestumpft; die obern Theile, vom Kopf bis zum Schwanz, sind schwarz; die Seiten des Kopfs und der Kehle schmutzig grau; die Brust, der Bauch, die Schenkel und die Stelle unter dem Schwanz, weiß; die flossenartigen Flügel oben schwarz, am untern Rande weiß, und unten auch weiß, mit Schwarz melirt; der Schwanz kurz und keilsförmig; die Füße haben vier Zehen, die innere steht sehr hoch oben, und an der innern Seite des Fußes; Füße, Schwimmhäute und Zehen sind schwarz^{y)}.

5. Var. A. *Aptenodytes demersa*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 557. No. 6. β. 2)

Le Manchot tacheté. BRISS. orn. VI. p. 99. tab. 9.

Le Manchot à bec tronqué. BUFF. ois. IX. p. 411. pl. 31. — Pl. enlum. 1005.

Black-footed Penguin. EDW. Nat. Hist. pl. 94. a)

Von der Größe des letztern. Der Schnabel eben so; der obere Theil des Kopfs, der Hals, der Rücken und der Steiß schwärzlich, jede Feder längs dem Schafte herab dunkel schwarz gestreift, und zu beyden Seiten mit sehr kleinen, weißlich grauen Punkten bezeichnet; an beyden Seiten des Kopfs ist ein weißer Streifen, der an der Wurzel des Schnabels anfängt, über den Augen weg, nach dem Hinterkopf hinläuft, und sich mit dem Weißen an den Seiten des Halses vereinigt; die Seiten des Kopfs und der Kehle sind schwärzlichbraun, und, wie der Rücken, mit kleinen, schmutzigweißen, aber nicht so sichtbaren Flecken bezeichnet; an der Brust ist ein gewölbtes, schwärzlichbraunes Band, das in einem Strich zu beyden Seiten bis an die Schenkel hinläuft; Flügel, Schwanz und Füße sind wie bey dem vorigen^{b)}.

5. Var. B. *Aptenodytes demersa*. L. I. 2. p. 557. No. 6. γ. c)

Im Leberschen Museum bemerkte ich noch eine Spielart. Bey dieser sind der Scheitel, der Hinterhals und alle obern Theile des Körpers schwarz; die untern mehrentheils weiß, das Kinn ausgenommen, das schwarz ist, und das Schwarze umgiebt die Augen einigermaßen auf eben die Art, wie bey dem letztbeschriebenen; aber in einer solchen Entfernung, und so kreisförmig, daß es ziemlich so aussieht, als wenn die Vögel Brillen aufhätten^{d)}, besonders wenn man sie von vornen betrachtet; sie haben auch das nämliche Band über die Brust, und es läuft auch an beyden Seiten bis zu den Schenkeln herab, wie bey dem letztbeschriebenen.

Die

y) Nach Kolben, hellgrün. — In einem Gemälde des verstorbenen Hrn. Edwards, das ich jetzt besitze, bemerkte ich, daß die Füße roth sind; daher kann man schließen, daß sie in der Farbe sehr variiren.

z) Latham I. c. β. B.

a) Seligmanns Vögel IV. Taf. 83. B.

b) Dies ist Brissons Beschreibung: Edwards

Vogel geht darin ab, daß das Schwarze mehr ins braune zieht, und die weißlichen Flecken fehlen; und dies ist auch der Fall bey einem Exemplare in meiner eigenen Sammlung.

c) Latham I. c. γ. B.

d) Vergleiche Pinguin à lunettes. Pernetty Voy. vol. II. p. 17. tab. 7. fig. 3. Englische Uebers. p. 243. tab. 15.

Die zwey zuerst erwähnten sind vermuthlich Männchen und Weibchen; und diejenigen, die von diesen Beschreibungen abweichen, sind, vielleicht junge Vögel eines oder des andern Geschlechts.

Alle obige Vögel finden sich in der Nähe des Vorgebürgs der guten Hoffnung, besonders auf der Robben- oder Penguin-Insel, in der Gegend der Saldanien-Bay^e). Gleich allen andern dieser Gattung ist diese Art ein vortrefflicher Schwimmer und Taucher; zu Lande aber hüpfet und flattert sie auf eine äußerst lächerliche Art, und wenn sie sich übereilt, so stolpert sie beständig; oft läuft sie eine Strecke weit, wie ein vierfüßiges Thier, und bedient sich der Flügel statt der Füße, bis sie ihre aufrechte Stellung wieder bekommt. Zugleich schreyt sie, wie eine Gans, aber mit einer viel rauhern Stimme. Man sagt sie klettere ein Stück Weges an den Klippen hinauf, um ein Nest zu bauen; worin sie, wie man bemerkt hat, ihr Schnabel unterstützt. Der Eyer sind zwey, weiß, so groß, wie Enteneyer, und sie werden für eine delikate Speise gehalten, wenigstens am Cap, wohin sie in großer Menge in dieser Absicht gebracht werden. Am Cap sieht man diese Vögel auch oft zahm; gewöhnlich leben sie aber nur wenige Monate in der Gefangenschaft.

Ich^f) finde bey Herrn Sparrmann^g), daß gegenwärtig die kleine Insel Malaga, in Falso-Bay, vorzüglich mit Penguins und Robben (Seals) bevölkert ist; und obschon die Robben- oder Seekuh-Inseln (sonst Penguin-Inseln genannt) in Tafel-Bay, den Namen des Vogels trägt, so findet man sie doch selten mehr da, seitdem sie bewohnt ist.

6. Der Magellanische Penguin. (Magellanic P.)

Aptenodytes magellanica. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 557. No. 5. h) — FORSTER in Comm. Gott. vol. III. p. 143. tab. 5. — MILLERS illustr. tab. 34.

Er hat die Größe des antarktischen Penguins (Nr. 4), eine Länge von zwey Fuß, bis zwey Fuß, sechs Zoll, und ein Gewicht von elf Pfunden. Sein Schnabel ist schwarz mit einem Querbande nahe an der Spitze, die untere Kinnlade schief abgestumpft; der Augenstern ist rothbraun; die Seiten des Kopfs, unter den Augen, und das Kinn, sind schwarz; von der Wurzel des Schnabels, zwischen und über den Augen weg, läuft ein weißer Streifen, der das Schwarze

e) „In Menge auf der Kaninchen-Insel, 14 kleine Meilen (leagues) von Saldanien Bay, wo sie in der See von Fischen, und an der Küste von Gras leben, und Höhlen haben, wie die Kaninchen, in denen sie wohnen. Einige haben es versucht, sie zu essen, aber um eine Speise aus ihnen zu machen, kann ich^f kein andern Rath geben, als den folgenden „Distichon enthält:

„Tota quidem ponatur Anas, sed peccatore tantum

„Et cervice sapit, cetera redde coquo.“

„Von dieser Ente schmeckt die Brust, der Hals so ziemlich noch,

„Das Uebrige giebt aber wieder hin dem Koch.

f) Zus. a. d. Suppl. S. 278. Herb. Trav. p. 12.

g) Voy. vol. I. p. 24.

h) Latham Ind. orn. II. p. 380. n. 6. B.

Schwarze an den Seiten des Kopfs umgiebt, und sich unter der Kehle vereinigt; obige Zeichen ausgenommen, sind der übrige Kopf und Hals schwarz, eben so die obern Theile des Körpers und die Flügel; die untern Theile der Lebern, und die des Körpers, von der Brust an, weiß, ein schmales, schwarzes Band ausgenommen, das in einer kleinen Entfernung innerhalb des Weißen an der Brust, und herabwärts zu beyden Seiten, unter den Flügeln, bis zu den Schenkeln hinläuft; die Füße sind röthlich fleischfarben, an den Zehen unregelmäßig gefleckt; die Klauen schwarz.

Diese Art scheint sehr nahe mit der vorigen verwandt zu seyn, und im Aeußern sich hauptsächlich dadurch zu unterscheiden, daß die Mitte des Halses rings herum schwarz ist.

Sie ist in der Magellanischen Straße, in Staatenland, Feuerland, und auf den Falklands-Inseln zu Hause, und eine sehr zahlreiche Art. Man sieht sie oft zu Tausenden, wenn sie sich des Abends in die höchsten Gegenden der Inseln zurückzieht, um da zu übernachten. Ihre Stimme ist dem Geschrey des Esels nicht unähnlich. Sie ist kein furchtsamer Vogel, denn sie geht nicht leicht jemand aus dem Wege; ja statt dessen fällt sie oft den Menschen an und beißt ihn in die Beine, daß es Blut giebt. Die Matrosen auf Capitains Cooks Schiff schlugen sie zu Hunderten mit Prügeln todt, und fanden sie nicht unschmackhaft zu essen, ob sie gleich glaubten, sie hätten einen Bisamgeschmack; am besten fanden sie sie noch in einem Ragout. Sie mischen sich oft unter die Seewölfe (Sea-Wolves), unter dem Rohr, und bauen sich Höhlen, wie die Füchse. Wenn sie schwimmen, so sieht man bloß den Hals und die Schultern über dem Wasser hervorragen, und sie kommen mit solcher Geschwindigkeit vorwärts, daß kein Fisch ihnen zu folgen im Stande zu seyn scheint. Wenn sie ein Hinderniß antreffen, so hüpfen sie vier bis fünf Fuß weit aus dem Wasser, und tauchen dann wieder unter, um ihren Weg fortzusetzen.

Dies ist wahrscheinlich die Art, auf die Petrose anspielt, und die Art ihre Eyer zu legen, als die größte Sonderbarkeit an ihr bemerkt. Dieß thun sie in großen Gesellschaften (collective bodies), indem sie sich in unglaublicher Menge auf gewissen Plätzen versammeln, die ihr langer Aufenthalt von Gras befreyt hat, und denen man die Namen Städte (towns) ¹⁾ gegeben hat. „Hier,“ sagt er, „hatten wir zur Brütezeit einen Anblick, der eine äußerst traurige, ich darf sagen, schreckliche Idee dieser von Menschen verlassenen Inseln gab: — eine allgemeine Stille herrscht in diesen Städten, und wohin wir unsern Fuß unter ihnen setzten, um uns mit Eiern zu versehen, wurden wir mit Seitenblicken beobachtet, wir hatten aber keine Furcht. Die Eyer sind etwas größer als Gänse-Eyer, und liegen paarweise. Wenn wir eines, und zuweilen zwey auf Einmal wegnahmen, so wurden sie eben so oft von den Vögeln wieder ersetzt; aber die Klugheit erlaubte uns keine allzugroße Plünderung, um nicht eine künftige Ergänzung bey der nächsten jährlichen Brut zu verblindern.“ Sie legen zuweilen

1) Nach seiner Bemerkung machen sie ihre Nester aus Mist, Einen Fuß hoch, und so nahe aneinander, als möglich. — Es ist möglich, daß sie verschiedene Arten zu nisten haben, nach Maaß-

gabe der Plätze, die sie bewohnen; oder vielleich sind die Sitten dieser Art mit denen einer andern verwechselt worden.

Ihre Eyer im November, indem sie die Schiffsvögel austreiben, die ihre Jungen schon vor ihnen ausgebrütet hatten. Die Eyer selbst fand man sehr schmackhaft, und sie ließen sich drey bis vier Monate gut aufbewahren.

7. Der Penguin mit dem Halsbande. (Collared P.)

Aptenodytes torquata. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 558. No. 8. *k*) — FORSTER in Comm. Gott. vol. III. p. 146.

Le Manchot à collier de la Nouvelle Guinée. SONN. Voy. p. 181. tab. 114. *l*)

Etwas kleiner, als der Papus-Penguin (Nr. 3), und achtzehn Zoll lang. Sein Schnabel ist in der Form dem des Riesen-Penguins (Nr. 2) einigermaßen ähnlich, und schwarz; der Augenstern eben so; das Auge mit einer kahlen, blutrothen Haut umgeben, die eysförmig, und drey mal so groß, als das Auge selbst ist; der Kopf, die Kehle, der Hinterhals, und die Seiten des Halses, der Rücken, die Flügel und der Schwanz sind schwarz; Vorderhals, Brust, Bauch und Schenkel weiß, und dieß zieht sich um den Hals, wo das Weiße anfängt, wie ein Halsband herum, außer daß es sich hinten nicht gänzlich schließt; die Füße sind schwarz.

Er ist in Neuguinea zu Hause. Hr. Forster hat ihn auch in Kerguelens Land, und dann wieder auf zwey, an die Insel Süd-Georgien gränzenden Inseln, gesehen.

8. Der rothfüßige Penguin. (Red-footed P.)

Aptenodytes Catarractes. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 558. No. 7. *m*) — FORSTER in Comm. Gott. vol. III. p. 145.

Phaëton demersus. LIN. Syst. Nat. XII. T. 1. P. 1. p. 219.

Le Gornfou. BRÜSS. orn. VI. p. 102.

Red-footed Penguin. EDW. Nat. Hist. pl. 49. *n*) — Phil. Transact. vol. LVIII. p. 98. *o*)

Von der Größe einer Gans. Der Schnabel zwey und einen Drittel Zoll lang, und roth, beyde Kinnladen spitzig, und die obere nur sehr wenig gebogen; der vordere Theil des Kopfs schmutzigbraun; der hintere Theil desselben, und alle obern Theile des Halses und Körpers schmutzig purpurroth; alle untern Theile weiß *r*); die Flügel braun, und weiß eingefast: der Schwanz kurz, borstig, und schwarz; Füße, Beinen und Schwimmhäute schmutzig roth; die Klauen braun.

Er ist in der Südsee zu Hause.

9. Der

k) Latham Ind. orn. II. p. 880. n. 5. B.

l) Sonnerats Reise nach Neuguinea. S. 64.

m. 1. Fig. Donndorfs Zool. Beytr. II. S.

829. Nr. 8. B.

m) Latham Ind. orn. p. II. 881. n. 8. B.

n) Seligmanns Vögel II. Taf. 97. B.

o) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 828. Nr. 7. B.

p) Edwards Vogel war an den untern Theilen wellenförmig gestreift.

9. Der kleine Penguin. (Little P.)

(S. die hundert und eilfte Kupfertafel.)

Aptenodytes minor. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 558. No. g. 9) — FORST. in COMM. Gott. vol. III. p. 147.

Small Penguin. COOKS last. Voy. vol. I. p. 151.
LEV. Mus. 7)

Er hat die Größe einer Kriech-Ente, und ist funfzehn Zoll lang. Sein Schnabel ist anderthalb Zoll lang, und am Bau dem des vorigen sehr ähnlich, von dunkler Farbe, die untere Kinnlade etwas abgestumpft, und blau an der Wurzel; der Augenstern schwarzgelb (livid); die obern Theile des Vogels, vom Kopf bis zum Schwanz scheinen aschblau zu seyn, weil die Enden der Federn diese Farbe haben, ihre Wurzel aber ist braunschwarz, und der Schaft jeder Feder schwarz; um die Augen herum, und ein wenig unter ihnen zu beyden Seiten, ist eine bräunlich aschfarbene Stelle; die untern Theile, vom Kinn bis zum After, sind weiß; die Flügel oben dunkelbraun, unten weiß; der Schwanz sehr kurz, aus sechzehn steifen Federn bestehend, ist aber kaum sichtbar, außer daß die Federn an diesem Theile etwas verlängert scheinen; die Füße sind mattroth; die Schwimmhaut schwärzlich; die Klauen schwarz.

Diese Art findet sich unter den Felsen am südlichen Theil von Neu-Seeland, wo sie nicht selten ist; am häufigsten auf DUSKY-Bay. Sie gräbt tiefe Höhlen an die Seiten der Hügel, in die sie ihre Eier legt. Diese Höhlen sind an einigen Stellen so häufig (thick), daß man kaum drey oder vier Schritte machen kann ohne in Eine derselben auf die Kniee zu fallen. Die Einwohner von Königin Charlotten-Lund schlagen diese Vögel mit Prügelein todt, und halten ihr Fleisch, wenn es abgehäutet worden, für eine gute Speise. In Neu-Seeland kennt man sie unter dem Namen Koro'ra.

Ich habe bemerkt, daß diese Vögel, sowohl an Größe, als an Farbe, variiren: Einige sind viel kleiner, als die andern, oben ganz schwarz, und nur dreyzehn Zoll lang; andere etwas größer, an den obern Theilen einfarbig bleifarben, mit schwarzen Flügeln; alle aber an den untern Theilen weiß, oder doch beynahe so. Die Füße sind bey diesen zwey letzten an den Enden der Zehen mit Schwarz bezeichnet; und die Klauen auch schwarz.

Z u s a t z e.

10 Der Quethu-Penguin.

Aptenodytes chiloensis. Gmelin LIN. I. 2. p. 559 n. 10. — LATHAM Ind. ORN. II. p. 881. n. 10. — BUFFON IX. p. 415. IV.

Diomedea chiloensis. MOLINA Chili p. 210.

Er

9) Latham Ind. orn. II. p. 881. n. 9. B.

7) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 829. Nr. 9. B.



Der kleine Pinguin .



Drey und neunzigste Gattung. Penguin.

495

Er hat die Größe einer Haus-Ente. Der Leib ist mit länglichen, dichten, wolligen, krausen aschgrauen Federn bedeckt.

Er hält sich bey der großen Insel Chiloe auf, ist sehr gemein, und die Federn werden von den Eingebornen zu Kleidungen verbraucht.

II. Der Chilische Penguin.

Aptenodytes chilensis. Gmelin Lin. I. 2. p. 559. n. 11.

Aptenodytes Molinae. Latham Ind. orn. II. p. 881.

Diomedea chilensis. Molina Chili p. 210.

Er hat die Größe einer Haus-Ente. Der Kopf ist so wie der Schnabel klein und zusammengedrückt; der Hals lang; der Leib haarig; oben grau und blau bunt; Brust und Bauch weiß; die Füße dreyzehig.

Er bewohnt Chili; legt sechs bis sieben schwarzpunktierte Eyer in den Sand; schwimmt sehr gut, kann aber dem stürmischen Meere oft nicht widerstehen, und wird todt ans Ufer geworfen. Er geht aufgerichtet. Die dichte Haut läßt sich leicht vom Fleische trennen. Das Fleisch ist schwachhaft. B.

Vier und neunzigste Gattung. Pelikan.

Der Schnabel ist bey dieser Gattung lang und gerade; das Ende entweder haakenförmig oder schief zulaufend (sloping). Die Nasenlöcher liegen in einer Furche, die längs den Seiten des Schnabels hinführt, und sind bey den meisten Arten nicht zu unterscheiden. Das Gesicht ist mehrentheils unbefiedert, und nur mit einer kahlen Haut bedeckt ¹⁾. Der Kropf (Gullet) kahl, und sehr ausdehnbar; der Zehen vier, und alle untereinander verbunden.

In der Gattung Pelikan sind alle, bisher unter den besondern Namen, von Kropfgans (Pelican), Fregat-Vogel (Man of War Bird), Cormoran (Cormorant), Wasserrabe (Mag) Schottische Gans (Gannet) und Tölpel (Booby) bekannte Vögel begriffen ²⁾; da sie aber alle ähnliche Charaktere haben, die so scharf gezeichnet sind, daß sie nicht getrennt werden können, so habe ich wohl nicht unrecht gethan, wenn ich in der Vereinigung derselben, dem Beispiel Linne's folgte. Die Eigenthümlichkeiten desselben kann man sehen, wenn man auf die Beschreibung der einzelnen Arten selbst Acht hat ³⁾.

Nr 2

I. Der

1) Meine elfte und zwölfte Art ausgenommen, bey denen diese Theile befiedert sind.

2) S. Brisson's Ornith. vol. VI. Gen. CX. CXII.

3) Man macht zwey Familien a) mit ungezähnelten und b) gezähnelten Schnabel. Die erste acht von Nr. 1 — 24, und die zweyte von Nr. 25 an. B.

I. Der große Pelikan. (Great white Pelican).

Pelecanus Onocrotalus. LIN. Syst. XIII. I. 2. p. 569. No. 1. *un*)

— — — — —, *orientalis*. LIN. Syst. Nat. ed. XII. T. I. P. I. p. 215.

No. 1. 2. — HASSELQ. Voy. p. 288. — Nov. Comment. Acad. Petrop. vol. XV. p. 471. No. 16. — SCOP. ann. I. No. 97. *x*) — GEORGI Reise p. 196.

— KRAM. elench. p. 345.

Le Pelican. BRISS. orn. VI. p. 519. No. 1. — BUFF. cis. VIII. p. 282. pl. 25. — Pl. enlrm. 87.

Baba. BELL. Trav. p. 41.

Pelethane. RAI. Syn. p. 121. No. 1. — WILL. orn. p. 327. pl. 63.

Tubano. WHEELERS Trav. p. 304. pl. *ibid*.

The Pelican. EDW. Nat. Hist. pl. 92. *y*)

Great Pelecan. Arct. Zool. No. 505. 2) — Gen. of Birds p. 67. pl. 15.

Br. Mus. Lev. Mus. *a*)

Dieser Vogel ist, ausgewachsen, viel größer als ein Schwam; er misst zuweilen, von einer Flügelspitze zur andern, bis auf funfzehn Fuß, und wiegt fünf und zwanzig Pfunde. Sein Schnabel ist funfzehn bis sechzehn Zoll lang, die obere Kinnlade flach und breit, am Ende mit einem Haken versehen; die Haut zwischen den Seiten der obern Kinnlade sehr schlapp und ausdehnbar *b*), und reicht auf acht bis neun Zoll den Hals herab; diese Haut ist unbefiedert, und kann bey Einigen viele Quart Wassers halten; die Oeffnung des Schnabels ist sehr weit *c*). Ueber den Rücken des Schnabels läuft eine karmosinrothe Ribbe (*rib*); das Uebrige derselben ist an der Wurzel hellroth, und wird gegen die Spitze hin gelb; die untere Kinnlade ist hellroth, und der Sack roth oder gelb; die Zunge sehr klein, kaum zu bemerken; der Augenstern nussbraun; die Seiten des Kopfs unbefiedert, und nur mit einer fleischfarbenen Haut bedeckt, in der die Augen liegen; der Hinterkopf hat einigermaßen einen Federdusch; das Gefieder ist durchaus weiß, mit Fleisch-

un) Latham Ind. orn. II. p. 882. n. 1. B.

x) Uebers. v. Günther I. S. 83. Nr. 97. B.

y) Seligmanns Vögel IV. Taf. 79. B.

z) Uebers. v. Zimmermann II. S. 538. Nr. 423. B.

a) Kirsch Vögel Taf. 186. Meine N. G. Deutschlands II. S. 750. Nr. 1. Cetti N. G. von Serdinien II. S. 343. Taf. 6. Lapechin Reisebuch der Russ. Reise I. S. 307. Adanson Senegal. S. 202. Pallas Reise Auszug I. S. 98. 314 II. S. 74. Dessen Nord. Beytr. I. S. 7. Le Drün Reise nach Mosk. und Pers. II. S. 161. Lichtenbergs und Voigts Magazin f. d. Neueste N. G. III. 2 S. 154. Verault u. Abhandl. aus der N. G. II S. 341. Taf. 85. Zergliederung Taf. 86. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 844. Nr. 1. B.

b) Die gemeinen Matrosen bedienen sich ihrer oft zu Tabacksheuteln, indem sie sie bloß durch das Hineinstecken eines großen Steins, oder einer Stückerugel in Form bringen, und dann den Sack zum Trocknen aufhängen. Ich habe sie aber auch zu einem Arbeitsbeutel der Frau einzimmer gearbeitet und artig ausgeschmückt gesehen; auf diese Art sieht sie fast einer gutgearbeiteten Pergamenthaut ähnlich, und ist sehr geschmeidig.

c) Vey Etnem, der vor einigen Jahren in London gezeigt wurde, konnte der Wärter sehr leicht seinen Kopf hineinstecken; und von einem andern, der in Frankreich gesehen worden, wird erzählt, sein Nacken sey so weit gewesen, daß ein Mann seine Beine sammt den Stt hineinbringen konnte. Salerne Orn. p. 369.

Fleischfarbe überlaufen, die Aferflügel, und die großen Schwungfedern ausgenommen, die schwarz sind; die Füße sind bleifarben; die Klauen grau. Bey jungen Vögeln ist der ganze Schnabel gelb.

Diese Art ist in einigen warmen Ländern Europens, auf dem festen Lande, gemein, vorzüglich aber bewohnt sie den heißen Erdgürtel. Im Russischen Reiche findet sie sich in unglaublicher Menge am Caspischen, und schwarzen Meere, und zuweilen geht sie eine ziemliche Strecke die Flüsse hinauf, die in diese Meere fallen; sie kommt mit den Schwänen, Gänsen, Störchen und andern Vögeln an, und zieht mit ihnen wieder weg; gegen Osten ist sie sehr selten, und gegen Norden trifft man sie kaum bis an die See Sibiriens an, wiewohl man sie hier und da am See Baikal gesehen hat; oft hat man sie an den Küsten des Mittelländischen Meeres und den darin liegenden Inseln *) angetroffen; sie ist in Griechenland gemein, und sie soll auf einigen Flüssen nisten, die sich in die Donau ergießen †); zuweilen verirrt sie sich in die Schweiz, wo eine in Zürich geschossen worden ist; sie ist aber so selten daselbst, daß sie das gemeine Volk gar nicht kennt; hin und wieder hat man sie in Frankreich gesehen, wo Eine in der Provinz Dauphine, und eine andere am Fluß Saone, in Lothringen, erlegt worden ist ‡). Ich finde auch eine Nachricht, daß Eine in England, zu Horseshoe, im May 1663 geschossen worden ist, die von Einer Flügelspitze zur andern drey Ellen maß §); und Dr. Leith versichert mir, er habe vor einigen Jahren, auch im May, bey Hrn. Gregory Page's Landgut, auf Blackheath, in Kent, einen Pelikan über seinen Kopf wegfliegen gesehen; dieser war aber von bräunlicher Farbe, meiner braunen Art (Nr. 3) sehr ähnlich. Durch ganz Afrika sind sie sehr häufig; sie kommen dort im September an, und fliegen in ganzen Heerden, die einen Keil bilden, dessen Spitze nach vornen gerichtet ist, wie die wilden Gänse. In Damietta, und andern Gegenden Aegyptens, sind sie nicht selten, so wie an der Küste von Senegal und den angrenzenden Ländern, Guinea und der Goldküste, und von da an bis zum Vorgebürge der guten Hoffnung in den Buchten und Flüssen daselbst sind sie sehr häufig ¶), und in vielen andern Gegenden Asiens sowohl, als Afrikas sind sie von verschiedenen Schriftstellern bemerkt worden.

Das Weibchen bauet ein Nest aus Kiedgras, auf moosige, torfige Stellen, besonders auf die Inseln in den Seen, die von Menschen entfernt sind; dieses Nest hat anderthalb Fuß im Durchmesser, ist tief ausgehöhlet und mit weichem Gras ausgefüllt. Es legt zwey oder mehr weiße, den Schwänen-Eiern sehr ähnliche Eier, und brütet ohngefähr eben so lang, als der Schwan. Wenn zufälligerweise den Vogel im Brüten irgend Jemand stört, so nimmt er die Eier mit dem Schnabel aus dem Nest heraus, läßt sie ins Wasser fallen, und bringt sie dann wieder an ihren Ort zurück, sobald ihm sein Feind aus dem Gesichte ist †).

Nr 3

Die

a) Auf der Insel Majorca.

e) Hist des Ois.

f) Hist des Ois.

g) S. ein Manuscript im Britischen Museum. Nr 1380 16. C in einer Nachricht von T. Brown, von Norwich. — Hierentscheid die

Krae ob dies nicht einer von den Pelikanen des Königs in St. James's Park gewesen seyn möchte, die um diese Zeit vermisst wurden?

b) In Seebohm's Strom, im December. Phil. Trans. vol. LXVI. p. 291. und in Hunderten im Thal Berboore. ibid. p. 309.

i) Decour. Russ. vol. I. p. 142.

Die vorzüglichste Nahrung des Pelikans sind Fische, die er, wenn er einzeln ist, durchs Untertauchen fängt. Man sieht ihn häufig über dem Wasser schweben, und so wie er einen Fisch unten gewahr wird, so taucht er in einem Augenblick herunter, wobey er selten seinen Zweck verfehlt, da ihm die ungeheure Oeffnung seines Schnabels zum Fang seiner Beute gar sehr zu statten kommt. Wenn er auf diese Art seinen Sack mit einer so großen Ladung, als er tragen kann, angefüllt hat, so fliegt er auf irgend eine bequem gelegene Felsen Spitze, und verzehrt seine Fische mit Muse. Wenn aber mehrere beisammen sind, so bedienen sie sich einer andern Art zu fischen, besonders wenn sie in Gesellschaft des Cormoran (Cormorant, s. Nr. 12) sind. Diese beyden Vögel beschreiben einen großen Cirkel, in einiger Entfernung vom Land; die Pelikane flattern mit ihren breiten Flügeln oben, auf der Oberfläche, herum, während die Cormorane untertauchen; auf diese Art werden die Fische, die sich in diesem Kreise befinden, vorwärts gegen das Land hin getrieben, und, so wie der Kreis durch die dichter aneinander kommenden Vögel, kleiner wird, werden die Fische in einen immer kleineren Raum gedrängt, wo denn ihre Verfolger keine Schwierigkeit finden, ihre Bäuche zu füllen. Hierbey werden sie von der schwarzköpfigen und andern Arten von Meven begleitet, die sich ebenfalls ihres Antheils wegen dabey einfinden.

Man bemerkt auch, daß dieser Vogel ein Nest in die Wüsteneyen sehr weit von allem Wasser entfernt, baut; aus welchem Grunde aber, kann die Vorsehung allein bestimmen, weil des Vogels einzige Nahrung aus diesem Element kommen muß. Daher ist er genöthigt Wasser zu tragen, um seine Jungen zu erhalten, indem er seinen Sack damit anfüllt. Man sagt, die Kameele und andere Thiere bedienen sich dieses Vortheils um ihren Durst zu stillen, indem sie die Nester dieser Vögel aufsuchen, und, dankbar für diese Versorgung, den Jungen nicht das geringste Feld zufügen^{k)}. Auch soll man sich dieses Vogels zum Fischfang (domestic fishing), eben so, wie sich die Chineser des Fregat-Vogels (Nr. 9.) bedienen^{l)}. Ich finde nicht, daß der Pelikan sehr zur Speise empfohlen wird; wiewohl man mir gesagt hat, er gäbe ein besseres Gericht, als der Tölpel (Booby) oder der Fregat-Vogel (Man of War Bird s. Nr. 9.^{m)}).

1. Var. A. Der sägeschnäblige Pelikan. (Saw-billed P.)

Pelecanus Onocrotalus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 56g. No. 1. β.

Le Pelican à bec dentelé. BRISS. orn. VI. p. 523. A. — BUFF. ois. VIII. p. 30g. n)

Dieser

k) Osbeck Voy. — Der Pelikan ist wegen seiner eigenthümlichen Zärtlichkeit gegen seine Jungen berühmt geworden, die er mit dem Blut aus seiner Brust nährt; dieß ist aber daher entstanden, daß man einen Vogel dieser Art seinen rothen Wassertrocken sah, welches er durch das Andrücken desselben an die Brust bewirkte, und das Eine hierin unersahrbare Person leicht irre führen konnte.

l) Hist. des Ois.

m) Dampier's Voy. Part. II. p. 71. Den Juden war er zu essen verboten, so wie die Scharpe. 3. B. Mos. XI. 17. 18.

n) Diese Varietät wird im Ind. orn. II. p. 884. n. 9. zu den Thago Nr. 31. gezogen, wo er auch eher hingehört, als daß es eine Varietät von dem großen Pelikan seyn sollte, da der gezähnelte Schnabel ein zu ausgezeichnetes Merkmal ist. D.

Dieser unterscheidet sich vom vorigen in nichts, außer daß sein Schnabel gezähnt, und saffrangelb ist; die Füße sind eben so, ins Rothe ziehend.

Er ist in Mexico zu Hause.

2. Der rosenfarbene Pelikan. (Rose coloured P.)

Pelecanus roseus LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 570. No. 9. ^{a)}

Le Pelican rose de l'Isle de Luçon. SONN. Voy. p. 91. tab. 54. ^{p)}

Er hat die Größe einer zahmen Gans. Sein Schnabel ist schwarz; die Augenkreise sind kahl und gelb; der Sack eben so; das Gefieder über und über rosenfarben; die Füße schwarz.

Er ist auf der Insel Manilla zu Hause.

3. Der braune Pelikan. (Brown P.)

Pelecanus fuscus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 570. Nr. 10. ^{q)}

— — *Onocrotalus occidentalis*. LIN. Syst. Nat. XII. T. I. P. 1. p. 215.

No. 1. ^β. — GEORGI Reise p. 169.

Le Pelican brun. BRISS. orn. VI p. 524. No. 2. — BUFF. ois. VIII. p. 306. — Pl. enlum. 957.

The Pelecan. RAIE Syn. p. 191. No. 3. — WILL. orn. p. 327. — SLOANE Jam. p. 322. No. 1. — BROWN Jam. p. 480.

Pelican of America. EDW. Nat. Hist. pl. 93. ^{r)} — ELLIS Hudson's Bay vol. I. pl. 1. Arct. Zool. No. 506. ^{s)}

Br. Mus. Lev. Mus. ^{t)}

Dieser ist etwas größer, als eine Gans, und beynähe vier Fuß lang. Sein Schnabel ist wie bey den andern Arten gestaltet, und funfzehn, ein Viertel Z. L. lang, an der Wurzel grünlich, am Ende ins Blaue übergehend, und ein wenig Roth vermischt; der Sack bläulich aschfarben, und mit röthlichen Strichen gestreift; der Augenfleck dunkel bläulich aschfarben; die kahle Haut um die Augen herum weißlich; Kopf und Hals weiß; jener hat hinten einen kleinen Federbusch; Rücken, Schulterfedern und Streiß aschbraun, die Mitte jeder Feder weißlich; die Brust und die untern Theile wie die obern, aber einsärbig; die obern Deckfedern der Flügel, wie der Rücken, einige der äußern, größern aber einsärbig braun; die mehresten der
oben

^{a)} Latham Ind. orn. II. p. 883 n. 2. ^{B.}

^{p)} Sonnerats Reise nach Neuquinea S. 34. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 848. Nr. 9. Herr Sonnerat glaubt dieser und der Montikische Pelikan (Nr. 4) möchten wohl zu einer Art gehören und nach dem Alter die Farbe ändern. ^{B.}

^{q)} Latham Ind. orn. II. p. 883. n. 3. ^{B.}

^{r)} Seligmanns Vögel. IV. Taf. 81. ^{B.}

^{s)} Uebers. II. S. 539. Nr. 424. ^{B.}

^{t)} Ellis Hudsons Bay S. 37. Cetti II S. von Sardinien II S. 346. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 848 Nr. 10. — Linne, Elouane u. a. m. halten diesen Vogel nur für eine Varietät vom großen Pelikan Nr. 1. ^{B.}

oben beschriebenen Federn sind spitzig, schmal und lang; die großen lang und schwarz; die kürzern schimmelgrau braun; der Schwanz eben so, aus achtzehn Federn bestehend; die Füße bleifarben; die Klauen schwarz.

Ich merke, daß dieß der Vogel ist, der in der Geschichte von Californien (vol. I. p. 40) Meve genannt wird, und sich in großer Menge daselbst, so wie auf Isle d'Assumption und San Roche, befindet. Er soll einer sehr großen Gans an Größe gleichen, und einen weiten Kropf haben, der bey einigen gleich den ledernen Wasserschlänchen aus Peru *) herabhängt;

*) Unter der Peruvianschen Lederflasche (Peruvian leather bottle) wird vielleicht die, aus dem elastischen Harze, oder Caoutchouc, verfertigte, verstanden, den man gewöhnlich unter dem Namen Gummi elasticum (Indian rubber) kennt. Er kommt aus dem Saft des Pfeifensstrauchs (Syringe-tree) von Cayenne und andern Ländern Südamerikas, verhärtet sich in der Kälte, wird durch die Wärme in einem hohen Grade weich, und ist bewundernswürdig elastisch. Es soll so damit zugehen: Der Saft des Baums wird durch Einschnitte erhalten; dann wird er über Stückchen Thon ausgebreitet, in die verlangte Form geknetet, und sobald eine Lage trocken ist, eine andere darauf gelegt, bis der Ventel eine gewisse Dicke hat; alsdann wird das Ganze über einen starken Rauch von Vegetabilien auf dem Feuer gehalten, wodurch es hart wird, und die Textur, so wie das Ansehen von Leder bekommt, und vor Endigung dieses Processes, so lang es noch weich ist, nimmt es jeden Eindruck an, der auf der Außenseite angebracht wird, und der hernach beständig bleibt. Wenn das Ganze fertig ist, so wird der innere Model herausgeklopft (a).

Der Gebrauch dieses Ventels, als ein Gefäß, ist ohne Zweifel nicht so ganz neu, weil er schon in der oben citirten Geschichte von Californien (die zuerst Spanisch, im Jahr 1757. erschien), als eine allgemein bekannte Sache angeführt wird. Ich erinnere mich selbst, vor mehr als 30 Jahren, eine kleinere Art dieser Ventel gesehen zu haben, die mir als eine

Seltenheit gezeigt wurde. Was aber die Anwendung dieser Substanz, zum Austilgen der mit Bleystift gemachten Zeichen betrifft, so ist diese wahrscheinlich noch nicht alt; das erstmal, daß ich mich ihrer erinnere, ist vom Jahr 1771. oder 72. wo vielerley Stückchen, etwas über einen halben Zoll im Durchmesser, in kleinen Büchsen zu letztbenannten Entzweck verkauft wurden, wo ich, zu meinem großen Vergnügen, auch Eines kaufte. — In Rücksicht der Pflanze, die diesen nützlichen Stoff hergiebt, wissen wir nicht gewiß zu welcher Gattung sie gehöre. Aublet, in seiner Geschichte der Pflanzen von Guayana (S. 871) beschreibt den Baum, die Frucht, und die Art und Weise den Saft zu sammeln, hat aber die Blume niemals gesehen; er nennt ihn *Hevea Guianensis*. Linne', der Sohn, in seinen Pflanzen; Supplementen (S. 422.) nennt ihn *Jatropha elastica*, gesteht aber, daß er ihm diesen Namen bloß der Struktur der Frucht wegen gegeben habe, die die meiste Ähnlichkeit mit dieser Gattung hat; seinem getrockneten Exemplar fehlten ebenfalls die Blumen. — Was die klebrige und elastische Beschaffenheit obiges Castes betrifft, so finde ich, daß sie diesem nicht allein eigen ist, weil wir wissen, daß der Saft verschiedener Bäume (b) die nämliche Eigenschaft besitzt, weßwegen die Eingebornen sich desselben als eines Vogelkleins bedienen, und Pfauen und andere große Vögel, damit fangen und fest halten können.

(a) Siefriched. Revue. 1679. pp. 129. mit einer chemischen Analyse dieser Substanz.

(b) *Cecropia peltata*, *Ficus indica* und *religiosa* L. — S. Phil. Trans. vol. LXXI. p. 376. und Allgem. Uebers. II. B. II. Th. S. 646, Note A).

hängt. Diese Vögel pflegen ihre verwundeten oder kranken Kammeraden mit Speise zu versorgen; daher die Eingebornen sich den Vortheil zu Nutzen machen, Einen nahe an der Küste einzusperrern, wodurch sie sich ein Gerichte Fische verschaffen, ohne die Mühe zu haben, sie zu fangen.

Der braune Pelikan ist sehr gemein in vielen Küsten, Ländern von Amerika, und nirgends so häufig, als auf den Westindischen Inseln, Jamaika, Barbadoes u. s. w. Auch in großer Menge in der Bucht von Campeche, und bis nach Carthagena herab. Im Sommer sieht man ihn gegen Norden bis zur Hudsons-Bay. Wenn er im Wasser fische, ist er ziemlich munter; wenn er aber seinen Sack vollgefüllt, und sich auf die Felsen zurückgezogen hat, um auch seinen Bauch zu füllen, so bemerkt man, daß er außerordentlich dumm und gefühllos ist; denn er bleibt Stunden lang unbeweglich sitzen, den Schnabel auf die Brust stützend, und halb schlafend. Und hier ist es nicht selten, daß sich Jemand unversehens an ihm hinschleichen, und ihn ohne Widerstand beym Halse fangen kann.

Ob dieser, oder irgend ein anderer brauner Pelikan, bloß das Junge von dem weißen (Nr. 1.) ist, kann ich nicht bestimmen; viele Schriftsteller behaupten es, während andre zweifelhaft darüber sind, oder diesen Punkt ganz mit Stillschweigen übergehen. Daß die braunen kleiner sind, als die weißen, ist wahr; so wie man auch einige mit vermischten Farben sieht, die den Uebergang von einer zur andern anzudeuten scheinen; ja, Sonnerat geht noch weiter, indem er annimmt die weißen würden rosenfarben, wenn sie ein höheres Alter erreichten. Diese Sache mag übrigens beschaffen seyn, wie sie wolle, so kann nur eine lange Reihe mehrjähriger Beobachtungen, angestellt, die Sache außer Zweifel setzen, da er ein langlebender Vogel ist. In dieser Rücksicht nehme ich keinen Anstand, hier die von früheren Schriftstellern als Arten angegebenen Vögel, auch hier als solche aufzustellen, bis uns neuere und hinlängliche Aufklärungen künftiger Schriftsteller in den Stand setzen, sie mit Zuverlässigkeit zu vereinigen.

4. Der Manillische Pelikan. (Manilla P.)

Pelecanus manillensis. Lrx. Ed. XIII. I. 2. p. 571. No. 11. x)

Le Pelican brun de l'Isle de Luçon. SONN. Voy. p. 91. pl. 53. y)

Dieser ist dem rosenfarbenen Pelikan (Nr. 2.) vollkommen gleich, außer daß sein Gefieder durchaus braun ist.

Er ist in Manilla, nebst dem vorigen, zu Hause. Herr Sonnerat vermuthet, beyde seyen Einer und ebenderselbe, der hier beschriebene aber habe sein vollkommenes Alter noch nicht erreicht, wie der Flamant, der scharlachrothe Ibis und Einige andere. Beyde machen ihr Nest auf den Boden, und scheinen zu Lande sehr unbehülflich zu seyn; doch fliegen sie zuweilen sehr hoch. Ihr Fleisch ist ranzig und schlecht.

5. Der

x) Latham Ind. orn. II. p. 883. n. 4. B.

y) Sonnerats Reise nach Neuguinea. S. 34.

Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 849. Nr. 11.

B.

Latham's allgem. Uebers. der Vögel. III. Band 2. Th.

SSS

5. Der Philippinische Pelikan. (Philippine P.)

Pelecanus philippensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 571. No. 12. 2)

Le Pelican des Philippines. BRISS. orn. VI. p. 527. No. 3. pl. 46. a)

Dieser ist fast vier und einen Viertel Zoll lang. Sein Schnabel ist vierzehn Zoll lang, röthlichweiß, mit einigen braunen Flecken an den Seiten der obern Kinnlade; die kahle Stelle um die Augen herum hat die Farbe des Schnabels; der Beutel ist sehr blaß; Kopf und Hals sind weißlich; vom Hinterkopf nach dem Rücken läuft ein Streifen von Federn, die etwas länger, als die übrigen, und braun und weiß melirt sind; die Federn am Hinterkopf sind noch länger so daß sie einen Busch bilden; alle aber sehr weich und seidenartig; der Obrerrücken und die Schulterfedern sind aschgrau; der untere Theil des Halses, die Brust, die untern Theile des Körpers, der Unterrücken und der Steiß weiß; die Deckfedern der Flügel aschgrau, mit weißen Schäften und Rändern; die äußern, größern, und die Aftersflügel, dunkler, fast schwarz; die Schwungfedern dunkelschwarz; die Wurzel vieler der zweyten Reihe weiß; der Schwanz besteh aus achtzehn, graulichweißen Federn, alle, die zwey mittlern ausgenommen, sind an den Wurzeln der innern Fahnen weiß, die Schäfte schwarz; die Füße roth.

Er ist auf den Philippinen zu Hause, und wahrscheinlich der dort unter dem Namen Alcatraz bekannte Vogel ^{b)}. Die Einwohner behaupten, die Haut der Brust, mit den Federn gearbeitet, habe einen angenehmen Geruch; und auf dem Magen getragen, soll sie ein Mittel gegen den Dampf (asthma) seyn.

6. Der rothrückige Pelikan. (Red-backed P.)

Pelicanus rufescens. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 571. No. 13 c)

Er hat die Größe eines großen Schwans, und fünf Fuß Länge. Sein Schnabel ist dreyzehn Zoll lang, gestaltet wie bey den andern Arten, und hell schmutzig gelb; die Augenfleise, und der Sack eben so; letzterer reicht acht Zoll lang den Hals herab; der Hinterkopf ist mit einem Federbusch geziert, wovon einige Federn vier Zoll lang sind; Kopf und Hals sind schmutzig bräunlichweiß; der Rücken schön hellröthlich zimmetfarben; die Deckfedern wie der Hals, aber dunkler; die Schulterfedern hellgraulich bleifarben; die kleinern Schwungfedern fast wie die Deckfedern, aber mit dunkelgrauen Endspitzen und schwarzen Schäften; die großen Schwungfedern schwarz; der Schwanz dunkelgrau, die Schäfte an der Wurzel weiß, und gegen das Ende hin schwarz; der Bauch; die Schenkel, die untern Deckfedern der Flügel und der Afters, wie der Rücken, aber viel heller; die Federn an der Brust, die Deckfedern der Flügel und am untern Theile des Halses, lang, schmal und spizig, besonders die an der Brust; die Füße gelb.

Dieser Vogel wurde mir von Herrn Schiffschirurgus Lewis geschickt, der mir sagte, er habe ihn von dem Statthalter einer unserer Forts an der Goldküste lebendig erhalten, wo er lange

a) Latham Ind. orn. II. p. 883. n. 5. B.

b) Phil. Trans. vol. XXIII. p. 1394 No. 40.

c) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 849. Nr. 12. B.

c) Latham Ind. orn. II. p. 884 n. 6. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 849. Nr. 13. B.

lange Zeit zahm lebte, und seines Federbusches wegen, für einen seltenen Vogel gehalten wurde. Er war gleich andern seiner Gattung sehr gefräßig; man machte den Versuch, wie viele Fische er in seinen Schnabel fassen könnte, und legte eine gewisse Anzahl, von verschiedener Größe, vor ihm hin auf die Erde: zuerst versuchte er einen zehnpfündigen zu ergreifen, sein Schnabel konnte ihn aber auf keine Art von dem Boden aufheben; hierauf schnappte er zehn andere weg, wovon jeder ein Pfund wog, und steckte sie sorgfältig in seinen Sack, indem er einen an den andern nach der Länge (along side) hinlegte, mit den Köpfen gegen die Kehle gekehrt; nach diesem gieng er sehr gravitatisch hin und her, wobey ihm der Sack bis zu den Füßen herabhieng. Der Sack hielt ohngefähr zwey Gallonen Wasser.

7. Der Carolinische Pelikan. (Charles-Town P.)

Pelecanus carolinensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 571. No. 14. d)

Charles-Town Pelican. Arct. Zool. No. 507. e)

Er hat die Größe der Canadischen Gans. Die Farbe des Gefieders an den obern Theilen ist dunkelbraun; an Brust und Bauch weiß; und der Sack kann viele Gallonen Flüssigkeiten enthalten f).

Diese Vögel sind in Menge um Charles Town, in America, wo sie beständig fischen.

Species.

Pelecanus caroliniensis. L. I. 2. p. 571. No. 14. β. γ. g)

Im Hunterischen Museum sind zwey Exemplare von Vögeln, die diesem ähnlich, wo nicht die nämlichen sind. Die Größe trifft zu; die Länge ist vier Fuß; der Schnabel ist vier zehn Zoll lang, und unterscheidet sich von vielen andern dadurch, daß derjenige Theil der obern Kinnlade, der zunächst an der Wurzel ansitzet, fast cylindrisch, und nicht platt ist, wiewohl er sich am Ende beträchtlich erweitert; das Gefieder ist oben braun; der Kopf, der Hals und die untern Theile bräunlichweiß; die untere Hälfte des Rückens, bey einem Exemplar, schwarz und schmutzig weiß gestreift; die Federn schmal, und mit der letzten Farbe gerändert; bey dem andern ist der Rücken einfärbig; der Sack ist bey beyden von ungeheurer Größe, und nimmt den größten Theil des Vorderhalses ein; am Hinterhalse, seiner ganzen Länge herab, sind die Federn viel länger, als an den übrigen Theilen; wiewohl am Nacken, oder am Hinterkopf gar kein Federbusch ist.

Diese wurde aus Cayenne gebracht.

Ess 2

8. Der

d) Latham Ind. orn. II. p. 884. n 7. B.

e) Uebers. II. S. 540. Nr. 425. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 850. Nr. 14. B.

f) Arct. Zool.

g) Latham Ind. orn. II. p. 884. β. Dunkels braun mit braunlichweiß; die obere Kinnlade an der Wurzel abgerundet. γ. Am Unterrücken schwarz und dunkelweiß gestreift. B.

8. Der raushschnäblige Pelikan. (Rough-billed P.)

Pelecanus erythrorhynchos. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 571. No. 15. *b)*
Br. Mus. Lev. Mus.]

An Größe hält er zwischen einer Gans und einem Schwan die Mitte, und ist vier Fuß, sechs Zoll lang. Sein Schnabel ist dreizehn Zoll lang, wie bey andern Pelikanen gebaut, nebst einigen sonderbaren Erhabenheiten auf dem Rücken der obern Kinnlade, von deren Wurzel an, über sieben Zoll breitt, die Oberfläche glatt ist, wie bey andern Arten; hier aber beginnt eine erhabene Schneide (ridge), ohngefähr anderthalb Zoll hoch, und einen Drittel Zoll dick; diese läuft ohngefähr anderthalb Zoll lang am Schnabel fort, und dann kommen andere, kleinere, zum Vorschein, von verschiedener Größe, und werden auf eine abgebrochene Art immer kleiner, bis zum Endel des Schnabels; die Farbe des Schnabels und seine Schneide ist röthlichgelb, hier und da mehr ins Rothe ziehend; die untere Kinnlade und der Sack sind wie bey andern Arten; zu beyden Seiten aber, ohngefähr in der Mitte jener, ist ein schwarzer Fleck, von der Größe eines Silberpfennigs, und der Sack ist mit artigen, schwarzen Strichen gestreift, die am vordern Theil desselben sehr zahlreich, am häufigsten aber zunächst am Ende des Schnabels sind; das Gefieder ist über und über rein weiß, die großen Schwungfedern ausgenommen, die schwarz sind; die Federn am Hinterkopf sind sehr lang, und bilden einen fünft-halb Zoll langen Federbusch; die Füße sind schwarz.

Diese Art (denn ich halte sie für eine eigene Art) ist 'in einigen Gegenden Amerikas' zu Hause. Ich habe nur drey Exemplare gesehen, wovon zwey aus Hudsons-Bay gekommen sind, und das dritte aus Newyork. Herr Pennant aber sagt, sie sey ihm auch aus Südcarolina geschickt worden. Das vollständigste Exemplar ist im Leverschen Museum. Bey dem meinigen ist der erhabene Theil des Schnabels an vielen Stellen beschädigt, aber doch hinreichend, um den ursprünglichen Zustand anzudeuten. Bey einem dritten, im Brittischen Museum, ist der erhabene Theil auf einen bloßen Büschel von Fasern zurückgebracht, das Uebrige ist abgestoßen; woraus ich schliesse, die Natur habe diese hinzugekommene Erhabenheit zur Vertheidigung des Vogels bestimmt; und da sie eine eben so harte Textur hat, als der übrige Schnabel, so sind nur wiederholte und starke Schläge oder Stöße im Stande gewesen, die Brüche, die sich an meinem Exemplar befinden, besonders aber die gänzliche Zerstörung der Form, zu verursachen, die man an jenem im Brittischen Museum sieht.

9. Der gemeine Fregat-Vogel. (Frigate P.)

Pelecanus Aquilus. LIN. XIII. p. 216. No. 2. Ed. XIII. I. 2. p. 572. No. 2. *i)*
Le Fregate. BRISS. orn. VI. p. 506. No. 6. pl. 43. fig. 2. A. — BUFF. ois VIII.
p. 381. — PERNETTY Voy. vol I. p. 125. — Hist. Louis. vol. II. p. 48.
La grande Fregate de Cayenne. Pl. enlum. 961.
Fregata Avis. RAN Syn. p. 153.

Rabi-

b) Latham Ind. orn. II. p. 884. n. 8. Phil. Transact. LXII. p. 419. n. 54. *dorfs Zool. Beytr.* II. S. 850. Nr. 15. *B.*
i) Latham Ind. orn. II. p. 885. n. 10. *B.*

Rabihorcado. RAN I. c. p. 192 No. 15. — WILL. orn. p. 395. pl. 77. — VILLOA's Voy. vol. II. p. 304.

Man of War Birds. BROWN Jam. p. 483. — Voy. vol. I. p. 49. pl. in vol. III. part. 2. p. 99.

Frigate Bird. ALBIN Nat. Hist. vol. III. pl. 80. — Gen. of Birds p. 67. pl. 16. Lev. Mus. k)

Er hat, am Körper, die Größe eines großen Huhns, ist drey Fuß lang, und vierzehn Fuß breit. Der Schnabel ist dünne, fünf Zoll lang und an der Spitze stark gebogen; von dunkler Farbe; von der Wurzel an erstreckt sich eine dunkelgefärbte Haut nach beyden Seiten des Kopfs hin, und schließt die Augen mit ein; von der untern Kinnlade hängt ein großer, häutiger Sack herab, der eine Strecke lang an die Kehle befestigt ist, wie bey'm Pelikan, und ist zu dem nämlichen Gebrauch bestimmt; die Farbe desselben ist schön dunkelroth, und an den Seiten ist er mit wenigen, zerstreuten Federn besetzt; das ganze Gefieder ist bräunlichschwarz, die Deckfedern der Flügel ausgenommen, die einen gelbrothen Anstrich haben; der Schwanz ist lang und stark gabelförmig; seine äussern Federn sind achtzehn Zoll lang, oder auch wohl noch länger; die mittlern, sieben bis acht; die Füße sind klein, alle Zehen miteinander verbunden, und die Häute tief gezähnt, ihre Farbe ist dunkelroth.

Das Weibchen unterscheidet sich durch den Mangel des häutigen Sacks unter dem Kinn, und durch einen weißen Bauch; ausserdem ist es dem Männchen sehr ähnlich.

Der Fregat, oder Orlogschiffs-Vogel (Man of War Bird) ^{l)}, wie ihn Einige nennen, wird hauptsächlich, wo nicht einzig zwischen den Wendezirkeln angetroffen, und zwar beständig außer der See, weil man ihn nicht anders, als im Flug sieht ^{m)}. Andere Vögel pflegen, wenn sie vom Fliegen ermüdet sind, auf der Oberfläche der See auszuruhen. Diesem Vogel aber hat die Natur, wegen der außerordentlichen Länge der Flügel, womit sie ihn versehen, das Erheben vom Wasser gänzlich unmöglich gemacht; dieß lehren uns nicht nur die Schriftsteller, sondern alle, mit denen ich noch hierüber gesprochen habe, versichern mir das Nämliche; wiewohl es vielleicht kein Fehler der Natur ist, weil der Vogel eben nicht viel Ruhe zu bedürfen scheint; wenigstens scheint er wegen der Länge seiner Flügel, und wegen seiner scheinbar leichten Bewegung (fast wie bey der Wephe), einen sehr langen Flug ausdauern zu können; denn man sieht sie oft über hundert ⁿ⁾, und nicht selten über zwey hundert Meilen vom Lande enfernt ^{o)}. Inzwischen hat man doch in Erfahrung gebracht, daß er sich auf den Schiffsmasten niederläßt; dieß geschieht aber nicht oft, wiewohl er sich oft den Schiffen nähert,

SSS 3

und

k) Seltgmanns Vögel VIII. Taf. 99. Melane N. S. Deutschlands III. S. 756. Nr. 4. Forsters Reise I. S. 49. 257. Bonnors Zool. Beitr. II. S. 850 Nr. 2. B.

l) Von den Franzosen wird er auch Schneiz der (Tailleur oder Taylor) genannt, wegen der Bewegung seines Schwanzes, der eine offene Scheere vorstellt; und wenn er fliegt, so öffnet und bewegt er seinen Schwanz häufig auf

die Art, wie man sich dieses Instruments bedient. Ulloa's Voy. vol. II. p. 304.

m) Im Jahr 1792 wurde im Winter einer auf der Weser bey Hanoversch. Winden geschossen. V.

n) Forst. Voy. vol. I. p. 47. und Observ. p. 211.

o) Hist Barbado. p. 56. — Bis auf vierhundert. Pernetty.

und um die Topmast • Flagge herumflattert ²⁾. Zuweilen schwebt er so hoch in der Luft, daß man ihn kaum sieht, da er hingegen ein andermal sich der Oberfläche des Wassers nähert, wo er, indem er in einiger Entfernung herumflattert, in dem Augenblick, wo er einen Fisch aus-
spähet, mit der größten Schnelligkeit auf ihn herabschleßt, und selten verfehlt er seinen Zweck; hierauf steigt er eben so schnell wieder hinauf, als er herabgestoßen ist ³⁾. Man hat ihn auch Meven, und andere Vögel, die keinen Fisch gefangen haben, anfallen gesehen, die er dann zwingt, ihn fallen zu lassen, und Sorge trägt, ihn zu erhaschen, ehe er ins Wasser fällt. Er ist ein Feind der fliegenden Fische; denn wenn diese unter dem Wasser von dem Delphin, und andern gefräßigen Fischen angegriffen werden, so hüpfen sie, um den Nachen derselben zu entgehen, haufenweise aus dem Wasser, und bedienen sich ihrer langen Flossen als Flügel, um sich in die Luft zu erheben, das sie, so lange sie naß sind, thun können; sobald sie aber trocken werden, so sind sie zum Flug untüchtig, und fallen wieder in das ihnen angemessene Element; während ihres Fluges schießt dann die Fregatte in dieses Geschwader, und erhascht wenigstens Einen oder ein Paar. Dieser Vogel kennt, aus dem Blasenwerfen des Wassers, genau die Stelle, wo die Fische heraufkommen, und dieß leitet ihn dann dahin ⁴⁾; hierin wird er von den Meven und andern Vögeln begleitet, die in Gesellschaft mit ihm agiren.

Ob schon diese Vögel allenthalben, innerhalb der Wendekreise, nicht selten sind, so sind sie es an einigen Orten mehr, als an andern. Cook hat sie im 30sten Grad gesehen. In der alten Reiseroute der Weltumsegler wird ihrer häufig gedacht, sie haben sie auf den Inseln Ascension, Ceylon, in Ostindien und China ⁵⁾ angetroffen. Dampier sah sie in größter Menge auf der Insel Aves, in Westindien. Unfre letzten Weltumsegler berichten von ihnen, daß sie sich an verschiedenen Orten in der Südsee, um die Marquesas, die östlichen Inseln, und Neukaledonien ⁶⁾, so wie auf Otahite, vorfinden, wiewohl an letztem Orte in nicht so großer Menge, als an vielen andern. Sie sollen ihre Nester auf Bäume machen, wenn deren in einiger Entfernung vorhanden sind, ausserdem auf die Felsen ⁷⁾. Sie legen Ein bis zwey fleischfarbene, mit karmoisinrothen Flecken bezeichnete, Eier. Die jungen Vögel sind mit graulichweißem Pflaum bedeckt; die Füße sind von eben dieser Farbe; und der Schnabel weiß.

10. Der kleine Fregat. Vogel. (Letter Fr. P.)

Pelecanus minor. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 572. No. 16. x)

La petite Fregate. BRISS. orn. VI. p. 509. No. 7. — BUFF. ois. VIII. pl. 30.

Man of War Bird. EDW. Nat. Hist. pl. 309. y)

Dieser

p) Cook's last Voy. vol. 1. p. 81.

q) Dampier. Er bemerkt, die Fregatte nehme ihren Raub nicht in den Schnabel.

r) Hist. Barbadoes. I. c.

s) Osbeck hält sie für Eine von den Arten von Vögeln, deren sich die Chineser zum Fischen bedienen.

z) FORST. Voy. vol. I. p. 588. vol. II. p. 433.

u) Dampier. Man weiß daß sie in Menge auf einer kleinen, an Guadalupe gränzenden, Insel brüten. Hist. Ois. note (s).

x) Latham Ind. orn. II. p. 885. n. 11. B.

y) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 851. Nr. 16. B.

Dieser ist kleiner als der vorige, und hält nur zwey Fuß, neun Zoll in der Länge; die Breite, von Einem Flügel zum andern, ist sechsthalf Fuß. Der Schnabel ist fünf Zoll lang, und roth; die Wurzel desselben, und die kahlen Augenkreise, sind eben so; die Nasenlöcher ziemlich sichtbar, und nahe an der Wurzel; die Form des Schnabels wie bey der größern Art; der Kopf, der Hinterhals, und die obern Theile des Körpers und der Flügel sind rostigrothbraun; die Kehle, der Vorderhals und die Brust weiß; der Schwanz stark gabelförmig, wie bey der vorigen; die Füße schmutziggelb.

In meiner Sammlung ist ein, diesem sehr ähnlicher Vogel, wenn es nicht derselbe ist. Die Hauptfarbe des Gefieders ist ein tiefes Schwarz; Brust und Bauch sind aschfarben gesprenkelt; der innere Flügelrand ist eben so; der Schnabel hat die lange Furche, die man bey der größern gewahr wird, aber die Nasenlöcher sind hinlänglich sichtbar, da sie ohngefähr einen halben Zoll lang, und da, wo sie an die Wurzel des Schnabels anstoßen, noch etwas breiter sind. Dieser Vogel hat einen großen, rothen Sack am Kinn und an der Kehle, wie die vorige Art. Wahrscheinlich ist der meinige das Männchen, da andere, die vermuthlich entgegengegesetzten Geschlechts sind, wenig oder gar keine Spur von einem Kehlsacke haben ²⁾. Nach einiger Vermuthung, sind der große und kleine Fregat-Vogel Ein und ebenderfelbe Vogel, in verschiedenen Perioden des Alters.

II. Der weißköpfige Fregat-Vogel. (White-headed Fr. P)

Pelecanus leucocephalos. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 572. No. 17. a)

Er hat die Größe einer großen Ente, und ist beynabe drey Fuß lang. Der Schnabel ist fünf Zoll lang, und dunkelbraun, die Spitze ausgenommen, die sehr blaß, beynabe weiß ist, beyde Kinnladen sind gekrümmet; die Seiten des Kopfs sind mit Federn bedeckt; Kopf und Vorderhals weiß, und dieß endigt sich an letzterem in eine Spitze; Brust und Bauch sind auch weiß; ausserdem ist das übrige Gefieder braun; der Schwanz gabelförmig; die Füße röthlichbraun.

Diese Art befindet sich im Hünterschen Museum. Eben daselbst bemerkte ich noch Eine, ihr sehr ähnliche, bey der der Kopf und der halbe Hals ringsherum weiß ist, und dieß läuft am Vorderhals bis zur Brust herab, und endigt sich zwischen den Beinen; die Seiten des Körpers und der Hinterhals sind braun; und dieß ist, wie bey den andern, die Hauptfarbe des übrigen Gefieders; die Füße sind röthlichbraun; die mittlern Zehen sägeförmig eingeschnitten; keine von beyden war an den Seiten des Kopfs unbefiedert oder hatte irgend eine Spur von einem Sack an der untern Kinnlade. Von obiger nicht sehr verschieden, ist Eine, deren Osbeck erwähnt ^{b)}. Bey dieser ist die Wachshaut an der Wurzel des Schnabels (wie er sagt) blau, und

2) Diese Vermuthung wird durch ein Paar im Hünterschen Museum bestätigt die beyde ein ganz schwarzes Gefieder haben; die Eine hat einen großen Sack, die Andere keinen. L. — In Ind. orn. l. c. wird dieß für gewiß angenommen. B.

a) Latham Ind. orn. II. p. 886. n. 12. La Fregatte. Buff VIII. n. 30. Osb Voy. II. p. 87. Bonndorfs Zool. Beytr. III. S. 851. Nr. 17. B.

b) Voy. vol. II. p. 87. — Amoen. Acad. vol. IV. p. 238. No. 7.

und erstreckt sich bis an die Augen; die Schläfe, oder die Seiten des Kopfs, sind nackt; die Zunge groß, am obern Theil (top) fast dreyspaltig; der Winkel am untern (bottom) auch gespalten; Kopf, Vorderhals, Brust und Bauch weiß; die Hauptfarbe des übrigen Gefieders schwarz; der Schwanz gabelförmig und erinnert an eine Scheere; die Füße schwarz.

Diese Art traf Osbeck auf Isle d'Ascension an, wo sie sehr zahm ist, und sich vor Niemand zu fürchten scheint. Er glaubt, sie sey nicht im Stande für sich selbst Fische zu fangen, weil er bemerkt hat, daß sie so lange lauert, bis ein anderer Vogel welche gefangen hat, den sie dann unmittelbar verfolgt, und den glücklichen Räuber zwingt, seine Beute fahren zu lassen, indem er sie durch den Schnabel, womit er den Fisch gefangen hat, wieder zurück glebt, worauf dann die fernere Verfolgung ein Ende hat.

12 Der Fregat-Vogel von Palmerston. (Palmerston Fr. P.)

Pelecanus Palmerstoni. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 573. No. 18. c)

Seine Länge ist drey Fuß, zwey Zoll. Der Schnabel ist sechshalb Zoll lang, und am Ende gekrümmt, wie bey dem Cormoran (Nr. 13), von Farbe schwarz; die Augenkreise gut mit Federn bedeckt; der obere Theil des Kopfs, des Halses und des Körpers ist braun, mit einem grünlichen Glanze; die zunächst am Körper stehenden Deckfedern der Flügel dunkelglänzend grün; der Vorderhals braun und weiß gesprenkelt; die übrigen untern Theile weiß; der After schwarz; der Schwanz gabelförmig; die Schäfte alle weiß; die Füße dunkelschwarz; die mittlere Klaue an der innern Seite sägeartig eingeschnitten.

Sie ist auf der Insel Palmerston, in der Südsee, zu Hause, und befindet sich in Herrn Joseph Banks Sammlung.

13. Der Cormoran. (Cormorant).^{a)}

Pelecanus Carbo. LIN. XII. I. p. 216. 3. XIII. I. 2. p. 573. No. 3. d) — FAUN.

Suec. No. 145. — SCOP. ann. I. No. 98. e) — BRÜNN. orn. No. 120. 122.

— MÜLLER Zool. No. 146. 148. — GEORGI Reise p. 169. — FRISCH av. tab. 187. — NOV. Comment. Acad. Petrop. vol. IV. p. 423. — FANN. Groenl. No. 57. — SEPP. Vog. pl. in p.

Le Cormoran. BRISS. orn. VI. p. 511. No. 1. pl. 45. — BLÜFF. ois. VIII. p. 310. pl. 26. — PL. enlum. 927.

Cormorant. RAM Syn. p. 122. A. 3. — WILL. orn. p. 329. pl. 63. — ALBIN Nat. Hist. vol. II. pl. 81. — BR. Zool. II. No. 291. — ARCT. Zool. No. 509. f)

Lev. Mus. g)

Er

a) Latham Ind. orn. II. p. 886. n. 13. B.

d) Latham Ind. orn. II. p. 886. n. 13. B.

e) Uebers. v. Gänther I. S. 84. Nr. 98. B.

f) Uebers. II. S. 546. Nr. 420. B.

g) Schriften der Berl. Naturf. Gesellsch. VII. S.

Er hat die Größe einer Gans, ist aber schlanker, bis auf dreß Fuß hoch, oder noch höher, vier Fuß, zwey Zoll lang und sieben Pfund schwer. Sein Schnabel ist dunkelbraun, vierthalb Zoll lang; die obere Kinnlade am Ende gekrümmt, und nach der Länge läuft von der Wurzel an über eine große Strecke eine Furche, aber es sind keine Nasenlöcher sichtbar; die untere Kinnlade ist mit einer Art von gelblichgrüner Wachshaut bedeckt, die sich bis unter das Kinn und die Kehle hin erstreckt, wo sie eine Art von Sack bildet, und von da an läuft sie nach hinten und um die Augen herum; der Augenstern ist grün; der Scheitel, und ein Theil des Halses, schwarz, mit perpendikulär laufenden, weißen Streifen gesprenkelt; am hintern Theil sind die Federn länger, als vornen, und bilden einen kurzen Busch; die Kehle ist weiß, und dieß läuft aufwärts und hinter die Augen; der untere Theil des Halses, die Brust und alle untern Theile sind grünlichschwarz; über den Schenkeln ist ein großer, weißer Flecken; der Rücken, die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel sind bräunlich, das in verschiedenen Richtungen purpurfärbig und grün schillert; jede Feder ist schwarz gerändert; die kürzern Schwungfedern sind fast eben so, wie die Deckfedern; die großen dunkelschwarz; der Schwanz ist eben so, stark abgerundet, und besteht aus vierzehn Federn; die Füße sind schwarz.

In der Britischen Zoologie finde ich die Bemerkung, daß das Kinn bey dem Männchen schwarz sey, und daß dieses Geschlecht auch einen kurzen, fliegenden, herabhängenden Federbusch am Hinterkopf habe, mit einem großen, weißen Flecken über den Schenkeln; dieß ist aber vielleicht nicht charakteristisch, weil mir versichert worden ist, daß ein Exemplar mit allen erstbenannten Zeichen, bey der Zergliederung als ein Weibchen befunden worden ^{b)}). Könnte man daher nicht mit größerem Rechte schließen, daß obige Unterscheidungs-Kennzeichen Vögeln in ihren höchsten Lebensstufen zugehörten, und die verschiedenen andern Abweichungen im Gefieder von dem frühern Alter herrührten? Ich habe viele sogenannte Cormorans untersucht, aber keine hatten das Weiße über den Schenkeln, als die mit gestreiften Köpfen; von den andern hatten die meisten mehr oder weniger Weißes unter dem Kinn und an den Seiten des Kopfs, unter den Augen; viele hatten einiges Weiße an der Brust und am Bauch, ja der letzte war sogar ganz weiß, wiewohl bey andern die untern Theile durchaus schwarz waren; und bey Einem Exemplar, im Leverschen Museum, hatte die Mitte des Hinterkopfs und Nackens eine schmale Reihe von langen Federn, die die Stelle eines Federbusches vertraten ^{c)}).

Diese

400. Nr. 22. Meine N. G. Deutschlands II. S. 756. Nr. 2. Cetti N. G. v. Sardinien II. S. 342. Pallas Reise Auszug II. S. 7. Dessen nord. Beytr. III. S. 13. IV. S. 7. 20. Plassens Reise nach Island I. S. 34. 257. Lepechin Russ. Tageb. I. S. 307. Pontoppidans N. G. v. Dänemark S. 169. Nr. 1. von Norwegen. 181. Allgem. Reise V. S. 260. Bonnors Zool. Beytr. II. S. 852. Nr. 3. B.

b) Herr Linné.

c) Latham Ind. orn. I. c. β wird als Bartetät aufgeführt:

Der Cormoran mit abgerundetem Schwanz, schwarzem Körper und glattem Kopf; Schnabel und Sackkehle weiß, wie am vorhergehenden; Kopf und ganzer Hals glatt, schwarz, ohne weiße Streifen; die Kehle weiß; an den Schenkeln keine Flecken. D.

Diese Art findet sich in England und in vielen Gegenden der alten Welt; an den Küsten des Caspischen Meeres sieht man sie zuweilen in unzähligen Flügen; sie ist häufig am See Baikal, wird als ein Bewohner des Caps angegeben, ist gemein in China, auf den Philippinen, in Neuhollland, Neuseeland und andern Ländern ^{k)}. Sie findet sich in vielen Gegenden des festen Landes von Amerika, denn man hat sie auf Hudsons-Bay, Neuport, und von da bis nach Carolina herab angetroffen; im letztern Lande sieht man sie, besonders im März und April, wenn die Heeringe die kleinen Buchten hinauf ziehen, wo man diese Vögel auf Baumstämmen, die ins Wasser gefallen sind, sitzen sehen kann, indem sie das Vorüberziehen der Fische ablauren ^{l)}. Unfre letzten Reisenden haben sie auch am Kotka-Sund angetroffen ^{m)}.

Der Cormoran, oder ein Vogel, den man so genannt hat, soll von den Chinesern häufig zum Fischen gebraucht werden ⁿ⁾; verschiedene Fischer halten sich Einige zu diesem Endzweck, und erwerben sich ein hübsches Vermögen damit; man kann dieß, wie man mir sagt, noch jetzt sehen, wenn man nach China kommt. Ein Ring um den Hals des Vogels, hindert das Hinunterschlingen; sein natürlicher Instinkt vereinigt sich mit dem Willen seines Herrn, und er taucht augenblicklich auf das Commando-Wort unter, und, unfähig den Fisch, den er gefangen hat, hinunter zu schlingen, kommt er zu seinem Herrn zurück, der ihn denselben für sich abnimmt. Zuweilen, wenn der Fisch zu groß ist, als daß ihn Einer bezwingen könnte, vereinigen sich ihrer zwey, der Eine hält ihn beym Kopf, und der Andere beym Schwanz.

Das Abrichten der Cormorane zum Fischen, war, wie man mir sagt, ehemals auch in England gewöhnlich, man legte ihnen nämlich, statt des Rings, einen ledernen Klemen um den Hals, und hielt sie mit gehöriger Sorgfalt im Hause, wie man es mit den Falken zu halten pflegt. Ich glaube aber nicht, daß die Ausführung dieser Methode jemals sehr gemein bey uns gewesen ist, weil die Schriftsteller nicht allgemein davon sprechen, wie sie doch hätten thun müssen, wenn sie häufig in Gebrauch gewesen wäre. Willughby, der diesen Umstand erwähnt, führt

k) In Deutschland sieht man sie nur selten.
B.

l) Arct. Zool. — Lawson Carol.

m) „Il ressemble assez un Corbeau, mais le cou est fort long, et le bec long, crochu et pointu: c'est une espece de Cormorans, qu'ils dressent à la peche du poisson, à peu près comme on dresse les chiens à prendre des lievres.“
v. HALDE Chin. Vol II. p. 142. pl. in p. 162. — Die Abbildungen des Vogels auf der Platte sind nicht gut ausgedrückt. Sie scheinen aber doch eher einen Cormoran, als irgend einen andern Vogel vorzustellen. Osbeck (Voy. vol. II. p. 35) sagt, die Chineser nannten ihn Lou, soo. Nach seiner Meinung, hat er

im Kupferstich sehr das Ansehen des Fregat-Vogels; er konnte aber, trotz der angewandten Mühe, den Vogel nicht selbst bekommen; auch bemerkt er, dieß sey die Methode zu fischen, deren man sich in Macao bedient, und sie sey sehr einträglich. Der Fischer bezahlt eine gewisse Summe Geldes, als einen jährlichen Tribut.

n) „Wenn man an die Flüsse kommt, so nimmt man den Vögeln die Kappen (hoods) ab, sie haben lederne Klemen um den untern Theil des Halses, damit sie die Fische, die sie fangen, nicht verschlingen können, und so wirft man sie ins Wasser. Sie tauchen sogleich unter, und verfolgen den Fisch, mit bewundernswürdiger

führt am Rande seinen Gewährsmann, nämlich Faber's Anmerkungen zu Recchus's Thieren, an; bey Untersuchung der citirten Stelle aber ^{o)}, findet man weiter nichts, als daß einige Cormorans, die zum Fischen abgerichtet waren, nebst einem Geyer, als Geschenke von England an den König von Frankreich geschickt worden sind, daß ihnen die Augen verbunden waren, bis man sie zum Fischen losließ, wie die Falken, und daß sie sehr geschickte Forellen aus den Flüssen heraus holten. Inzwischen ist, sowohl aus obiger Stelle, als aus der Britischen Zoologie ^{p)}, offenbar, daß man sich ihrer hin und wieder bedient hat. Swammerdem ^{q)} erwähnt gleichfalls eines Umstandes, der zu beweisen scheint, daß diese Vögel nicht in England abgerichtet, sondern aus andern Orten hergebracht worden sind, und erzählt die Art, mit ihnen zu fischen, so ziemlich auf einerley Weise mit der oben von mir angeführten Nachricht.

Der Cormoran ist ziemlich gemein bey uns, mehr aber im Norden des Reiches; er ist auch auf dem festen Lande sehr häufig an allen nordischen Küsten, bis nach Kamtschatka ^{r)}; in Grönland bleibt er das ganze Jahr hindurch, und bauet auf die Gipfel der Klippen, und legt drey bis vier hellgrüne Eyer, von der Größe der Gänse-Eyer, die aber so stinkend und ekelhaft sind, daß sie kaum die Grönländer essen mögen. Man sieht ihn oft in ganzen Flügen auf den unzugänglichen Stellen der Felsen. Er ist im Ganzen ein sehr vorsichtiger Vogel, wiewohl zu Zeiten unfähig dumm oder unbedachtsam; denn nach einer reichlichen Ueberladung mit Fischen, oder im Schlaf, läßt er ein Netz über sich ziehen, oder sich eine Schlinge um den Hals werfen, so daß man ihn leicht fangen kann. Vor ohngesähr fünf und zwanzig Jahren saß ein solcher Vogel auf dem Schloß zu Carlsisle und flog bald hernach auf die Domkirche (cathedral), wo zwanzigmal ohne Erfolg nach ihm geschossen wurde; endlich gieng Jemand auf die Domkirche, schoß auf ihn, und erlegte ihm. Ein andermal saß ein Flug von funfzehn oder zwanzigen, in der Abenddämmerung, auf einen Baum an den Ufern des Flusses

Ttt 2

Esf

„würdiger Geschwindigkeit, eine lange Zeit;
 „wenn sie ihn dann erhascht haben, so steigen
 „sie unmittelbar wieder auf die Oberfläche des
 „Wassers herauf, drücken den Fisch gelinde mit
 „den Schnabel, schlucken ihn hinter, bis jeder
 „Vogel auf diese Art fünf oder sechs Fische verschlungen hat; dann locken sie ihre Wärter auf
 „die Hand, auf die sie gern fliegen, und ein Vogel nach dem andern glebt nach und nach alle
 „seine Fische wieder von sich, die durch das
 „Kneipen mit den Schnäbeln ein wenig verwundet sind. Wenn das Fischen vorüber ist, so
 „setzt man die Vögel auf irgend eine erhabene
 „Stelle, läßt den Riemen um ihren Hals auf,
 „wodurch die Passage in den Magen frey und
 „offen wird, und glebt ihnen zur Belohnung
 „einen Theil der Beute, die sie gemacht haben,
 „auf jeden Einen oder zwey Fische, die sie, wenn
 „sie in die Luft geworfen werden, äußerst ge-

„schickt mit den Schnäbeln auffangen.“ WILL.
 orn. p. 329.

o) C. Hernand Mex p. 693.

p) Whittlock erzählt uns. „er habe eine Art
 „derselben, wie Habichte abgerichtet, die ihm
 „auf die Hand flogen. Er machte sich viel Vergnügen mit ihnen, und sagt der beste, den er
 „gehabt, wäre ihm von Herrn W. d. C. m. o.
 „ranmeister Karls I. geschenkt worden.“
 Br. Zool. vol. II. p. 610.

q) Bibl. Nat. Englische Uebers. P. I. p. 193.

r) An den Ufern des Don's, und der an Rußland gränzenden See sind sie sehr gemein, und bauen auf Bäume fünf bis sechs Nester neben einander auf einen Baum; die Nester sind groß und bestehen aus Reisig und Wurzeln Decouv. Russ. vol. I p. 164 — Sie machen auch zuweilen bey uns ihre Nester auf Bäume, in Gesellschaft der Reiher.

Esß bey Netherby, dem Landfische des Herrn Jakob Graham. Jemand, der sie sitzen sah, schoß in der Dunkelheit auf Gerathewohl sechs oder siebenmal nach ihnen, ohne einen zu erlegen, oder sie wegzuschrecken; hierdurch betroffen, kam er bey Tage wieder, erlegte Einen von ihnen, wo dann die andern davon flogen ¹⁾. Er hält sich, des Fisches wegen, mehrentheils in der Nähe der See auf, und erhascht seine Beute im Untertauchen nach ihr; zuweilen hat man bemerkt, daß er den Fisch mit seinen Klauen aus dem Schnabel herausnimmt, um sich das Fliegen zu erleichtern. Seine Haut ist sehr zähe, und wird von den Grönländern zu Kleidern gebraucht; zuweilen essen sie auch sein Fleisch, und die Haut unter den Rinnladen dient ihnen, so wie die von andern Vögeln dieser Gattung, zu Blasen, um damit ihre kleinere Fischeerpfeile über dem Wasser zu erhalten.

Es ²⁾ ist schwer, den Cormoran das Wasser herauf zu locken, besonders wenn er verfolgt wird, und oft untertauchen muß, weil seine Federn viele Feuchtigkeit einsaugen; deswegen bemerkt man, daß er, wenn er aus dem Wasser kommt, seine Flügel so weit, als möglich ausspannt und damit flattert, um die Federn desto eher abzutrocknen. Herr Jackson hat mir die Bemerkung mitgetheilt, daß er, als er Einmal unter dem Neste eines Cormorans, der auf die Felsen gebaut hatte, ein großes Geräusch gemacht, drey Junge herausgeschreckt habe, die noch nicht flück genug waren, um zu fliegen, und daher ins Wasser fielen, aber unmittelbar darin umherschwammen, und ohne die geringste Schwierigkeit untertauchten, als wenn sie dieses Element schon gewohnt wären. — Beyde, sowohl der Cormoran, als der Wasserrabe (Nr. 14), werden um Sandwich, Rohlgans (Cole-Goose) genannt ³⁾.

14. Der gemeine Wasserrabe. (Common Shey).

Pelecanus Graculus. LIN. XII. I. p. 217. 4. Ed. XIII. I. 2. p. 374. No. 4. *) —

Faun. Sueg. No. 146. — BRÜNN. orn. 121. — MÜLLER Zool. No. 147.

Le petit Cormoran. BAISS. orn. 81. p. 516. No. 2.

— — — , ou le Nigaud. BUFF. ois. VIII. p. 319.

Shagge, or Crane. RAI Syn. p. 123. A. 4. — WILL. orn. p. 330. pl. 63.

The Shag. Arct. Zool. No. 508. y).

Lev. Mus. z)

Seine Länge ist zwey Fuß, sechs Zoll; seine Breite drey Fuß, acht Zoll; und sein Gewicht vier Pfund. Kopf und Hals sind schwarz mit grünem Glanz, wie Seide; der Rücken und die Deckfedern der Flügel eben so, mit purpurschwarzen Rändern; der Bauch dunkelbraun, und ohne Glanz, die Mitte desselben aschgrau; der Schwanz besteht aus zwölf Federn, und ist von

1) Dr. Hensham.

2) Zus. a. d. Suppl. S. 279.

3) Herr Voss.

*) Latham Ind. orn. II. p. 887. n. 15. S.

γ) Ueberf. II. S. 540. Nr. 426. S.

z) Pontoppidan's Danemark. S. 169. Nr. 2.

Neue Schwedische Abh. III. S. 104. Per-

rault 10. Abh. aus N. S. I. S. 247. Taf.

32. Geflügelerde. Taf. 33. Meine N. S.

Deutschlands II. S. 761. Nr. 3. Don-

dorf's Zool. Beytr. II. S. 855. Nr. 4. S.

von dunkelbrauner Farbe mit grünem Glanz; die Füße sind schwarz; die mittlere Klaue ist sägenartig eingeschnitten.

Die Wasserraben besuchen verschiedene Gegenden von Großbritannien und Irland; auch Schweden, Norwegen und Island, und sie sollen auf Bäume nisten, wie die Cormorans; dies hat man besonders in dem Walde von Seven Huis, bey Leiden, in Holland, bemerkt, so lange als die Bäume daselbst standen ^{a)}. Ihre Eyer sind lang und weiß ^{b)}. Es sollen sehr dumme Vögel seyn, wenn sie sich an der Küste aufhalten, aber schwer zu schließen, wenn sie im Wasser sind. Sie schwimmen mit erhabenen Kopf, den Körper fast ganz ins Wasser gesenkt, und wenn eine Büchse auf sie losgeschossen wird, so tauchen sie, in dem Augenblick, wo sie die Flamme sehen, ins Wasser.

In der Beschreibung des Wasserraben von Willughby und Brisson, wird das Kinn weiß, und die untern Theile mehr oder weniger ins Aschfarbene ziehend, angegeben. Linne' bemerkt, die Wasserraben kämen in allen Stücken mit den Cormorans überein, außer daß sie kleiner sind; auch sagt er, die ganze untere Fläche, vom Kinn bis zu den Schenkeln, sey mit muschelfarbig weißen Flecken bezeichnet; ferner nimmt er als wahrscheinlich an, daß dieser Vogel ein junger Cormoran seyn möchte ^{c)}. Ich glaube inzwischen, daß der Cormoran und der Wasserrabe verschiedene Vögel seyen, und ganz und gar nicht zu einander gehören; ja in der That, daß der erste vierzehn Federn im Schwanz hat, und der andere nur zwölf, scheint die Sache außer allen Streit zu setzen, wenn es auch keine andere Umstände bewiesen. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß die Verschiedenheit in den Beschreibungen der oben genannten Schriftsteller davon herrühre, daß sie dieselben von den jüngern Cormorans genommen haben, die außerordentlich variiren.

Z u s ä t z e.

Im Ind. orn. I. c. werden noch folgende zwey Varletäten beygefügt:

Var. A. Der Capische Wasserrabe.

Ich füge die Beschreibung nach dem Mus. Carls. III. 61. (*Pelecanus capensis*) bey.

Er ist zwey Fuß lang; der Schnabel ungezähnelst und rosenfarbig; der Kehlsack gelb; Kopf und Hals sind schwarzbraun; die Brust aschgrau schwarzbraun; der Bauch, die Hüften, der

Tit 3

a) Book of Nature p. I. p. 193.

b) Ray. Willughby.

c) Linne' trennt die Gattung Pelikan in zwey Abtheilungen; die Eine mit gezähnelten, die andere mit glatten Kinnladen; Rayn;

bern; freigerweise aber fängt diese Abtheilung schon vor seinem Graculus oder Wasserraben an, da sie erst nach der Beschreibung dieses Vogels, oder vor seinem P. Passanus stehen sollte. Syst. Nat. Ed. XII. Tom. I. p. 217.

der After, der Unterrücken und Steiß seidenartig bläulichschwarz; die Schulterfedern und Deckfedern der Flügel seidenartiggrün mit schwarzen Rändern; die Schwungfedern grünlichbraunfarben mit schwarzen Schäften; die vierzehigen Füße schwarz, an der zweiten Zehe mit einem schwarzen Nagel; der keilförmige Schwanz hat zwölf Federn und ist schwarz.

Seine Heymach ist der falsche Bay des Vorgebüres der guten Hoffnung. Die gelbe Kehle unterscheidet ihn vorzüglich von dem gemeinen Wasserraben (*Pelecanus Graculus*, L.)

Var. B. *Le petit Fou brun*. BUFFON VIII. p. 374.

Fou brun de Cayenne. Planch. enlum. 974. (Diese beyden Synonymen sind in Gmelin. Linneischen Natursystem bey *Pelecanus Fiber* (unten Nr. 28.) angeführt.)

Der Leib ist schwärzlich, unten dunkelbraun; oben die Federn mit schwarzen Rändern; der Schnabel bloß an der Spitze haakenförmig; die Füße schwärzlich; die Länge sechs und zwanzig Zoll.

Bewohnt Cayenne und die Carraibischen Inseln. B.

15. Der gehäubte Wasserrabe. (Crested Sh.)

Pelecanus cristatus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 575. No. 21. d) — FAUN. GROENL. No. 58. — BÄRNN. ORN. No. 123

Crested Shay. ARCT. ZOOL. No. 583. A. e) — BR. ZOOL. II. p. 292. pl. 102. Lev. Mus.

Etwas kleiner, als der letzte; zwey Fuß, drey Zoll lang; drey Fuß, sechs Zoll breit; und drey und drey Viertel Pfund schwer. Der Schnabel ist vier Zoll lang, schmal, dunkelbraun, und am Ende gekrümmt; der Augenstern schön grün; an beyden Seiten des Kopfs ein langer Büschel von dunkelbraunen Federn, die über den Scheitel hinausreichen, und einen artigen Federbusch bilden; der Kopf, der Hals und der Unterrücken sind schön glänzend grün; der Ober Rücken und die Deckfedern der Flügel eben so, und purpurschwarz gerändert; der Bauch dunkelfarbig; der Schwanz dunkelgrün, aus zwölf Federn bestehend; die Füße dunkelschwarz.

Dieser ist in Großbritannien und in den weiten Erdschluchten um Holyhead zu Hause; auch in Norwegen, Island und Grönland, im letztern aber nicht sehr gemein. Herr Pennant

d) Latham Ind. orn. p. II. 888. n. 16. B.

e) Uebers. II. S. 542. A. Olafsens Reise durch Island II. S. 295. Donnerfers Zool.

Beytr. II S. 857. Nr. 21. Es scheint mir, als wenn dieser Vogel eine Varietät des gefleckten Wasserraben Nr. 18. sey. B.

Vier und neunzigste Gattung. Pelikan.

515

nant bemerkt, er habe verschiedene Wasserraben auf den Hebriden angetroffen, aber keinem mit dem Federbusch gesehen. Woraus man schließen muß; daß er etwas selten sey.

16. Der violette Wasserrabe. (Violet Sh.)

Pelecanus violaceus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 575. No. 22. f)

Violet Corvorant. Arct. Zool. p. 484. B. g)

Dieser Vogel soll ganz schwarz seyn, mit violetttem Glanze. Seine Größe ist nicht angegeben.

Er findet sich um Kamtschatka und auf den nahen Inseln. Ein diesem sehr ähnlicher ist im Levenschen Museum; die Farbe seines Gefieders und die Größe sind wie oben angegeben; auf dem Scheitel aber steht ein langer, spitziger, aufrechter Federbusch.

17. Der Schnarr-Wasserrabe. (Red-faced Sh.)

Pelecanus Vrile. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 575. No. 23. h)

Red-faced Corvorant. Arct. Zool. p. 584. C. i)

Vrile. Hist. Kamtsch. p. 157. k)

Dieser ist etwas kleiner als der Cormoran, und zwey Fuß, zwey Zoll lang. Sein Schnabel ist vierthalb Zoll lang, die Wurzel röthlichgrün, das Ende schwarz; um die Augen herum sitzt eine kahle, röthliche Haut; Kopf und Hals sind dunkelschwärzlichgrün; an der Mitte des Halses vornen, stehen einige schmale, weiße Federn, die sparsam unter die andern gesäet sind, und viele davon sind dritthalb Zoll lang; der Rücken und die Flügel sind dunkelschwarz, aber glänzend; der Rücken hat auch einen grünen Glanz bey gewissen Richtungen, mit hier und da eingestreuten, schmalen weißen Federn; der Bauch ist ganz schwarz; zu beyden Seiten des Steißes ist ein großer Fleck von weißen Federn; der Schwanz ist sechs Zoll lang, und hat zwölf Federn; die Schwungfedern sind schwarz; eben so die Füße.

Er ist in Kamtschatka zu Hause, vorzüglich an den felsigen und klippenreichen Stellen an den Seeküsten, wo er im Junius nistet. Seine Eier haben die Größe der Hühnereier, sind grün, und sehr übel-schmeckend; demungeachtet halten es die Eingebornen der Mühe werth mit Lebensgefahr die Felsen ihrentwegen hinaufzuklettern. Er lebt, wie andere dieser Gattung, von Fischen, die er ganz verschlingt. Er fliegt gut und schnell, erhebt sich aber nur schwer vom Boden. Wenn er auf den Felsen sitzt, soll er sehr dumm, und nicht leicht aufzuschrecken seyn; daher ihn die Eingebornen leicht mit Netzen, die sie über ihn ziehen, oder mit Schlingen, die an

f) Latham Ind. orn. II. p. 575. n. 22. B.

g) Uebers. II. S. 543. B. Donndorfs Zool.

Beutr. II. S. 858. Nr. 22. B.

h) Latham Ind. orn. II. p. 888. n. 18. B.

i) Uebers. II. S. 543. C. B.

k) Etzelers Kamtschatka S. 179. Donndorfs Zool. Beutr. II. S. 858. Nr. 23. B.

an lange Stängen befestigt sind, fangen können; und nicht selten lassen sich diese dummen Vögel, einer nach dem andern, bis auf den letzten, fangen. Als Speise betrachtet, muß ihn jeder, der kein Kamtschatdale ist, verabscheuen, wiewohl diese Nation ihn für sehr wohlschmeckend hält; ob hieran die Art der Zubereitung Schuld ist, oder nicht, läßt sich nicht so gewiß sagen. Ihre Methode ist, ihn ganz, ohne die Federn auszupflücken, oder die Eingeweide herauszunehmen, in Löchern in der Erde zu braten, und wenn dieß genug geschehen ist, abzuhäuten und zu essen. Er soll keine Zunge haben; wiewohl man sagt, daß er Morgens und Abends schreie, und daß dieß Geschrey dem Blasen einer Trompete nicht sehr unähnlich klinge. Einige nennen diesen Vogel den See- oder Wasserraben (Sea-Raven').

18. Der gefleckte Wasserrabe. (Spotted Sh.)

(s. die hundert und zwölfte Kupfertafel.)

Pelecanus naevius. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 575. No. 24. 1)

Pelecanus punctatus. SPARRM. Mus. Carlson. tab. 10.

Crested Shag, Cook's last Voy. I. p. 151.

Lev. Mus. m)

Er hat die Größe des gemeinen Wasserraben (Nr. 14), und ist zwey Fuß, oder darüber lang. Sein Schnabel ist drey Zoll lang, hellbläulich bleifarben, bey Einigen gelb; die Spitze gekrümmt; die Augenkreise kahl, und dunkelroth; Kinn, Kehle und Vorderhals beynah schwarz; eben so die Stirn; der Hinterhals und der Anfang des Rückens; gerade über der Stirn entspringen einige lange Federn, die einen zugespitzten Federbusch bilden; und am Hinterkopf ist ein zweyter, dem erstern nicht unähnlicher, aber etwas längerer, denn einige Federn messen anderthalb Zoll, gerade über den Augen entspringt ein weißer Strich, der zu beyden Seiten des Halses bis auf die Flügel herabläuft, und breiter wird, so wie er herabkommt; die Mitte des Rückens und die Flügel sind bräunlich aschfarben, und jede Feder ist am Ende mit einem runden, schwarzen Fleck bezeichnet, der am größten an den Deckfedern der Flügel, aber nirgends größer, als eine kleine Erbse ist; die Schwungfedern sind ungefleckt; von der Mitte des Rückens bis zum Schwanz, und von der Stelle zwischen den Beinen bis zum After, ist die Farbe schwarz, mit grünem Glanze; der Schwanz ist drey Zoll lang, am Ende abgerundet, und, nebst den Schwungfedern, einfarbig schwarz; die Füße sind dunkelbraun, oder schwarz.

Bey einigen Exemplaren ist der Schnabel röthlich, und die Füße mattgelb; das Kinn weiß, mit Federn bedeckt, und ohne Federbusch; die Federn an den Seiten am After weiß gestreift; die Schenkel schwarz; der Streifen zu beyden Seiten des Halses nicht so deutlich, und das Schwarze am Hals minder rein. Ob dieß die Geschlechtsverschiedenheit bestimmt, muß künftigen Beobachtungen zur Entscheidung überlassen werden. Bey andern Vögeln bemerke ich

1) Hist. Kamtsch.

2) Er kommt im System noch einmal unter dem Namen *Pelecanus punctatus*, p. 574. n. 20.

vor. *Pelecanus punctatus*. LATHAM Ind. orn. II. p. 889. n. 19. B.

e) Bonnors Zool. Voytr. II. S. 857. Nr. 20. S. 858. Nr. 24. B.

Tab. 112.



Der gefleckte Pelikan



ich den Federbusch wie bey dem zuerst beschriebenen; aber der ausdehnbare Beutel an der Kehle ist nicht kahl, und scheinbar nicht so geräumig. Ich habe auch Einen gesehen, bey dem das Weiße am Hals nicht über die Hälfte desselben sich erstreckte.

Diese Art ist in Neuzeeland zu Hause, und nistet unter die Felsen; man findet sie vorzüglich in Königin Charlotten-Sund, wo sie unter dem Namen: Pa-degga-degga bekannt ist.

Dieser ⁿ⁾ hat, wie der Cormoran und viele andere Vögel, ohne Zweifel zweyerley Arten zu nisten, deren jede er sich nach der Schicklichkeit des Orts bedient. Gewöhnlich soll er unter die Felsen nisten; Herr Sparrmann aber belehrt uns, daß er sein Nest auch auf Bäume mache.

19. Der belappte Wasserrabe. (Carunculated Sh.)

Pelecanus carunculatus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 576. No. 25. o)

Lev. Mus. p)

Er hat fast die Größe des vorigen. Sein Schnabel ist schwärzlich; die Seiten des Kopfs sind unbefiedert; zwischen dem Schnabel und den Augen sind viele, rothe Fleischlappen; das Uebrige der Augengegend ist aschfarben; die Augenkreise sind schön mazarinblau, erhaben, und über den Augen ist eine Erhabenheit (tubercle), die größer ist als die übrigen; der Augenstern ist weißlich, oder sehr hellbraun; der Kopf ist an den Seiten etwas flach gedrückt; und der Scheitel dicht mit Federn besetzt; der Scheitel, und die Seiten des Kopfs, der Hinterhals und alle obere Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz sind schwarz, einen länglichen, weißen Fleck an den Deckfedern der Flügel ausgenommen; die Stirn, das Kinn, und alle untern Theile weiß; die Füße fleischfarben, oder sehr hellbraun.

Er ist in Neuzeeland zu Hause, und findet sich in Königin-Charlotten-Sund, wiewohl nicht häufig; zu vielen Tausenden hingegen in Staatenland, und, den Berichten der Seefahrer zu Folge, bauet er in Städten (towns). Hierunter wird verstanden, daß sich diese Vögel in Gesellschaften vereinigen, und gewisse Plätze hiezu aussuchen. Ihre Nester machen sie an die Ränder der Klippen, auf die Gipfel gewisser Grasbüschel ^{q)}, die oben flach und breit sind, welches davon herrührt, daß diese Vögel Jahr aus, Jahr ein, auf ihnen nisten.

20. Der

n) Zus. aus den Suppl. S. 279.

o) Latham Ind. orn. II. p. 576. n. 25. B.

p) Försters Voy. I. p. 41. B.

q) *Dactylis glomerata* L. f. Forst. Voy. vol.

I. p. 41. Dieses Gras wächst oft vier Fuß hoch, und ist an seinem Stoppel zwey oder drey mal so breit. Die Penguins verbergen sich oft unter demselben. Forst. Observ. p. 41.

20. Der Magellanische Wasserrabe. (Magellanic Sh.)

Pelecanus magellanicus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 576. No. 26. ^{r)}
 Lev. Mus. ^{r)}

Seine Länge ist dreihzig Zoll. Der Schnabel ist drey Zoll lang, und schwarz; die Seiten des Kopfs und das Kinn kahl und röhlich; die Mitte des letztern aber etwas mit Pflaum besetzt; Kopf und Hals bis zur Brust, Rücken, Flügel und Schwanz sind tief schwarz; Kopf und Hals etwas glänzend und die Federn an erstem scheinen dick zu stehen, wodurch dieser Theil größer erscheint, als er wirklich ist; der Kopf selbst aber hat keinen Federbusch; hinter jedem Auge ist ein weißer Fleck: die untern Theile, von der Brust an, sind auch weiß; und die Seitenfedern unter den Flügeln weiß gestreift; die Schenkel schwarz; Schwungfedern und Schwanz tief schwarz; letzterer keilsförmig, und vier Zoll lang; die Füße hellbraun.

Er ist im Feuerland zu Hause, soll aber auch in Staatenland angetroffen worden, und lebt in Horden, wie andere dieser Gattung. Im Weynachts- Sund nisten sie bey Tausenden unter die Felsen, und zwar an solchen Stellen, die über die See hervorragten, oder wenigstens sich perpendikular erheben, damit, wenn die Jungen herausfallen, sie keinen Schaden leiden, und nur ins Wasser fallen. Sie sollen Löcher in die Felsen machen, die zu ihrem Zwecke dienen, oder wenigstens, in Felsen die nicht allzu hart sind, die natürlichen Höhlungen so erweitern, daß für ihre Nachkommenschaft Raum darin ist. Die Wasserraben sind sowohl hier, als an andern von Menschen unbesuchten Orten, so zahm, daß sie ein Flintenschuß eben nicht sehr erschreckt; denn, wenn man auf sie gefeuert hat, und sie auch anfangs verstört worden sind, so kommen sie doch gleich wieder zum Nest zurück, so daß es gar keine Schwierigkeit hat, sie im Flug zu schießen, weil sie etwas schwer fliegen ^{r)}.

21. Der geschäckte Wasserrabe. (Pied Sh.)

Pelecanus varius. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 576. No. 27. ^{u)}
 Lev. Mus. ^{x)}

Er ist zwey Fuß, sechs Zoll lang. Sein Schnabel ist fünfhalb Zoll lang, und wie bey dem gemeinen Wasserraben gestaltet; der Rücken desselben schwärzlich, das Uebrige, und die kahlen Augenkreise gelb; über den Augen ist ein schmaler Streifen von heller Farbe; der Schetel, der Hinterhals, der Rücken, die Flügel und der Schwanz sind braun, die Mitte des Rückens und die Deckfedern der Flügel am hellsten, die Ränder der letzten fast weiß, oder sehr hell; der untere Theil des Rückens, der Steiß und die Schenkel sehr dunkelbraun, fast schwarz; die Schwungfedern schwarz, einige der zunächst am Körper stehenden haben blasse Spitzen; der Schwanz ist braun schwarz, abgerundet und sechs oder mehr Zoll lang; die äußern Ränder und die

^{r)} Latham Ind. orn. II. p. 889. n. 21. B.

^{u)} Latham Ind. orn. II. p. 890. n. 22. B.

^{s)} Forsters Voy. II. p. 494. Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 858. Nr. 26. B.

^{x)} Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 859. Nr. 27. B.

^{z)} Forst. Voy. vol. II. p. 494. 95.

Vier und neunzigste Gattung: Pelikan.

519

die Schäfte weiß; die untern Theile, vom Kinn bis zum After, ganz weiß; die Füße fleischfarben; die Klauen dunkelbraun.

Obige Beschreibung ist von einem Exemplar im Leverschen Museum genommen, und ein diesem ähnliches sehe ich unter den Gemälden des Sir Jos. Banks. Dieß geht in einigen Stücken ab; das Gefieder ist ziemlich das nämliche, außer daß an den braunen Theilen die Farbe im Allgemeinen einerley Schattirung hatte, aber ins Schwarze zieht; die Haut um die Augen herum ist bläulich, und die Seiten des Kopfs, so wie alle untern Theile weiß; die Füße schwarz.

Obige Art ist in Neu-Seeland zu Hause, und häufig in Königin-Charlotten-Lund angetroffen worden. Sie nistet auf Bäume, auf welchen man ein Duzend oder noch mehr auf Einmal gesehen hat⁷⁾. Die Eier sind dritthalb Zoll lang, etwas kleiner, als Hühnereier, und von hellbläulich-weißer Farbe.

22. Der gekrönte Wasserrabe. (Tufted Sh.)

*Pelecanus cirrhatu*s. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 576. No. 28. z)

Seine Länge ist zwey Fuß, zehn Zoll. Der Schnabel ist dritthalb Zoll lang, und dunkelgelb; die Augenkreise kahl; der Kopf, die Seiten desselben über den Augen, der Hinterhals und alle obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz schwarz; die Federn auf dem Kopf sehr lang, und bilden einen spitzen, aufrechten Büschel (tuft) oder Federbusch, der sich etwas vorwärts neigt; an den Deckfedern der Flügel ist ein länglicher, weißer Fleck; die untern Theile, vom Kinn bis zum After, sind auch weiß; der Schwanz ist fünfsthalb Zoll lang, abgerundet und besteht aus vierzehn Federn; die Füße sind hell gelbbraun.

Dieser wurde mit den andern aus Königin-Charlotten-Lund gebracht, und ist im Hunterschen Museum.

23. Der Afrikanische Wasserrabe. (African Sh.)

Pelecanus africanus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 577. No. 29; a)
Br. Mus. b)

Er hat die Größe einer Kriek-Ente, und zwanzig Zoll Länge. Sein Schnabel ist an der Spitze gekrümmt; die Augenkreise sind kahl; die Farbe der obern Kinnlade ist braun, schwarz,
Uuu 2

7) Diese Art soll gemeiner seyn, als die gefleckte, a) Latham Ind. orn. II. p. 890. n. 24. B.
(Nr. 18. Cook's last Voy. vol. I. p. 151. b) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 859. Nr. 29.
z) Latham Ind. orn. II. p. 890. n. 23. — B.
Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 859. Nr.
28. B.

schwarz, der übrige Schnabel schmutzig gelblichweiß; das Gefieder an den obern Theilen des Kopfs und Halses braunschwarz; die Mitte des Rückens und der Steiß glänzend schwarz, die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel blaugrau, jede Feder ringsherum schwarz eingefasst, und mit eben solchen Spitzen; die drey ersten großen Schwungfedern hellbraun, ins Zimmetfarbene ziehend, die übrigen braunschwarz; die der zweyten Reihe eben so lang, als die großen, und dunkelschwarz, mit braunen Rändern; der Schwanz besteht aus zwölf Federn, ist keilförmig, seine zwey mittlern Federn sind sieben Zoll lang, und die äußern nur dritthalb; die vier mittlern, und die äußere zu beyden Seiten hellbraun, die übrigen schwarz; das Kinn ist weiß; der Vorderhals schmutzig weiß und schwarz gesprenkelt; der Bauch fast eben so, mit einer Mischung von Braunem; die Füße schwarz.

Er ist in Afrika zu Hause.

24. Der Zwerg-Wasserrabe. (Dwarf Sh.)

Pelecanus pygmaeus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 575. No. 19. c) — PALLAS Trav. vol. II. p. 712. No. 16. tab. G. d)

Diese Art ist kaum so groß, als eine Krick-Ente. An Schnabel, Füße und Körperbau kommt sie vollkommen mit dem gemeinen Wasserraben überein; der Körper ist schwarz mit einem grünen Anstrich an Hals und Brust; die Deckfedern der Flügel sind unscheinlich braun, und jede Feder glänzend schwarz gerändert; um die Augen herum weiße Linseln, die aber nicht sehr zahlreich sind; an Hals, Brust und Seiten sind auch einige wenige, zerstreute Flecken, die von sehr zarten Haarpinseln entstehen, die diese Farbe haben, und hier und da unter den Federn sichtbar sind; der Schwanz besteht aus zwölf Federn, ist steif, lang und keilförmig, wie beym gemeinen Wasserraben.

Das Weibchen ist ganz braun, oder matt schwarz, und ungefleckt.

Man findet diese Art am Caspischen Meere, nebst andern ihrer Gattung; auch am Flusse Jaick und Gurjef *) f).

25. Der

c) Latham Ind. orn. II. p. 890. n. 25. B.

d) Pallas Reise Auszug II. S. 7. Anh. S. 14.

Mr. 26. Taf. G. Donndorfs Zool. Beytr.

II. S. 857. Nr. 19. B.

e) Decouv. Russ. vol. III. p. 504.

f) Im Ind. orn. I. c. β ist eine Varietät angegeben: *Pelecanus pygmaeus*. It. Poseg. p. 25.

Kopf und Hals sind oben und an den Seiten kastanienbraun; am Hals mit einzelnen schneeweißen Punkten besetzt; Kopf und Leib unten mit dunkelbraunen, kastanienbraun gerändeten Federn bedeckt; die Kehle milchfarben; der Bauch grau, dunkelbraun gefleckt; die Deckfedern der Flügel schwarz mit einem dunkleren Saum, der dunkelbraun bährt hat, umgeben.

Wohnt in Possegana. B.

Vier und neunzigste Gattung. Pelikan.

521

25. Der große Gannet. (Gannet).

Pelecanus Bassanus. LIN. I. p. 217. No. 7. Ed. XIII. I. 2. p. 577. No. 5. g) —
Faun. Suec. 147. — BRÜNN. orn. No. 124. — MÜLLER Zool. No. 147. —
Faun. Groenl. No. 59.

Le Fou de Bassan. BRISS. orn. VI. p. 503. pl. 44. — BUFF. ois. VIII. p. 376. —
Pl. enlum. 278.

Sula Hoieri. RAU Syn. p. 123. No. 5?

Soland Goose. — RAU l. c. p. 122. A. 2. — WILL. orn. p. 328. pl. 63. —
ALBIN Nat. Hist. vol. I. pl. 86.

Gannet. Br. Zool II. No. 263. — Arct. Zool. No. 510. b)

Br. Mus. Lev. Mus. i)

Von der Größe einer Gans. fast drey Fuß lang, sechs Fuß breit, und sieben Pfund schwer. Der Schnabel bläulich aschfarben ¹⁾, sechs Zoll lang; die Nasenlöcher in einer Furche; die innere Seite des Mundes schwarz, eine kahle, blaue Haut umgiebt die Augen, und die Wurzel des Schnabels; die Kehle ist unbefiedert und ihre Haut sehr ausdehnbar, so daß sie einen Sack bildet, der fünf bis sechs Heeringe fassen kann; der Augenstern ist gelblich; die Hauptfarbe des Gefieders weiß; der Scheitel aber, und der obere und hintere Theil des Halses sind schwärzlichbraun; die Ackerflügel und die großen Schwungfedern schwarz; der Schwanz besteht aus zwölf Federn und ist fellsförmig; die Füße sind schwarz, und vornen mit einem Erbsengrünen Streifen bezeichnet; die Klaue der mittlern Zehe fahlförmig eingeschnitten, wie bey einem Reiher.

Männchen und Weibchen sind ziemlich überein. Die jungen Vögel sind im ersten Jahr dunkelbraun, mit weißen Sprenkeln; und von dieser Art, vermuthet ich, ist der zunächst zu beschreibende Vogel.

Der Gannet ist in den kältern Gegenden unsers Reiches, besonders aber auf verschiedenen nördlichen Inseln, und ausschlagweise auf der Bass-Insel in Schottland zu Hause, daher ihr Name (Bassanus) ¹⁾. Gewöhnlich erscheint er zuerst im März, und nachdem er um die ganze Insel herumgekommen ist, zieht er im Oktober oder November wieder weg ²⁾. Diese Art scheint die Heeringe und Sardellen zu verfolgen, deren Bewegungen sie beobachtet, und die Fischer erkennen die Ankunft dieser Fische aus der Erscheinung dieses Vogels. Daß dieß der Beweggrund ist, scheint daher wahrscheinlich, weil man sie auch im December, bis an die Küste von Lissabon und Gibraltar, gegen Süden, nach Sardellen untertauchen sieht ³⁾. Sie ist

g) Latham Ind. orn. II. p. 891. n. 26. B.

b) Uebers. II. S. 541. Nr. 428. B.

i) Pallas nord. Beytr. II. S. 299. Claffens Jst. I. S. 120. III. S. 201. Pontoppid dan Norwegen II. S. 145. Bonnors Zool. Beytr. II. S. 860 Nr. 5. B.

k) Der Schnabel ist hellblau; das Gesicht und die Kehle dunkelblau. B.

l) Er zeigt sich auch zuweilen in Deutschland. Vor 4 Jahren wurde einer im Odenwalde in der Gegend eines großen Teiches, der er fast alle Fische geraubt haben soll, geschossen. B.

m) Nachdem nämlich die Einwohner das erste Ey wegmehmen, oder da lassen. Br. Zool.

n) ibid.

ist auch an den Küsten von Norwegen und Island gemein, und hin und wieder an den südlichen Küsten von Grönland angetroffen worden. In Amerika findet sie sich an den Küsten von Newfoundland vor, wo sie brütet; und im Winter zieht sie bis nach Carolina. Verschiedene unserer Seefahrer sollen sie auch häufig in verschiedenen Gegenden der Südsee angetroffen haben; ich bin aber ungewiß, ob die Art, die sie meynen, der große Gannet ist, von der hier die Rede ist, oder die unten anzuführende kleinere Art^{o)}. Ihr Nest besteht aus verschiedenen Stoffen, als Gras und Seepflanzen, vermischt mit verschiedenen Dingen, die der Vogel auf dem Wasser schwimmend findet. Er legt nur Ein Ey, das weiß und etwas kleiner, als ein Gänse-Ey ist; wenn ihm dieß genommen wird, so legt er ein zweytes; und wenn ihm auch dieß geraubt wird, ein drittes; wenn er aber auch das letzte verliert, so kann er es in diesem Jahr nicht wieder ersetzen. Die jungen Gannete sind nach Edinburg gebracht, und das Stück für zwanzig Silber verkauft worden, wo man sie denn gebraten, und kurz vor dem Mittagessen aufgetragen hat, gleichsam um den Appetit zu erregen (by way of whet); aber die Einwohner auf der Insel St. Kilda machen aus diesen Vögeln einen großen Artikel ihres Unterhalts, und sollen jährlich nicht weniger, als 22000,600 junge Vögel, nebst einer erstaunlichen Menge Eyer, konsumiren; sie erhalten sowohl die Eyer, als die Vögel in kleinen, pyramidenförmigen, steinernen Gebäuden (buildings), und bedecken sie mit Torfasche um sie vor der Feuchtigkeit zu verwahren. Um diese Vögel zu bekommen, laufen die Einwohner große Gefahr, indem sie sich an Seilen von den Felsenspitzen herablassen, wobey sie nicht selten zu Grunde gehen^{p)}.

Ich^{q)} finde, daß diese nicht der *Pelecanus Sula* des Linne' sey, sondern der *Sula Hoi-eri* ein von ihm verschiedener Vogel, und eine bloße Spielart von meinen großen Gannet, der sich hin und wieder bey uns vorfindet^{r)}. Sie weicht hauptsächlich darin ab, daß einige ihrer kürzern Schwungfedern, so wie einige Schwanzfedern schwarz sind.

Herr Martin von Teignmouth, in Devonshire, vermuthet, der Gannet brüte dorthierum, weil er die alten Vögel zur Sommerszeit gesehen hat.

25. Var. A. Die Charniergans.

Pelecanus Bassanus. L. I. 2. p. 577. No. 5. β. s)

Le grand Fou. BRISS. orn. VI p 497. No. 2. — BUFF. ois. VIII. p. 372.

Great Booby. GATESBY Carol. vol. I. pl. 86. (der Kopf).

Diese

^{o)} s. Cook's Voy. vol. I. p. 10. 11. — HAWKESW. Voy. vol. II. p. 382. 83. 439. 637. u. a. Ort.

^{p)} In Rücksicht des obigen, so wie der allgemeinen Beschreibung ihrer Stitten, s. Br. Zool. — In Rücksicht der Methode selbst, s. Arct. Zool. Introd. p. XXIX. pl. IV.

^{q)} Zus. a. d. Suppl. S. 280.

^{r)} s. unten bey Nr. 27. — Arct. Zool. II. p. 583.

^{s)} Latham I. c. β. B.

^{t)} Seltmann's Vögel IV. Taf. 72. (Kopf). Bonndorfs Zool. Beytr. II. S. 861. β. B.

Vier und neunzigste Gattung. Pelikan.

523

Diese hat ohngefähr die Größe einer Gans, aber einen längern Schwanz. Der Schnabel ist etwas über fünf Zoll lang, und graubraun; der Augenstern rufbraun; der Raum zwischen dem Schnabel und den Augen unbefiedert, und bloß mit einer dunkelbraunen Haut bedeckt; Kopf, Hals und Brust, und alle obern Theile, sind dunkelbraun, mit weißen Flecken bezeichnet, die am Kopf klein und zahlreicher, größer und seltner am Rücken und auf der Brust sind; der Bauch und die übrigen untern Theile sind schmutzigweiß; Schwungfedern und Schwanz braun; die Füße schwarz.

Sie ist an den Küsten von Florida zu Hause, wo sie häufig ist, und scheint nichts weiter, als ein Junges des Gannet zu seyn *).

26. Der kleine Gannet. (Lesser G.)

Pelecanus Piscator. LIN. I. p. 217. No. 6. Ed. XIII. I. 2. p. 578. No. 6. x)

— Amoen. Acad. vol. IV. p. 239. No. 8. β. (das Weibchen). — OSBECK Voy. vol. I. p. 127.

Le Fou blanc. BRISS. orn. VI. p. 501. No. 4. — BUFF. ois. VIII. p. 371. y)

Er hat die Größe einer großen Ente, und ist zwey Fuß, sieben Zoll lang. Sein Schnabel ist fünf Zoll lang, an den Rändern gezähnt, und röthlich; die Stelle zwischen dem Schnabel und den Augen kahl, und von eben dieser Farbe; die Kehle unbefiedert, und dunkelschwarz; die Hauptfarbe des Gefieders weiß; die größern Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern ausgenommen, die schwarz sind; die Schulterfedern sind an den Enden ebenfalls schwarz; der Schwanz besteht aus vierzehn Federn, ist keilsförmig, die Wurzel weiß, das Uebrige seiner Länge aber schwarz; die Füße roth; die mittlere Klaue breit und gezähnt.

Diese Art soll in China zu Hause seyn, wo sie Bubbi heißt, und ist vermuthlich eine von den Arten, deren sich die Chineser zum Fischen bedienen, weil sie einen Ring um den Hals hat. Bey einigen Vögeln sind diejenigen Theile, die bey den andern schwarz sind, braun.

Das Männchen soll ganz schwarz seyn, mit einem schimmelgrauen Bauch; Schnabel und Füße wie bey den andern. Ich vermuthete aber sehr, daß dieß der braune Zöpel ²⁾, oder irgend eine andere Art sey, und gar nicht zu dem weißen gehöre. Dieß zu glauben, verleitet mich eine Abbildung des letztern, wo die dazu gehörigen Noten bemerken, daß er auf der Osters-Insel gemein sey, und besonders noch angeben, es sey kein Unterschied im Gefieder bey irgend einem Geschlechte.

Eine

*) Im Ind. orn. II. p. 892. y wird der gefleckte Zöpel (Pelecanus maculatus. Lin.) als zweyte Varietät hierher gerechnet und gesagt, daß es vielleicht ein junger Vogel sey. B.

x) Latham Ind. orn. II. p. 892. n. 27. B.

y) Bonnors Zool. Beytr. II. S. 862. Nr. 6. B.

z) Pelecanus Fiber. L. f. No. 28.

Eine Spielart).

Von der Größe einer Ente, und zwanzig Zoll lang. Der Schnabel gerad, wie bey dem großen Gannet, und eben so geformt; die Farbe röthlichbraun, mit einer dunkeln oder schwarzen Spitze; die Wurzel und die Haut um die Augen herum, dunkelroth; das Gefieder durchaus weiß, die Flügel, die Schulterfedern und die Mitte des Rückens ausgenommen, die dunkelbraun sind, und die Schwungfedern schwarz; der Schwanz am Ende gleich; die Füße blutroth.

Ich halte diesen Vogel für eine Spielart von dem kleinen Gannet. Er unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, daß er kleiner ist, und daß seine Schwanzfedern durchaus weiß sind, da sie bey den andern nur an der Wurzel weiß sind, und das Uebrige ihrer Länge schwarz ist.

27. Der gemeine Fölpel. (Common Booby).

Pelecanus Sula. LIN. I. p. 218. 7. Ed. XIII. I. 2. p. 218. No. 7. b)

Le Fou. BRISS. orn. VI. p. 495. No. 1. — BUFF. ois. VIII. p. 368. pl. 29.

Anseri Bassano congener fusca avis. RAU Syn p. 191. No. 6. — SLOANE Jam, p. 322. tab. 271. fig. 2.

Booby. BROWN Jam. p. 481. — CATESBY Carol. vol. 1. pl. 87. c)
Lev. Mus.

Er hat die Größe des kleinen Gannet, und ist zwey Fuß, sechs Zoll lang. Sein Schnabel ist beynähe fünfhalb Zoll lang, an den Rändern gezähnt, und von grauer Farbe, die Wurzel hellbraun; die Augenfleise und das Kinn sind unbefiedert, und mit einer gelblichen Haut bedeckt; der Augenstern ist hellgrau; der Kopf, der Hals, die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz aschbraun; die großen Schwungfedern bey weitem am dunkelsten; der Schwanz am Ende bräunlich, und stark keilsförmig; Brust, Bauch, Schenkel und After weiß; die Füße hellgelb; die Klauen grau. Catesby bemerkt, daß diese Vögel variiren, einige haben weiße Bäuche, andere nicht, und zwischen Männchen und Weibchen sey kein merklicher Unterschied.

Bei jungen Vögeln sind Kopf und Hals weiß, mit einem sehr geringen Anstrich von Braunem; man kann sie aber dadurch unterscheiden, daß die Federn dieser Theile pflaumartig und weich, und nicht von der gewöhnlichen Textur sind.

Sie sind auf den Bahama Inseln zu Hause, und, wie ich glaube, auch in vielen andern Weltgegenden sehr gemein. Mein Exemplar kam aus Capenne. Wahrscheinlich ist dieß

a) Aus den Suppl. S. 280.

b) Latham Ind. orn. II. p. 892. n. 28. B.

c) Seligmanns Vögel. IV. Taf. 74. Dorn's Zool. Beytr. II. S. 862. Nr. 7. B.

Vier und neunzigste Gattung. Pelikan.

525

bleß die Art, deren Dampier, als so häufig auf der Insel Ayres, acht oder neun Meilen östlich von Buenos-Ayres, erwähnt, und als ein so dummes Geschöpf beschreibt, daß sie nicht leicht einem Menschen aus dem Wege gehe. Sie soll ihr Nest auf dem Boden an solche Stellen bauen, wo keine Bäume wachsen, auf diese hingegen, wenn sie dergleichen vorfinden kann. Ihr Fleisch ist schwarz und schmeckt nach Fischen, ob es gleich doch oft von den Seekapern gegessen wird. Man hat sie auch in Neuguinea ^{a)} angetroffen, und in Kamtschatka gesehen ^{b)}; auch auf den Ferroe-Inseln findet sie sich vor, und vor einigen Jahren, ist sie auch an unsern eignen Küsten gesehen worden ^{c)}.

28. Der braune Fölpel. (Brown B.)

Pelecanus Fiber. LIN. I. p. 218. 8. Ed. XIII. I. 2. p. 579. No. 8. g)

Le Fou brun. BRISS. orn. VI. p. 499. No. 3. pl. 43. fig. 1.

Le Fou brun de Cayenne. PL. enlum. 974. b)

Le petit Fou brun. BUFF. ois. VIII. p. 374.

Anseri Bassano affinis, avis cinereo-alba, a Booby. RAZZ. SYN. p. 191. No. 5.

— SLOANE JAM. vol. I. praef. p. 31. pl. 6. fig. 1. i)

Er ist etwas größer, als die wilde Ente, und zwey Fuß, oder darüber lang. Sein Schnabel ist drey und drey Viertel Zoll lang, von röthlicher Farbe, an der Spitze gebogen, und an den Rändern etwas gezähnt; die Augenkreise kahl und roth; die Hauptfarbe des Gefieders hell aschbraun, dunkler am Rücken und an den Schulterfedern, und heller an den untern Theilen des Körpers; der Steiß, und die obern und untern Deckfedern des Schwanzes hellgrau; die großen Schwungfedern dunkel aschfarben; der Schwanz besteht aus vierzehn Federn, und ist keilsförmig, die zwey mittlern Federn sind aschfarben, die übrigen eben so, ziehen aber ins braune und haben graue Spitzen; die Füße sind roth.

Er ist in Cayenne und andern Gegenden Amerikas, so wie auf verschiedenen westindischen Inseln zu Hause, und findet sich auch in Afrika.

29. Der kleine Fölpel. (Lesser B.)

Pelecanus parvus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 579. No. 31. k)

Le petit Fou. BUFF. ois. VIII. p. 374.

Fou de Cayenne. PL. enlum. 973. l)

Dies

d) Dampier, Voy. vol. III. P. II. pl. in p. 165.

e) Ellis's Narrat. vol. II. p. 189.

f) Arct Zool. — Br. Zool. II. p. 619.

g) Latham Ind. orn. II. p. 893. n. 29. B.

h) Dieses und das folgende Synonym sind von Hrn. Latham oben unter gemeiner Wasser-

rabe als zweyte Varietät angeführt worden. B.

i) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 863. Nr. 8. B.

k) Latham Ind. orn. II. p. 893. n. 30. B.

l) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 863. Nr. 31. B.

Dies ist der kleinste dieser Familie, und mißt kaum achtzehn Zoll in der Länge. Sein Schnabel ist ziemlich gerad; und die Augenkreise sind nicht kahl; Kehle, Brust und Bauch sind weiß; alles übrige Gefieder dunkelschwarz.

Er ist in Cayenne zu Hause.

30. Der gefleckte Fölpel. (Spotted B. ^m)

Pelecanus maculatus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 579. No. 32.

Le Fou tacheté. BUFF. ois. VIII. p. 375. — Pl. enlum. 986.

Er hat einen hellbraunen Schnabel, der gegen die Spitze hin gelb ist; das Gefieder überhaupt ist dunkelbraun, und durchaus weiß gefleckt; die Flecken sind am Kopf kleiner, und am Rücken und an den Flügeln am größten; Brust und Bauch weiß, mit dunkelbraunen Wellenlinien und Flecken; die Flügel beträchtlich kurz, viel kürzer als bey irgend einer bekannten Art; Schwungfedern und Schwanz einsärbig braun; die Füße hellbraun.

Er ist ebenfalls in Cayenne zu Hause.

Z u s a ß.

31. Der Thage.

Pelecanus Thajus. GMELIN LIN. I. 2. p. 577. No. 30. — MOLINA Chil. p. 212.

Onocratulus rostro denticulato. BRISS. VI. p. 523. A. Ed. 8vo. II. p. 499.

Onocratulus maximus dentatus, Alcatraz, RAU Syn. p. 122. — HERNANDEZ Mexico t. p. 672.

Vergleiche auch oben großer Pelikan. Nr. 1. Var. A.

Er hat die Größe einer Truthe, von einem Ende der Flügelspitze bis zum andern neun Fuß; der Schnabel ist einen Fuß lang, an den Seiten gezähnel; der Kehlsack sehr groß, etwas wollig, und sehr ausdehnbar; der Kopf fast wie am braunen Pelikan Nr. 3., von welchem er sich bloß durch den gezähnelten Schnabel unterscheidet.

Er ist ein einsamer Vogel, dessen Vaterland Chili und Mexiko ist. Sein Nest steht auf den Felsen, und er hat gewöhnlich fünf Junge. B.

Fünf

^m) Im Ind. orn. II. p. 892, wird er als zweyte

Varietät von gemeinen Gannet Nr. 26. *Pelecanus Bassanus* γ aufgeführt. B.

Fünf und neunzigste Gattung. Tropikvogel.

Der Schnabel zusammengebrückt, und etwas schief abwärts laufend (sloping), mit scharfer Spitze; und unterer eckiger Kinnlade. Die Nasenlöcher sind offen. Der Zehen vier, und alle mit einer Schwimmhaut verbunden. Der Schwanz keilförmig; seine zwey mittlern Federn sehr weit über die andern hinausreichend.

I. Der gemeine Tropikvogel. (Common Tropic Bird.)

Phaethon aethereus. LIN. I. p. 219. 1. Ed. XIII. I. 2 p. 581. No. 1. n)

La Paille en cul. BRISS. orn. VI. p. 480. pl. 42. fig. 1. — PERNETTY Voy. vol. II. p. 75.

La Paille en cul de Cayenne. Pl. enlum. 998.

Le grand Paille en cul. BUFF. ois. VIII. p. 348. pl. 28.

Rabijuncos. VILLOA Voy. vol. II. p. 305.

Tropic Bird. RAU Syn. p. 123. No. 6. p. 191. No. 4. — WILL. orn. p. 331. pl. 75.

Br. Mus. Lev. Mus. o)

Die Größe dieses Vogels ist ohngefähr die einer Pfeif-Ente, und seine Länge, bis an die Spitze seiner langen Schwanzfedern, zwey Fuß, zehn Zoll. Sein Schnabel ist über drey Zoll lang und roth; der Kopf, der Hals, und die untern Theile des Körpers weiß; an der Wurzel der obern Kinnlade entsteht ein schwarzer Streifen, der sich um den obern Theil des Auges krümmt, und sich etwas dahinter in einer geraden Richtung endiget; der Rücken, der Steiß und die Schulterfedern sind weiß, und mit krummen schwarzen Streifen durchzogen; die kleinen Deckfedern der Flügel weiß und einige derselben nach der Queere schwarz bezeichnet; die großen Schwungfedern schwarz, mit weißen Rändern; die Sellen über den Schenkeln schwarz oder dunkelbraun und weiß melirt; der Schwanz besteht aus vierzehn Federn, deren zwölf von mäßiger Länge, die längsten ohngefähr sechshalb Zoll lang sind, und kürzer werden, so wie sie nach aussen zu stehen kommen; die zwey mittlern hingegen sind über zwanzig Zoll lang, und laufen in eine Spitze aus; von Farbe sind sie alle weiß, die langen ausgenommen, die ohngefähr auf ein Viertel, von der Wurzel an, schwarz sind; die Füße sind dunkelgelb; die Klauen schwarz.

Der Name Tropikvogel, den diese Gattung führt, rührt davon her, daß man sie hauptsächlich innerhalb der Wendekreise (tropics) antrifft; wir dürfen aber daraus nicht schließen, daß

Err 2

n) Latham Ind. orn. II. p. 893. n. 1. B. o) Donndorfs Zool. Beytr. II. S. 867. Nr. 1. B.

daß sie sich nicht freiwillig oder gezwungen über sie hinaus verbreiteten; denn wir haben einige Beispiele, die das Gegentheil beweisen ²⁾). Inzwischen ist es so gewöhnlich, sie innerhalb der Wendekreise vorzufinden, daß die Ansicht dieses Vogels allein hinreichend ist, den Seemann zu überzeugen, daß er sehr nahe an ihnen, wo nicht schon selbst in ihnen sey. Man hat auch geglaubt, sie prophezeiten das angränzende Land ³⁾); dieß hat man aber oft trügllich besunden, weil man sie nicht selten in einer sehr großen Entfernung vom Lande gesehen hat. Der Flug dieses Vogels geht oft zu einer bewundernswürdigen Höhe; zu andern Zeiten sieht man ihn aber auch in Gesellschaft des Fregat-Vogels, des Tölpels und anderer Vögel, den fliegenden Fischen nachhellen, wenn sich diese über das Wasser erheben, und von ihren Feinden im Wasser, aus ihrem natürlichen Element in die Luft getrieben werden, als das sind die Haje ⁴⁾), das Meer-schwein ⁵⁾, der Thunfisch ⁶⁾, die Makrele ⁷⁾, und der Delphin ⁸⁾), die sie unter dem Wasser verfolgen, und Jagt auf sie machen. Zuweilen sieht man diese Vögel auf der Oberfläche des Wassers ruhen, und hin und wieder hat man sie, bey stillem Wetter, auf dem Rücken der faulen Schildkröte (drowsy Trotoise), nachlässig auf dem Wasser hin und her schwimmen sehen, wo man sie denn leicht mittelst des bemanneten langen Nachs (long boat manned), fangen konnte ⁹⁾). Am Ufer setzt er sich auf Bäume, und soll in Wäldern, auf der Erde unter denselben brüten. Man hat ihn in Menge auf den Inseln St. Helena, der Oterinsel, der Insel Mauritius, Neuholland, und verschiedene Gegenden der Südsee angetroffen; nirgends aber so häufig, als auf der Insel Palmerston, wo diese Vögel, so wie die Fregatvögel, in solcher Menge waren, daß die Bäume gänzlich von ihnen belastet waren, und so zahm, daß sie sich mit der Hand von den Ästen herabfangen ließen ¹⁰⁾). Auf Otaheita und den freundschafflichen Inseln geben ihnen die Einwohner die Namen Haingoo und Toolaitee.

Weil der Tropikvogel jährlich seine langen Schwanzfedern verliert, so sammeln sie die Bewohner der Inseln, auf denen er sich aufhält, und bedienen sich ihrer verschiedentlich zum Schmuck; sie werden auf den Rücken der Einwohner von Sandwich getragen, weil sie in großen

2) Dr. Forster bemerkt, man sehe sie niemals über den 28ten Gr. d. Br., nach Andern aber verbreiten sie sich weit darüber hinaus. Im 32 Gr. 45 Gr. Dr. Ellis's Narrat. vol. II. p. 64. — 33 Gr. 1 Gr. N. Cooks last Voy vol. III. p. 178. — 38 Gr. 34 Gr. S. Parkinsons Voy. p. 132. — 38 Gr. 29 Gr. S. Hawkesw. Voy. vol. III. p. 77. — Dieß wird als nicht gewöhnlich angegeben; Kalm aber sagt, er habe sie im 40 Gr. N. angetroffen. s. Trav. vol. I. p. 22. und einer meiner Freunde versichert mir, er habe Einen im 47 1/2 Gr. N. Br. gesehen, bemerkt aber zugleich, es sey dieß das erste Beispiel dieser Art.

9) Villosa's Voy. vol. II. p. 301. Er bemerkt, daß man sie selten über 8 bis 10 Meilen (leagues) vom Lande antreffe.

7) Shark. Squalus Conductor L.

8) Porpoise. Delphinus Phocaena. L.

9) Albicore. Scomber Thynnus L.

10) Bonico. Scomber Pelamis. L.

11) Dolphin. Delphinus Coryphaena. s. Phil. Transact vol LXVIII. p. 800. Man hat bemerkt, daß der fliegende Fisch sechs- oder mehr Ellen weit auf einmal fliegen, und dieß zum zweyten ja auch zum drittenmal wiederholen kann, ohne daß man nur die geringste augenblickliche Verührung der Oberfläche dazwischen bemerken kann; und bey diesen Flügen geschieht es oft, daß er gegen die Schiffe anfliegt, oder auf das Verdeck fällt.

12) Fryers Trav. p. 219.

13) Ellis's Narrat. 53.

Fünf und neunzigste Gattung. Tropikvogel:

529

ßer Menge in Tahoorä sind ¹⁾, auch machen sie verschiedene Kleidungsstücke daraus; nirgendes aber machen sie mehr Aufsehen, als an den Trauerkleidern auf Otahite, wo eine Menge in den Gebirgsgegenden ausgerupft werden, und wo diese Vögel auch brüten ²⁾. Ihr Fleisch kann man nicht gut nennen, doch haben es diejenigen, die lange Zeit auf gesalzene Kost eingeschränkt gewesen sind, so ziemlich erträglich gefunden, und die Matrosen es unter diesen Umständen nicht ausgeschlagen.

1. Var. A. Der weiße Tropikvogel. (White Tr. B.)

Phaethon aethereus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 581. No. 1. β. b)

Le Paille en cul blanc. BAISS. orn. VI. p. 485. No. 2. pl. 42. fig. 2.

Le petit Paille en queue. BUFF. ois. VIII. p. 355.

Paille en queue de l'Isle de France. Pl. enlum. 369.

Tropic Bird. GATESBY Carol. Append. pl. 14. — BROWN Jam. p. 482. — EDW. Nat. Hist. pl. 149. fig. 2. c)

Dieser ist kleiner, als der letztere. Sein Schnabel ist an der Wurzel aschgrau, das Uebrige seiner Länge gelblich; das Gefieder überhaupt silberweiß; er hat den schwarzen Halbmond um die Augen, wie der vorige; und die Schulterfedern sind, wie bey jenem, schwarz bezeichnet; die Füße sind gelblich; die Wurzel der Zehen eben so; das Uebrige ihrer Länge, die Schwimmhäute und die Klauen schwarz.

Er soll sich, gleich dem vorigen, an verschiedenen Orten vorfinden, und scheint eine Spielart von ihm zu seyn ³⁾.

1. Var. B. Der gelbe Tropikvogel. (Yellow Tr. B.)

Phaethon aethereus. LIN. I. Ed. XIII. I. 2. p. 581. No. 1. γ. e)

Le Paille en queue fauve. BAISS. orn. VI. p. 485. No. 3. f)

Dies ist noch eine Spielart, die sich hauptsächlich durch ein gelblichweißes Gefieder unterscheidet, da es bey dem vorigen rein silberweiß war. Diese Verschiedenheiten rühren vielleicht bloß vom Alter her, wenn sie nicht die Unterscheidungsmerkmale des Geschlechts sind.

2. Der schwarzchnäblige Tropikvogel. (Black-billed Tr. B.)

Phaethon melanorhynchos. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 582. No. 2. g)

Fr'r 3

Dieser

a) Cook's last Voy. vol. II. p. 242. Ill. p. 172.

b) Forster, Voy vol II. p. 92.

c) Latham I. c. β. B.

d) Seltmann's Vögel IV. Taf. III. Donner

dorfs Zool. Beyr. II. S. 868. Nr. 1. β. B.

e) Brisson macht eine eigene Art daraus. B.

f) Latham I. c. γ. B.

g) Nach Brisson obermals eine besondere Art. B.

h) Latham Ind. orn. II p. 894. n. 2. Donner

dorfs Zool. Beyr. II. S. 869. Nr. 2. B.

Dieser ist kleiner, als einer der vorhergehenden, und neunzehn, einen halben Zoll lang. Sein Schnabel ist drey Zoll lang, an den Seiten stark eingedrückt, und schwarz; das Gefieder an den obern Theilen des Körpers, und an den Flügeln, ist unterbrochen schwarz und weiß gestreift; vor den Augen ist ein großer, schwarzer Halbmond; hinter diesem ein Streifen von der nämlichen Farbe; die Stirn, und alle untern Theile des Körpers sind rein weiß; Schwanzfedern und Schwanz, sind wie die obern Theile gezeichnet, die Endspitzen der erstern aber weiß, und die meisten Federn des letztern an den Spizen dunkelschwarz bezeichnet; die Seiten über den Schenkeln schwarz und weiß gestreift; die Füße schwarz.

Dieser wurde auf der Schildkröten- und Palmerston-Insel in der Südsee angetroffen, und ist jetzt im Besitz des Herrn Jos. Banks.

3. Der rothschwänzige Tropikvogel. (Red-tailed Tr. B.)

(s. die hundert und dreyzehnte Kupfertafel.)

Phaethon phoenicurus. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 583. No. 3. b)

Le Paille en queue à brins rouges. BUFF. ois. VIII. p. 357.

— — — de l'Isle de France. Pl. enlum. 979. d)

— — — Lev. Mus.

Die Länge dieser Art ist zwey Fuß, zehn Zoll, wovon die zwey langen Schwanzfedern allein Einen Fuß und neun Zoll betragen. Der Schnabel ist vierthals Zoll lang, und dunkelroth; das Gefieder weiß, mit einem schönen, hellrosenfarbenen Anstrich; der Halbmond über den Augen, wie bey den andern, in der Mitte aber etwas abgebrochen; die Enden der Schulterfedern schwarz bezeichnet; was aber den Vogel vor andern auszeichnet, sind die zwey mittlern, langen Schwanzfedern, die ihrer ganzen Länge nach prächtig dunkelroth sind, die Schäfte ausgenommen, die schwarz sind; die Füße sind auch schwarz.

Man trifft diese Art häufig auf der offenen See (at large) an, wie die andern, sie scheint aber doch nicht so weit verbreitet zu seyn. Unsrer Weltumseegler haben sie in verschiedenen Gegenden gesehen, aber selten an der Küste, ausser zur Brütezeit, im September und October. In großer Menge findet man sie auf der Insel Mauritius, wo sie ihr Nest in Erdhöhlen unter die Bäume macht; der Eyer sind zwey, gelblich weiß, mit gelbrothen Flecken ¹⁾. Ich habe anderswo ²⁾ der Einführung der Paradies-Azeln auf die Insel Bourbon gedacht, von wo aus sie sich nach der Insel Mauritius verbreitet haben; zuerst beabsichtigte man damit den nützlichen Endzweck, die Heuschrecken und Grashüpfer auszurotten, die dafelbst in hohem Grade schwärmten; die Wirkung (result) der ungeheuren Vermehrung derselben, so wie die unvorhergesehenen Folgen davon, ist gleichfalls dort angegeben worden.


Diese

b) Latham Ind. orn. II. p. 894. n. 3. B. k) Voy. to Maurit. p. 66. — Hist. des Ois.

d) Donnadors Zool. Veytr. II. S. 869. Nr. u) Allg. Uebers. I. B. 2. Th. S. 379.

3. D.

Tab. 113.



Der rothschwänzige Tropikvogel.



Drey und neunzigste Gattung. Penguin.

531

Diese Vögel sind, wie man mir erzählt hat, große Feinde der Tropikvögel, wovon sich Herr von Querschbent durch den Augenschein überzeugte; denn als er unter einem Baum saß, auf welchen sich einige Aelzeln niedergelassen hatten, bemerkte er, daß ein Tropikvogel auf seine Höhle zuflieg, um in sein Nest zu kommen, die Aelzeln aber fielen diesen Vogel alle zugleich an, und zwangen ihn die Flucht zu ergreifen; er kehrte hierauf in Gesellschaft seines Gatten zurück, aber ohne Erfolg; denn sie wurden beyde vertrieben, wie vorher der Einzelne; die Aelzeln kehrten auf ihren Baum zurück, und der Zuschauer verließ sie in dieser Lage.

Man hat diese Art Tropikvögel an verschiedenen Orten der Südsee angetroffen; sehr gemein ist sie auf den Palmerston- und Turtel-Inseln; in größter Menge auf Hervey's Inseln, wo eine beträchtliche Anzahl zum Proviant erlegt wurde; hier bauen sie auch ihre Nester eben so, wie auf St. Mauritius. Der Name, unter dem man sie auf Otaheite und den freundschaftlichen Inseln kennt, ist Tawagge und Totto.

Sechs und neunzigste Gattung. Schlangenvogel.

Der Schnabel ist lang, gerade, und scharf zugespitzt. Die Nasenlöcher sind ein langer Ritz an der Wurzel desselben. Gesicht und Kinn sind unbefiedert ^{m)}. Der Hals ist lang. Die Füße sind kurz; der Zehen vier; die alle mit einer Schwimmhaut verbunden sind.

1. Der

^{m)} Linne' sagt, das Gesicht sey mit Federn besetzt, und schließt es vielleicht bloß daraus, weil die ältern Schriftsteller nicht ausdrücklich das Gegentheil angegeben haben; da ich aber an drey Exemplaren der schwarzbäuchigen Art (Nr. 2) wovon meine Abbildung genommen ist, durch den Augenschein überzeugt worden bin, daß das Gesicht bloß mit einer kahlen Haut bedeckt war, so entsteht hieraus die größte Wahrscheinlichkeit, daß es bey der weißbäuchigen (Nr. 1.) ebenfalls so sey; besonders

da die Aehnlichkeit aller untereinander, in Rücksicht der Hauptcharaktere, so groß ist, daß minder scrupulöse Ornithologen, dadurch verleitet werden könnten, sie als Spielarten des Geschlechts, des Alters oder des Himmesstichs aufzustellen. Bey der Surinamischen Art (Nr. 3) ist das Gesicht dicht mit Federn bedeckt; dieß ist aber eine anomalische Art, und hier nur zu dieser Gattung gezogen, weil sie mit ihr am nächsten verwandt ist.

1. Der weißbäuchige Schlangenvogel. (White-bellied Darter).

Plotus Anhinga. LIN. I. p. 218. 1 Ed. XIII. I. 2. p. 580. n)

L'Anhinga. BAISS. orn. VI. p. 476. No. 1. — BUFF. ois. VIII. p. 448. — RALL
Syn. p. 124. No. 7. — WILL. orn. p. 332. pl. 72. o)

Er ist kaum so groß, als eine wilde Ente am Körper, mißt aber in der Länge, von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze, nicht weniger, als zwei Fuß, zehn Zoll. Sein Schnabel ist drei Zoll lang und spitzig, die Ränder gezähnt, die Farbe gräulich, an der Wurzel aber gelblich; der Augenstern goldfarben; der Kopf sehr klein, und der Hals schlank, von sehr großer Länge, und mit pfaumartigen, weichen, gelbrothgrauen Federn bedeckt; Kehle und Vorderhals aber sind grau; der Oberrücken und die Schulterfedern sind dunkelschwarz, und die Mitte der Federn weiß gestreift; der Unterrücken, der Steiß und die Deckfedern des Schwanzes schön schwarz; alle untern Theile, von der Brust an, rein silberweiß; die kleinern und mittlern Deckfedern der Flügel wie der Oberrücken; die längern, zunächst am Körper stehenden, schwarz, mit weißen Flecken, die äußern aber einfarbig schwarz; der Schwanz besteht aus zwölf sehr breiten und langen Federn, von glänzend schwarzer Farbe; Füße und Zehen sind gelblichgrau.

Er ist in Brasilien zu Hause, und soll sehr geschickt im Fischen seyn; denn nach Art der Schlangen, zieht er zuerst seinen Hals zurück, schießt dann seinen Schnabel auf den Fisch hervor, und fängt ihn mit den Klauen. Er nistet, wie der Kormoran, auf Bäume, und ruht, wie dieser, die Nacht über auf ihnen, und wenn er nicht im Wasser ist, so sieht man ihn mehrentheils auf den höchsten Zweigen der Bäume, die auf den feuchten Savannen oder an der Flußseite stehn, und fast niemals auf der Erde. Wenn er ausruht, so sieht er häufig mit zwischen die Schultern gezogenem Hals, wie der Reiher, wodurch die Brust beträchtlich voller erscheint, als sie von Natur ist, und der Hals viel kürzer. Sein Fleisch soll mehrentheils sehr fett, aber von öligen, ranzigen, und unangenehmen Geschmack seyn?).

2. Der schwarzbäuchige Schlangenvogel. (Black-bellied D.)

Plotus melanogaster. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 580. No. 3. q)

Anhinga melanogaster. Zool. Ind. p. 22. tab. 12.

Anhinga de Cayenne. Pl. enlum. 959.

Black-bellied Anhinga. Ind. Zool. p. 13. tab. 12. r)


Er hat die Größe der gemeinen Ente, sein Hals ist aber außerordentlich lang; sein Schnabel gerad, lang und scharf zugespitzt; der obere Theil hellblau, der untere röthlich, die Augen sehr feurig, (piercing); der Kopf, der Hals und der obere Theil der Brust lichtbraun; jede Seite des Kopfs und der obere Theil des Halses mit einem breiten, weißen Strich bezeichnet; der Kropf sehr groß; der Rücken, die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel nach
der

n) Latham Ind. orn. II. p. 895. n. 1. B. graf. — f. Will orn. p. 332.

o) Donndorfs Zool. Beyr. II. S. 864. Nr. 1. B. q) Latham Ind. orn. II. p. 895. n. 2. B.

p) Nicht besser, als das einer Meve. Mart. r) Naturforscher I. S. 275. B.

Tafel 114



Die Schwarzbäuchige Anhinga.



Fünf und neunzigste Gattung. Tropikvogel.

535

der Länge, zu gleichen Theilen, mit schwarzen und weißen Streifen bezeichnet; die Schwungfedern, der Bauch, die Schenkel und der Schwanz dunkelschwarz; der Schwanz beträchtlich lang und schlank; Beine und Füße hellgrün; die vier Zehen durch Schwimmhäute vereinigt, wie beim Cormoran.

Dies ist die Beschreibung in der Indischen Zoologie, wo bemerkt wird, daß er sich auf den Inseln Ceylon und Java aufhalte, und auf dem Gebüsch sitze, das über das Wasser herüber hängt. In einem Lande, wo man sich allenthalben mit der Idee von Schlangen trüge, erschreckt er oft die Reisenden, indem er seinen langen, dünnen Hals hervorschießt, den man auf den ersten Blick für das Hervorschießen irgend einer gefährlichen Schlange hält.

2. Var. A. *Plotus melanogaster*. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 580. No. 2. β. 5)

(s. die hundert und vierzehnte Kupfertafel.)

Anhinga. BUFF. ois. VIII. p. 110. pl. 35.

Br. Mus.

Er hat die Größe des vorigen, und ist drey Fuß, vierthalb Zoll lang. Sein Schnabel ist fünfsthalb Zoll lang, dunkelgelb, und an der Wurzel mit einer Haut von eben dieser Farbe bedeckt, die den Raum zwischen dem Schnabel und den Augen einnimmt, und letztere umgibt; die Nasenlöcher sind ein schließender Schlit, nicht weit von der Wurzel des Schnabels, die obere Kinnlade ist fein gezähnt; der Kopf klein; der Hals lang und schlank, beyde mit kurzen, pflaumartigen Federn bedeckt, von schmutzigweißer, oder sehr hellbrauner Farbe, die vorn am hellsten, und hinten und unten am dunkelsten ist; der Rücken, die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel sind von der nämlichen Farbe, aber dunkler; der untere Theil des Halses, an den Seiten, und die Deckfedern der Flügel sind mit eyrunden, weißen Flecken bezeichnet, die regelmäßig sind, und an den letztern Reihen bilden; die Schulterfedern sind nach der Länge weiß gestreift, das dem Vogel ein artiges Ansehen giebt; quer über den untern Theil der Brust läuft ein matt gelbrother Streifen; von hier an sind alle untern Theile schwarz, so wie auch die Schwungfedern und der Schwanz; letzterer ist elf Zoll lang, ein wenig abgerundet, und das Ende der Federn rostig hellbraun; die zwey mittlern auf eine sonderbare Art kreuzweise wellenförmig gestreift; die Füße ungeschickt, stark, und nur fünfsthalb Zoll lang; ihre Farbe schmutzig gelblich-braun.

2. Var. B. Der schwarze Schlangenvogel. (Black D.)

Plotus melanogaster. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 580. No. 2. γ 1)

Anhinga noir de Cayenne. Pl. enlum. 660.

Er hat die Größe der andern, und drey Fuß Länge. Der Schnabel ist gelb, aber sehr bloß; die Augenkreise und die Kehle hell schmutzigweiß; die Deckfedern der Flügel gelblichweiß;

das

5) Latham l. c. β. B.

5) Latham l. c. γ. B.

Latham's allgem. Hebers, der Vögel. III. Band 2. Th.

U n n

das übrige Gefieder schwarz, die Federn am Anfang des Rückens und einige Schulterfedern ausgenommen, die Länge der Mitte herab, ohngefähr so wie die andern Arten, weiß gestreift sind, und die Schwanzspitze ist schmutzig gelbroth; die Füße sind bräunlichgelb.

Er ist in Cayenne zu Hause.

2. Var. C. Der gelbrothe Schlangenvogel. (Rufous D.)

Plotus melanogaster. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 580. No. 2. d. 2)

Anhinga roux. BUFF. ois. VIII. p. 453.

Anhinga du Senegal. PL. enlum. 107. 2)

Er hat die Größe der andern, und unterscheidet sich dadurch, daß sein Kopf, Hals und die Deckfedern der Flügel schmutziggelbroth und dunkelbraun, in Streifen gemischt sind; das übrige Gefieder ist schwarz.

Er ist in Afrika, besonders in Senegal zu Hause, wo er Randar genannt wird.

3. Der Surinamsche Schlangenvogel. (Surinam D.)

Plotus surinamensis. LIN. Ed. XIII. I. 2. p. 581. No. 3. y)

Le Grebe foulque. BUFF. ois. VIII. p. 248. — PL. enlum. 893.

Oiseau de Soleil. FERMIN Surin. vol. II. p. 192.

Surinam Tern. BROWN. illustr. p. 98. pl. 39.

Br. Mus. Lev. Mus. 2)

Er hat die Größe einer Krick-Ente, und ist dreyzehn Zoll lang. Sein Schnabel ist Einen und ein Achtel Zoll lang, und von blasser Farbe; der Augenstern roth; der Scheitel schwarz und seine Federn hinten in einen kleinen Busch verlängert; der Kopf selbst klein; der Hals schlank und im Verhältniß zum Körper, lang; die Wangen lebhaft kastanienbraun; von jedem Augenwinkel läuft ein weißer Strich weg; die Seiten des Halses und der Hinterhals sind nach der Länge mit schwarzen und weißen Strichen bezeichnet; Flügel, Rücken und Schwanz sind dunkelbraun; die Flügel sehr lang, und reichen bis auf einen Zoll auf den Schwanz hin, wenn sie geschlossen sind; der Schwanz hat eine weiße Spitze, und ist keilsförmig; die obern Deckfedern desselben sind beträchtlich lang, wodurch der Vogel aussieht, als wenn er zwey Schwänze, einen über dem andern, hätte; Brust und Bauch sind weiß; die Füße kurz, und ziemlich stark; alle vier Zehen sind durch eine Haut verbunden; die Füße sind von blaßdunkelbrauner Farbe; und die Zehen schwarz gestreift.

Dieser Vogel ist in Surinam zu Hause, und läßt sich hauptsächlich an den Ufern der Flüsse und Klippen sehen, wo er von kleinen Fischen, so wie von Insekten, vor allen aber von Illeggen lebt, die er so geschickt zu fangen weiß, daß er niemals eine verfehlt, wenn er mit dem

Schnabel

2) Latham I. c. d. B.

3) Le Vaillant's Reise. (Uebers. von Forster)

II. S. 164. Taf. 1. B.

y) Latham Ind. orn. II. p. 896. n. 3. B.

z) Donndorf's Zool. Beytr. II. S. 866. Nr. 3.

B.

Fünf und neunzigste Gattung. Tropikvogel.

535

Schnabel (der sehr scharf ist) nach ihr schlägt. Die Einwohner pflegen ihn oft zu zähmen, und geben ihm den Namen Sonnenvogel. Er ist sehr unruhig, und Kopf und Körper sollen in beständiger Bewegung seyn. Aus dem Umstand, daß er beständig Flügel und Schwanz zu gleicher Zeit ausbreitet, hat man geglaubt, er gleiche der Sonne, nach den Ideen derer, die ihn in dieser Stellung beobachtet haben, und daher hat er den Namen Sonnenvogel erhalten.

Wenn wir die Synonymen betrachten, so sehen wir, wie verschieden die Vorstellungen der Schriftsteller gewesen sind, die dieses Vogels erwähnt haben; und, die Wahrheit zu gestehen, er kommt mit keiner Gattung vollkommen überein, ob er gleich mit der, zu der wir ihn hier gebracht haben, die möglich-größte Ähnlichkeit hat. Herr Forster hat uns seine Meynung hierüber gesagt, wie man in seiner Indischen Zoologie (S. 23. Note *) sehen kann, wo er die Verbindung aller vier Zehen untereinander bemerkt, die bey dem vollständigen Vogel ganz offenbar ist. Ein zweyter Umstand bestimmt gleichfalls seine Verwandtschaft mit dieser Gattung, nämlich das plötzliche Hervorschießen des Schnabels nach den Gegenständen seines Raubes, wie die andern Schlangenvögel ebenfalls thun; wiewohl der hier abgehandelte Vogel in Einer Rücksicht wieder von ihnen abweicht; und dieß ist, daß er an den Seiten des Kopfs nicht kahl ist; aber dieser Umstand muß, wo alles andere eintrifft, weniger in Betracht kommen, wenn wir die unendliche Mannichfaltigkeit der Natur erwägen, die sich in vielen Fällen, nicht in die engen Gränzen eines Systems einzwängen läßt, wie nützlich auch übrigens eine solche Methode zur Unterstützung der Schriftsteller in Anordnung ihrer Werke seyn mag.

Z u s ä t z e

zu allen sechs Theilen der allgemeinen Uebersicht.)

Zur Allgemeinen Uebersicht n. I. 1. S. 8. Der Brasilische Geyer.

Im Ind. orn. I. p. 5. n. 8. β . ist der in der Note von Molina entlehnte Jota - Geyer als Varietät angegeben.

Zur Allg. Uebers. I. 1. S. 10. Nr. 6. Der Bartgeyer.

Nach dem Ind. orn. I. p. 3. n. 6. gehört, so wie im Gmelin. Linne'schen System schon angegeben ist, 1) als Var. β hlerher: Der Goldgeyer Nr. 13. Vultur aureus, BRISS. I. 458. 5. Id. 8vo. p. 132. Pallas nord. Beytr. IV. S. 84. Gmelins Reise IV. S. 185. 2) Der große Adler. S. G. Gmelins Reise III. S. 365. t. 38. Latham I. c. 7. Die Wachsheit ist bläulich; der Leib unten kastanienbraun und weiß gemischt; der Schwanz aschgrau. Auf den Persischen Gebürgen.

— I. 1. S. 12. 7. Var. A. Der aschgraue Geyer.

Im Ind. orn. I. p. 2. n. 4. macht Herr Latham diesen Vogel, den er für einen Nasgeyer (Vultur percnopterus, L.) ausgiebt, zu einer besonderen Art, unter dem Gmelinisch Linne'schen Namen, Vultur leucocephalus. Hiermit stimmt überein, was ich in meinen Zusätzen zu diesem Theile S. 653 gesagt habe.

Zu diesem aschgrauen Geyer rechnet er aber auch noch den S. 17. Nr. 16. beschriebenen und abgebildeten Bengalischen Geyer, als das Weibchen, welches er in der Synopsis noch nicht gewiß wußte.

— I. 1. S. 17. Der Sekretär.

Gestalt und Lebensart dieses Vogels sind von den Geyern und Falken so sehr verschieden, daß man billig eine besondere Gattung (Sagittarius) aus ihm machen sollte. Er giebt ein natürliches Bindeglied zwischen den Geyern und Falken, und dann zwischen den Raub- und Sumpfvögeln ab.

Der Herr Recensent in der Allgemeinen Literatur - Zeitung, der den 5ten Theil beurtheilt, sagt bey Gelegenheit des gehäubten Anhima (Palamadea cristata) S. 6, daß man den Sekretär und gehäubten Anhima unter eine Gattung bringen sollte. Er schlägt den Namen Geyerkranich (Gypogeranus) mit folgenden Kennzeichen vor: Der Schnabel ist gekrümmt; die Beine sind lang, vierzehig, gespalten, mit gebogenen scharfen Krallen.

Herr

*) Ich habe die mehresten davon der Güte des

Herrn Assessor Dr. Vorkhausens zu Darmstadt zu verdanken.

Herr Le Vaillant, der aber kein Freund des Systems ist, zählt ihn in seiner Naturgeschichte der Afrikanischen Vögel (s. meine Uebers. Nr. 24. Taf. 25) als Raubvogel auf, und vertheidigt ihn gegen andere, die ihn nicht dafür haben gelten lassen, gar sehr. Doch zeigt seine Lebensart, von der er viel Neues erzählt hinlänglich, daß wenn er auch sehr wenig Eigenschaften mit den Sumpfvögeln gemein hat, er eben so wenig ein Falke ist, unter welcher Gattung er ihn auführt; denn er nennt ihn selbst einen Erdraubvogel.

Zur Allgem. Uebers. I. 1. S. 44. Der gemeine Bussard.

Herr Dr. Borkhausen besitzt einen Bussard, der ganz wie eine weibliche Halbmeyhe (*Falco Pygargus*) gezeichnet ist. Der Kopf ist weiß und graubraun gefleckt; die Schläfe und Augenkreise sind schneeweiß; die Wangen graubraun; Kehle, Brust, Bauch, Steiß und Schenkel Federn schneeweiß; die Brust mit einzelnen großen, graubraunen Flecken, und die Kehle mit vier dergleichen Strichen gezeichnet; die Federn des Hinterhalses, Rückens, der Schultern, die sämtlichen Deckfedern der Flügel graubraun und weiß gerändert; einige haben rostfarbige Spitzen; auch die Schwungfedern sind an den Spitzen, aber schwach weiß gerändert; die Schwanzfedern haben sehr undeutliche dunkle und lichtere Bänder, und sind an den Spitzen schwach weiß gerändert. Sollte nicht der weißliche Falke (*Falco albidus*, Gmel. Lin. p. 267) hierher gehören und dieser eine Varietät des Bussards seyn?

Ein ähnlicher ist in Hrn. v. Wildungen Neujaarsgeschenk für Forst- und Jagdliebhaber 1798. Taf. V. S. 55. abgebildet und beschrieben.

— I. 1. S. 166. Nr. 37. C. Der Louisianische Tyrann.

Dieser Vogel ist wahrscheinlich entweder von dem Tyrann (*Lanio Tyrannus*, L.) gänzlich verschieden, oder beyde gehören nicht zu den Würgern. Sein Schnabel hat weder an der Spitze einen Haken, noch gegen die Spitze einen vorspringenden Zahn, auch ist er oben nicht so messerförmig erhaben, wie bey den Würgern, sondern vielmehr sehr flach gewölbt, an der Wurzel beynähe platt gedrückt, wie bey den Plattschnäblern (*Todus*), kegelförmig zugespitzt, und stumpflich; die Nasenlöcher ziemlich groß, mit Borstenhaaren. Brisson zählt ihn zu den Fliegenfängern; (*Muscicapa*), wohin er aber gar nicht paßt. Ich glaube, man müßte eine neue Gattung (genus) errichten, welchem außer diesem wohl noch viel Würger zu zuzählen wären. Der Vogel, welchen Herr Borkhausen untersuchte, findet sich in dem Cabinet des Herrn Landgrafen zu Darmstadt, und ist aus Virginien.

— I. 1. S. 220. Nr. 63. Der rothbäuchige Kakatu.

Den 17ten Februar 1798 sah ich zu Gotha, unter mehrern seltenen Papagay- und Thierarten, einen hierher gehörigen Kakatu, der vermuthlich das Weibchen war. Er war etwas kleiner als der gemeine aschgraue Papagen. Die Hauptfarbe weiß, auf den Flügeln matt; die Ohren und der Unterschwanz, so wie die Seitenfedern schwefelgelb angelauten; der After rosenroth; der Schnabel silberfarben; die Wachsahut blegrau; der Augenstern mattbraun.

Zur Allg. Uebers. I. 1. S. 334. Nr. 40. Die Capennische Krähe.

Dieser Vogel ist im zweyten Theile S. 416. Nr. 17. unter dem Namen des rothschnäbligen Bartvogels noch einmal beschrieben, wo Hr. Latham selbst vermuthet, daß jener Vogel der nämliche sey, und diese Vermuthung im Suppl. Band S. 96. bestätigt. Man vergleiche auch unten S. 446. Nr. 42. den Capennischen schwarzen Ruckuf.

— I. 2. S. 350. Der Keispirol. Hierzu gehört die Abbildung Taf. 115.

— I. 2. S. 354. Der rothflügelige Pirol.

Eben der Beobachter, welcher die im landgräfl. Darmstädtischen Cabinette befindlichen Amerikanischen Vögel mitgebracht hat, hat diesen Vogel dreyzehn Jahre lang beobachtet und mehrere von Jugend auf erzogen. Vor dem dritten Jahre wird er nicht mannbar, und vor dieser Zeit erlangt er auch seine vollständigen Farben nicht, und Männchen und Weibchen sind schwer zu unterscheiden. Im ersten Jahre haben sie noch gar nichts rothes auf den Schultern, und das übrige Gefieder ist weiß gefleckt; im zweyten Jahre zeigt sich das Rothe bald mit bald ohne weiße Federränder und das übrige Gefieder ist weißlich gerändert, erst im dritten Jahre wird das Männchen ganz schwarz mit vollständigem Schulterflecken, das Weibchen hingegen behält die Farbe und Flecken des zweyten Jahres.

Wir besitzen einige Weibchen, welche folgendermaßen gezeichnet sind: mattschwarz, über den oberen Theil des Halses und des Rückens undeutlich weiß gefleckt, gegen den Bürzel sind die Federn, so wie auch die größern Flügeldeckfedern und die Schwungfedern, weißlich oder lichtrothfarbig gerändert. Der Schulterflecken ist nur rothgelb und bald mehr bald weniger stark mit Schwarz gemischt, auch ist er nicht so groß, als bey dem Männchen. Bey einem Stücke sind auch die Schwanzfedern weißlich gerändert, bey einem andern haben sie einen schwachrothfarbigen Saum, und bey einem dritten sind sie einfarbig schwarz.

— I. 2. 358. Der Bastard-Baltimor.

Von diesem Vogel befinden sich drey angebliche Weibchen im Darmstädtischen Naturalienkabinette. Kopf, Nacken und Rücken sind olivenfarbig; die Kehle schwarz; die Flügeldeckfedern und Schwungfedern trübschwarz und weißlich gerändert; die Schwanzfedern trübschwarz und gelblich gerändert; der Bürzel gelblich.

— I. 2. S. 367. Der braunköpfige Pirol.

Oriclus fuscus. Gmelin Lin. I. 1. p. 393. No. 44.

— — Pennant's Arct. Zool. II. S. 247. Nr. 61.

Er hat ohngefähr die Größe einer Schwarzdrossel. Die Hauptfarbe ist schwarz, mit einem stahlgrünen Schimmer; Kopf und Hals trüb rothbraun; die ersten Schwungfedern mit rothfar-



Der Reispivol

G. Vogel del. Thg.



rothfarbigem Anstrich; der Schwanz tief schwarz, unten nur bräunlich angelauten; Schnabel und Füße schwarz; ersterer gegen die Schnäbel anderer Pirole sehr kurz und dem Schnabel einer Merle ähnlich, allein die obere Kinnlade ist unbeweglich und geht wie bey allen Pirolen weit in die Stirne.

Das Weibchen hat einen bräunlichen Schwanz.

In Canada. Die Buffonsche Abbildung ist schlecht.

— I. 2. S. 369. Der gemeine Pirol.

Hr. Dr. Borkhausen bekam ein Weibchen, das das Gefieder des Männchens hatte. Die Weibchen werden also, wie mehrere Vögel, im Alter hahnenfederig.

— I. 2. S. 374. Der rothfarbige Pirol.

Das Weibchen ist etwas größer als das Männchen. Kopf und Hinterhals sind mattschwärzlich, ohne Schiller, mit hellrothfarbigen Federrändern. Der Streifen, welcher sich durch die Augen zieht und bey dem Männchen tief schwarz erscheint, ist hier nur undeutlich schwarzbraun und reicht nicht bis zum Hinterkopfe; über den Augen ist eine rothfarbig-graulliche Binde; die Schwungfedern sind mattschwarz, ohne Schiller, und die der zweyten Ordnung haben einen rothfarbigen Rand; die Schwanzfedern sind ebenfalls mattschwarz, ohne grünen Schiller.

— I. 2. S. 462. Der rothköpfige Specht.

Einer von den beyden im Darmstädtschen Naturalienkabinette befindlichen Exemplaren hat auf den Schwungfedern der zweyten Ordnung zwey abgebrochene schwarze Binden.

— I. 2. S. 471. Der Canadische Buntspecht.

Die beyden im Darmstädtschen Cabinette befindliche Vögel sind kleiner als der mittlere Buntspecht, ohngefähr so groß oder etwas größer wie der gemeine Eisvogel. Das Band im Nacken ist nicht orangefarben, wie es Hr. Latham angiebt, sondern hochroth.

— I. 2. S. 472. Der Carolinische Specht.

Es befinden sich drey Stücke in obigem Cabinette. Zwey davon haben den ganzen obern Kopf, von der Stirn bis in den Nacken, hellscarlachroth, bey einem hingegen ist nur die Stirne und der Hinterkopf so gefärbt, der Scheitel aschgrau. Bey eben diesem sind auch alle Rußfedern schwarz und nur die beyden äußern haben an den schmalen Seiten einige weiße Flecken; bey den beyden andern hingegen sind die Schwanzfedern stärker weiß gefleckt und die mittlern beyden sind ganz weiß, mit schwarzen Flecken. Die Brust und der Bauch haben bey allen dreyen einen kaum sichtlich röthlichen Anlauf.

Zur Allg. Uebers. I. 2. S. 478. Der Grünspecht.

Herr Dr. Borkhausen schreibt mir folgendes: „Weber in Lathams Werke, noch in Jh-
rer Naturgeschichte Deutschlands finde ich des kleinen Grünspechts, dessen Bock im Natur-
forscher (9. St. 56 S.) erwähnt, gedacht. Es findet sich ein Vogel bey uns häufig, welcher
sich durch folgendes beständig von dem großen Grünspechte unterscheidet: 1) Er ist standhaft klei-
ner; 2) der Schnabel ist spitziger; 3) das Männchen hat nur eine rothe Stirne, das übrige
des Kopfs ist olivengrün; das Weibchen hat weder etwas Rothes, noch etwas Graues auf
dem Kopfe, sondern ist an diesem Orte ganz olivengrün. Alles übrige ist ganz vollkommen wie
beym großen Grünspechte. Alle unsere Jäger versichern, daß er von dem großen Grünspech-
te verschieden sey, und man brachte mir, mich zu überzeugen, daß diese Abweichung nicht von
der Jugend herrühre, über dem Neste gefangen seyn sollende Männchen und Weibchen, nebst den
Eiern, welche, wie Bock im Naturforscher sagt, hellweiß, kleiner und runder, als die des
großen Grünspechts waren. Ist also dieser Vogel Art oder Abart oder ein Junger?“

Dieser Vogel ist mir ebenfalls vorgekommen, allein ich habe ihn immer für einen zum
erstenmal gemauserten jungen Grünspecht gehalten. Ich werde in Zukunft mehr auf ihn
achten. Vielleicht ist der Unterschied wie beym großen und mittlern Buntspecht.

— I. 2. S. 492. Der Goldspecht.

Die Kehle ist bey beyden, im Darmstädtischen Cabinette befindlichen, Exemplaren nicht
schwarz, wie Hr. Gmelin im Linne'schen Systeme angiebt, sondern grau, und die Wangen
sind nicht roth, sondern schwarz. Die rothen Wangen sind bey den Spechtarten nicht standhaft,
sondern wohl das meistmal ein Kennzeichen des hohen Alters beym männlichen Geschlechte.

— I. 2. S. 497. Der grüne Takamar.

Der im Darmstädter Cabinette befindliche Vogel hat keine weiße, sondern eine rostfarbli-
ge, wie der Bauch gefärbte Kehle, und über die Brust geht ein grüngoldenes Band.

Aus Louisiana und Virginien.

Zusätze: S. 737. Nr. 68. Der größte Kolibri. Dieß ist der grüne Takamar.


— I. 2. S. 565. Nr. 3. Der Paradies-Wiedehopf.

Gehört zu dem Paradies-Fliegenfänger (II. 1. S. 334. Nr. 44. und 45), wo aber
alle jene Vögel von Pallas zu Plattischnäbeln gemacht werden.

— I. 2. S. 566. Nr. 5. Der Cayse Wiedehopf.

Hierher gehört: Zusätze S. 737. Nr. 70. Der langschwänzige Baumläufer:

Certhia longicauda, Mus. Loeck. I. No. 71, tab. 1. fig. 2;



Der prächtigste Kolibri. 1. Männchen. 2. Weibchen.



Zur Allg. Uebers. I. 2. S. 638. Der rubinköpfige Kolibri.

Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen; die Rubinfarbe des Scheitels und Nackens ist dunkler; die Kehle lange nicht so feurig, sondern matter, und die Topasfarbe zeigt sich nur in einem matten Streifen; das übrige Gefieder hat lange nicht den Glanz, den es bey dem Männchen hat.

— I. 2. S. 610. Zusätze: S. 786. Nr. 67. Der Capsche Bienenfresser.

Dies scheint der Capsche Kegelschnäbler (*Colius Capensis*, Gmel. Lin.) zu seyn.

— I. 2. S. 647. und 738. 73. Der prächtigste Kolibri.

(S. die hundert und sechzigste Kupfertafel. 1. Männchen, 2. Weibchen.)

Trochilus elegantissimus BORKH.

Im Darmstädtschen Naturalienkabinette.

Kein Vogel dieser Gattung ist prächtiger als das Männchen von dieser Art. Die Größe ist ohngefähr wie die gemeine Spechtmeise, und die Gestalt und der Zuschnitt der Schwungfedern wie an dem rubinköpfigen Kolibri (S. 638). Der Kopf, der Rücken und die Brust haben ein dunkles in Gold schillerndes Rubinroth, welches gegen den Bauch und den Bürzel hin allmählig lighter wird und in helle Rubinfarbe übergeht; diese verliert sich auf dem Bürzel allmählig in Grüngolden; Kinn und Kehle sind grün, glänzen wie geschlagenes Gold und schillern schwach ins Röthliche. Der After ist grüngolden. Damit sich der prächtige Kehlflecken noch desto höher ausnehme, ist er sammerschwarz eingefast, und diese Einfassung ist sehr sanft in die Rubinfarbe schattirt.

Das Weibchen hat gleiche Größe, wie das Männchen, und ist ganz grün mit Goldschiller, nur an dem Kinn und der Kehle ist ein röthlich golden schillernder Fleck.

Beide Geschlechter haben einen schwarzen, kaum merklich gekrümmten Schnabel, schwarze Schwungfedern, rothfarbige Achseln und untere Flügeldeckfedern. Der Schwanz ist wie bey dem rubinköpfigen Kolibri gebaut. Die mittellste Schwanzfeder, welche etwas kürzer ist, als die beyden ihr zur Seite stehenden, ist bey dem Männchen grüngolden, bey dem Weibchen hingegen eben so wie die beyden nächsten, schwarz und violetschillernd, die übrigen sind rothfarbig.

Es ist diese Art aus Carolina.

— I. 2. S. 648. Der Musafresser.

Zu dieser Gattung sollte auch wohl der Turafo (*Cuculus Persa*) oben S. 447. Nr. 46. gerechnet werden.

Der violette Musafresser ist auch wohl der *Cuculus regius*. SHAW'S. MUSEUM LIVERIANUM. Fasc. IV. 40. Hier sind aber Kletterfüße. Vielleicht kann er die äußere Zehe zurück und vorwärts bewegen (*digitus versatilis*), wie die Papageyen.

Zur Allgem. Uebers. II. 1. S. 23. Die Wanderdrossel.

Die beyden im Darmstädtschen Naturalienkabinette befindliche Exemplare weichen von der Latham'schen Beschreibung merklich ab. Der Oberleib ist bleygrau; der Unterleib rothbraun; die Schwungfedern schwarz mit bleygrauen Rändern; der Schwanz schwarz, die äußere Feder zu beyden Seiten an der Spitze mit einem weißen Flecken; der Kopf schwarzbraun; der Augenkreis weiß; die Kehle weiß und schwarz gestrichelt.

Zur Allgem. Uebers. II. 1. S. 85. Zusatz.

136. Die schwarzgeäumte Drossel.

(S. Taf. 117. Fig. 2.)

Turdus Trichas. LIN. Syst. XII. p. 290. No. 7. Ed. XIII. I. 2. p. 811. No. 7.

Im Linne'schen Natursystem sowohl, als im Latham'schen Werke sind zwey Vögel verschiedener Gattung und Art miteinander verwechselt, nämlich *Turdus Trichas*, LIN. und *Ficedula marylandica*, BRISS. sind unter dem Namen des gelbbrüstigen Sängers (Vergleiche Allgem. Uebers. II. 2. S. 439. Nr. 32.) zusammen aufgestellt. Im Hesse-Darmstädtschen Naturalienkabinette befinden sich beyde Vögel, die ich durch die Güte des Hrn. Assessor Vorkhausens abgebildet und beschrieben bekommen habe. (Taf. 117. Fig. 1. der gelbbrüstige Sänger).

Die schwarzgeäumte Drossel hat die Größe eines Goldhammers; der Schnabel ist messerförmig zusammengedrückt und an der Spitze der obern Kinnlade abwärts gebogen, von Farbe tief glänzend schwarz; der ganze Oberleib olivengrün, welches auf dem Scheitel, an der Stirne und den Wangen ins olivengraue übergeht; die Augenlider sind schneeweiß, und eine weiße Linie zieht sich vom Schnabel dicht über die Augen hin; unter dieser ist ein breiter schwarzer Streifen, der bis ans Auge geht; unten ist der Körper hochgelb; unter den Augen scheidet eine schmale weiße Linie das Gelbe und Olivengrüne; der hintere Theil des Unterleibes, der After und die untern Deckfedern des Schwanzes sind weiß; die Schwung- und Schwanzfedern olivenbraun mit olivengrünen Rändern; letztere sind unten weißlich; die Füße braun.

In Nordamerika. Er hat in seinen Stücken alles mit den Drosseln gemein, und ahmt auch wie die Spottedrossel (*Turdus polyglottus*, LIN.) die Stimme und Lieder anderer Vögel nach. Er verdient also auch um desswillen eine Stelle unter dieser Gattung, wohn ihn schon sein Schnabel unwidersprechlich weist.

Um beyde Vögel, diesen und den gelbbrüstigen Sänger desto besser mit einander zu vergleichen, stehen beyde Abbildungen auf einer Kupfertafel.

— II. 1. S. 95. Der Capsche Kegelschnäbler.

Merops Cafer? Mus. Lesk. I. No. 64.

— II. 1. S. 120. Der rothbrüstige Kernbeißer.



1. Der gelbbrüstige Sanger -
2. Die schwarzgehaumte Droschel





Der gefleckte Kernbeißer. Weibchen

Vogel sc.



Im Darmstädtschen Museum befindet sich ein Exemplar mit rosenrother Brust, wie ihn Buffon abgebildet hat.

Zur Allg. Uebers. II. 1. S. 120, Der gefleckte Kernbeißer.

(S. Taf. 118. Weibchen.)

Das Männchen hat keinen schwarzen Strich über den Augen, wie Pennant (Aukt. Zool. S. 326. Nr. 129) sagt, sondern einen weißen; die Grundfarbe des Oberleibs ist hochbraun.

Das Weibchen ist etwas größer; der Kopf braungrau, über dem Scheitel, der Länge nach, ein weißgefleckter Theilungsstreifen; die Augenbraunen, und eine Linie, welche unten her die Augen umgiebt, weiß; die Kehle weiß; die Brust gelblich mit braunen Längsstreifen, der obere Theil des Halses, der Rücken und Steiß trübgelblich und braungrau gefleckt, jede Feder nämlich in der Mitte braungrau mit einem trübgelblichen Rand; die Flügel braungrau; die erste und zweyte Reihe Deckfedern haben weiße Spitzen, wodurch zwei weiße Binden entstehen, von welchen aber die hintere wenig sichtbar ist; die Schwanzfedern einfarbig braungrau; die Füße hellbraun.

Er ist in Louisiana zu Hause.

— II. 1. S. 193. Nr. 37. Der schwarzfehlige Ammer.

Von diesem Vogel sind im Darmstädtschen Naturalienkabinette zwei Exemplare vorhanden, die mehr mit der in der Note angegebenen Pennantschen als mit der Lathamschen Beschreibung übereinstimmen. Bey dem einen Exemplare ist der ganze Kopf, vom Schnabel bis in den Nacken aschgrau und fein schwarz gefleckt; bey dem andern hat er auf der Stirne einen gelblichen Anstrich; Schwung- und Schwanzfedern sind schwarz mit braungrauen Rändern. Das Uebrige stimmt mit Pennants Beschreibung überein.

— II. 1. S. 202. Nr. 53. Der Indigo-Ammer.

Das Gesicht und ein Theil des Halses sind türkisblau; das Uebrige grünspanblau.

Der bläuliche Ammer (*Emberiza cyanella* Gmel. Lin.) ist ein junger Vogel. In der Jugend ist der Rücken braun gefleckt; diese Flecken aber verlieren sich, so wie der Vogel älter wird.

— II. 1. S. 196. Der rothhängige Ammer.

(S. die 119. Kupfertafel.)

Genauer ist die Beschreibung, wie die Abbildung ausweist: Der Schnabel ist schwarz; die Augen sind hochroth; die Füße hellbraun; der ganze Oberleib, so wie der Unterleib bis zur halben Brust schwarz; die großen Schwungfedern weiß gerändert, und ihre Wurzel weiß; der Schwanz schwarz, die äußern Federn mit keilsförmigen weißen Flecken; die übrige Brust und der Oberbauch weiß; alles Uebrige am Unterleibe hell zimmetbraun.

Zur Allgem. Uebers. II. 1. S. 267. Der weißfahlige Fink.

Die Beschreibung ist weder bey Pennant noch Latham genau genug. Der Rücken und die Flügelfedern sind schwarz; mit breiten braunen Rändern; die Augenbraunen hochgelb; über die Flügel zwey weiße Binden; die Wangen und der untere Körper hellaschgrau; die Kehle des Männchens weiß. Beyde Geschlechter haben vollkommen gleiche Größe und unterscheiden sich bloß in der Zeichnung des Kopfs und der Kehle. Das Männchen nämlich hat vier schwarze Streifen am Kopf, zwey ziehen sich von der Stirn bis in den Nacken (zwischen beyden ist ein weißer Streifen) und von jedem Auge zieht sich einer bis an den Hals; die Kehle hat einen weißen Fleck. Beym Weibchen hingegen ist der Kopf braun, ohne Streifen, und der weiße Kehlfleck fehlt auch.

— II. 1. S. 314. Zusätze.

117. Der schwarz- und weiße Fink.

Fringilla leucomelas. БОРКН.
Darmstadt. Mus.

Er ist größer als der Goldammer. Der Schnabel ist dick und stark, doch nicht so gebaut, daß er der Kernbeißer-Gattung gezählt werden könnte; die Füße sind gelb; die Hauptfarbe tiefschwarz, welche sich auch über den Schnabel verbreitet; der Leib schneeweiß und zu beyden Seiten kastanienbraun; der Steiß rostfarbig; die ersten Schwungfedern an der Wurzel und seine große an ihrer äußeren Fahnen schneeweiß; die Schwanzfedern (die beyden mittlern ausgenommen) an den Enden und die äußern beyden über die Hälfte weiß.

Das Vaterland ist Louisiana und Canada.

118. Der Sperlingsfink.

(S. die 120. Kupfertafel Fig. 1.)

Fringilla passerina. БОРКН.
Darmstadt. Mus.

Diesen Finken kann man der Farbe halber sehr leicht mit den Feldsperlingen verwechseln, und es ist auch vielleicht schon geschehen. Er ist zwar so groß, aber schlanker; der Schnabel hat einen ganz andern Bau, und stimmt ganz mit dem des Flachsfinke überein; beyde Kinnladen sind schwarz; auf den Flügeln fehlen die beyden weißen Binden, welche den Feldsperling so deutlich charakterisiren; der Kopf hat nur eine braune Platte, da er beym Feldsperling bis in den Nacken braun ist.


Die Rücken- und Flügelfedern sind schwarz, graubraun gerändert; der Kopf ist grau mit rothbraunem Scheitel und einem schwarzen Strich durch die Augen; die Kehle weißlich; Brust und Bauch aschgrau; der Schwanz schwarz.

Sein Vaterland ist Canada.



Der rothäugige Ammer.





1. Der Sperlingsfink. 2. Der olivengarbige Fink



119. Der olivenfarbige Fink.

(S. die 120ste Kupfertafel, Fig. 2.)

Fringilla olivacea. BORKH.

Darmstäd. Mus.

Er hat ohngefähr die Größe des gemeinen Stieglizes. Der Schnabel ist wie beim gemeinen Hänfling und braun; der Körper oben und unten olivenfarbig; vom Kopf bis an den Bürzel aber, welcher weißgrau ist, gleichsam mit dünner Rostfarbe überzogen; und unten verläuft sich das olivenfarbene ins Gelbe; die kleinern Flügeldeckfedern gelblich olivenfarben; die übrigen Flügeldeckfedern aber schwarz; die großen Flügeldeckfedern haben schmutzgelbe Spitzen, und die zweite Ordnung der Schwungfedern schmutzgelbe Ränder, wodurch zwei Binden entstehen; die ersten Schwungfedern sind nur an den Spitzen ein wenig weiß; der Schwanz ist hinten ausgeschnitten, und schwarz, die Federn an der innern Fahne weißlich; selbne Deckfedern hellgrau und der After weiß.

Aus Canada.

Zur Allgem. Uebers. II. 2. S. 405. Note. Die gelbe Bachstelze.

Var. G. Die weiße gelbe Bachstelze. Mot. flava alba.

Ganz weiß, nur einige Schwung- und Schwanzfedern wie gewöhnlich.

Von Herrn Dr. Borkhausen mitgetheilt.

— II. 2. S. 431. Der Rohrsänger.

Motacilla falicaria. Lin.

Dies ist eine besondere Art, und nicht die, welche ich in der Note beschrieben habe. Ich habe sie seitdem auch in Deutschland im Schilf in Menge angetroffen. Am Weibchen ist die Grundfarbe heller, gelbrothlich; eben so auch der Streifen über den Augen. Es scheint auch die Vinsennachtigall S. 418. Nr. 7. hierher zu gehören.

Dem unten in der Note angegebenen Rohrsänger muß ich einen andern Namen geben. Ich schlage vor: Der Sumpfsänger. *Motacilla* f. *Sylvia palustris*.

— II. 2. S. 437. Der Newyorker Sänger.

Bei diesem Vogel hat Herr Latham die zwei Binden vergessen, welche sich auf jedem Flügel befinden und welche von den weißlichen Spitzen der beyden Ordnungen der Deckfedern entstehen.

— II. 2. S. 439. Der gelbbrüstige Sänger.

(S. die 117te Kupfertafel, Fig. 1.)

Motacilla seu *Sylvia marylandica*. *)

Wie

*) Weil nun der Name *Turdus Trichas* s. oben S. 542 wegfällt.

Wie die Abbildung ausweist, so stimmt hier bey diesem wahren Snger (Motacilla LIN. SYLVIA LATHAM). die Brisson'sche, Latham'sche und Buffon'sche Beschreibung genau ber ein.

— II. 2. S. 445. Der blaue Snger.

Sechs im Darmstdtischen Museum befindliche Vgel stimmen ganz mit Latham's Beschreibung ber ein, bis auf Kehle, Vorderhals und Brust, welche nicht gelbroth, sondern matt rothbraun sind.

Eben so ist mein Exemplar, das ich selbst besitze.

— II. 2. S. 472. Der Louisianische Snger.

Das Weibchen ist oben olivenfarbig; Kehle und Brust hellgelb und ungefleckt; der Bauch weis; die Flgel schwarz mit zwey weis;en Binden; die Schwanzfedern schwarz und olivenfarbig gerndet, die beyden u;ern an der Spitze weis;.

— II. 2. S. 480. Der weis;kappige Snger.

Es giebt Vgel dieser Art, wo der Bauch ganz weis;, der Scheitel aber nicht ganz weis;, sondern wie der Rcken schwarz und weis; gefleckt ist.

— II. 2. S. 505. Der gelbkpfige Snger.

Von den drey im Darmstdtischen Cabinette befindlichen Vgeln hat nur einer einen hellgelben Scheitel, bey den brigen beyden ist er wie der Rcken olivengrn; die Rnder der Schwungfedern sind bey allen gelb, nicht olivengrn.

— II. 2. S. 516 und 775. Zusatz. 179. Die grauliche Grasmcke.

(S. die 121ste Kupfertafel.)

Motacilla L. Sylvia Currucoides. BORKH.

Darmstdt. Mus.

Dieser Vogel hat viel hnlichkeit mit dem Mllerchen (Motacilla Curruca, L.) *) An Gr;e gleicht er der gro;en Nachtigall (Motacilla Philomela, mihi). Die ganze obere Seite des Krpers ist graubraun, die Federn nmlich sind schwrzlichbraun und haben breite braungraue Rnder, welche Mischung das blulichgraue Ansehen hervorbringt; die Schwungfedern sind etwas dunkler, haben aber eben so, wie die Rcken- und Deckfedern blulich.

*) Da die Diagnose auf zwey ganz verschiedene Vgel pa;st, so kann diese nach Herrn Vorkhausen's Angabe folgendergestalt gendert werden:

Motacilla Curruca. M. supra grisea fusca, subtus albida, vertice et stria infraoculari cinereis, remigum margine exte-

riori rufescente, rectrice extima margine tenuiore alba.

Motacilla Currucoides. M. supra griseofusca, mento cinerascens, remigum margine exteriore, rectrice extima margine tenuiore albida.



Die grauliche Grasmücke ~





Der Squakko - Reiher. Männchen



lichgraue Ränder; von den Schwanzfedern, welche alle die Farbe der Schwungfedern haben, ist zu beyden Seiten die äußere an der schmalen Spitze weißlich, die übrigen sind bläulichgrau gerändert; die ganze untere Seite schmutzigweiß, doch zieht das Kinn etwas ins aschgraue; Schnabel und Füße sind mattschwarz, und jener ist an der Spitze etwas übergebogen.

Sein Vaterland ist Virginien.

Zur Allgem. Uebers. III. 1. S. 31. Der gemeine Nachtreiber.

In Ungarn nistet dieser Vogel sehr häufig, und man findet das Nest auf freyen Wiesen, an Morästen, in hohem Grasse und unter Gesträuche. Er nistet also auf Bäumen wohl gar nicht.

— III. 1. S. 47. Der Squakko-Reiher.

(S. 122ste Kupfertafel.)

Der abgebildete, ein Männchen wurde am Rhein geschossen, und mir durch die Güte des Hrn. Dr. Borkhausens zugesandt. Unter der semmelgelben Brust ist eine hochgelbe Wolle, die angenehm riecht. Es ist wirklich das Männchen von *Ardea rolloides*, SCOPOLI.

— III. 1. S. 60. Der große Silberreiher.

Er lebt und nistet in Ungarn, legt vier bis sechs etwas grünliche Eyer in Morästen ins Rohr.

— III. 1. S. 61. Der kleine Silberreiher.

Der Recensent in der Allgem. Litt. Zeit. bemerkt, ob nicht dieser Vogel Linne's *Ardea alba* sey, da er sie nicht genau genug kannte.

In Ungarn nistet dieser Vogel in Morästen ins Rohr, und legt 4 — 6 weiße rundliche Eyer.

— III. 1. S. 87. Der sichelschnäblige Ibis.

Recensent in der Allgem. Litt. Zeit. bemerkt, daß sich das Weibchen von diesem Vogel gar nicht vom Männchen unterscheide, und das abgebildete Weibchen sey entweder eine besondere Art oder ein junger Vogel; und obgleich sein Schnabel verhältnißmäßig kürzer sey, so ist Rec. doch geneigt, das letztere zu glauben.

— III. 1. S. 118. Die Regenschnepe.

Hierher rechnet der Recens. in der Allg. Litt. Zeit. als Varietät, Frisch Vogel Taf. 236, und *Scolopax fusca*, deren Beschreibung Linne' von Brisson entlehnte; und die Nr. 30 steht.

— III. 1. S. 130. Die Dethardingische Schnepe.

(S. die 123ste Kupfertafel.)

Wenn auch dieser Vogel kein junger Zwergbrachvogel (Zwergschnepe) ist, wie doch das natürliche Exemplar, nach der Analogie zu schließen, zeigt, das ich von Herrn Dr. Detharding zum Geschenk bekommen habe, so ist es auch, des krummen Schnabels wegen keine Schnepe, sondern ein Brachvogel, den ich den Dethardingischen Brachvogel (*Numenius Dethardingii*) nenne; er muß also oben S. 102, Nr. 13 beygefügt werden.

Zur

Zur Allgem. Uebers. III. 1. S. 141. Der punktirte Strandläufer.

Der Rec. in der Allg. litt. Zeit. bemerkt, daß der Waldstrandläufer (*Tringa Glareola*, Linn.) Nr. 13 nur einerley Art mit diesem Vogel, und der Vogel in Meyers Zool. Annalen, Taf. 6. Magazin des Thierreichs bey Walther, Taf. 6. nur Abänderung sey.

— III. 1. S. 255. Der gehörnte Steißeuß.

Ein Exemplar aus Canada wich etwas ab: Der Kopf schwarz, grün oder blauschillernd; über den Augen ein rostgelbes Band, welches bis zum Ende des Hinterkopfs läuft und daselbst sich in eine Art Federbusch verlängert; der Hals vorn rothbraun, hinten braunschwarz; Rücken und Flügel schwarzbraun; die mittlern Schwungfedern weiß; Steiß und Bürzel grau; die Seiten des Bürzels und Steißes rostbraun.

— III. 1. S. 264. Der gemeine Säbelschnäbler.

Man sieht diese Vögel auch oft in der Mitte tiefer Sümpfe schwimmen, nicht bloß am Rande.

— III. 1. S. 325. Der gebührte Steißeuß.

Faun. Suec. No. 152. Hier wird *Colymbus subcristatus* als Abänderung des weiblichen *Colymbus auritus* beschrieben; es gehört dieß Synonym also auch zu S. 256. Nr. 7. Der grauehlige Steißeuß. B.

N a c h r i c h t.

Das von dem Herrn Recensenten in der Allgem. litt. Zeit. gewünschte vollständige Register über alle sechs Theile des Latgamschen Werks, so wie die zur leichtern Uebersicht verlangten Kennzeichen Art (*Differentia specifica*) von allen bekannten Vögeln sollen, sobald es meine übrigen nöthigen Arbeiten erlauben, nachfolgen.



123.



Der Dethardingische Brachvogel.