

Al [orenz, Th.]
869 1895

Verzeichniss...

HARVARD UNIVERSITY



LIBRARY

OF THE

Museum of Comparative Zoölogy

Purchase

Boston Society of Natural History

MUS. COMP. ZOOL.
LIBRARY

HARVARD
UNIVERSITY

Verzeichniss
zur Sammlung
abnormer und hybrider
Wildhühner

von

Th. Lorenz.

Tetrao urogallus, Auerhuhn.

Tetrao tetrix, Birkhuhn.

Tetrao medius, Rackelhuhn, Bastard von
Birkhahn und Auerhenne.

Tetrao lagopoides, Bastard von Schnee- und
Birkhuhn.

Tetrastes bonasia, Haselhuhn.

Perdix cinerea, Reb- oder Feldhuhn.

Phasianus chrysomelas, Fasan.

Scolopax major, Doppelschnepfe.

Scolopax gallinago, Bekassine.

R i g a.

Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei (Herderplatz № 1).

1895.

Дозволено цензурою. Рига, 16 Февраля 1895 г.



Ausartungen und Hybriden.

1. *Tetrao urogallus* ♀, alt. Hahnenfedrig. Nishni-Nowgorod.
Färbung genau die des alten Hahnes.
2. *Tetrao urogallus* ♀, alt. Hahnenf. Wladimir.
Etwas heller als Nr. 1 gefärbt.
3. *Tetrao urogallus* ♀, jung. Hahnenf. Archangelsk.
Von der Färbung eines Hahnes, aber kleinwüchsig.
4. *Tetrao uralensis* ♀. Hahnenfedrig. Ufa.
Sehr hell; Hals und Rücken sehr hell aschgrau;
Stosstheil wie beim Hahn, theils wie bei der Henne.
5. *Tetrao medius* (Meyer) ♂, alt. Kostroma.
Sehr gross, dunkel und prächtig violett am Kopf
und Rücken. Stoss lang und etwas auswärts
gebogen, die Federn breit.
6. *Tetrao medius* (Meyer) ♀. Wladimir.
Birkhuhnartig, stark rostig gef.
7. *Tetrao medius* ♀. Nishni-Nowgorod.
8. *Tetrao medius* ♀. Nishni-Nowgorod.
Birkhuhnartig, mehr grau.
9. *Tetrao medius* ♀. Archangel (October).
Fast noch nicht gemausert, altes verblichenes
Gefieder.
10. *Tetrao lagopoides* ♂. Tobolsk.
Vater *Lagopus albus*, Mutter *Tetrao tetrix*.
11. *Tetrao lagopoides* ♀. Ufa (Unicum).
Vater *Tetrao tetrix*, Mutter *Lagopus albus*. Die
Färbung mehr Birkhuhnartig, der Vogel sehr gross.
Stoss länger als beim ♂, Geschlechtstheile mit
Hermaphroditismus. Zehen bis zu den Nägeln
befiedert.

12. *Tetrao tetrix* ♀. Nowgorod.
Kopf und Oberhals wie bei der Birkhenne; der Körper weiss mit schönen schwarzen Spitzflecken und Endsäumen. Stoss weiss und schwarz. Lange Schwingen weiss, an den Schäften und Endungen dunkel. Tarsen weiss.
13. *Lagopus albus* ♂, Winterkleid. Archangelsk.
Kopf weiss mit dunkelrothbraunen regelmässigen Zeichnungen. Kehle einfarbig rothbraun. Vorderhals rothbraun gefleckt. Auf dem ganzen Körper schimmern dunkle Farben durch das Weiss. Kl. Flügeldecken schmal, schwarz gesäumt. Längste Flügeldecken fast schwarz; lange Schwingen schwarz, weiss bespritzt.
14. *Lagopus albus* ♂. (sehr gross. Winterkl.) Januar. Archangelsk.
Kopf schwarzgefleckt. Unterseite mit grossen weissen Flecken.
15. *Lagopus albus* ♂ (sehr gross). October. West-Sibirien.
Die langen Schwingen an der Endhälfte schwarz.
16. *Lagopus albus* ♀ (gross). November. W.-Sibirien.
Lange Schwingen an den Kielen und den Aussenfahnen schwarz.
17. *Tetrao titrix* ♂. Wladimir.
Vom Halse an bis in den Unterstoss weiss, mit schönen feinen schwarzen Zeichnungen in der Mitte des Bauches; die Seiten schneeweiss. Oberflügeldecken und lange Oberstossdecken zur Hälfte weiss. Ausser den beiden äussersten Stossfedern, alle übrigen fast zur Hälfte (am Ende) weiss. Tarsen ganz weiss.
18. *Tetrao tetrix* ♂. West-Sibirien.
Sehr regelmässig und schön gefleckte Unterseite und Weichen. Oberflügeldecken mit weissen Spritz-

flecken. Stosswurzel weiss. Oberstossdecken mit weissen Enden. Stoss weiss gekantet. Tarsen weiss.

19. *Tetrao tetrix* ♂. Ufa,

Vom Vorderhalse an bis an den Bauch weiss, jede Feder fein schwarz gerandet. Seiten schwarz mit weissen Keilflecken; längste Tragfedern mit grossen Endflecken; längste Flügeldecken mit weissen Keilflecken; Secundärschwingen weiss, in der Mitte fein dunkel bespritzt. Die Mittelstossfedern breit weiss gesäumt.

20. *Tetrao tetrix* ♂. Tobolsk.

Brust stark weiss gefleckt. Schulterfedern u. Oberflügeldecken, Seiten- u. Weichenfedern mit weissen Keilflecken. Stoss weiss gesäumt; Tarsen weiss.

21. *Tetrao tetrix* ♂. Tobolsk.

Unten, vom Vorderhalse an weiss gerieselte. Oberflügeldeck und Weichen mit weissen Keilflecken.

22. *Tetrao tetrix* ♂. Nishni-Nowgorod.

Ebenso, die weisse Fleckung aber gröber.

23. *Tetrao tetrix* ♂. Tobolsk.

Ebenso. Tarsen weiss. Lange Oberstossdecken und Stoss weiss gerandet.

24. *Tetrao tetrix* ♂. Schadunsk.

Der ganze Vogel hell bläulichgrau, fein schwärzlich bepudert; Stoss heller, dunkel marmorirt, 1. und 2. Schwinge rein weiss. Tarsen ebenso.

25. *Tetrao tetrix* ♂. Ufa.

Der ganze Vogel rauchgrau; Stoss dunkler.

26. *Tetrao tetrix* ♂. Tobolsk.

Der ganze Vogel sehr stark weiss gefleckt.

27. *Tetrao tetrix* ♂. West-Sibirien.

Der ganze Vogel fein weiss gefleckt.

28. *Tetrao tetrix* ♂. Twer.

Der ganze Vogel weiss gefleckt; Unterstoss federig, an den Enden breit, schwarz gefleckt.

29. *Tetrao tetrix* ♂. Ufa.
Kehle, Kropf und rechte Unterseite weiss gefleckt;
linker Flügel fast weiss, rechter Flügel weniger.
Stoss in der Wurzelhälfte weiss.
30. *Tetrao tetrix* ♂. West-Sibirien.
Kehle weiss; Vorderhals stark weiss gefleckt.
Brustmitte fast weiss. Rechter Flügel mit viel
weiss. Stosswurzel weiss.
31. *Tetrao tetrix* ♂. Simbirsk.
Hinterhals, Rücken, Schultern und Brust weiss
gefleckt.
32. *Tetrao tetrix* ♂. Saratow.
Am ganzen Körper mit grossen weissen Flecken.
33. *Tetrao tetrix* ♂. Tomsch.
Unterseite und Weichenfedern weiss gefleckt;
Tarsen weiss.
34. *Tetrao tetrix* ♂. West-Sibirien.
Hellgrau geflammt. Schwingen hellgrau.
35. *Tetrao tetrix* ♂. West-Sibirien.
Unterseite, Vorderhals, Schultern und Flügel dkl.
blaugrau, schwarz marmorirt, 1. und 2. Schwinge
fast weiss.
36. *Tetrao tetrix* ♂. Wologda.
Kehle und Kropf weiss gefleckt. Mehrere Schwung-
federn weiss.
37. *Tetrao tetrix* ♀. Ufa.
Kopf, Hals, Mitte des Kropfs rein weiss. Im
Uebrigen der ganze Körper mit grossen weissen
Flecken.
38. *Tetrao tetrix* ♀. Simbirsk.
Kehle rein weiss; der ganze Körper vorherrschend
weiss untermischt mit Normalfedern.
39. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Der ganze Vogel weiss gefleckt.

50. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Kehle weiss. Vom Vorderhalse an die ganze Unterseite unregelmässig weiss gefleckt. Schwingen fast rein weiss.
41. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Fast ebenso; die Schwingen weniger weiss.
42. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Grundfarbe ein sehr blasses Ockergelb mit sehr scharfen schwarzen Zeichnungen.
43. *Tetrao tetrix* ♀. Moskau.
Die ganze Färbung und Zeichnung anormal und originell.
44. *Tetrao tetrix* ♀. Twer.
Auf der Unterseite alle Federn sehr breit, weiss. Oberstossfed. und Stoss sehr breit, weiss gesäumt. Tarsen weiss.
45. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Ebenso, die Unterseite aber mit mehr weiss.
46. *Tetrao tetrix* ♀. Kostroma.
Ebenso, aber etwas weniger weiss.
47. *Tetrao tetrix* ♀. Tomsk.
Oberflügeldecken vorn hellgrau mit viel weiss; lange und zweite Schwingen weiss. Stoss zur Hälfte weiss, zum Ende grauschwarz. Tarsen weiss.
48. *Tetrao tetrix* ♀. Archangelsk.
Kopf und Hals braun, sehr fein schwarz gestrichelt und bespritzt. Schultern, Rücken bis in den Oberstoss, auf fein graubraun melirtem Grunde, auf jeder Feder ein kl. weisser Fleck. Unterseite trüb weiss, fein schwärzlich, mandelförmig bespritzt und geflammt. Stoss an der Wurzelhälfte weiss, dann schwarz, fein braun berieselt, dann wiederum weiss und an den Enden fein schwarz gesäumt. Schwingen weissgrau bespritzt.

49. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Melanistisch dunkel gefärbt, d. h. schwarz mit sehr
fein grau geriebelt. Reine Hahnenfedrigkeit.
Geschlechtsorgane normal.
50. *Tetrao tetrix* ♀. Ufa.
Ebenso, die graue Zeichnungen aber etwas gröber.
51. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Dunkler als normale Henne, etwas in Olivfarben,
die dunklen Flecke auf ganz kleine Flecke reducirt.
Stoss einfarbig schwarzbraun, sehr fein braun mar-
morirt. Unterseite weiss, fein dunkel bespritzt.
52. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Ebenso, nur die Farbe etwas bräunlich und heller.
53. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Ebenso, die Unterseite heller.
54. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Die allgemeine Zeichnung viel feiner als bei der
Normalhenne; Färbung dunkler, Unterseite schwarz
mit feinen weissen Keilflecken.
55. *Tetrao tetrix* ♀. West-Sibirien.
Grundfarbe gelbl. weiss mit blassen bräunlichen
Flecken.
56. *Tetrao tetrix* ♀. Ufa.
Grundfarbe sehr hell, lehmfarbig mit sehr blassen
Flecken.
57. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Ebenso, die dunkle Zeichnung aber blasser.
58. *Tetrao tetrix* ♀. West-Sibirien.
Ockergelb mit undeutlichen Flecken.
59. *Tetrao tetrix* ♀. Ufa.
Grundf. hellgelbl. weiss; dunkle Flecken sehr blass.
Am Stoss hell aschgrau.
60. *Tetrao tetrix*. ♀. Ufa.
Grundfarbe etwas bräunlicher als Nr. 59. Flecken
dunkler; Unterseite sehr hell.

61. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Ockergelb mit matt schwarzen und aschgrauen Flecken, Schwingen blass graubräunlich. Stoss mit bl. aschgrauen Flecken.
62. *Tetrao tetrix* ♀. West-Sibirien.
Grundfarbe hellgelblich grau mit undeutlichen Flecken. Schwingen ganz hell.
63. *Tetrao tetrix* ♀. Archangelsk.
Grundfarbe lehmfarbig. Hals und Flügeldecken weisslich dunkle Flecken. Lange Schulterfedern, 2. Schwingen, Rücken und Stoss mit sehr hellen aschgrauen Flecken, 2. Schwinge ganz hell.
64. *Tetrao tetrix* ♀. Perm.
Grundfarbe lehmgelb, mit sehr hellen braunschwarzen Flecken.
65. *Tetrao tetrix* ♀. West-Sibirien.
Grundfarbe hell ockergelb mit blassen Flecken.
66. *Tetrao tetrix* ♀. Ufa.
Färbung etwas dunkler als Nr. 65.
67. *Tetrao tetrix* ♀. Archangelsk.
Grundfarbe lehmgelb; dunkle Zeichnung blass.
68. *Tetrao tetrix* ♀. West-Sibirien.
Grundfarbe hell ockergelb, Fleckung sehr blass. Stoss bläulich aschgrau gefleckt.
69. *Tetrao tetrix* ♀. Ufa.
Grundfarbe lehmgelb mit blasser Fleckung.
70. *Tetrao tetrix* ♀. Perm.
Grundfarbe lehmgelb mit aschgrauen Flecken.
71. *Tetrao tetrix* ♀. West-Sibirien.
Ebenso wie Nr. 70, aber dunkler und Flecke deutlicher.
72. *Tetrao tetrix* ♀. West-Sibirien.
Ebenso wie Nr. 71.
73. *Tetrao tetrix* ♀. Tobolsk.
Ebenso. Unterseite heller.

74. *Tetrao tetrix* ♀. Hahnenf. Unicum. W.-Sibirien.
Färbung im Allgemeinen dunkel, am Hals und Rücken mit Metallglanz. Unterseite fast einfarbig schwarz. Das Merkwürdigste an diesem Vogel ist der Stoss, welcher länger als beim alten Hahn ist; die äussersten Federn haben eine Länge von 24 Cm., dieselben sehr schmal, weich und bandförmig, lose herunterhängend. Solch ein Exemplar ist mir im Laufe von 25 Jahren sonst nicht vorgekommen.
75. *Tetrao tetrix* ♀. Hahnenfedrig. Ufa.
Farbe und Zeichnung der Normalhenne, aber mit colossal entwickeltem Stoss.
76. *Tetrao tetrix* Hermaphrodit. Ufa.
Grösse fast des Hahnes; Färbung der Henne; Stossentwicklung wie beim ♂. Geschlechtsorgane neben weiblichen theilweise männliche.
77. *Tetrao tetrix* ♂. Hennenfedrig. Perm.
Färbung des ♀, auf dem Rücken Metallglanz. Stoss sehr gross.
78. *Tetrao tetrix*. Hermaphrodit. West-Sibirien.
Färbung fast des ♀. Geschlechtsorgane wie bei № 76.
80. *Tetrao tetrix* ♂. Hennenfedrig. Tobolsk.
Färbung dunkler als Normalhenne; Hals und Rücken mit Metallglanz; Hennenfarbe vorherrschend. Geschlechtsorgane etwas verkümmert.
81. *Tetrao tetrix*. Hermaphrodit. Tobolsk.
Grundfärbung schwarz, grau gesandelt; Stoss schwarz und lang, Aussenfahnen braun bespritzt, Geschlechtstheile ♂ und ♀, aber beide verkümmert.
82. *Tetrao tetrix*. Hermaphrodit. Archangelsk.
Kopf, Hals und Stoss schwarz; Hals mit starkem Metallglanz, Stoss lang, der übrige Körper schwarz mit Federn der Normalhenne untermischt. Geschlechtsorgane ♀♂, aber verkümmert.

83. *Tetrao tetrix* Hermaphrodit. Tobolsk (Oct.).
Färbung des normalen ♀. Stosslänge wie beim alten ♂, Mauser etwas rückständig. Geschlechtstheile wie oben.
84. *Tetrao tetrix* Hermaphrodit. West-Sibirien.
Färbung des normalen ♀, Stoss colossal, Farbe dieselbe des ♀.
85. *Tetrao tetrix* Hermaphrodit. West-Sibirien.
Färbung viel dunkler als ♀ und mit Metallglanz am Hals und Rücken; Stoss lang und Aussenfahnen graubraun bespritzt.
86. *Tetrao tetrix* Hermaphrodit. Wladimir.
Färbung des ♀ auf dem Rücken etwas Metallglanz. Stosslänge wie beim alten ♂, fast schwarz mit braunen Flecken. Geschlechtstheile wie Nr. 84, 85 u. 86 männl. und weibl., aber unvollkommen.
87. *Tetrao tetrix* ♀. Hahnenfedrig. West-Sibirien.
Farbe des Hahnes, nur auf Schultern und Rücken etwas grau braun gesandelt. Stoss lang und schwarz. Der Vogel klein.
88. *Tetrao tetrix* ♀, alt. Hahnenfedrig. Tobolsk.
Ebenso, nur am Halse graubraun gesprenkelt. Stoss sehr lang. Grösse des Vogels der Normalhenne.
89. *Tetrao tetrix* ♀. Hahnenfedrig. Ufa.
Ebenso, aber mehr graubraun gepudert.
90. *Tetrao tetrix* Hermaphrodit. Perm.
Kopf und Hals wie beim alten Hahn; der Körper schwarz gemischt mit Federn des normalen ♀. Stoss lang, schwarz, braun gefleckt. Geschlechtstheile wie b. d. Vorigen.
91. *Tetrao tetrix* Hermaphrodit jung. W.-Sibirien.
Färbung des ♀ vorherrschend; Stoss etwas verlängert. Rücken und Hals etwas metallglänzend. Geschlechtstheile wie oben.

- 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104 u. 105
alles tetrao tetrrix ♀. Hahnenfedrig mit stark
entwickeltem Hahnenstoss und mehr oder weniger
dunkel gefärbt.
- 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
auch tetrao tetrrix ♀. Hahnenfedrig, aber mit
kürzerm Stoss als die 92 bis 105.
118. *Phasianus chrysomelas* ♀. Amudarja (Oxus).
Hell ockergelb; alle dunklen Flecken statt schwarz
sehr blass braun.
119. *Scolopax gallinago* ♀. Moskau.
Unterseite rein weiss; Vorderhals weiss gefleckt;
Oberflügeldecken schneeweiss.
120. *Scolopax major* ♂. Twer.
Unterseite von der Kehle an aufweissem Grunde
schwarz gefleckt, Kopfseiten eigenthümlich grob
schwarz bespritzt. Im Allgemeinen sehr wenig
Rostfarbe.
121. *Tetrastes bonasia* ♂. Ufa.
Der ganze Hals, Rücken und der Stoss weiss mit
schönen regelmässigen schwarzen Zeichnungen.
122. *Tetrastes bonasia*. ♂. W.-Sibirien.
Der ganze Vogel (Stoss inbegriffen) auf schwarzem
Grunde mit schönen regelmässigen weissen Punkten
und Flecken.
Ebenso, die weisse Zeichnung jedoch vorherrschend,
am Halse etwas hell rostig.
124. *Tetrastes bonasia* ♀. Kastroma.
Schneeweiss, nur am Hinterkopf kleine graue
Flecken und der Unterrücken und die längsten
Flügeldecken grau, fein bräunlich melirt. Schnabel
und Zehen weiss.
125. *Tetrastes griseiventris* ♂. Kasan.
127. do. do. ♀. Tobolsk.

128. *Tetras. bonasia* ♂. W.-Sibirien.
Von der Kehle an ganze Unterseite weiss, an den Seiten blass gefleckt; Rücken und Flügel sehr hell aschgrau, bräunlich bespritzt. Stoss hell und anormal gefärbt, dazwischen weisse Federn.
129. *Tetras. bonasia* ♀. Ufa.
Sehr blass; am Stoss das schwarze Band — grau; Schwingen rein weiss.
130. *Tetrastes griseiventris* ♂. Kasan.
131. *Tetras. bonasia* ♀. West-Sibirien.
Sehr blass, namentlich der Rücken, welcher sehr hellgrau und fein dunkel und gepudert ist.
132. *Tetras. bonasia* ♂. Tomsk.
Kehle weiss, dieselbe an den Seiten dunkel. Rothbraun gefleckt; die allgemeine Färbung sehr blass; Unterseite sehr stark weiss gefleckt. Stoss anormal gefärbt und gezeichnet.
133. *Tetras. bonasia* ♂. West-Sibirien.
Kehle braun, weisslich gefleckt, die dunkle Zeichnung am Körper durch braun ersetzt.
134. *Tetras. bonasia* ♀. Wologda.
Vorderkopf, Kehle und ganze Unterseite stark weiss gefleckt.
135. *Tetras. bonasia* ♀. West-Sibirien.
Dunkle Zeichnung sehr blass; Rücken sehr hell.
136. *Tetras. bonasia* ♂. Tomsk.
Dunkle Zeichnung sehr blass; auf dem Rücken hell aschgrau, jede Feder schmal schwarz gekantet.
137. *Tetras. bonasia* ♀. Nischny-Nowgorod.
Vom Kopfe an die ganze Unterseite auf weissem Grunde fein und dicht schwarz bespritzt.
138. *Tetras. bonasia* ♂. Tobolsk.
Kehle schneeweiss, an den Seiten fein braun bespritzt; Unterseite weiss, spärlich untermischt mit blasser Zeichnung; Oberseite sehr hell; Stoss anormal gefärbt und gezeichnet.

139. *Tetras. bonasia* ♀. Ufa.
Rücken und Stoss fast einfarbig düster grau; das dunkle Band am Stoss nicht scharf begrenzt. Unterseite weiss gefleckt.
140. *Tetras. bonasia* ♀. Perm.
Unterseite weiss mit schmalen schwarzen Schaftstrichen.
141. *Tetras. bonasia* ♂. West-Sibirien.
Kehle gelblich weiss, schwarz geschuppt; der ganze Vogel hell bl. aschgrau, am Kopf und Hals gelblich angefliegen. Stossband sehr blass.
142. *Tetras. bonasia* ♀. West-Sibiren.
Kehle weiss; die Unterseite stark weiss gefleckt; mehrere lange Schwingen rein weiss; Oberseite sehr dunkel und fein gezeichnet.
143. *Tetras. bonasia* ♂. Archangelsk.
Fast weiss; die dunkle Zeichnung hell aschgrau.
144. *Tetras. bonasia* ♀. Archangelsk.
Ebenso.
145. *Tetras. bonasia* ♂. West-Sibirien.
Ebenso, oben aber etwas gelbbraunlich bespritzt.
146. *Tetras. bonasia* ♂. Nischny-Nowgorod.
Kehle in der Mitte weiss; Unterseite weiss, an den Seiten etwas gefleckt. Einige Schwingen weiss,
147. *Tetras. bonasia* ♀. Archangelsk.
Unterseite weiss mit feinen dunklen Zeichnungen; Rücken anormal gezeichnet.
148. *Tetras. bonasia* ♂. West-Sibirien.
Fast weiss, alle sonst dunklen Zeichnungen hell aschfarbig.
149. *Tetras. bonasia* ♀. Wladimir.
Sonst dunkle Fleckung sehr hell."
150. *Tetras. bonasia* ♀. Nischny-Nowgorod.
Unterseite schneeweiss, an den Seiten kleine Flecken; das Uebrige weit heller als am normalen Vogel.


151. *Tetrast. bonasia* ♀. Perm.
Kehle. Oberhals und Backen schneeweiss; lange Schwingen ebenfalls; Unterseite weiss, undeutlich graubraun melirt. Kropf, Oberkopf, Hinterhals, Rücken hellrosthroth mit feinen dunklen Zeichnungen; Stoss rostbraun mit kleinen dunklen Flecken. Tarsen weiss. Vielleicht ein Hybrid von *Lag. albus* und *Tetrastes bonasia*?
152. *Perdix cinerea* ♀. Tobolsk,
Sehr hell gelblich weiss; Brust und Hals bläulich grau angehaucht. Stoss in der Endhälfte weiss, rothbraun gesäumt.
153. *Perdix cinerea* ♀- Ufa.
Elenso; auf dem Rücken mehr bräunlich, im Stoss die weissen Flecken kleiner.
154. *Perdix cinerea* ♀. Ufa.
Kehle und Backen fast weiss, der ganze Vogel hellaschgrau, nur an den Seiten und der Stoss blassrostbraun.
- 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, alles *Perdix cinerea* mehr oder weniger abweichend gefärbt und gezeichnet.
163. *Perdix dahuricus* ♂. Semiretschensk.



Nachtrag.

164. *Tetrao urogallus* ♂. Auerhahn. November 1894.
Mit ausserordentlich weisser Brust.
165. *Tetrao urogallus* ♀. Auerhenne. Westsibirien 1894.
Sehr hell gefärbt.
166. *Tetrao urogallus* ♀. Auerhenne. Omsk 1894.
Abnorm hell gefärbt.
167. *Tetrao tetrix* ♀. Birkhenne. Smolensk.
Stark gelbe Färbung.
168. *Strix lapponica* ♀.
Lappländischer Kauz. Tobolsk. November 1894.
169. *Bubo sibiricus* ♀.
Uhu aus Sibirien mit stark weisser Brust. Omsk.
November 1894.





3 2044 107 220 725

DIGEST OF THE LIBRARY REGULATIONS.

No book shall be taken from the Library without the record of the Librarian.

No person shall be allowed to retain more than five volumes at any one time, unless by special vote of the Council.

Books may be kept out one calendar month; no longer without renewal, and renewal may not be granted more than twice.

A fine of five cents per day incurred for every volume not returned within the time specified by the rules.

The Librarian may demand the return of a book after the expiration of ten days from the date of borrowing.

Certain books, so designated, cannot be taken from the Library without special permission.

All books must be returned at least two weeks previous to the Annual Meeting.

Persons are responsible for all injury or loss of books charged to their name.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Vertebrata Aves](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [0136](#)

Autor(en)/Author(s): Lorenz Theodor

Artikel/Article: [Verzeichniss zur Sammlung abnormer und hybrider Wildhühner 1-20](#)