download unter www.biologiezentrum.at

Arten der Ornis Austriaco-Hungarica,

welche in West-Sibirien vorkommen; nach Finsch, Brehm und Graf Karl Waldburg.

Auszug aus den Verhandlungen der Wiener k. k. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, 1879, 1. Halbjahr, Seite 134 — 280.)

Von August Friedrich Graf Marschall.

Haliaëtos Albicilla, L. Der häufigste und weitest verbreitete Raubvogel. 5. April am Ural; Ende April in Felsen am Irtisch (zugleich mit Hal. leucoryphus, Pall.); Anfang Julius und im September am Ob, von 67° n. Br. bis zur Baumgrenze einzeln; 9. August Einer in der Tundra.

Aquila Chrysaëtos, L. 4. Mai Arkat-Berge; 20. Juni Kolywan-Schleiferei; Omsk.

Aquila Mogilnik, Gm. ♂, 8. Juni Chines. Altaï, 5000 Fuss Meereshöhe; ♂, 26. Mai Hochsteppe im Tabargatai-Gebirge.

Pandion Haliaëtos, L. Steppe nahe am Irtisch zwischen Omsk und Semipalatinsk, Ende April; am Ob nur Einmal, 7. September; 62° n. Br. bis Polarkreis.

Buteo Desertorum Daud. Lepsa, 17. Mai, uraltes, ausgehungertes, hellfarbiges Exemplar; Jekaterinenburg; Ende April zwischen Omsk und Semipalatinsk (?).

Buteo ferox, Gm. 4. Mai Semipalatinsk, 7. Mai Sergiopol (?).

Buteo vulgaris, L. 7. und 29. Juni im Altaï (?). Im hohen Norden bis jenseits 67° häufig. Horste 17 bis 31. Juli mit 4 Jungen; 1. und 5. August Horste mit 3 Jungen; Hauptnahrung Lemminge; Junge sehr von Mücken geplagt;

Buteo Lagopus, Gm. Zug 8.—16. October zwischen Tjumén und Perm; am Pirby 66—67° n. Br.

Bussarde überhaupt in der Steppe sehr selten.

Falco Gyrfalco, L. Perm 30. März; Samarowa am Irtisch 20. September (?).

Falco sacer, Gm. Arkat-Berge, südl. von Semipalatinsk, 7. Mai; Omsk.

Falco peregrinus, L. Steppe nur Einmal 28. April hinter Omsk; auf der Tundra sehr häufig; horstet auf hohem Fels-Flussufer; 29. Juli 4 Junge in Dunen, 3 dergl. unter 68° n. Br., 4 dergl. 12. August.

Hypotriorchis Sub-buteo, L. vor Jalutorowsk 13. April; Chines. Altai 6 Juni mit flugbaren Jungen; Tschornejar 13. August; Ob 21. Sept. 63—64° n. Br.

Hypotriorchis Aesalon, Briss. 24. Juli 67° n. Br.; 6., 11. und 16. September am Ob; Omsk; wird von Otus brachyotus verfolgt; folgt den Schneeammern bis zur Petschora.

Tinnunculus alaudarius, L. In südl. Steppen nahe an Felsgegenden, auch in den Wäldern des Altaï nicht selten, 16. April bis 26. Mai; 9. Juni im Chines. Altaï, 6000 Fuss Meereshöhe; 30. Juni häufig in der mit Busch und Wald untermischten Steppe zwischen Salair und Tomsk, 6 schwarze Binden.

Tinnunculus Cenchris, Cuv. In der Steppe nicht selten, zuerst 28. April zwischen Omsk und Semipalatinsk; 4. Mai Arkat; 7. Mai Sergiopol in Turkestan.

Tinnunculus vespertinus. 3. Mai, ♂ bei Semipalatinsk; der häufigste Raubvogel in den Steppen; zuerst 25. April in Paaren hinter Omsk; 3. Juni am Kara Biruk in grosser Schaar mit unzähligen Rosenstaaren; 20. Juni Kolywan mit halb-flugbaren Jungen, 30. Juni dergl. bei Tomsk; Omsk.

Astur palumbarius, L. Bei Omsk.

Accipiter Nisus, L. 1877, 3. Mai auf Durchzug bei Omsk 29. Juni im nordwestl. Altaï; 2. September Polarkreis, nicht scheu von Bachstelzen verfolgt.

Circus aeruginosus, L. Omsk; 28. April vor Semipalatinsk; 8. Mai Steppe hinter Sergiopol.

Circus cyaneus, L. 30. Juni zwischen Salair und Tomsk; gegen Norden seltener; nicht über 67° n. Br.

Circus cineraceus, Naum. 6. Mai Arkat-Berge; Omsk; nicht selten in den Steppen und im Chines. Altaï; am nördlichsten Bolschoi Ustram am Ob, 11. September.

Surnia Ulula, L. Jekaterinenburg; Omsk; 9. Juli Bercosoff (?); 30. Juli Ural, 63—64° n. Br.

Nyctea Scandiaca, L. August, nur 3 Mal auf der Tundra, ein Pärchen Omsk; Jekaterinenburg; selten im Gebirg, 68—70° n. Br. und in der Petschora-Tundra; verzehrt Lemminge; aus den Flügeln verfertigt man Mückenfächer; rein weiss, Flügel fleckig.

Nyctale Tengmalmi, Gm. ♂ am Irtisch, 28. September.

Bubo maximus (sub-sp. Turcomana). Ein Exemplar im Museum zu Omsk, auffallend hellfarbig.

Otus accipitrinus, Pall. 16. September am Ob, in voller Mauser; 18. Juli bis Anfang September häufig auf der Tundra; 6.—16. September am Ob.

Caprimulgus Europaeus, L. Omsk, 11. Mai ein ♀.

Hirundo rustica, L. Ueberall bei und in menschlichen Wohnungen, 7. Mai bis 10. Juli; 20. Mai Nestbau in Turkestan, kömmt dort 3 Wochen später an als am Kaspischen Meere; Omsk, Ankunft 1877 am 7. Mai.

Cotyle riparia, L. Von 46—67° n. Br.; 10. Mai brütend an den Ufern des Ala-Kul, häufig; 3. Juli Nestbau am Ob, bis 12. August; 1877 Ankunft zu Omsk; 11. Mai.

Cotyle rupestris, Scop. Am Alpen-See Dschasil-Kul.

Chelidon urbica, L. Omsk, häufig in einzelnen Oertlichkeiten; 26. Mai zahlreiche Nester in den Felsen vor Saissan; Nestbau 12. Juni Altaïske-Staniza an Häusern und in den Felswänden des Irtisch, 10. Juli Bercosoff am Ob an Häusern.

Cypselus Apus, L. Omsk; Jekarinenburg; 9. Juli in der Steppenwüste nördl. von Saissan Nor (?).

Coracias garrula, L. Oefter im südl. Siberien; nistet in den steilen Ufern der Steppenflüsse; 12. Mai bis 29. Juni; Omsk.

Alcedo Ispida, L. Omsk.

Merops Apiaster, L. 12., 17., 18. Mai in Steppen, südl. von Ala-Kul und in den Vorbergen des Altaï.

Upupa Epops, L. Sehr häufig in den Steppen, 10. Mai bis 19. Juni; Semipalatinsk.

Sitta Europaea, L. Einzeln am Ob, mitunter zu Meisen gesellt, 16. September bis 1. October; im westl. Ural bis 62° n. Br.; Mittelform zwischen denen aus Schweden und aus Kamtschatka; gilt für einen Zaubervogel.

Certhia familiaris, L. Omsk.

Troglodytes Europaeus, Koch. Nur Einmal; 8. Juni Chines. Altaï, Meereshöhe 5000 Fuss.

Sylvia nisoria, Bchst. 7. Juni Chines. Hoch-Altaï, 5000 Fuss Meereshöhe.

download unter www.biologiezentrum.at

Sylvia atricapilla, L. Omsk.

Sylvia hortensis, Gm. Omsk; 8. Juli am Ob (?).

Sylvia cinerea, Lath. Häufig in den Steppen und in den Vorbergen und buschigen Thälern des Altaï bis Barnaul, 6. Mai bis 13. Juni.

Sylvia Curruca, L. Omsk, Ankunft 1879 am 12. Mai; Ala-Kul in Turkestan, 9. Mai bis Obdorsk, über 66° n. Br. 16. Juli. Nach Henderson in Yarkand).

Sylvia Trochilus, L. ♀, Kuschowat, 11. Juli bis Schtutschutschja, 20. Juli, ♂ am kleinen Ob, 12. August bis Parawatsky-Jurti; 6. September am Ob bis 16. September, August und September Mauser; ziemlich häufig bis zur Baumgrenze; an den Quellen der Petschora.

Regulus cristatus, Br. Omsk; in Siberien sehr selten (nach Schrenk im Amur-Land).

Acrocephalus arundinaceus, L. Häufig (?) in den Rohrwäldern am Ala-Kul; 8. Mai, am Kara-Irtisch 1. Juni; am Saissan Nor 2. Juni.

Calamoherpe palustris, Bchst. Omsk; grasige Steppen, 20. Mai und 5. Juni.

Sylvia Locustella, Lath. Röhricht am Ala-Kul, 9. Mai.

Calamoherpe Schoenobaenus, Lath. In Weiden-Dickicht; 19. Juli und 15. August in vollem Brüten.

Cyanecula Suecica, L. Echte Suecica-Form; 25. bis 31. Juli und 23. October in der Mauser; Omsk, Ankunft 1877 am 16. Mai; Semipalatinsk 1. Mai, bis Wandiarskia Jurta 5. September; Altaï bis 5000 Fuss Meereshöhe 9. Mai; Podarata, 68° n. Br. 3. und 4. August; Junge 26. Juli, flugbare, 3. August; an der Petschora, 62° n. Br.

Luscinia Philomela, Bchst. Nicht selten an den bewaldeten Flüssen mit Unterholz im südl. Theile von West-Siberien, 18. Mai bis 5. Juni und im Gebüsch der Vorberge des Altaï 18. und 19. Juni; zwischen Salair und Tomsk häufig.

Ruticilla Phoenicurus, L. Omsk, nur auf Durchzug, 30. April bis 12. Mai; Kolywan-Schleiferei, 20. und 21. Juni; Petschora-Quellen, 62° n. Br.

Ruticilla Tithys. Omsk.

Saxicola Oenanthe, L. In der Steppe, im Hochgebirg und auf der Tundra häufig, bis 5000—6000 Fuss Meereshöhe, 14. April bis 11. September: Anfang Juni im Hochgebirg brütend; Omsk Durchzug 1877 vom 7. bis 16. Mai.

Pratincola rubetra, L. Omsk.

Pratincola rubicola, L. Omsk; häufig in den Steppen, besonders wo Gras und Rheum; im Hochgebirg (über 5000 Fuss) und den Vorbergen des Altaï und am Ob, 6. Mai bis 11. Juli; besonders häufig zwischen Salair und Tomsk; Omsk, nistet 19. bis 20. Mai; in Indien Wintergast.

Parus major, L. Wälder zwischen Nischnej-Nowgorod und Kasan, 22. bis 29. März, und im nordwestl. Altaï, 22. Juni; am Ob, 21. bis 25. September; Omsk, 1877 Ankunft 29. März.

Parus ater, L. Selten; Ob, ♂, 18. September; Irtisch, ♂, 1. October.

Parus cyanus, Pall. Omsk, nicht selten, 1877, einzeln 17. April, in Flügen 2. bis 10. Mai; Tjumén an der Tura, October.

Aegithalus biarmicus, L. Blässere Färbung; nur am Nor-Saissan-See im Röhricht; im Magen Samen von Rohr, ♂ mit kahlem Brutfleck am Bauch.

Motacilla alba, L. Häufig, ausser im Hochgebirg; Tjumén, 13. April bei —8° R. Häufig längs dem Ob, 13. April bis 25. September; bis über die Baumgrenze; Omsk 1877 Ankunft 29. April; volles Brautkleid des ♂, 15. April; Tschugor, 63° n. Br.

Motacilla flava, L. Abänderungen: Mot. cinerea-capilla, Finsch, Mot. viridis, Dress., Mot. flava melanocephala, Licht., letztere bis 4000—5000 Fuss Meereshöhe.

Anthus trivialis, L. ♀, 5000 Fuss Meereshöhe im Altaï, 9. Juni; Kara Irtisch, 1. Juni; ♂ Dschasil-Kul, 14. Mai; Omsk, 1877 Ankunft 17. Mai bis 29. Mai in Menge; häufiger im Gebirg, 14. April bis 11. Juni; bebrütete Eier 9. Juni; Quelle der Petschora.

Anthus cervinus, Pall. Häufig am untern Ob, 19. Juli bis 21. September.

Anthus campestris, L. ♂, Steppe hinter Sergiopol, 7. Mai; Arkat-Berge 4. Mai und zwischen Salair und Tomsk 30. Juni (?).

Anthus Spinoletta, L. (?). Altaï, 4000 Fuss Meereshöhe, 7. Juni; Ural 61—63$^3/_4$° n. Br.

Turdus viscivorus, L. Dschasil-Kul, 5000 Fuss Meereshöhe, 14. Mai 1 Stück; Hoch-Altaï 10. Juni; Wald von Salair, 29 Juni (?).

Turdus musicus, L. Nur Ein ♂ am Ob, 17. September; zwischen Barnaul und Salair 29. Juni (?); Omsk, 1877, 30. April bis 2. Mai; Quelle der Petschora, 62° n. Br.

Turdus pilaris, L. Brütet im Gebiet des Ob, 8. Juli bis 1. October; 13. October Tjumén; 16. October zwischen Jekaterinenburg und Perm; Omsk, 1877 Ankunft 30. April bis 2. Mai auf Zug mit Turdus musicus.

Turdus dubius, Bchst. Ein Stück im ersten Herbstkleid, ♂ Boltschoi-Ustram, 11. September.

Turdus Merula, L. Omsk.

Petrocincla saxatilis, L. Selten, ♂, Manrak-Gebirg, 28. Juni; Arkat-Berge, 4 Mai; Sergiopol in Steppe mit Felsen, 7. Mai.

Cinclus aquaticus, L. Omsk (?); Junge an der Quelle der Petschora.

Oriolus galbula, L. 1. Juni auf hohen Bäumen am Ufer des Kara-Irtisch; 5. Juni Vorberge des Altaï 19. Juni Kolywan; 29. Juni nordwestl. Altaï; Omsk.

Muscicapa grisola, L. In West-Siberien sehr selten; Hoch-Altaï, 8. Juni (?); Omsk, 1877, zuerst 3. Mai.

Muscicapa atricapilla, L. Omsk.

Lanius Excubitor, L. Zwei ♂ in theilweiser Mauser, 6. und 20. September; im Ural bis 63$^1/_2$° n. Br.

Lanius Homeyeri, Cab. Ein ♂, 23. April, Belo-Kamene am Irtisch, von L. Excubitor verschieden durch weissliche Stirn und weisse obere Schweifdecken.

Lanius Collurio, L. Mehrmal zwischen Altaiske-Staniza und Kolywan-Schleiferei, 13.—20. Juni.

Lanius minor, Gm. Omsk, 1877 Durchzug 1.—3. Mai; 28. April 25 Stationen hinter Omsk; 5. Juni an einen Steppenbach nördl. von Saissan-Nor.

Ampelis garrula, L. Am Ob bekannt; Umgebung von Jekaterinenburg.

Corvus Corax, L. Ueberall, ausser in der eigentlichen Steppe und im Gebirg, gern in Wäldern und an menschlichen Wohnungen, 19. März bis 16 Oct.; 19.—23. März zwischen Nischney-Nowgorod und Kasan nistend und brütend; 8. August Einer auf der Tundra nahe der Baumgrenze; Quellen der Petschora, 62° n. Br.; wegen des Propheten Elias heilig gehalten.

Corvus Corone, L. Saissan-Ala-Kul, im Rohr; Steppe bei Agin-Su, 19. Mai; grosse Brut-Colonie auf

download unter www.biologiezentrum.at

Bäumen am Kara-Irtisch, 1. Juni, desgleichen am Bakun-Fluss; vertilgt Heuschrecken.

Corvus frugilegus, L. Oertlich in grosser Menge; Moskau 22. März; an der Strasse von Nischnej-Nowgorod bis Kasan 24. März; in Kasan grosse Brut-Colonien in Birken-Alleen; fehlt um Perm, 1.—3. April; Ural, 1260 Fuss Meereshöhe, häufig, 5. April; fehlt auf baumloser Steppe; Ischim in Paarung; liebt Baumgruppen zur Anlage von Brut-Colonien; Bercosoff, 64° n. Br., grosser Flug 13. September; desgleichen zwischen Tobolsk und Tjumén.

Corvus Cornix, L. Sehr häufig, häufiger als Dohlen und Elstern; Moskau bis Tjumén, 19. März bis 30. September; bis 1260 Fuss Meereshöhe; Junge 23. August; Mauser 16. August bis 7. September; Tobolsk auf Rückreise 7. September; 16. October grosse Flüge auf Zug zwischen Jekaterinenburg und Perm; keine Hybride von C. Cornix und C. Corone.

Corvus Pica, L. Nischnej-Nowgorod bis über den Ural; Tscherdin, 62° n. Br. trifft in Ural mit Pica leucoptera zusammen.

Pyrrhocorax Alpinus, Vieill. Manrak-Berge, 28. Mai; Tau-Teké-Gebirg, 11. Juni.

Fregilus Graculus, L. Tau-Teké-Gebirg, Meereshöhe 8000 Fuss, bei sehr tiefem Schnee, auf Felswänden, 11. Juni; Hoch-Altaï, 7.—10. Juni (?).

Nucifraga Caryocatactes, L. Nicht selten am Ob von Kischgort bis Samarowa, 6.—30. September, wenig scheu, meist vermauserte Junge; 8. September vor Kuschowat Flug von 60—80 Stück; Quellen der Petschora; 62° n. Br., 12. Juni; Kirgisen-Steppe, grosse Flüge von Ost nach West.

Garrulus glandarius, L. Einzeln zwischen Kasan und Perm, 28. und 29. März; vor Jekaterinenburg 13. October; trifft im östl. Europa, Russland und am Ural mit Garr. Brandti zusammen.

Perisoreus infaustus, L. Scharkalskaja ♂, in Mauser; Samarowa, 26. September; Kloster Kondinsky ♂ 8. ♀, 18. September, im Magen Preisselbeeren, Reste von Käfern und Haare von Mäusen.

Sturnus vulgaris, L. In Siberien beliebt und überall mit Nistkästen versorgt, weniger in den Kosaken-Dörfern; die ersten bei Kasan, 27. März; liebt hohe Bäume; Ala-Kul, 9. Mai; Lepsa, in Nistkästen auf Stangen; öde Hochsteppe Tarbagatai, 23. Mai; Bäume und Felsen am Ufer des Irtisch, 1. bis 16. Juni, zwischen Salair und Tomsk, Junge mit den Alten ausfliegend, 29. und 30. Juni

Pastor roseus, L. Alle Exemplare abgerieben, ♀ wie ♂ gefärbt; Omsk; häufig, nicht regelmässig in den südl. Steppen, auch in den buschigen steppenähnlichen Steppen, am nördl. Abhang des Altaï; 8.—10 Mai, Ala-Kul, in Fortpflanzung; zahlreich (zuweilen mit Staaren zusammen) 12. Mai, Aul Uwanas; 26. Mai, Felsen vor Saissan; 3. Juni Karabiruk; 26. Juni an den felsigen Ufern des Irtisch; zuletzt gesehen bei Barnaul und 19. Juni zwischen Smeinogorsk und Kolywan- Schleiferei.

(Fortsetzung folgt.)

Vereinsangelegenheiten.

Rechenschaftsbericht

des Ausschusses für das Jahr 1879, vorgelegt in der IV. ordentlichen Generalversammlung.

Geehrte Versammlung!

Gleich wie im Leben des Einzelnen nicht jedes Jahr ein ereignissreiches ist, in dem einen Jahre besonders hervorstechende Ereignisse zu verzeichnen sind, während ein anderes ruhiger und stiller verläuft, ebenso verhält es sich im Leben der Vereine.

Das verflossene vierte Jahr des ornithologischen Vereines ist ein solches, in welchem nach keiner Richtung hin ein epochemachendes Vorkommniss hervortrat; nichtsdestoweniger hat sich unser Verein in demselben stetig fortentwickelt und ist das Ergebniss des Jahres ein günstiges und erfreuliches.

Hatten wir im vorigen Jahre zwei ausserordentliche Ereignisse, die Uebernahme des Protectorates durch Se. kais. und königl. Hoheit den durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Kronprinzen Rudolf, und über die erste Ausstellung unseres Vereines zu berichten, so haben wir diessmal lediglich auf den ruhigen, regelmässigen Verlauf des abgeschlossenen Jahres zurückzublicken, wenngleich auch in diesem Jahre ein bedeutsamer Schritt durch die Erwerbung eines eigenen Vereinslocales, wovon wir später berichten, geschah.

In erster Reihe müssen wir unserer öffentlichen Monatsversammlungen gedenken und dabei mit Vergnügen constatiren, dass die Theilnahme an denselben sowohl von Seite der Mitglieder, als auch von Seite nicht dem Vereine angehörender Gäste im merklichen Steigen begriffen ist — obschon ein noch zahlreicherer Besuch immerhin wünschenswerth wäre.

Die Versammlungen fanden wie gewöhnlich an den zweiten Freitagen der Monate Jänner, Februar und März, im April des Charfreitages wegen am Samstag den 5., in den Monaten Mai, Juni, October, November und December wieder an den zweiten Freitagen statt. Eine kurze Erinnerung an diese Abende, an das, was sie ihren Besuchern Anregendes und Interessantes boten, mag hier am Platze sein.

Am 10. Jänner wurden vom Herrn v. Pelzeln drei Exemplare vom sibirischen Gimpel (Pyrrhula major, Brehm), welche Herr v. Tschusi-Schmidhoffen nebst weiteren zwei Stücken in seinem Garten bei Hallein im December 1878 geschossen hatte, sowie mehrere Exemplare verwandter Species vorgezeigt und eingehend besprochen. — Zwei vom Herrn Badhausbesitzer Weber dem Vereine durch Herrn Hodek's gefällige Vermittlung geschenkte Eier, die ein rother Ara in der Gefangenschaft gelegt hatte, wurden vorgelegt. — Herr Jos. Kolazy hielt einen interessanten Vortrag über „das Wandern der Vögel", welcher durch ein Verzeichniss unserer sämmtlichen Zugvögel bereichert, in der Zeitschrift des Vereines erschien. — Secretär Dr. von Enderes legte zwei werthvolle Werke vor, welche dem Vereine durch ihre Verfasser zum Geschenke gemacht worden waren, nämlich Altum's ausgezeichnete „Forstzoologie" und Russ' schöne „fremdländische Stubenvögel".

Auf den 14. Februar war die III. ordentliche Generalversammlung des Vereines anberaumt, auf deren Tagesordnung ausser den eigentlich geschäftlichen An-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: 004

Autor(en)/Author(s): Marschall August Friedrich

Artikel/Article: Arten der Ornis Austriaco - Hungarica, welche in West-Sibirien vorkommen 18-20