

## Arten der Ornis Austriaco-Hungarica im Gebiet von Astrachan

(nach K. Seeböhm und K. G. Henke — Ibis, 1882, April, p. 204—232).

Von August Grafen Marschall.

(Fortsetzung.)

- Garrulus glandarius.** Ebenso.  
**Corvus Pica.** Sehr gemeiner Standvogel.  
**Corvus Cornix.** Aeusserst gemeiner Standvogel.  
**Corvus cornix.** Im Sommer gemein.  
**Corvus Monedula.** Standvogel, überall gemein.  
**Columba Palumbus.** Sehr gemeiner Standvogel.  
**Columba Oenas.** Auf Zug, besonders im Herbst.  
**Turtur auritus.** Sehr gemein im Sommer.  
**Tetrao Tetrix.** Sarepta, im Winter; selten.  
**Perdix cinerea.** Sehr gemein, besonders im Winter; brütet auf allen bewaldeten Stellen der Steppen.  
**Perdix Coturnix.** Sehr gemein im Sommer.  
**Phasianus Colchicus.** Sehr gemein in den sumppigen Niederungen unterhalb Astrachan; eine kleine Race im Thal des Terekflusses.  
**Otis tarda.** Sehr gemein, besonders in den Steppen; einzeln im Winter bei Astrachan.  
**Otis Tetrax.** Etwas selten in der Brutzeit, gemein auf Herbstzug.  
**Oedicnemus crepitans.** Sehr gemein im Sommer.  
**Charadrius Morinellus.** Astrachan auf Frühlings- und Herbstzug; einige sollen in den Steppen brüten.  
**Charadrius Hiaticula.** Im Sommer häufig an der Wolga und in den Steppen.  
**Charadrius Cantianus.** Sehr gemein im Sommer in den Kirgisen-Steppen, besonders an den Salzseen; legt nie mehr als drei Eier.  
**Charadrius minor.** Im Sommer sehr gemein im Delta der Wolga, und auf den Seehunds-Inseln des Kaspischen Meeres.  
**Vanellus cristatus.** Sehr gemein im Sommer.  
**Squatarola Helvetica.** Im Herbst sehr gemein in Astrachan; im Frühling, mitunter bis Julius.  
**Recurvirostra Avocetta.** Im Sommer überall sehr gemein, brütet in Kolonien.  
**Haematopus ostralegus.** Im Sommer überall gemein.  
**Himantopus vulgaris.** Gemein in den Sümpfen der Kirgisen-Steppen, seltener im Wolga-Delta; fehlt im Winter.  
**Totanus fuscus.** Gemein auf Herbst-Zug; brütet vermuthlich in den Steppen.  
**Totanus Calidris.** Im Sommer in den Steppen  
**Totanus stagnatilis.** Im Sommer in den Steppen  
**Totanus Glottis.** Im Herbst-Zuge sehr häufig.  
**Totanus Glareola.** Herbst- und Frühlings-Zug; einige wenige brüten in den Steppen.  
**Totanus ochropus.** Im Sommer sehr gemein.  
**Actitis hypoleucis.** Nur im Frühjahr und Herbst.  
**Phalaropus cinereus.** Auf Zug, besonders im Frühjahr; in der Kirgisen-Steppe oft im Junius, mitunter auch im Julius.  
**Phalaropus rufescens.** Mitunter nicht selten in den Kirgisen-Steppen.  
**Calidris arenaria.** Sarepta.  
**Limosa melanura.** Frühlings- und Herbst-Zug um Astrachan, sehr gemein im Herbst, brütet zahlreich in den Kirgisen-Steppen.  
**Limosa Lapponica.** Nur im Herbst; sehr selten.  
**Machetes pugnax.** Um Astrachan im Herbst sehr gemein; brütet in den Kirgisen-Steppen.
- Tringa sub-arcuata.** } Nur im Frühlings- und  
**Tringa alpina.** } Herbst-Zug.  
**Tringa Temmincki.** }  
**Tringa minuta.** Nur auf Zug.  
**Scolopax rusticola.** Sehr gemein im Herbst, besonders in den Weinbergen.  
**Scolopax Gallinago.** Sehr gemein auf Herbst-Zug.  
**Gallinago major.** Sehr gemein auf Herbst-Zug.  
**Gallinago Gallinula.** Sehr gemein auf Herbst-Zug.  
**Numenius arcuatus.** Ziemlich zahlreich im Frühjahr und Herbst; brütet in den Kirgisen-Steppen.  
**Numenius phaeopus.** Gemein im Herbst-Zug.  
**Numenius tenuirostris.** Nicht selten im Herbst-Zug.  
**Ibis Falcinellus.** Sehr gemein im Sommer, brütet in zahlreichen Kolonien in Gesellschaft von Reiher.  
**Ardea cinerea.** Sehr gemein im Sommer.  
**Ardea purpurea.** Im Sommer nicht sehr gemein.  
**Ardea alba.** Im Sommer sehr gemein, brütet auf Weiden und in baumlosen Gegenden auf niederbeugtem Rohr.  
**Ardea garzetta.** } Gemein im Sommer; brüten nur  
**Ardea comata.** } auf hohen Weiden.  
**Ardea minuta.** Sehr gemein im Sommer; brütet im Rohr, am liebsten in einer Höhlung unter dem Nest eines grösseren Reihers.  
**Nycticorax griseus.** Sehr gemein im Sommer.  
**Botaurus stellaris.** Sehr gemein im Sommer; brütet einsam im Röhricht; sein Nest ist sehr versteckt.  
**Ciconia nigra.** Nicht selten im Spätsommer und im Herbst; soll bei Astrachan brüten. Im Sommer häufig auf den Kirgisen-Steppen.  
**Platalea Leucorodia.** Sehr gemein im Sommer; brütet sowohl unter Reiher als in abgesonderten Colonien.  
**Crex pratensis.** Auf Frühlings- und Herbstzug; soll bei Sarepta brüten.  
**Ortygometra Porzana.** Brütet ziemlich zahlreich in den Kirgisen-Steppen; fehlt im Winter.  
**Ortygometra minuta.** Auf Zug bei Astrachan, besonders im Herbst; einige brüten, die meisten ziehen in die Steppen.  
**Rallus aquaticus.** Brütet häufig bei Astrachan, bisweilen bis spät in den Herbst; überwintert mitunter.  
**Gallinula chloropus.** Sehr gemein im Sommer an der Wolga.  
**Fulica atra.** Sehr häufig, überall, wo beständiges Wasser; fehlt im Winter.  
**Cygnus Olor.** Gemein im Sommer; brütet im Delta der Wolga.  
**Cygnus musicus.** Nur auf Sommer- und Herbstzug.  
**Cygnus minor.** Nur auf Zug, und weniger gemein als die grösseren Arten.  
**Anser cinereus.** Sehr gemein im Sommer; brütet in Delta der Wolga.  
**Anser albifrons.** Nur im Herbst.  
**Anser erythropus.** Nur im Herbst; zahlreicher als Anser albifrons.  
**Bernicla ruficollis.** Nicht selten auf Frühlings- und Herbstzug.

(Schluss folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [006](#)

Autor(en)/Author(s): Marschall August Friedrich

Artikel/Article: [Arten der Ornis Austriaco-Hungarica im Gebiet von Astrachan \(nach K. Seebohm und K.G. Henke - Ibis, 1882, April, p. 204-232\) \(Fortsetzung\) 106](#)