

Höhe des Schnabels	0·5 Cm.
Tarsus	4·0 "
Mittelzehe mit Nagel	2·3 "
Nagel an der Mittelzehe	0·5 "

Sein Körper war gut genährt, stellenweise mit einer Fettschichte überzogen; die Testikeln unbedeutend angeschwollen.

Im Magen befanden sich stark verdaute Käferreste. Um mich von der Beschaffenheit des Fleisches, das nach Dr. Fritsch unter die größten Leckerbissen gehört, zu überzeugen, liess ich den ausgebalgten Rumpf zubereiten und fand den kleinen Braten in der That ausserordentlich zart und schmackhaft. (Schluss folgt.)

Die Ostgrenzen der böhmischen Vögel. I.

Von Dr. Joh. Palacky.

1. **Gyps fulvus**, Gray (Handlist 8, Heuglin NO-Afrika 1) f. *occidentalis*, Jerdon 3.

(= *indicus*, Temm. non Scop., = *persicus*, Pall. [ex Schlegel] ? *nivicola* Severzow-himalajensis Hume, [David 8] ? *indicus* Hume [Tenasserim]).

Himalaja (Jerd.), Birma (Gray), Nepal, Sindh (Schlegel), Persien (Filippi), Schiras (Blanford), Palästina (Tristr.), Kleinasien (Danford), Baschkirenland (Brandt), Turkestan (Severzow ex Dresser), (? fehlt Ostsibirien) (Taczanowsky), Westsibirien (Finsch), China (David), Japan (Blakiston).

Böhmen Nordgrenze.

Südgrenze ganz Afrika, Algier (Loche), Egypten, Sahara (Tristran), Tunis, Fez, Cadsee, Aschanti, Niger (Allen), Zambesi, Nubien, Abyssinien (12000'), Nilgebiet, Cordofan, Südafrika (Heuglin).

2. **Vultur monachus**, Gr. (Handlist 3, Heuglin 5, Jerdon 1, David 7).
= *cinereus*, Gm.

Mongolien (Alaßan, Mnniula, Caidom - Prewalsky), China (selten), Ningpo, Cekieng — aus Mangel an Aesern und Amphibien (Hume), Indien (Himalaja, Suporn, Mhor, Nepal (Hodyson), Persien, Elburs (Blanford), Palästina, Kleinasien (Xanthus), Turkestan, Baschkirenland.

Südgrenze Nordafrika Algier (Loche), Egypten (selten, Heuglin), Zugvogel, ? Nubien (Hartmann), Abyssinien (Lefebvre).

3. **Aquila chrysaetos** (L.), Pallas, Handlist 87, Heuglin 24, Jerdon 26, David 10, Taczanowsky 2.
= *fulva*, Meyer, *canadensis* L., *nobilis*, Pall.

Ostsibirien (Onon Radde, Daurien, Baikal Radde), Amur, Japan (Blakiston, Mongolien, Westosina (David), Himalaja (Jerd.), Nepal (Hodgson), Mekran (Blanford), Kleinasien, Turkestan, Westsibirien (Finsch), Palästina, Peträisches Arabien (Heuglin).

Westgrenze N.-Mexiko, Utah, Californien, Arizona (Coes), Mexiko (Schlegel), Labrador, Nordost-Amerika (selten; Andubon).

Südgrenze Tunis, Tripolis, Egypten (selten, im Winter, Heuglin).

4. **Aquila imperialis**, Cuv. (88 Handl., 27 Jerd, 11 David, 25 Heuglin, 4 Taczanowsky ?.

? *adalberti* (vetus).

= *heliaca* Sav., *mogilnik* Gm.,

Ostsibirien (Onon, Dybovsky), Argun (orientalis), Daurien, Baikal (Taczan.), Tareinor (Radde), China (11 Dav.), Indien (Jerd.) Tavoy, Mulmein (Hume), Nepal (Hodgs.), Altai (Kaukasus), Westsibirien (Finsch), Kernian (Blanford), Kleinasien, Palästina, Turkestan (Sev.).

Südgrenze Egypten, Nubien, Kordofan, Abyssinien (Heuglin).

5. **Aquila naevia**, Br. (= *clanga*, Pall., 91, 92 Handlist, 12, 13 Oustal, 28 Jerd, 25, 26 Heugl. (94) (Less. ex Sharpe), *fulvescens* (Gr. Dybovsky ex Taczanowsky).

Ostsibirien (Tacz., Radde, Prewalsky, Schrenk), Kamtschatka, Amur, Ussuri, Nerinsk, Tareinor (Radde), China (als *clanga* Nordwest, *naevia* nie), Indien (Nepal Hodgson), Cochinchina Oustalet), Tenasserim (Hume), Turkestan, Mongolien, Palästina, Kleinasien, Bagdad (Loftus), Beyrut (Gurney), Schiraz (Blanford).

Algier, Tunis, Egypten, Nubien, Abyssinien (12.000', Süd., Ost- und West-Afrika (Heuglin).

6. **Aquila bonelli**, Bpte (99 Handlist, Heuglin 29, Jerdon 33).

= *nepalensis* Hodgs. ex Gray, = *fasciata* Vieill. ex Blanford, *wiedii* Brehm ex Heuglin).

Indien (Himalaja, Nepal, Nilgeries), Ceylon (Tennent), Westsibirien (Finsch), Beludschistan (Blanford ex), Palästina, Petr.-Arabien (Tor), Arabien (Blasius) fehlt Ostsibirien (Taczan.); China, Japan.

Südgrenze ganz Afrika (Heuglin), Algier (Loche), Senegal (Hartlaub), Egypten, Winter nicht häufig (Heuglin), Nubien, Sennaar (Antinori), Südafrika (Layard).

7. **Haliaeetus albicilla**, L. (144 Handl. Taczanowsky 9, 14 David, 31 Heuglin),
(fehlt Jerdon).

Ostsibirien Schrenk, Prewalský etc. Abrakbari Dybovský; Kamtschatka (Kittlitz), Baikal Čirgan, Amur, Tureja, Ochoek (Middendorff), Ussuri (Radde), Selenga, Japan (Schleg F. Jap.) Jezo (Blakiston), China (Wandervogel David), Indien (Sindh Schlegel — Beludschistan).

Fehlt Palästina, Kleinasien Aralsee, Orenburg, Aleuten (nicht weiter Amerika) Grönland, Island.

Südgrenze — Algier (Schleg.), Unteregypthen (Menzale nicht weiter am Nil, Henglin).

8. **Pandion haliaetus**, Cuv., 131. Handl. 33. Heuglin, 40. Jerd, 19. Dav., 40. Hume, 11. Taczanowsky.
? *solitarius* Peale, *Sandwich-Orientalis* Tem. *Schl. carolinensis* Gmel.

Kosmopolit (Cabanis, Coes, eto exclus. Madagaskar (Heuglin).)

Sibirien (Pečora [Finsch]), Baikal, Kamtschatka (Kittitz) Ussuri, Amur, Japan (F. Jap.), China, Formosa, Indien, Nepal (Hodgson) Tenasserim (Hume), Arakan, Birma (Anders.), Beludschistan, Singapur, Java, Borneo, Ternate, Ceram, Celebes, Neu-Guinea, Australien, Tusanien, Neu-Caledonien.

Palästina, Turkestan, Cuban ? (Brandt). Ganz Amerika. (Grönland, Oregon, Californ., Antillen, Honduras, Brasilien [Sharpe]). Ganz Afrika, Algier, Egypten, Abyssinien, Capverden, Guinea, Somaliland. (Heugl. Natal.)

9. *Circaetus gallicus*. Gm. (119 Hl., 38 Jerd., 51 Heugl. 29 David.)

= brachydauctylus Tem.

fehlt Sibirien (Finsch, Taczanowsky, Radde excl.) Mongolien, China, Indien (Nepal). Calouke (E. J. M.), Timor, Flores (Schlegel.)

? Arabien, Palästina, Turkestan, (Severzow.)

Südgrenze ? Egypten, Abyssinien, Kordofan, Ostsenar, Senegal, Damara, Cap.

10. *Archibuteo lagopus*, Gm. (81 Handl., Taczanowsky 15.) nach Taczanowsky bei Pallas (Daurien) verwechselt mit *Buteo hemilaisus* Temm., bei Schlegel contrahirt mit B. St. Johannis (Nordamerika bis Mexiko). Sibirien (Finsch, Ob, Ural, Boganida [Middendorff], Radde [selten], Pallas Dybovsky, [1 ex Kultuk — nach Taczanowsky selten im Osten], Japan [Blakiston 297], Turkestan [Severzow].)

Westgrenze Nordamerika (Cones) bis Oregon, Californien, N.-Mexiko, Arktisches Amerika (Roe).

Südgrenze: (Sharpe Cap, Natal wohl Irrthum), fehlt bei Heuglin, Tristram, etc.

11. *Buteo vulgaris*, Bechst. (36 Handl., 44 Jerdon, 58 Heuglin) ex Sharpe = japonicus (37 Handlist, dann in China und Japan ? Sibirien (Radde).

Altai (Finsch), Stanowoj, Hongkong (Schlegel), Japan (Blakiston), Indien (Nepal, Nilgeries), Palästina, Kleinasien (Danford) (Acre, Tristram.)

Egypten (Heuglin, selten) Algier (Loche), Canaren (Bolle).

12. *Pernis apivorus*, Cuv. 237 Handlist, 62 Heugl., 24 David.

= tachardus (238 H.) ex Sharpe.

Sibirien (Radde — ex Taczanowsky, cristatus (13), Daurien, Ussuri) — China (David), Japan (Blakiston 302), Baschkirenland (Sarepta, Hartlaub), Arabien (Rüppell), Beirut, Palästina, Syrien.

Südgrenze: Algier, Egypten (Hedenborg, Rüppell — nach Heuglin verirrte Vögel), Goldküste (Pel, Hartlaub) Madagaskar (Winter-Hartlaub), Gabun (dto.), Südafrika (Natal, Ayres.)

13. *Milvus regalis*, Brisson. 243. H. (63 Heuglin.) Sibirien (Omsk [Museum] Finsch), Palästina, Kleinasien.

Südgrenze: Algier, Tripolis, Canaren, Capverden (Schlegel), Egypten ? Heuglin zweifelt, wie Savigny und Brehm, Rüppell gibt sie an, sowie Lefebvre in Abyssinien.

14. *Milvus ater*, Daud. (245 HL. 64 Heuglin.) = niger, Briss. aetolius V., Korschun (Sharpe migrans Bodd. nicht melanotis Tem. (244 a, Taczanowsky 12 — Ostsibirien, Japan), nicht govinda Sykes (244. mit dem viele Autoren z. B. Dybowski sie verwechseln. ? ater (Blyth, China) Middendorff (Udokoi).

Sibirien (Finsch) contrahirt govinda, Tareinor, Baikal, Kjachta, Silka, Amur, Bargusinsk], Radde — Taczanowsky bezweifelt sein Vorkommen [S. 122] und zieht alle ostsibirische Ex. zu melanotis.

Persien (Schiraz-Blanford 34), Palästina, Kleinasien (Danford), Turkestan (Sev.)

Egypten, Adams, Sennar, (Hartman), Schoa (Harris), Capverden, Algier (Loche), Abyssinien (Lefebvre), Senegal, Madagaskar (Newton), Südafrika (Chapman, Layard), Sambesi (Cabanis.)

15. *Falco peregrinus*, L. 163 Handl., David 47, Jerdon 8, Taczan. 19, Heuglin 10.

= communis, Gm. 165 = orientalis, Gr. = anatum (Audubon, Wilson Nordamerika, Grönland), nigriceps Cass. (166.) ? minor Bpt. (168 = Schlegel als var. bei Heuglin südafrikanisch-madagassische var.)

Nowaja-Semlja (Gf. Wilczek) Sibirien (Finsch, Amur, Ussuri, Ochock (Middendorff), (Pfevalsky), Schilla, Tareinor (Radde), Formosa, China, Japan (Blakiston 310), Filipinen (Salvadori, Birna (Blyth).

Indien, Arakan (Hume), Ceylon (Tennent), Nepai, Himalaja (wohl Stolicka S) Ternate (Salvadori), Ceram (Schlegel), Java, Borneo, Australien, Sumatra, Persien (Buschur), Turkestan, Palästina, Kleinasien, Südostarien (Sharpe.)

Nach Cones Kosmopolit — Chile — Valdivia (Schlegel) Californien, Aljaska, Labrador, Oregon, Mexiko, Trinidad, Bahuma, Jamaika, Canada), Novaja-Semlja, Brasilien.

Südgrenze: Algier, Canaren, Egypten, Tanager, Nubien, Abyssinien, Reunion, Madagaskar (Newton, Pollen, Grandidier), Anjuan, Cap. (Holub, Layard) Sokotra.

16. *Falco saker*. Seblg. 171. Hl. (13 Heuglin, 46 Dav., 16 Jerdon.)

= lanarius auct.

= milvipes Hodgs. (Nepal), ? Hendersoni Hume. (Jarkand) ex Blanford, der orientalische Jagdfalke (Persien, St. John, Syrien, Arabien, Egypten, als 12 Lanarius getrennt von 13 sacer Heuglin.)

Sibirien (Finsch), China, Heinan, Tensi, Mongolien, Indien (Nepal), Turkestan, Palästina, Kleinasien (Heuglin),

Tunis, Egypten (selten), Abyssinien, West- und Südafrika (Heuglin), Chartum, Guinea, Damarland, Cap.

17. *Hypotriorchis subbuteo* (L.), Hl. 180, 48 Dav., 13 Jerd., 15 Haugl., 20 Taczan.

Ostsibirien, Irtis, Ochock (Middend.), Onon (Radde), China, Japan (307 Blakiston), Indien (Bioten), Jarkand, Kaschmir, Ladak (Hume), Yunnan (Anderson). Nordpersien (Elburs, Lankora), Palästina, Turkestan, Kleinasien, Orenburg (wenn noch = frontatus Gould, lunulatus Lath., Flores, Amboina, Ceram, Australien, Tasmanien).

Südgrenze Algier, Canaren, Sahara, Egypten, Sudan, (= gracilis, Brehm ex Heuglin) Dongola, Cap (Schlegel, Layard, Smith.

18. *Falco aesalon*, Gm., 192 Hl. (15 Jerd., 49 Dav., 17 Heugl., 21 Taczan.)

Sibirien (Tareinor), Stanowoj (Radde), Udokoi (Middendorff), Ussuri, China (Schanghai), (? regulus Pall.), Japan (308 Blakiston), Indien, Kleinasien (Trapezunt), Palästina, Turkestan.

? Persien, Sennar, Algier, Egypten, Nubien.

19. *Erythropus vespertinus*, Brehm, 213 Hl. Bei den Autoren oft cumulirt mit raddei, amurensis (Radde 214), David 50, Jerdon 19, 20 Heuglin, 22 Taczan. (Erythropus rufipes T.) Heuglin.

Westibirien, bei Taczanowsky bis zum Baikalsee (östlicher raddei), bei Anderen Amur, Dseja, Blagovescent, China (Winter), Indien, Nepal (Himalaja), Talys (Blanford), Birma (British-Bly th), Japan (ob. Amur ? Blakist. 309) Arabien, Palästina, Turkestan, Kleinasien (Caesarie), Orenburg.

Ganz Afrika, Algier, Tunis, Tripolis, Egypten, Nubien, Chartum, Guinea (Hartlaub), Zambesi, Natal (Cabanis), Cap, Damaraland (Schlegel).

Tinnunculus alaudarius (2) Gm., (203 Hl., 21 Heugl., 24 Taczan., 17 Jerdon, 52 David.)

Ostsibirien Baikol, Onon, Bureja, Ussuri (Radde), Japan, China, Indien, Jarkand, Ceylon (Tennent), Arakan (Hume), Britisch Birma (Blyth), Nepal, Luzon (Schlegel), Arabien (Winter-Blanford), Persien, Beludschistan, Palästina, Kleinasien, Bagdad, Turkestan (Severzov), Buchara (Meyendorff), Baschkirenland, Sokotra,

Madeira, Algier, Egypten, Nubien, Abyssinien, Sudan, Casamance, Senegal, Capverden, Cap (Schlegel).

21. *Tinnunculus cenchris*, Bp. 215 Hl. (Jerd. 18, 51 Dav., 23 Heugl.

? *pekinensis* Swinhoe

scheint Sibirien zu fehlen. China, Indien, Nepal (Hodgs), Turkestan, Persien (nach Blanford Zugvogel aus Arabien, wo er wintert), Palästina, Kleinasien, Aralsteppe,

Algier, Egypten, Nubien, Kordofan, Abyssinien, Sennar, Damaraland, Südafrika (Layard).

22. *Astur palambarius*, L., 268 Hl., 33 Dav., 21 Jerd., 25 Taczan., 37 Heugl.,

Sibirien (Udokoï Midd., Kamdotka, Buraja, Onon, Baikal (Radde), Mandschurei (Jagdthalke), China, Japan (Blakiston 303), Indien, Himalaja, Nepal, Nilgeries, Persien, Palästina, Turkestan, Kleinasien.

Egypten (? Rüppell, Savigny, Heuglin, nie Algier.

23. *Accipiter nisus* L., Hl. 299. 38 Dav., 24 Jerd., 41 Heugl., 26 Taczan.

Ostsibirien, Baikal, Amur, Ussuri, Stanowoj (Middendorff), China, Japan (Blakist. 304), Indien, Nepal, Tenasserim (Hume 1 ex.), Persien (Blanford), Arabien (Heuglin), Palästina, Kleinasien, Turkestan.

Canarien, Algier, Egypten, Nubien, Kordofan fossil in Spanien.

24. *Circus aeruginosus*, L., (356 Hl., 44 Dav., 54 Jerd., 68 Heuglin), rufus Brisson (ob immer).

Nach Radde Tareinor, nach Taczanowsky war es ein *C. spilonotus*, Derselbe spricht ihn Ostsibirien ab ? Sibirien (Pallas),

China, Japan (Schlegel) Indien (Nepal), Ceylon (Tennent), Arakan (Hume), Tenasserim, Rangun (Blyth), Formosa, Timor, Philippinen (Walden 24), Turkestan, Palästina, Beirut (Gurney),

Algier, Canaren, Egypten, Sennar, Abyssinien, Sudan.

25. *Strigiceps cyaneus*, Bpte 364 Hl., Tac. 29, Heugl. 69. (*Bohemicus, variabilis* Pall.)

Ostsibirien (Pallas, Middendorff, Schrenk, Radde, Prewalsky, Dybovsky, Amur, Ussuri, Tareinor, Stanowoj, Japan (Blakiston, Radde), China (39 David), Indien (50 Jerdon), Pendsjab, Nepal.

Caidom (Prewalsky), Turkestan, Arabien (Heuglin), Palästina, Kleinasien (Smyna).

Westgrenze (Coes) Wyoming, Dakota, Minesota, Cuba.

Südgrenze Algier, Egypten, Abyssinien, Nubien, Kordofan (Heuglin).

26. *Strigiceps cinereus*, Bpte, 369 Hl., 41 Dav., 52 Jerd., 70 Heugl., fehlt Ostsibirien ?

China (? sub *pygargus* L.), Indien (Nepal, Pegu, Tenasserim). Ceylon (Tennent), Turkestan, Palästina, Beirut (Gurney), Persien (Blanford).

Südgrenze, Canaren, Abyssinien, Sennar, Kordofan, Comoren, Südafrika (Layard, Smith-Heuglin, Schlegel).

27. *Strigiceps swansoni* 370 Hl., Jerd. 51, Dav. 40, Heugl. 71.

= feldeggi Bruch non Schlegel, pallidus Sykes, macurus Gm. (ex Blanford), Dalmatinus (ex Heugl.), abscens Less. desertorum Brehm.

China, Indien (Nepal), Ceylon (Tennent) Arakan, Pegu (Blyth), Beludschistan (Blanford), Palästina, Beirut, Turkestan, Arabien.

Südgrenze Egypten, Senegal, Casamance Guine, Sennar, Zebes, Kordofan (coll. Petherick), Südafrika (Heuglin).

28. *Surnia ulula*, Bpte (Strix ulula, L.), 376 Hl.

Westibirien (Finsch), Turkestan (Severzov), Ostsibirien bis zum Amur (Middendorff, Schrenk, Radde), Labrador, Pansylvanien, Illinois, Montana Bermudas (Coes).

29. *Nyctea nivea*, Bpte (377 H. L.), Westibirien, Ostsibirien (Middendorff, Schrenk, Radde, Prev., Dybovsky, Turkestan (Sev.), Pendschab (Hume, ex Blanford), Arktisch-Amerika 82° (Feilden), Grönland, Texas, Kentucky, Bermudas (Coes).

30. *Glaucidium passerinum*, L. (Boje) 433 Hl. Ostsibirien, Schrenk (Kultuk), Radde (Ussuri), Daurien, Middendorff (Zoblonoi).

31. *Athene noctua*, L., 378 Hl., ? 54 Dav. (plumipes Swinhoe),

Kleinasien (Danford), Turkestan (Sev.), Lenkoran, wenn *Athene meridionalis* in Südpersien, Palästina, Arabien, Nepal, Ostsibirien (Radde, Onon, Daurien, Dybowski),

Egypten, Algier, Sennar (Heuglin — meridionalis).

32. *Scops zorca*, Sav. 461 Hl.

Sibirien, Kleinasien, Turkestan, Palästina, Syrien (Schlegel), Persien (Buschir, Blanford), Algier (Loche) NO-Africa, Egypten, Abyssinien, Sennar.

33. *Bubo maximus*, Sibb. 440 Hl.

Japan, 288 Blakiston, Turkestan, Sibirien, China (58 David), Mongolien, Egypten, Algier (76 Heuglin).

34. *Otus vulgaris*, Flemm. 539 H. L.

Japan (Blakiston, Nepal, Kaschmir, Himalaya, Afghanistan (67 Jerdon), Kleinasien, Palästina, Petraeisches Arabien, Persien (Elbrus), Pendschab, Mongolei, Mupin (David), Nordwestchina (61 David), Ostsibirien, Arizona (Coes), Algier, Egypten (72 Heugl.) Canarien.

35. *Brachyotus palustris*, Bpte (549 H. L.),

Ostsibirien, Nordchina (62 David selten), Arakan (68 Blyth), Persien (Buschir, Zugvogel aus Arabien, Blanford), Palästina, Indien (Winter Jordan 68),

Nubien, Abyssinien, Egypten, Sennar (74 Heugl.), Sandwichsinseln (Dole), Amerika (Antillen, Galapagos), Unalashka, Californien (Coes), Florida, Wyoming, Chili, Mexiko, Cuba, Brasilien (Pelzeln).

36. *Syrnium aluco*, L. (Sav. 500), Kleinasien, Turkestan, Palästina, Syrien, Algier, Egypten zweifelhaft (86 Heuglin).

37. *Syrnium uralense*, Gr. (512),

Sibirien (Pallas, Middendorff, Schrenk, Radde, Prewalsky, Dybowsky (? Japan).

38. *Nyctale funerea*, Bpte (354), Ostsibirien Baikal, Daurien, Amur. (Egypten, Ex. Britisches Museum.)

39. *Strix flammea*, L. (558),

Kosmopolit bei Schlegel und Coes (nicht in Ostsibirien), Mesopotamien, Palästina, Turkestan, ganz Afrika, Canaren, Algier, Egypten, Cap, Madagaskar, Mauritius, Capverden, Madeira, Senegal, Zanzibar, Angola, Abyssinien, Azoren, ganz Amerika bis Gujana, Brasilien, Peru, Montevideo Galapagos, Neu-Caledonien, Viti, Samoa etc., Australien, Sandwich, Java, Flores.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [007](#)

Autor(en)/Author(s): Palacky Jan Kritel Kaspar

Artikel/Article: [Die Ostgrenzen der böhmischen Vögel. I. 47-49](#)