

Höhe des Schnabels 0·5 Cm.
 Tarsus 4·0 "
 Mittelzehe mit Nagel 2·3 "
 Nagel an der Mittelzehe 0·5 "
 Sein Körper war gut genährt, stellenweise mit einer Fettschicht überzogen; die Testikeln unbedeutend angeschwollen.

Im Magen befanden sich stark verdauta Käferreste. Um mich von der Beschaffenheit des Fleisches, das nach Dr. Fritsch unter die grössten Leckerbissen gehört, zu überzeugen, liess ich den ausgebürgten Rumpf zubereiten und fand den kleinen Braten in der That ausserordentlich zart und schmackhaft.
 (Schluss folgt.)

Die Ostgrenzen der böhmischen Vögel. I.

Von Dr. Joh. Palacky.

1. *Gyps fulvus*, Gray (Handlist 8, Heuglin NO-Afrika 1) f. occidentalis, Jerdon 3.

(== indicus, Temm, non Scop., == persicus, Pall. [ex Schlegel] ? nivicola Severzow-himalajensis Hume, [David 8] ? indicus Hume [Tenasserim].)

Himalaja (Jerd.), Birma (Gray), Nepal, Sindh (Schlegel), Persien (Filippi), Schiras (Blanford), Palästina (Tristri), Kleinasiens (Danford), Baschkirenenland (Brandt), Turkestan (Severzow ex Dresser), (? fehlt Ostsbirien) (Taczanowsky), Westsbirien (Finsch), China (David), Japan (Blakiston).

Böhmen Nordgrenze.

Südgrenze ganz Afrika, Algier (Loche), Egypten, Sahara (Tristram), Tunis, Fez, Cadsee, Aschanti, Niger (Allen), Zambesi, Nubien, Abyssinien (12000'), Nilgebiet, Cordofan, Südafrika (Heuglin).

2. *Vultur monachus*, Gr. (Handlist 3, Heuglin 5, Jerdon 1, David 7).

= cinereus Gm.

Mongolien (Alašan, Muniula, Caidom - Přewalsky), China (selten), Ningpo, Čekiang — aus Mangel an Aesern und Amphibien (Hume), Indien (Himalaja, Supor, Mhor, Nepal (Hodgson), Persien, Elburs (Blanford), Palästina, Kleinasiens (Xanthus), Turkestan, Baschkirenenland.

Südgrenze Nordafrika Algier (Loche), Egypten (selten, Heuglin), Zugvogel, ? Nubien (Hartmann), Abyssinien (Lefèvre).

3. *Aquila chrysaetos* (L.), Pallas, Handlist 87, Heuglin 24, Jerdon 26, David 10, Taczanowsky 2.

= fulva, Meyer, canadensis L., nobilis, Pall.

Ostsibirien (Ónor Radde, Daurien, Baikal Radde), Amur, Japan (Blakiston), Mongolien, Westosina (David), Himalaja (Jerd.), Nepal (Hodgson), Mekran (Blanford), Kleinasiens, Turkestan, Westsbirien (Finsch), Palästina, Petrasches Arabien (Heuglin).

Westgrenze N.-Mexiko, Utah, Californien, Arizona (Coues), Mexiko (Schlegel), Labrador, Nordost-Amerika (selten, Audubon).

Südgrenze Tunis, Tripolis, Egypten (selten, im Winter, Heuglin).

4. *Aquila imperialis*, Cuv. (88 Handl., 27 Jerd., 11 David, 25 Heuglin, 4 Taczanowsky ?).

? adalberti (vetus).

= heliaca Sav., mogilnik Gm.,

Ostsibirien (Onon, Dybovsky), Argun (orientalis), Daurien, Baikal (Taczan.), Tareinor (Radde), China (11 Dav.), Indien (Jerd.) Tavoy, Mulmein (Hume), Nepal (Hodggs.), Altai (Kaukasus), Westsbirien (Finsch), Kerman (Blanford), Kleinasiens, Palästina, Turkestan (Sev.).

Südgrenze Egypten, Nubien, Kordofan, Abyssinien (Heuglin).

5. *Aquila naevia*, Br. (= clanga, Pall., 91, 92 Handlist, 12, 13 Oustal, 28 Jerd., 25, 26 Heugl. (94) (Less. ex Sharpe), fulvescens (Gr. Dybovsky ex Taczanowsky).

Ostsibirien (Tacz., Radde, Převalsky, Schrenk), Kantschatka, Amur, Ussuri, Nerinsk, Tareinor (Radde), China (als clanga Nordwest. naevia nie), Indien (Nepal Hodgson), Cochinchina Oustalet), Tenasserim (Hume), Turkestan, Mongolien, Palästina, Kleinasiens, Bagdad (Loftus), Beyrut (Gurney), Schiras (Blanford).

Algier, Tunis, Egypten, Nubien, Abyssinien (12000', Süd-, Ost- und West-Afrika (Heuglin).

6. *Aquila bonelli*, Bpte (99 Handlist, Heuglin 29, Jerdon 33).

= nepalensis Hodgs. ex Gray, == fasciata Vieill. ex Blanford, wiedii Brehm ex Heuglin).

Indien (Himalaja, Nepal, Nilgeries), Ceylon (Tennent), Westsbirien (Finsch), Beludschanistan (Blanford ex), Palästina, Petr.-Arabien (Tor), Arabien (Blasius) fehlt Ostsibirien (Taczan.) ; China, Japan.

Südgrenze ganz Afrika (Heuglin), Algier (Loche), Senegal (Hartlaub), Egypten, Winter nicht häufig (Henglin), Nubien, Sennaar (Antinori), Südafrika (Layard).

7. *Haliaetus albicilla*, L (144 Handl. Taczanowsky 9, 14 David, 31 Heuglin),
 (fehlt Jerdon).

Ostsibirien Schrenk, Převalský etc. Abrakbari Dybovský ; Kantschatka (Kittlitz), Baikal Čirgān, Amur, Tureja, Ochock (Middendorff), Ussuri (Radde), Selenga, Japan (Selleg F. Jap.) Jezo (Blakiston), China (Wandervogel David), Indien (Sindh Schlegel — Beludschanistan).

Fehlt Palästina, Kleinasiens Aralsee, Orenburg, Aleuten (nicht weiter Amerika) Grönland, Island.

Südgrenze — Algier (Schleg.), Unteregypten (Menzaleh nicht weiter am Nil, Henglin).

8. *Pandion haliaetus*, Cuv., 131, Handl. 33. Heuglin, 40. Jerd., 19. Dav., 40. Hume, 11. Taczanowsky. ? solitarius Peale, Sandwich-Orientalis Tem. Schl. carolinensis Gmel.

Kosinopolit (Cabanis, Coues, eto exclus. Madagascar (Heuglin.)

Sibirien (Pečora [Finsch]), Baikal, Kantschatka (Kittlitz) Ussuri, Amur, Japan (F. Jap.), China, Formosa, Indien, Nepal (Hodgson) Tenasserim (Hume), Arakan, Birma (Anders.), Beludschanistan, Singapore, Java, Borneo, Ternate, Ceram, Celebes, Neu-Guinea, Australien, Tasmannien, Neu-Caledonien.

Palästina, Turkestan, Cuban ? (Brandt). Ganz Amerika. (Grönland, Oregon, California, Antillen, Honduras, Brasilien [Sharpe]). Ganz Afrika, Algier, Egypten, Abyssinien, Capverden, Guinea, Somaliland. (Hengl. Natal.)

9. *Circaetus gallicus*. Gm. (119 Hl., 38 Jerd., 51 Heugl., 29 David.)
= brachydactylus Tem.
fehl Sibirien (Finsch, Taczanowsky, Radde excl.)

Mongolen, China, Indien (Nepal). Calouke (E. J. M.), Timor, Flores (Schlegel.)

? Arabien, Palästina, Turkestan, (Severzow).

Südgrenze ? Egypten, Abyssinien, Kordofan, Ostseear, Senegal, Daimara, Cap.

10. *Archibuteo lagopus*, Gm. (81 Handl., Taczanowsky 15.) nach Taczanowsky bei Pallas (Daurien) verwechselt mit Buteo hemilasius Temm., bei Schlegel contrahirt mit B. St. Johannis (Nordamerika bis Mexiko).

Sibirien (Finsch, Ob., Ural, Boganiida [Middendorff], Radde [selten], Pallas Dybovsky, [1 ex Kultuk — nach Taczanowsky selten im Osten], Japan [Blakiston 297], Turkestan [Severzow].)

Westgrenze Nordamerika (Cones) bis Oregon, Californien, N.-Mexiko, Arktisches Amerika (Roe).

Südgrenze: (Sharpe Cap., Natal wohl Irrthum), fehlt bei Heuglin, Tristram, etc.

11. *Buteo vulgaris*, Bechst. (36 Handl., 44 Jerdon, 58 Heuglin) ex Sharpe = japonicus (37 Handlist, dann in China und Japan ? Sibirien (Radde)).

Altai (Finsch), Stanowoj, Hongkong (Schlegel), Japan (Blakiston), Indien (Nepal, Nilgeries), Palästina, Kleinasiens (Danford) (Acre. Tristram.)

Egypten (Heuglin, selten) Algier (Loche), Canaren (Bolle).

12. *Pernis apivorus*, Cuv. 237 Handlist, 62 Heugl., 24 David.

= tachardus (238 H.) ex Sharpe.

Sibirien (Radde — ex Taczanowsky, cristatus (13), Daurien, Ussuri) — China (David), Japan (Blakiston 302), Baschkireland (Sarepta, Hartlaub), Arabien (Rüppell), Beyru, Palästina, Syrien.

Südgrenze: Algier, Egypten (Hedenborg, Rüppell — nach Heuglin verirrte Vögel), Goldküste (Pel, Hartlaub) Madagaskar (Winter-Hartlaub), Gabun (dto.), Südafrika (Natal, Ayres.)

13. *Milvus regalis*, Brisson. 243. H. (63 Heuglin.)
Sibirien (Omsk [Museum] Finsch), Palästina, Kleinasiens.

Südgrenze: Algier, Tripolis, Canaren, Capverden (Schlegel), Egypten ? Heuglin zweifelt, wie Savigny und Brchm. Rüppell gibt sie an, sowie Lefèbre in Abyssinien.

14. *Milvus ater*, Daud. (245 HL. 64 Heuglin.)
= niger, Briss. aetolius V., Korschun (Sharpe migrans Bodd. nicht melanotis Tem. (244 a, Taczanowsky 12 — Ostsbirien, Japan), nicht govinda Sykes (244. mit dem viele Autoren z. B. Dybowsky sie verwechseln. ? ater (Blyth, China) Middendorff (Udko)).

Sibirien (Finsch) contrahirt govinda, Tareinor, Baikal, Kjachta, Silka, Amur, Bargusinsk), Radde — Taczanowsky bezweifelt sein Vorkommen [S. 122] und zieht alle ostsbirischen Ex. zu melanotis.

Persien (Schiraz-Banford 34), Palästina, Kleinasiens (Danford), Turkestan (Sev.).

Egypten, Adams, Sennar (Hartman), Schoa (Harris), Capverden, Algier (Loche), Abyssinien (Lefèbre), Senegal, Madagaskar (Newton), Südafrika (Chapman, Layard), Simbesi (Cabanis.)

15. *Falco peregrinus*, L. 163 Handl., David 47, Jerdon 8, Taczan. 19, Heuglin 10.

= communis, Gm. 165 = orientalis, Gr. = anatum (Audubon, Wilson Nordamerika, Grönland, nigriceps Cass. (166) ? minor Bpt. (168 = Schlegel als var. bei Heuglin südafrikanisch-madagassische var.)

Nowaja-Semja (Gf. Wilczek) Sibirien (Finsch, Amur, Ussuri, Ochock (Middendorff), (Převalsky), Schilla, Tareinor (Radde), Formosa, China, Japan (Blakiston 310), Filippinen (Salvadori, Birna (Blyth).

Indien, Arakan (Hume), Ceylon (Tennent), Nepal, Himalaja (wohl Stolicka 8) Ternate (Salvadori), Ceram (Schlegel), Java, Borneo, Australien, Sumatra, Persien (Buschin), Turkestan, Palästina, Kleinasiens, Südostasien (Sharpe.)

Nach Cones Kosmopolit — Chile — Valdivia Schlegel) Californien, Alaska, Labrador, Oregon, Mexiko, Trinidad, Bahuma, Jamaika, Canada), Novaja-Semja, Brasilien.

Südgrenze: Algier, Canaren, Egypten, Tanger, Nubien, Abyssinien, Reunion, Madagaskar (Newton, Pollen, Grandidier), Anjuan, Cap. (Holub, Layard) Sokotra.

16. *Falco sakar*. Sehlg. 171. Hl. (13 Heuglin, 46 Dav., 16 Jerdon.)

= lanarius auct.

= milvipes Hodgs. (Nepal), ? Hendersoni Hume. (Jarkand) ex Blanford, der orientalische Jagdfalke (Persien, St. John, Syrien, Arabien, Egypten, als 12 Lanarius getrennt von 13 sacer Heuglin.)

Sibirien (Finsch), China, Heinan, Tensi, Mongoliens, Indien (Nepal), Turkestan, Palästina, Kleinasiens, (Heuglin),

Tunis, Egypten (selten), Abyssinien, West- und Südafrika (Heuglin), Chartum, Guinea, Damarnland, Cap.

17. *Hypotorchis subbuteo* (L.), Hl. 180, 48 Dav., 13 Jerd., 15 Haugl., 20 Taczan.

Ostsbirien, Irtis, Ochock (Middend.), Onon (Radde), China, Japan (307 Blakiston), Indien (Bioten), Jarkand, Kaschmir, Ladak (Hume), Yunnan (Anderson). Nordpersien (Elburs, Lankora), Palästina, Turkestan, Kleinasiens, Orenburg (wenn noch = frontatus Gould, lunulatus Lath., Flores, Amboina, Ceram, Australien, Tasmanien).

Südgrenze Algier, Canaren, Sahara, Egypten, Sudan, (= gracilis, Brehm ex Heuglin) Dongola, Cap (Schlegel, Layard, Smith).

18. *Falco aesalon*, Gm., 192 Hl. (15 Jerd., 49 Dav., 17 Heugl., 21 Taczan.).

Sibirien (Tareinor) Stanovoj (Radde), Udko (Middendorff), Ussuri, China (Schanghai), (? regulus Pall.), Japan (308 Blakiston), Indien, Kleinasiens (Trapezunt), Palästina, Turkestan.

? Persien, Sennar, Algier, Egypten, Nubien.

19. *Erythropus vespertinus*, Brehm, 213 Hl. Bei den Autoren oft cumuliert mit raddei, amurenus (Radde 214), David 50, Jerdon 19, 20 Heuglin, 22 Taczan. (Erythrus rufipes T.) Heuglin.

Westsibirien bei Taczanowsky bis zum Baikalsee (östlicher raddei), bei Anderen Amur, Dseja, Blagovescent, China (Winter), Indien, Nepal (Himalaja), Talysh (Blanford), Birma (Britisch-Bly th.) Japan (ob. Amur ? Blakist. 309) Arabien, Palästina, Turkestan, Kleinasiens (Caesarie), Örenburg.

Ganz Afrika. Algier, Tunis, Tripolis, Egypten, Nubien, Chartum, Guinea (Hartlaub), Zambezi, Natal (Cabanis), Cap, Damaranland (Schlegel).

Tinnunculus laudarius (2) Gm., (203 Hl., 21 Heugl., 24 Taczan., 17 Jerdon, 52 David.)

Ostsibirien Baikol, Onon, Bureja, Ussuri (Radde), Japan, China, Indien, Jarkand, Ceylon (Tennent), Arakan (Hume), Britisch Birma (Blyth), Nepal, Luzon (Schlegel), Arabien (Winter-Blandford), Persien, Belutschistau, Palästina, Kleinasiens, Bagdad, Turkestan (Severzow), Bucharas (Meyendorff), Baschkirenländen, Sokotra,

Madeira, Algier, Egypten, Nubien, Abyssinien, Sudan, Casumance, Senegal, Capverden, Cap (Schlegel).

21. *Tinunculus cenchris*, Bp. 215 Hl. (Jerd. 18, 51 Dav., 23 Heugl.

? pekinensis Swinhoe

scheint Sibirien zu fehlen. China, Indien, Nepal (Hodges), Turkestan, Persien (nach Blanford Zugvögel aus Arabien, wo er winternt), Palästina, Kleinasiens, Aralsteppe,

Algier, Egypten, Nubien, Kordofan, Abyssinien, Sennar, Damaraland, Südafrika (Layard).

22. *Astur palumbarius*, L., 268 Hl., 33 Dav., 21 Jerd., 25 Taczan., 37 Heugl.,

Sibirien (Udokoi Midd., Kamdotka, Buraja, Onon, Baikal (Radde), Mandschurei (Jagdfalke), China, Japan (Blakiston 303), Indien, Huimalaja, Nepal, Nilgeries, Persien, Palästina, Turkestan, Kleinasiens.

Egypten (? Rüppell, Savigny, Heuglin, nie Algier, 23. *Accipiter nisus* L., Hl. 299. 38 Dav., 24 Jerd., 41 Heugl., 26 Taczan.

Ostsibirien, Baikal, Amur, Ussuri, Stanowoj (Middendorff), China, Japan (Blakist. 304), Indien, Nepal, Tenasserim (Hume 1 ex.), Persien (Blanford), Arabien (Heuglin), Palästina, Kleinasiens, Turkestan.

Canarien, Algier, Egypten, Nubien, Kordofan fossil in Spanien.

24. *Circus aeruginosus*, L., (356 Hl., 44 Dav., 54 Jerd., 68 Heuglin), rufus Brisson (ob immer).

Nach Radde Tareinor, nach Taczanowsky war es ein C. spilonotus, Derselbe spricht ihn Ostsibirien ab ? Sibirien (Pallas),

China, Japan (Schlegel) Indien (Nepal), Ceylon (Tennent), Arakan (Hume), Tenasserim, Rangun (Blyth), Formosa, Timor, Philippinen (Walden 24), Turkestan, Palästina, Beyrut (Gurney),

Algier, Canaren, Egypten, Sennar, Abyssinien, Sudan.

25. *Strigioeps cyaneus*, Bpte 364 Hl., Tac. 29, Heugl. 69. (Bohemicus, variabilis Pall.)

Ostsibirien (Pallas, Middendorff, Schrenk, Radde, Prewalsky, Dybowski, Amur, Ussuri, Tareinor, Stanovoj, Japan (Blakiston, Radde), China (39 David), Indien (50 Jerdon), Pendjab, Nepal.

Caidom (Prevatsky), Turkestan, Arabien (Heuglin), Palästina, Kleinasiens (Smyrna).

Westgrenze (Cones) Wyoming, Dakota, Minesota, Cuba.

Südgrenze Algier, Egypten, Abyssinien, Nubien, Kordofan (Heuglin).

26. *Strigioeps cineraceus*, Bpte, 369 Hl., 41 Dav., 52 Jerd., 70 Heugl., fehlt Ostsibirien ?,

China (? sub pygargus L.), Indien (Nepal, Pegu, Tenasserim). Ceylon (Tennent), Turkestan, Palästina, Beyrut (Gurney), Persien (Blanford).

Südgrenze, Canaren, Abyssinien, Sennar, Kordofan, Comoren, Südafrika (Layard, Smith-Heuglin, Schlegel).

27. *Strigioeps Swansonii* 370 Hl., Jerd. 51, Dav. 40, Heugl. 71.

= feldeggii Brueh non Schlegel, pallidus Sykes, macrurus Gm. (ex Blanford), Dahlmatius (ex Heugl.), albescens Less. desertorum Brehm.

China, Indien (Nepal), Ceylon (Tennent) Arakan, Pegu (Blyth), Belutschistan (Blanford), Palästina, Beirut, Turkestan, Arabien.

Südgrenze Egypten, Senegal, Casamance Guinea, Sennar, Zebes, Kordofan (coll. Petherick), Südafrika (Heuglin).

28. *Surnia ulula*, Bpte (Strix ulula, L.), 376 Hl.

Westensibirien (Finsch), Turkestan (Severzow), Ost-sibirien bis zum Amur (Middendorff, Schrenk, Radde), Labrador, Pensylvanien, Illinois, Montana Bermudas (Couches).

29. *Nyctea nivea*, Bpte (377 H. L.),

Westensibirien, Ostsibirien (Middendorff, Schrenk, Radde, Prev., Dybowski, Turkestan (Sev.), Pendschab (Hume, ex Blanford), Arktisch-Amerika 82° (Feilden), Grönland, Texas, Kentucky, Bermudas (Couches).

30. *Glaucidium passerinum*, L. (Boje) 433 Hl.

Ostsibirien, Schrenk (Kultuk), Radde (Ussuri), Daurien, Middendorff (Zoblonoi).

31. *Athene noctua*, L., 378 Hl., ? 54 Dav. (plumipes Swinhoe),

Kleinasiens (Danford), Turkestan (Sev.), Lenkoran, wenn Athene meridionalis im Südpersien, Palästina, Arabien, Nepal, Ostsibirien (Radde, Onon, Daurien, Dybowski).

Egypten, Algier, Sennar (Heuglin — meridionalis).

32. *Scops zorca*, Sav. 461 Hl.

Sibirien, Kleinasiens, Turkestan, Palästina, Syrien (Schlegel), Persien (Buschir, Blanford), Algier (Loche) NO-Africa, Egypten, Abyssinien, Sennar.

33. *Bubo maximus*, Sibb. 440 Hl.

Japan, 288 Blakiston, Turkestan, Sibirien, China (58 David), Mongolien, Egypten, Algier (76 Heuglin).

34. *Otus vulgaris*, Flemm. 539 H. L.

Japan (Blakiston, Nepal, Kaschmir, Himalaya, Afghanistan (67 Jerdon), Kleinasiens, Palästina, Petrasches Arabien, Persien (Elbrus), Pendschab, Mongolei, Mupin (David), Nordwestchina (61 David), Ostsibirien, Arizona (Couches), Algier, Egypten (72 Heugl.) Canarien.

35. *Brachyotus palustris*, Bpte (549 H. L.),

Ostsibirien, Nordchina (62 David selten), Arakan (68 Blyth), Persien (Buschir, Zugvogel aus Arabien, Blanford), Palästina, Indien (Winter Jordan 68),

Nubien, Abyssinien, Egypten, Sennar (74 Heugl.), Sandwichinseln (Dole), Amerika (Antillen, Galapagos), Unalaschka, Californien (Couches), Florida, Wyoming, Chili, Mexiko, Cuba, Brasilien (Pelzelz).

36. *Syrnium aluco*, L. (Sav.) 500,

Kleinasiens, Turkestan, Palästina, Syrien, Algier, Egypten zweifelhaft (86 Heuglin).

37. *Syrnium uralense*, Gr. (512),

Sibirien (Pallas, Middendorff, Schrenk, Radde, Prewalsky, Dybowski (? Japan)).

38. *Nyciale funerea*, Bpte (354),

Ostsibirien Baikal, Daurien, Amur. (Egypten, Ex. Britisches Museum.)

39. *Strix flammea*, L. (558),

Kosmopolit bei Schlegel und Couches (nicht in Ostsibirien), Mesopotamien, Palästina, Turkestan, ganz Afrika, Canaren, Algier, Egypten, Cap, Madagaskar, Mauritius, Capverden, Madeira, Senegal, Zanzibar, Angola, Abyssinien, Azoren, ganz Amerika bis Guiana, Brasilien, Pern, Montevideo Galapagos, Neu-Caledonien, Viti, Samoa etc., Australien, Sandwich, Java, Flores.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [007](#)

Autor(en)/Author(s): Palacky Jan Kritel Kaspar

Artikel/Article: [Die Ostgrenzen der böhmischen Vögel. I. 47-49](#)