

Arten der Ornitho Austriaco-Hungarica um Santander,

(Spanien, 43° 32' 30" N. Br.) Nach Lieut. Col. L. Howard Irby. (Ibis, 1883, April, p. 173—190).

Von August Graf Marschall.

Gyps fulvus. Hier u. da bei Santander; häufig in der Schlucht der Deva; brütet bei la Hermida.

Neophron percnopterus. Ein erwachsener öfter am Hafen von Santander; gemein bei la Hermida u. Potes.

Gypaëtus barbatus. Oft bei Potes u. in der Schlucht der Deva.

Accipiter nisus. Oft gesehen.

Circus aeruginosus. Zweimal im Mai u. einmal im November.

Circus cyaneus. Nebst dem Bussard der gemeinste Raubvogel; Brutzeit Mai u. Junius.

Buteo vulgaris. Ueberall sehr gemein; im Dunenkleid; 12. Junius.

Aquila chrysaetos. Oefter gesehen,

Aquila pennata. Ein- oder zweimal gesehen; 7. Jun.

Aquila bonellii. Oft gesehen; brütet.

Milvus iclinus. Im Junius Horste.

Milvus migrans. Einmal bei Santander, 17. Junius.

Pernis apivorus. Gemein in Buchenwäldern; 7. Juni ein ♀ am Horst geschossen.

Falco peregrinus. Gemein, oft am Hafen von Santander.

Hypotriorchis sub-buteo. Mehrmal gesehen.

Hypotriorchis aesalon. Zwei Exemplare, 23. November u. 9. Mai.

Tinnunculus alaudarius. In Menge bei Santander; brütet auf niederen Felsen am Cubas.

Pandion haliaëtus. Beständig eine oder zwei am Felsen.

Syrnium aluco. Soll um Llebona sehr gemein sein. Ein ♀ u. 2 halbflugbare Junge bei Potes, 8. Junius.

Scops giu. Nur Exemplare im Museum.

Strix flamma. Nur Exemplare im Museum.

Picus major. Gemein im tiefen Gebiet der Wälder bei Llebona.

Picus medius. Häufig in den Buchenwäldern u. in dem höheren Waldgebiet bei Llebona.

Gecinus viridis. Gemein in den tieferen Umgebungen von Llebona; 12. Junius befiederte Junge.

Picus martius. Gemeiner Waldvogel in 3000 Fuss Meereshöhe.

Jynx torquilla. Zweimal gehört, 19. und 23. Mai.

Cuculus canorus. Ueberall in Menge.

Merops apiaster. Nur ein Exemplar im Museum.

Upupa epops. Ein Exemplar, auf dem Markte gekauft, 5. Mai.

Alcedo ispida. Am Hafen von Santander, November.

Caprimulgus europaeus. Bei Santander, 17., 18. 19. Mai.

Cypselus melba. Einmal bei Santander, 15. Mai.

Cypselus apus. In Menge; Bai v. Biscaya, 3. Mai.

Turdus viscivorus. Bei Santander, zu Llebona gemein.

Turdus musicus. Brütet, gemein, auch in November.

Turdus pilaris. Ein Exemplar im Museum.

Turdus merula. Häufig.

Locustella naevia. (= Calamodita Locustella oder Calamodyta naevia?). Gemein an Flüssen, 3. Mai.

Sylvia sibilatrix. Gehört 16. Mai.

Sylvia trochilus. Gemein in Eichenwäldern.

Sylvia bonellii. Gemein in Llebona.

Sylvia rufo. Ziemlich gemein in Eichenwäldern.

Sylvia hortensis. Gemein um Santander.

Sylvia atricapilla. Einmal, 23. Mai.

Sylvia cinerea. Ueberall häufig, Mai u. Junius.

Sylvia rubecula. Häufig.

Ruticilla tithys. Gemein.

Ruticilla phoenicurus. Gemein, besonders in den Eichenwäldern von Llebona; ein Individuum in der Bai von Biscaya, 3. Mai.

Saxicola oenanthe. Ebenso.

Pratincola rubicola. Sehr häufig.

Accentor alpinus. Im Winter 1880—81 sehr zahlreich bei hohem Schnee.

Accentor modularis. Ein Paar hoch im Gebirge.

Cinclus albicollis. Gemein an Flüssen u. Bächen.

Troglodytes parvulus. Gemein.

Tichodroma muraria. Auf Picos de Europa nicht selten.

Sitta caesia. Gemein in den Eichen- u. Buchenwäldern v. Llebona.

Parus major. Zahlreich; Nest mit Eiern, 6. Mai.

Parus coeruleus. Gemein in Wäldern am Flusse Cubas, Nest mit Jungen, 20. Mai.

Parus ater. Einmal bei Santander.

Parus palustris. In einem Wald an den Fallen des Flusses Cubas, 17. Junius.

Parus caudatus. 17. Mai und 20. November.

Oriolus galbula. Ein Exemplar im Museum.

Muscicapa atricapilla. Gemein in den Buchenwäldern bei Potes.

Butalis grisola. Häufig um Santander.

Enneoctonus rufus? Einmal, 16. Mai.

Enneoct. collurio. Gemein um Potes u. längs der ganzen Strasse von Torre la Vega nach Potes.

Fregilus graculus. In zahllosen Schaaren auf dem höheren Gebirg von Llebona; wird gegessen.

Pyrrhocorax alpinus. Gemein eben dort, hält sich in noch höherm Gebirge auf.

Corvus corax. Ueberall sehr gemein; Nester mit gut befiederten Jungen, 15. Mai.

Corvus corone. Einige zwischen Torre la Vega und Unquera.

Corvus pica. Nicht gemein.

Garrulus glandarius. Sehr gemein um Llebona, wird gern gegessen.

Hirundo rustica. Sehr häufig.

Hirundo urbica. Nicht gemein.

Cotile riparia. Gemein, brütet bei Santander.

Cotile rupestris. Brütet zahlreich am Desfiladero; bei la Hermida.

Fringilla carduelis. Sehr zahlreich.

Fring. spinus. Ein Exemplar im Museum.

Fring. serinus. Gemein

Fring. chloris. Gemein

Fring. coelebs. Sehr zahlreich

Fring. cannabina. Sehr zahlreich

Fring. montifringilla. Ein Exemplar im Museum.

Passer domesticus. Sehr zahlreich.

Coccothraustes vulgaris. Ein Exemplar im Museum

- Pyrhula vulgaris.** Bei Potes und Santander.
Emberiza miliaria. Nur Einmal.
Emb. citrinella. Gemein bei Potes.
Emb. Cirius. Ueberall gemein.
Emb. Cia. In Paaren ziemlich gemein unter 3.000 bis 4.000 Fuss Meereshöhe.
Plectrophanes nivalis. Ein Exemplar im Museum.
Sturnus vulgaris. Ein Exemplar im Museum.
Alauda arvensis. Gemein im Mai u. Junius, noch mehr in November.
Alauda arborea. Einmal.
Anthus trivialis. Am Flusse Cubas bei Potas.
Anthus pratensis. Im November sehr häufig.
Anthus campestris. Zwei oder drei auf sandigem Boden bei Santander, 12. Mai.
Motacilla alba. Sehr zahlreich.
Motacilla Boarula. Sehr gemein am oberen Lauf der Deva.
Budytes flavus. Gemein.
Columba Palumbus. Ziemlich gemein; soll in den Wintermonaten sehr zahlreich sein.
Turtur auritus. Sehr gemein um Santander.
Tetrao Urogallus. Thäler von Llebona ober Bedoya und Lebenna; soll sich im Winter vorzüglich von Eicheln und Bucheckern nähren.
Perdix rufa. Soll auf den Anhöhen um Potes sehr häufig sein.
Perdix Coturnix. Mehrmal bei Santander und Potes gehört.
Rallus aquaticus. Zwei oder drei an der Laguna de Laredo, 28. November.
Numenius arcuatus. Häufig am Hafen und dessen Umgebungen, Mai, Junius und November.
Numen. phaeopus. Häufig Mai u. Junius, weniger November.
Limosa lapponica. Nicht gemein; auf Schlamm im Mai; ein Stück in schön rothem Gefieder, 20. Mai.
Limosa aegocephala. Drei am 13. Mai; am Hafen oft gehört.
Recurvirostra Avocetta. Ein Stück 21. November, mehrere am Hafen 28. November.
Totanus Calidris. Sehr häufig am Hafen im Mai, seltener im November.
Totanus Glottis. Ein Stück, 6. Mai; mehrere 26. November.
Totanus ochropus. Drei Stück, 19. Junius.
Actitis hypoleucus. Mitunter am Hafen; gemein am Fluss bei Torre la Vega, Mai.
Machetes pugnax (?) auf Schlamm im Mai; ein Exemplar im Museum.
Tringa Canutus. Die ersten 9. Mai am Hafen in Schlamm; am 17. Mai mit ziemlich rother Brust; 22 in fast vollständigem rothen Gefieder, 36 Stück; am 17. Junius 5 bis 6 Stück.
Tringa sub-arcuata. Eine kleine Schaar im Mai.
Tringa alpina. Zu Tausenden auf den schlammigen Flächen am Hafen, 4. bis 18. Mai, viele im vollen Brautkleid; gegen Ende Mai fast alle verschwunden.
Calidris arenaria. Gemein im Mai.
Scolopax rusticola. November; soll zu manchen Zeiten sehr häufig sein.
Gallinago scolopacina. Wie die vorige Art.
Gallinago Gallinula. Einige im November.
Phalaropus cinereus. Am 19. December auf offener See, einige Meilen westlich vom Hafen von Santander.
- Vanellus cristatus.** Grosse Schaaren um den Hafen, November.
Squatarola Helvetica. Nicht zahlreich auf den schlammigen Flächen, Mai, Junius und November.
Charadrius Cantianus. Kleine Schaaren am Eingang des Hafens, 12. Mai.
Charadrius Hiaticula. Häufig in Mai, Junius und November.
Haematopus ostralegus. Eine kleine Schaar in den Sandgruben, am Eingang des Hafens.
Streptilas Interpres. Gemein im Mai und Junius, auch im November gesehen.
Ardea cinerea. Ein Stück am Flusse Cubas, 17. Junius; gemein im November.
Botaurus stellaris. Ein Exemplar im Museum.
Platalea leucorodia. Eine Schaar von 18 Stück im Hafen, Mai; ein Stück im Junius geschossen; eine Schaar, 21. November.
Ibis Falcinellus. Einmal im Hafen, 22. Mai.
Ciconia alba. Ein Stück im Hafen, Mai.
Anser cinereus. Ein Exemplar im Museum (Wildgänse, deren Art nicht bestimmt werden konnte, um den Hafen im November).
Mareca Penelope. Zwei ♂ am Flusse Cubas, 17. Mai; sehr grosse Flüge im November.
Dafila acuta.
Anas Boschas. | Einige wenige im Mai u. Nov.
Querquedula Crecca. Grosse Schaaren im November.
Fuligula ferina. Eine Schaar im Hafen, 14. December.
Fuligula cristata. Ein Flug von etwa 12 Stück am Quarantaine-Fluss, 6. December.
Clangula Glaucion. Ein erwachsenes ♂, 3. Dec.
Oedemia fusca. Drei bis vier gesehen und ein ♂ geschossen, 21. November.
Oedemia nigra. Einige im Mai und Junius; in Menge, meist junge Vögel, im November.
Mergus Merganser. 4—5 im Hafen, 25. Nov.
Mergus Serrator. Gemein in kleinen Schaaren von drei bis sieben, November.
Larus marinus. Ein unreifes Stück, 2. December.
Larus argentatus. Gemein im November.
Larus leucophaeus. Mai und Junius, 23. November.
Larus fuscus. Mai und Junius, häufiger im November.
Larus ridibundus. Einmal im Mai, häufig im November.
Rissa tridactyla. Viele an der Küste, December.
Sterna Cantiaea. Einige im Mai.
Sterna minuta. Eine, 20. Mai.
Hydrochelidon fissipes. Eine, 6. Mai.
Puffinus Anglorum. Viele an der Küste, Mai.
Sula Bassana. Viele an der Küste, 19. u. 20. Dec.
Graculus Carbo. Nicht selten, Mai und November.
Podiceps cristatus. Zwei oder drei im Hafen, November.
Podiceps auritus. Einer im Hafen, 2. December.
Podiceps nigricollis. Gemein, November.
Podiceps minor. Ein Exemplar im Museum.
Colymbus glacialis. Einer im Hafen, im Mai bis 17. Mai; mitunter im November; einer 4. December.
Colymbus arcticus. Eimer im Hafen, 2. December.
Colymbus septentrionalis. Einige um den Hafen, November; einer 4. December.
Lunda arctica. An der Küste 3. Mai.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [007](#)

Autor(en)/Author(s): Marschall August Friedrich

Artikel/Article: [Arten der Ornis Austriaco-Hungarica um Santander 149-150](#)