

Verzeichniss

der

VOGEL EIER - S A M M L U N G

des
ornithologischen Vereines in Wien

geordnet von HERMANN FOURNES.

(Schluss.)

31. Fam. Fringillidae, Finken.

- 6 Stück *Passer montanus*, Linn. Feldsperling.
 12 „ *Passer montanus*, 2 Gelege je 3 Eier, 1 Gelege 6 Eier.
 189 „ *Passer domesticus*, Linn. Haussperling.
 1 „ *Passer salicarius*, K. und B. Sardinischer Sperling.
 4 „ *Fringilla coelebs*, Linn. Buchfink.
 15 „ *Fringilla coelebs*, 2 Gelege je 3 Eier, 2 Gelege je 4 und 5 Eier.
 1 „ *Fringilla montifringilla*, Linn. Bergfink.
 4 „ *Coccothraustes vulgaris*, Pall. Kirschkernebeisser, 1 Gelege.
 8 „ *Ligurinus chloris*, Linn. Grünfink.
 15 „ *Ligurinus chloris*, 4 Gelege je 2, 3, 4 und 6 Eier.
 3 „ *Serinus hortulanus*, Koch. Girlitz.
 6 „ *Serinus hortulanus*, 2 Gelege je 3 Eier.
 3 „ *Chrysomitris spinus*, Linn. Erlenzeisig, 1 Gelege.
 17 „ *Carduelis elegans*, Steph. Stieglitz.
 2 „ *Carduelis elegans*, 1 Gelege.
 7 „ *Cannabina sanguinea*, Landb. Bluthänfling.
 3 „ *Cannabina sanguinea*, 1 Gelege.
 1 „ *Linaria alnorum*, Chr. L. Br. Nordischer Leinfink.
 1 „ *Carpodacus erythrinus*, Pall. Karmingimpel.
 8 „ *Pyrrhula europaea*, Vieill. Mitteleuropäischer Gimpel.
 1 „ *Corythus enucleator*, Linn. Hackengimpel.

IX. ORDNUNG.

Columbae, Tauben.

32. Fam. Columbidae, Tauben.

- 3 Stück *Columba palumbus*, Linn. Ringeltaube.
 2 „ *Columba oenas*, Linn. Hohлтаube.
 4 „ *Columba oenas*, 2 Gelege je 2 Eier.
 7 „ *Columba domestica*, Linn. Haustaube.
 4 „ *Columba domestica*, 2 Gelege je 2 Eier.
 4 „ *Columba domestica*, abnorm in Form und Grösse.
 3 „ *Turtur auritus*, Ray. Turteltaube.
 10 „ *Turtur auritus*, 5 Gelege je 2 Eier.
 1 „ *Turtur auritus*, Abnormität.
 6 „ *Turtur nisoria*, Sw. Lachtaube, 3 Gelege je 2 Eier.

X. ORDNUNG.

Rasores, Scharrvögel.

33. Fam. Tetraonidae, Raufusshühner.

- 1 Stück *Tetrao urogallus*, Linn. Auerhuhn.
 2 .. *Tetrao tetrix*, Linn. Birkhuhn.
 1 .. *Tetrao bonasia*, Linn. Haselhuhn.
 1 .. *Lagopus alpinus*, Nils. Alpenschneehuhn.
 1 .. *Lagopus var. islandicus*, Br. Islands-Schneehuhn.
 1 .. *Lagopus scoticus*, Vieill. Schottlands-Schneehuhn.

34. Fam. Perdidae, Feldhühner.

- 1 Stück *Perdix rubra*, Briss. Rothhuhn.
 6 .. *Perdix saxatilis*, M. und W. Steinhuhn.
 2 .. Var. *graeca*, Briss.
 3 .. *Perdix chukár*, Gray. 1 Gelege.
 8 .. *Sterna cinerea*, Linn. Rebhuhn.
 21 .. *Sterna cinerea*, 2 Gelege je 8 und 13 Eier.
 12 .. *Coturnix dactylisonans*, Meyer. Wachtel, 1 Gelege.
 1 .. *Francolinus vulgaris*, Stepli. Gemeines Frankolinuhuhn.
 9 .. *Lophortyx californianus*, Linn. Kalifornisches Wachtelhuhn.

35. Fam. Phasianidae, Fasane.

- 3 Stück *Phasianus colchicus*, Linn. Edelfasan.
 2 .. *Phasianus pictus*, Linn. Goldfasan, 1 Gelege.
 2 .. *Phasianus nyctemerus*, Linn. Silberfasan, 1 Gelege.
 3 .. *Phasianus gallus*, dom. Fasanuhuhn. Rieseneier.
 17 .. *Phasianus gallus*, eine sehr interessante Collection von
 Abnormitäten.
 9 .. (*Gallus d. germanicus*, Deutsches Landhuhn) Abnormitäten.
 1 .. (*Numida meleagris*, Linn. Gemeines Perlhuhn) Abnormität.
 1 .. *Pavo cristatus*, Linn. Pfau.

XI. ORDNUNG.

Grallae, Stelzvögel.

36. Fam. Glareolidae, Brachschnalben.

- 3 Stück *Glareola pratincola*, Briss. Halsbandgiarol.

37. Fam. Otidae, Trappen.

- 3 Stück *Otis tarda*, Linn. Grosstrappe.
 4 .. *Otis tetrax*, Linn. Zwergtrappe, 1 Gelege, welches von
 Pastor Thienemann in Zangenberg, in einem Espar-
 settefelde gefunden und auf Grund dessen die Ein-
 wandrung der Zwergtrappe in Thüringen als voll-
 zogen betrachtet wurde.

39. Fam. Charadriidae, Regenpfeifer.

- 1 Stück *Oedienemus crepitans*, Linn. Trief.
 2 .. *Oedienemus crepitans* 1 Gelege.
 2 .. *Charadrius pluvialis*, Linn. Goldregenpfeifer, 1 Gelege.
 1 .. *Eudromias morinellus*, Linn. Mornell.
 2 .. *Aegialites caucasicus*, Lath. Seereggenpfeifer, 1 Gelege.

- 2 Stück *Aegialites hiaticula*, Linn. Sandregenpfeifer.
 4 „ *Aegialites hiaticula*, 1 Gelege.
 1 „ *Aegialites minor*, M. und W. Flussregenpfeifer.
 4 „ *Aegialites minor*, 1 Gelege.
 26 „ *Vanellus cristatus*, Linn. Kiebitz.
 3 „ *Vanellus cristatus*, 1 Gelege, seltene Varietät.
 1 „ *Vanellus gregarius*, Vieill. Geselliger Kiebitz.
 1 „ *Streptopelia interpres*, Linn. Steinwalzer.
 9 „ *Haematopus ostralegus*, Linn. Austernfischer.
 1 „ *Haematopus ostralegus*, seltene Varietät.

40. Fam. Gruidae, Kraniche.

- 1 Stück *Grus cinereus*, Bechst. Grauer Kranich.

XII. ORDNUNG.

Grallatores, Reiherartige Vogel.

41. Fam. Ciconiidae, Storche.

- 1 Stück *Ciconia alba*, Bechst. Weisser Storch.
 4 „ *Ciconia alba*, 2 Gelege je 2 Eier.
 1 „ *Ciconia nigra*, Linn. Schwarzer Storch.
 2 „ *Ciconia nigra*, 1 Gelege.

42. Fam. Ibisidae, Ibisse.

- 2 Stück *Platalea leucorodia*, Linn. Loffelreiher.
 3 „ *Platalea leucorodia*, 1 Gelege.
 3 „ *Falcinellus igneus*, Leach. Dunkelfarbiger Sichler.
 4 „ *Falcinellus igneus*, 1 Gelege.

43. Fam. Ardeidae, Reiher.

- 8 Stück *Ardea cinerea*, Linn. Grauer Reiher, 2 Gelege je 3 und 5 Eier.
 1 „ *Ardea purpurea*, Linn. Purpurreiher.
 4 „ *Ardea purpurea*, 1 Gelege.
 1 „ *Ardea egretta*, Bechst. Silberreiher.
 1 „ *Ardea garzetta*, Linn. Seidenreiher.
 2 „ *Ardea garzetta*, 2 Gelege je 2 und 4 Eier.
 1 „ *Ardea ralloides*, Scop. Rallenreiher.
 10 „ *Ardea ralloides*, 2 Gelege je 4, 1 Gelege 2 Eier.
 3 „ *Ardetta minuta*, Linn. Zwergreiher, 1 Gelege.
 1 „ *Nycticorax griseus*, Strickl. Nachtreiher.
 6 „ *Nycticorax griseus*, 1 Gelege.
 1 „ *Botaurus stellaris*, Linn. Rohrdommel.

44. Fam. Gallinulidae, Wasserhuhner.

- 1 Stück *Rallus aquaticus*, Linn. Wasserralle.
 6 „ *Crex pratensis*, Bechst. Wiesenralle, 1 Gelege.
 1 „ *Gallinula minuta*, Pall. Kleines Sumpfhuhn.
 1 „ *Gallinula porzana*, Linn. Getupfeltes Sumpfhuhn, seltene Varietät.
 5 „ *Gallinula porzana*, 2 Gelege je 2 und 3 Eier.
 4 „ *Gallinula chloropus*, Linn. Grunfussiges Teichhuhn.
 5 „ *Gallinula chloropus*, 1 Gelege.
 1 „ *Fulica atra*, Linn. Schwarzes Wasserhuhn.
 10 „ *Fulica atra*, 2 Gelege je 5 Eier.

XIII. ORDNUNG.

Scolopaces, Schnepfenvögel.

45. Fam. Scolopacidae, Schnepfen.

2	Stück	<i>Numenius arquatus</i> , Cuv. Grosser Brachvogel.
4	"	<i>Numenius arquatus</i> , 1 Gelege.
2	"	<i>Numenius phaeopus</i> , Linn. Regenbrachvogel.
7	"	<i>Limosa aegocephala</i> , Bechst. Schwarzwänzige Uferschnepfe.
2	"	<i>Limosa aegocephala</i> , 1 Gelege.
2	"	<i>Scolopax rusticola</i> , Linn. Waldschnepfe.
1	"	<i>Gallinago scolapacina</i> , Bp. Becassine.
1	"	<i>Gallinago major</i> , Bp. Grosse Sumpfschnepfe.
1	"	<i>Totanus fuscus</i> , Linn. Dunkler Wasserläufer.
5	"	<i>Totanus calidris</i> , Bechst. Heller Wasserläufer.
1	"	<i>Totanus glareola</i> , Linn. Bruchwasserläufer.
8	"	<i>Machetes pugnax</i> , Linn. Kampfschnepfe.
3	"	<i>Tringa alpina</i> , Linn. Alpenstrandläufer.
1	"	Var. <i>Schinzii</i> , Chr. L. Br. Schinz's Strandläufer.
1	"	<i>Tringa Temminckii</i> , Leist. Temminck's Zwergstrandläufer.
1	"	<i>Limicola platyryncha</i> , Temm. Kleiner Sumpfläufer.
2	"	<i>Recurvirostra avocetta</i> , Linn. Avosettschnäbler.
1	"	<i>Phoenicopterus antiquorum</i> , Temm. Flamingo.

XIV. ORDNUNG.

Anseres, Gänseartige Vögel.

46. Fam. Anatidae, Entvögel.

1	Stück	<i>Anser minutus</i> , Naum. Zwerggans.
1	"	<i>Anser cinereus</i> , Meyer. Graugans.
3	"	<i>Anser cinereus</i> , 1 Gelege.
1	"	<i>Anser segetum</i> , Mayer. Saatgans.
3	"	<i>Anser cygnoides</i> , Pall. Schwanengans.
2	"	<i>Cygnus olor</i> , Gm. Höckerschwan.
2	"	<i>Tadorna cornuta</i> , Gm. Brandente.
1	"	<i>Spatula clypeata</i> , Linn. Löffelente.
2	"	<i>Spatula clypeata</i> , 1 Gelege.
6	"	<i>Anas boschas</i> , Linn. Stockente.
2	"	<i>Anas acuta</i> , Linn. Spiessente.
1	"	<i>Anas strepera</i> , Linn. Mittelente.
1	"	<i>Anas querquedula</i> , Linn. Knäckente.
5	"	<i>Anas querquedula</i> , 1 Gelege.
2	"	<i>Anas crecca</i> , Linn. Krickente, 1 Gelege.
1	"	<i>Anas penelope</i> , Linn. Pfeifente.
3	"	<i>Fuligula nyroca</i> , Gildenst. Moorente.
1	"	<i>Fuligula ferina</i> , Linn. Tafelente.
2	"	<i>Fuligula marila</i> , Linn. Bergente.
1	"	<i>Fuligula cristata</i> , Leach. Reiherente.
1	"	<i>Clangula glaucion</i> , Linne. Schellente.
1	"	<i>Harelda glacialis</i> , Leach. Eisente.
1	"	<i>Erismatura leucocephala</i> , Scop. Ruderente.
3	"	<i>Somateria mollissima</i> , Linn. Eiderente.

- 3 Stück *Anas domestica*, Linn. Hausente.
 1 „ *Anas domestica*. In diesem Ei befand sich der im Spiritus-
 fläschchen aufbewahrte kleine Fleischkörper. Die
 Oeffnung im Ei war von Natur aus.
 2 „ *Anas moschata*, Linn. Bisamente.
 2 „ *Mergus serrator*, Linn. Mittlerer Säger.

XV. ORDNUNG.

Colymbidae, Taucher.

47. Fam. Alcidae, Alken.

- 4 Stück *Uria troile*, Linn. Dumme Lumme.
 1 „ *Uria grylle*, Linn. Gryll-Lumme.
 1 „ *Mergulus alle*, Linn. Zwergalk.
 1 „ *Alca torda*, Linn. Tordalk.
 1 „ *Mormon fratercula*, Temm. Nordischer Larventaucher.

48. Fam. Podicipidae, Krontaucher.

- 3 Stück *Podiceps cristatus*, Linn. Haubentaucher.
 2 „ *Podiceps rubricollis*, Gm. Rothalsiger Steissfuss.
 2 „ *Podiceps rubricollis*. 1 Gelege.
 1 „ *Podiceps arcticus*, Boie. Hornsteissfuss.
 2 „ *Podiceps nigricollis*, Lundew. Ohrensteissfuss.
 3 „ *Podiceps minor*, Gm. Zwergsteissfuss.
 4 „ *Podiceps minor*. 2 Gelege je 2 Eier.

49. Fam. Colymbydae, Seetaucher.

- 1 Stück *Colymbus arcticus*, Linn. Polarseetaucher.
 1 „ *Colymbus glacialis*, Linn. Eisseetaucher.
 1 „ *Colymbus septentrionalis*, Linn. Nordseetaucher.

50. Fam. Pelecanidae, Pelikane.

- 1 Stück *Pelecanus onocrotalus*, Linn. Gemeiner Pelikan.
 1 „ *Pelecanus minor*, Rüpp. Kleiner Pelikan. Donau-Delta.
 1 „ *Pelecanus crispus*, Bruch. Krausköpfiger Pelikan.
 1 „ *Carbo cormoranus*, M. und W. Kormoranscharbe.
 1 „ *Carbo graculus*, Linn. Krähenscharbe.
 1 „ *Carbo pygmaeus*, Pall. Zwergscharbe.
 1 „ *Sula bassana*, Linn. Basstölpel.

51. Fam. Procellaridae, Sturmvoegel.

- 1 Stück *Puffinus anglorum*, Kuhl. Nordischer Tauchersturmvoegel.
 1 „ *Puffinus glacialis*, Linn. Eissturmvoegel.
 1 „ *Thalassidroma pelagica*, Linn. Kleiner Schwalbensturmvoegel.

XVI. ORDNUNG.

Laridae, Mövenartige Voegel.

52. Fam. Lestrinae, Raubmöven.

- 1 Stück *Lestris catarrhactes*, Linn. Grosse Raubmöve.
 1 „ *Lestris parasitica*, Linn. Schmarotzer Raubmöve.
 1 „ *Lestris Buffonii*, Boie. Kleine Raubmöve.

53. Fam. Laridae, Möven.

- 1 Stück *Larus marinus*, Linn. Mantelmöve.
 1 „ *Larus argentatus*, Brünn. Nordische Silbermöve.

2 Stück	<i>Larus argentatus</i> , 1 Gelege.
1 "	Var. <i>leucophaeus</i> , Licht. Graumantelmöve.
2 "	<i>Larus fuscus</i> , Linn. Heringsmöve, 1 Gelege.
2 "	<i>Larus cauus</i> , Linn. Sturmmöve, 1 Gelege.
1 "	<i>Larus glaucus</i> . Brünn. Eismöve.
1 "	<i>Larus leucopterus</i> , Fab. Polarmöve.
1 "	<i>Larus gelastes</i> , Licht. Rosensilbermöve.
1 "	<i>Rissa tridactyla</i> , Linn. Dreizehige Möve.
1 "	<i>Larus ichtyaetus</i> , Pall. Fischermöve.
1 "	<i>Xema melanocephalum</i> , Natt. Schwarzköpfige Möve.
1 "	<i>Xema minutum</i> , Pall. Zwergmöve.
19 "	<i>Xema ridibundum</i> , Linn. Lachmöve.
3 "	<i>Xema ridibundum</i> , 1 Gelege.

54. Fam. Sterninae, Seeschwalben.

1 Stück	<i>Sterna caspia</i> , Pall. Raubmeerschwalbe.
2 "	<i>Sterna anglica</i> . Mont. Lachmeerschwalbe, 1 Gelege.
5 "	<i>Sterna cautiaca</i> , Gm. Brandmeerschwalbe.
2 "	<i>Sterna argentata</i> , Naum. Silbergraue Meerschwalbe.
6 "	<i>Sterna fluviatilis</i> , Naum. Flusseeeschwalbe.
6 "	<i>Sterna minuta</i> , Linn. Zwergseeeschwalbe.
1 "	<i>Hydrochelidon hybrida</i> , Pall. Weissbärtige Seeschwalbe.
3 "	<i>Hydrochelidon nigra</i> , Boie. Schwarze Seeschwalbe.

Ornithologisches aus dem hohen Erzgebirge.

Nicht selten kann man unter dem Dachvorsprunge an dem Gesimse eines Hauses zwei bis zehn Nester der *Hirundo urbana*, L. finden. Einzig und allein wird aber das Forsthaus oberhalb Hüttmesgrün unweit des höchsten Berges des Erzgebirges, des Keilberges, dastehen. Obwohl einschichtig am Saume des Waldes gelegen, haben doch dortselbst über 80 (achtzig) Pärchen Hausschwalben unter dem Dache an dem Gesimse ihr Heim aufgeschlagen. Hunderte dieser Vögel umkreisen im Frühjahr und Herbste dieses alleinstehende Gebäude. Es ist eine Freude, diesen fluggewandten Vögeln zuzusehen, wie mit fröhlichem Gezwitzchen einzelne ihre alten Nester ausbessern und andere neue anlegen.

Zum erstenmale wurden im heurigen Frühjahr einige „Kitten“ von *Perdix cinerea*, L. auf dem hohen Erzgebirge beobachtet. Ob dieselben auf demselben sich für ständig niederlassen werden, muss noch abgewartet werden. Auch *Tetrao tetrix*, L. und *Tetrao urogallus*, L. sind heuer sehr zahlreich auf dem hohen Erzgebirge vertreten. Vorzüglich auf dem Hochplateau von Gottesgab kann man oft bei Tage ganze Züge von Birk-Hennen und Hähnen beobachten. Der „Balz“ hat infolge dessen zahlreiche Jagdbeute ergeben. Nicht unerwähnt darf hier bleiben, dass auch der in dem von Herrn Med. Dr. Wladislaw Schier verfassten Aufsätze: „Die Verbreitung der Spaltschmäbler (*Fissirostres*) u. s. w. in Böhmen“ auf Seite 150 dieses Blattes aufgezählte *Nucifraga caryocatactes*, L. in Böhmen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Verzeichniss der VOGELEIER-SAMMLUNG des ornithologischen Vereines in Wien \(Schluss\) 219-224](#)