

die Schwärme wieder, schicken ihre Vorposten aus und lassen sich dann dichtgedrängt nieder. Ohne irgendwie gestört worden zu sein, erheben sie sich abermals gleichzeitig und wiederholen neuerdings ihre Flugübungen, die neben den Teichen an der Strasse stehenden hohen Pappeln öfters als Ruhestation benützend. Unbekümmert um den vorübergehenden Wanderer wird auf diesen Bäumen lebhaft diskutirt und debattirt, so dass dieselben aufgeregten riesigen Bienenstöcken gleichen. Ist endlich die Sonne am westlichen Horizonte verschwunden, so verkündet nur ein Schwirren und Surren aus dem Schilfe die Anwesenheit der unzähligen, daselbst der Nachruhe sich hingebenden Vögel. Je näher ihre Abreise heranrückt, desto grösser und zahlreicher werden mit jedem Tage die Schwärme. Unstreitig müssen sich hier nicht allein die Staare der ganzen Umgebung, sondern auch jene des Erzgebirges vor der Abreise nach Süden sammeln.

W. Peiter.

Die Vögel des Tridentino.

Von Professor A. Bonomi.

(Schluss.)

V. Ordnung: Gallinae.

201. **Syrnhaptes paradoxus** (Pall.) Serratte. Steppenhuhn.
202. **Lagopus mutus** (Montin.) Ronceno, Haselhuhn. Dial. Val di Sole, Pinzolo, Roncone, Condino: taine, Lavis: gallinetta, Ledro: taina gallina, bianca, Cavalese: gallina bianca.
203. **Tetrao urogallus** (Linn.) Gallo cedrone. Auerhuhn. Dial. Lavis. Cavalese: zedron, Fassa: gialcedron, Val di Sole, Pinzolo, Roncone: cedron, Tiarno di sotto: cedro.
204. **Tetrao tetrix** (Linn.) Fagiano di monte, Birkhuhn. Dial. Lavis. Fiemme, Condino: galsforzel, galline, Fassa: gialsforzel, Val di Sole: gal de montagna, Val di Ledro: gal selvadegh, galline, Primiero: storzel, Pinzolo: gal selvadegh, galline selvadeghe.
205. **Bonasa betulina** (Scop.) Francolino di monte. Dial. Lavis, Fiemme, Fassa, Val di Sole, Roncone, Condino: francolin.
206. **Perdix saxatilis** (Meyer.) Coturnice, Steinhuhn. Dial. Lavis, Cavalese: cotorno, Pinzolo, Roncone: cotorn, Val di Sole, Pinzolo: cotorna.
207. **Perdix cinerea** (Lath.) Starna, Rebhuhn. Dial. Val di Sole, di Ledro, Lavis, Roncone, Condino: permiss, Pinzolo: pärmiss.
208. **Coturnix communis** (Bonn.) Quaglia, Wachtel. Dial. Val di Sole, di Ledro, di Fiemme, Lavis, Rendena: quaja, Condino: palpala.

VI. Ordnung: Grallatores.

209. **Otis tarda** (Linn.) Otarda, Grosstrappe.
210. **Otis tetrax** (Linn.) Gallina prataiola, Zwergtrappe.
211. **Glareola pratinnola** (Linn.) Pernice di mare.
212. **Cursorius gallicus** (Gm.) Corriere biondo.
213. **Oedicnemus scolopax** (Gm.) Oechione, Triel.
214. **Vanellus cristatus** (Mey et Wolf.) Pavoncella, Kibitz. Dial. Cavalese, Condino, Lavis: paonzin.
215. **Squatarola helvetica** (Linn.) Pivieressa.

216. *Charadrius pluvialis* (Linn.) Piviere, Goldregenpfeifer.
 217. *Eudromias morinellus* (Linn.) Piviere tortollino, Mornell.
 218. *Aegialitis hiaticula* (Linn.) Corriere grosso, Sandregenpfeifer.
 219. *Aegialitis curonica* (Gm.) Corriere piccolo.
 220. *Aegialitis cantiana* (Lath.) Fratino.
 221. *Strepilas interpres* (Linn.) Voltapietre, Steinwalzer.
 222. *Haematopus ostralegus* (Linn.) Beccaccia di mare, Aulsternfischer.
 223. *Recurvirostra avocetta* (Linn.) Avocetta, Avocettensabler.
 224. *Himantopus candidus* (Bonn.) Cavalier d'Italia.
 225. *Phalaropus fulicarius* (Linn.) Falaropo a becco largo.
 226. *Calidris arenaria* (Linn.) Calidra.
 227. *Limicola platyrrhyncha* (Temm.) Gamberchio frullino, Kleiner Sumpflufer.
 228. *Pelidna subarquata* (Guld.) Piovanello.
 229. *Pelidna alpina* (Linn.) Piovanello pancia nera.
 230. *Actodromas minuta* (Leisl.) Gamberchio.
 231. *Actodromas Temmincki* (Leisl.) Gamberchio nano.
 232. *Tringa canutus* (Linn.) Piovanello maggiore.
 233. *Machetes pugnax* (Linn.) Gambetta, Kampfschnepfe.
 234. *Tringoides hypoleucus* (Linn.) Piro-piro piccolo.
 235. *Totanus ochropus* (Linn.) Piro-piro culbianco. Dial. Lavis: beccanot, Condino: beccanella.
 236. *Totanus glareola* (Gmel.) Piro-piro boscareccio.
 237. *Totanus fuscus* (Linn.) Totano moro, Dunkler Wasserlufer.
 238. *Totanus calidris* (Linn.) Pettegola, Gambettwasserlufer.
 239. *Totanus stagnatilis* (Bechst.) Piro-piro gambe lunghe, Teichwasserlufer.
 240. *Totanus glottis* (Bechst.) Pantana, Heller Wasserlufer.
 241. *Limosa aegocephala* (Bechst.) Pittima, Schwarzschwanzige Uferschnepfe.
 242. *Limosa rufa* (Leach.) Pittima minore.
 243. *Numenius arquata* (Linn.) Chiurlo, Grosser Brachvogel.
 244. *Numenius tenuirostris* (Vieill.) Chiurlotello, Dunnschnabeliger Brachvogel.
 245. *Numenius phaeopus* (Linn.) Chiurlo piccolo, Regenbrachvogel.
 246. *Scolopax rusticola* (Linn.) Beccaccia, Waldschnepfe. Dial. Bleggio, Val di Sole, Fassa: beccaccia. Rovereto, Trento, Fiemme, Roncone: becazza.
 247. *Gallinago maior* (Gmel.) Croccolone, Grosse Sumpfschnepfe. Dial. Rovereto anche: becchetta.
 248. *Gallinago scolopacina* (Bp.) = *G. coelestis* (Frenzel) Beccaccino, Becassine.
 249. *Gallinago gallinula* (Linn.) Frullino, Kleine Sumpfschnepfe. Dial. Lavis: beccanot piccol.
 250. *Rallus aquaticus* (Linn.) Porciglione, Wasserralle. Dial. Lavis: Pinciorlo, Condino: Pinzorlo.
 251. *Crex pratensis* (Bechst.) Re di quaglie, Wachtelkonig. Dial. Lavis, Val di Ledro, Cavalese: redequaie.
 252. *Ortygometra porzana* (Linn.) Voltolino. Dial. Trento: squarziana.
 253. *Ortygometra Bailloni* (Vieill.) Schiribilla grigiata.
 254. *Ortygometra parva* (Scop.) Schiribilla.

255. *Gallinula chloropus* (Linn.) Sciabica. Grünfüßiges Teichhuhn. Dial. Lavis; fölega piccola, Lizzana; girardina.
 256. *Fulica atra* (Linn.) Fologa. Schwarzes Wasserhuhn. Dial. Lavis; fölega grossa.
 257. *Grus communis* (Bechst.) Gru. Gemeiner Kranich.
 258. *Ardea cinerea* (Linn.) Airone. Grauer Reiher.
 259. *Ardea purpurea* (Linn.) Airone rosso. Purpurreiher.
 260. *Egretta alba* (Linn.) Sgarza. Silberreiher.
 161. *Egretta Garzetta* (Linn.) Sgarzetta. Seidenreiher.
 262. *Ardeola ralloides* (Scop.) Sgarza ciuffetto. Rallenreiher.
 263. *Ardeola minuta* (Linn.) Nonnotto, Tarabusino, Zwergreiher.
 264. *Botaurus stellaris* (Linn.) Tarabuso. Rohrdommel.
 265. *Nycticorax griseus* (Linn.) Corvo di notte. Nachtreiher.
 266. *Ciconia alba* (Schäff.) Cicogna bianca. Weisser Storch.
 267. *Ciconia nigra* (Linn.) Cicogna nera. Schwarzer Storch.
 268. *Plegadis falcinellus* (Linn.) Mignattaio.
 269. *Platalea leucorodia* (Linn.) Spatola. Löffelreiher.
 270. *Phoenicopterus roseus* (Pall.) Fiammante. Flamingo.

VII. Ordnung: Anseres.

271. *Anser cinereus* (Meyer.) Oca selvatica. Graugans.
 272. *Anser segetum* (Gmel.) Oca granaiola. Saatgans. Dial. Cavalese, Lavis; Oco selvadegh.
 273. *Anser albifrons* (Scop.) Oca lombardella. Blässengans.
 274. *Bernicla brenta* (Pall.) Oca colombaccio.
 275. *Cygnus olor* (Gmel.) Cigno. Höckereschwan.
 276. *Cygnus musicus* (Bechst.) Cigno selvatico. Singschwan.
 277. *Tadorna cornuta* (Gmel.) Volpoca.
 278. *Anas boscas* (Linn.) Germano. Dial. Cavalese, Lavis; anedra selvadega. Condino; anedra mazurrina.
 279. *Chaulelasmus streperus* (Linn.) Canapiglia.
 280. *Mareca penelope*. (Linn.) Fischione. Pfeifente.
 281. *Dafila acuta* (Linn.) Codone. Spiessente.
 282. *Spatula clypeata* (Linn.) Mestolone. Löffelente.
 283. *Querquedula crecca* (Linn.) Alzavola. Krickente.
 284. *Querquedula circia* (Linn.) Marzaiola.
 285. *Fuligula rufiga* (Pall.) Germano turco. Kolbenente.
 286. *Fulix nyroca* (Guld.) Moretta tabaccata. Moorente.
 287. *Fulix cristata* (Leach.) Moretta. Reiherente.
 288. *Fulix Marila* (Linn.) Moretta grigia.
 289. *Fulix ferina* (Linn.) Moriglione. Tafelente.
 290. *Bucephala clangula* (Linn.) Quattr'occhi.
 291. *Harlelda glacialis* (Linn.) Moretta codona.
 292. *Somateria mollissima* (Linn.) Edredone. Eiderente.
 293. *Oedemia fusca* (Linn.) Orco marino. Sammetente.
 294. *Oedemia nigra* (Linn.) Orchetto marino. Trauerente.
 295. *Mergellus albellus* (Linn.) Pesciaiola.
 296. *Mergus merganser* (Linn.) Smergo maggiore. Grosser Säger.
 297. *Mergus serrator* (Linn.) Smergo minore. Mittlerer Säger.
 298. *Phalacrocorax carbo* (Linn.) Marangone. Scharbe.

299. *Pelecanus onocrotalus* (Linn.) Pellicano. Pelikan.
300. *Sterna fluviatilis* (Naum.) Rondine di mare. Flusseeeschwalbe.
301. *Sterna minuta* (Linn.) Fraticello. Zwergseeeschwalbe.
302. *Gelochelidon anglica* (Montagn.) Beccapesci inglese.
303. *Hydrochelidon hybrida* (Pall.) Rondine di mare piombata.
304. *Hydrochelidon leucoptera* (Schinz.) Mignattino ali-bianche.
305. *Hydrochelidon fissipes* (Linn.) Mignattino.
306. *Chrocephalus melanocephalus* (Natt.) Gabbiano corralino.
307. *Chrocephalus ridibundus* (Linn.) Gabbiano.
308. *Chrocephalus minutus* (Pall.) Gabbianello.
309. *Larus canus* (Linn.) Gavina. Sturmmöve.
310. *Larus cachinnans* (Pall.) Gabbiano reale.
311. *Larus marinus* (Linn.) Mugnaiaccio. Mantelmöve.
312. *Larus fuscus* (Linn.) Zafferano. Häringsmöve.
313. *Rissa tridactyla* (Linn.) Gabbiano tridatilo. Stummelmöve.
314. *Stercorarius parasiticus* (Linn.) Labbo coda-lunga.
315. *Stercorarius pomatorhinus* (Temm.) Gabbiano nero.
316. *Colymbus glacialis* (Linn.) Strolaga maggiore. Eistaucher.
317. *Colymbus arcticus* (Linn.) Strolaga mezzana. Polarseetaucher.
318. *Colymbus septentrionalis* (Linn.) Strolagaminnore. Nordseetaucher.
319. *Podiceps cristatus* (Linn.) Svasso maggiore. Haubensteissfuss.
320. *Podiceps griseigena* (Bodd.) Svasso dal collo rosso.
321. *Podiceps auritus* (Linn.) Svasso cornuto. Ohrentaucher.
322. *Podiceps nigricollis* (C. L. Brehm.) Svasso piccolo.
323. *Podiceps minor* (Gmel.) Tuffetto. Flusstauer.

Prof. Targioni-Tozzetti: Relazioni inlovno ai lavori della R. Stazioni di entomologia agraria in Firenze per gli anni 1883, 1884, 1885.

(Annali di agricol. Firenze 1888.)

Bei Erwähnung der Sperlinge, als der Agricultur schädlicher Vögel, gibt Professor Targioni-Tozzetti eine kurze Uebersicht der in Italien lebenden Fringeliden und Emberiziden u. s. w.

Fringilla coelebs, L. Jene Individuen, welche im Herbst einwandern, reteriren im Frühjahr und die zurückgebliebenen ziehen sich im Sommer in die Gebirgswaldungen.¹⁾

— *montifringilla*, L. zeigt sich auch, aber in minderer Menge.
Passer montanus, L.²⁾

— *hispaniolensis*, Tem.³⁾ (*P. salicicola* Vieill.)

— *Italia*, Vieill.⁴⁾ (*Fringilla cisalpina* T.)

— *domesticus*, L.⁵⁾ Diese 4 Species unterscheiden sich in ihrer Form und in ihrem Benehmen so wenig, dass sie wohl als Modification eines und desselben Typus zu betrachten. *P. Italiae* ist charakteristisch für den italienischen Continent und die Halbinsel; wenn er auch den Feldern, Obstgärten und anderen Culturen manchen Schaden bringt, so ist derselbe doch nicht der Art, um

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s): Bonomi Augustin

Artikel/Article: [Die Vögel des Tridentino. 458-461](#)