

61. *Turdus musicus*, L. Ital. Tordo bottaccio. Im Dialect Tord.
62. *Turdus iliacus*, L. Ital. Tordo sassello. Im Dialect Duro spinard, Züfl.
63. *Turdus pilaris*, L. Ital. Cesena. Im Dialect Viscarda.
64. *Merula nigra*, Leach. Ital. Merlo. Im Dialect Merlo.
65. *Merula torquata*, L. Ital. Merlo col petto bicuco. Im Dialect Merlo de montagna.
66. *Monticola cyaneus*, L. Ital. Passera solitaria. Im Dialect Passera sulitaria.
67. *Monticola saxatilis*, L. Ital. Codirossone. Im Dialect Currassulon.
68. *Saxicola oenanthe*, L. Ital. Culbianco. Im Dialect Cubianch.
69. *Pratincola rubetra*, L. Ital. Stiaccino. Im Dialect Taragu, Taraguin, Machett.
70. *Pratincola rubicola*, L. Ital. Saltimpalo. Im Dialect Taragu? Maratt.
71. *Ruticilla phoenicurus*, L. Ital. Codirosso. Im Dialect Cuross.
72. *Ruticilla titys*, Scop. Ital. Codirosso spazza camino. Im Dialect Curóss-ferè, Murettou.
73. *Cyanecula Wolfi*, Brehm. Ital. Pettazzurro occidentale.
74. *Erithacus rubecula*, L. Ital. Pettiroso. Im Dialect Picett, Pettróss.
75. *Luscinia vera*, Sandicoll. Ital. Rusignolo. Im Dialect Rusigneu.

(Schluss folgt.)

## Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm.

(Fortsetzung.)

154. (539) *Turdus fuscatus* 1.
155. (540) *Turdus atrigularis* 2.
156. (541) *Turdus obsoletus* 1.
157. (542—544) *Turdus migratorius megarhynchos* 2. *mikrorhynchos* 2. minor 1.
158. (545) *Turdus ruiventris* 1.
159. (546) *Turdus ferrugineus* 1.
160. (547) *Turdus Wilsonii* 1.
161. (548) *Turdus mustelinus* 1.
162. (549) *Turdus pygmaeus* 1.
163. (550) *Turdus nanus* 1.
164. (551) *Oreocinclu varia* 1.
165. (552) *Mimus rufus* 1.
166. (553) *Mimus polyglottus* 1.
167. (554—555) *Picnonotos arsinoë major* 2. minor 2.

168. (556—559) *Cinclus aquaticus* verus 6, medius 9, obsoletus 7, peregrinus 5.  
 169. (560) *Cinclus rupestris* 7.  
 170. (561) *Cinclus meridionalis* 6.  
 171. (562) *Cinclus septentrionalis* 3.  
 172. (563) *Cinclus melanogaster* 1.  
 173. (564) *Cinclus leucogaster* 1.  
 174. (565) *Cinclus Khevenhuelleri* 1.

## Saxicolidae.

175. (566—568) *Dromolaea leucura* magnirostris 5, parvirostris 5, nigerrima 1.  
 176. (569) *Dromolaea leucocephala* 2.  
 177. (570—571) *Dromolaea leucopyga* major 2, minor 1.  
 178. (572) *Saxicola leucomela* 2.  
 179. (573—574) *Saxicola lugens* major 2, minor 1.  
 180. (575—582) *Saxicola oenanthe* grisea 5, cinerea 8, septentrionalis 6, alpestris 4, melanoptera 5, maritima 4, crassirostris 2, macrorhynchos 5.  
 181. (583—584) *Saxicola saltatrix* major 2, minor 1.  
 182. (585—587) *Saxicola rufa* longirostris 2, brevisrostris 4, crassirostris 2.  
 183. (588—589) *Saxicola stapazina* brachyrhynchos 3, macrorhynchos 2.  
 184. (590—591) *Saxicola paradoxa* major 3, minor 2.  
 185. (592—594) *Saxicola aurita* brevisrostris 2, longirostris 3, occidentalis 3.  
 186. (595—596) *Saxicola nigribarbata* crassirostris 2, tenuirostris 2.  
 187. (597—603) *Pratincola rubetra* major 3, media 4, planiceps 3, longirostris 2, pratorum 8, septentrionalis 4, crambes 5.  
 188. (604—606) *Pratincola rubicola* fruticeti 10, media 4, titys 3.  
 189. (607) *Pratincola maura* 6.  
 190. (608) *Pratincola Hemprichii* 1.

## Sylviidae.

191. (609—610) *Adophoneus nisorius* undatus 5, undulatus 3.  
 192. (611) *Curruca Orphea* 6.  
 193. (612) *Curruca Vidalii* 4.  
 194. (613) *Curruca musica* 1.  
 195. (614—615) *Curruca atricapilla* pileata 5, nigricapilla 7.  
 196. (616) *Curruca ruficapilla* 5.  
 197. (617—619) *Curruca hortensis* musica 7, grisea 4, brachyrhynchos 2.  
 198. (620) *Curruca guttata* 1.  
 199. (621—623) *Curruca cinerea* cinerea 9, fruticeti 3, caniceps 5.  
 200. (624—625) *Curruca conspicillata* major 2, minor 3.  
 201. (626—628) *Curruca leucopogon* major 2, minor 4, orientalis 1.  
 202. (629—631) *Curruca garrula* molaria 3, dumetorum 3, sordida 7.  
 203. (632) *Curruca superciliaris* 1.  
 204. (633) *Curruca septentrionalis* 3.  
 205. (634) *Curruca assimilis* 4.  
 206. (635) *Curruca obscura* 1.  
 207. (636—638) *Pyrophthalma melanocephala* major 7, luctuosa 2, longirostris 3.  
 208. (639) *Pyrophthalma sarda* 1.  
 209. (640—641) *Melizophilus provincialis* macrourus 3, brachyurus 4.

210. (642—646) *Phyllopneuste trochilus fitis* 5. *arborea* 4. *acredula* 2. *septentrionalis* 2. *gracilis* 5.  
 211. (647—648) *Phyllopneuste Bonelli montana* 3. *Nattereri* 3.  
 212. (649—651) *Phyllopneuste rufa pinetorum* 7. *solitaria* 2. *sylvestris* 5.  
 213. (652—653) *Phyllopneuste sibillatrix megarhynchos* 6. *sylvicola* 2.  
 214. (654—656) *Hypolais hortensis alticeps* 2. *media* 2. *planiceps* 5.  
 215. 657—659. *Hypolais polyglotta major* 2. *minor* 2. *intercedens* 2.  
 216. (660) *Hypolais olivetorum* 2.  
 217. (661) *Hypolais clausa* 2.  
 218. (662) *Hypolais paradoxa* 2.  
 219. (663—664) *Hypolais pallida crassirostris* 2. *tenuirostris* 2.  
 220. (665—667) *Hypolais Arigonis platyrhynchos* 2. *longirostris* 2. *brevirostris* 2.  
 221. (668) *Calliope kamschatkensis* 2.  
 222. (669—672) *Luscinopsis fluviatilis strepitans* 2. *alticeps* 2. *macrorhynchos* 2. *macroura* 2.  
 223. (673) *Luscinopsis Wodzickii* 1.  
 224. (674—676) *Luscinopsis luscinioides rufescens* 2. *macrorhynchos* 1. *brachyrhynchos* 1.  
 225. 677—680) *Locustella vera major* 2. *fruticeti* 2. *tenuirostris* 3. *anthirostris* 3.  
 (Fortsetzung folgt.)

## Literarisches.

**Ornis.** Internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Herausgegeben von Prof. Dr. R. Blasius und Prof. Dr. G. v. Hayek. V. Jahrg. I. bis III. Heft. Preis des Jahrganges (4 Hefte) 4 fl. 8 Mark). Wien. Karl Gerold's Sohn.

Von dieser vortrefflichen Vierteljahrsschrift liegen uns heute drei Hefte des laufenden Jahrganges vor.

Heft I (I—XXXIV und 1—164) bringt einen von Prof. Dr. R. Blasius verfassten, sehr umfangreichen Nachruf nach dem verstorbenen Protector des permanenten internationalen ornithologischen Comité's, Kronprinz Rudolf, mit dem dem Comité seine Hauptstütze gefallen; dann die Aufsätze: Die Vögel Transcaspiens. Von Dr. G. Radde und Dr. A. Walter (mit einer Tafel. S. 1—128). — Der Tannenheherzug durch Oesterreich-Ungarn im Herbste 1887. Von Victor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen (mit einer Tafel) S. 129—148. — Description of a new *Cinnyris* by Dr. Julius von Madarash (With a plate). S. 149. — Prof. Dr. Modest Bogdanow. Von Th. Pleske. S. 150—155. — Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers (*Muscicapa parva*. Bechst.) in Schweden. Von Dr. Karl Sundström. S. 156—164. — Mittheilungen.

Heft II. (S. 165—343) enthält: Die Vögel Transcaspiens. Von Dr. G. Radde und Dr. A. Walter (Schluss). S. 167—279. — Die geographische Verbreitung der Elstern, Genus *Pica* Vieill. Von Dr. Franz Diederich in Leipzig. (Mit einer Karte). S. 280—332. — Phänologische Notizen aus Holland. Von J. E. Coenradte (mitgetheilt von Paul Leverkühn). S. 333—335. Erwiderung auf Herrn Prof. M. N. Bogdanows (†) Kritik der *Ornis caucasica*. Von Dr. G. Radde. S. 336—340. — Zusatz zum Artikel. Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers (*Muscicapa parva*. Bechst.) in Schweden. Von Dr. Karl Sundström. S. 341. — Mittheilungen. S. 341—342.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm. 560-562](#)