

Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm.

(Fortsetzung.)

226. (681) *Losculiro tellaracistris* 3.
 227. (682—683) *Calamoherbe turdoides lacustris* 7, *stagnatilis* 5.
 228. (684—685) *Calamoherbe major inegarhynchos* 3, *microrhynchos* 2.
 229. (686) *Calamoherbe longirostris* 1.
 230. (687 — 689) *Calamoherbe arundinacea alnorum* 14, *arbustorum* 12, *salicaria* 5.
 231. (690 — 693) *Calamoherbe pinetorum hydrophilos* 15, *piscinarum* 7, *orientalis* 1, *ambigua* 4.
 232. (694—696) *Calamoherbe Brehmii crassirostris* 5, *canneti* 9, *pygmaea* 3.
 233. (697—699) *Calamoherbe palustris major* 4, *philomela* 5, *musica* 4.
 234. (700) *Cettia sericea* 2.
 235. (701) *Caricicola melanopogon* 3.
 236. (702—708) *Caricicola phragmitis tritici* 10, *subphragmitis* 4, *schoeni-baenus* 6, *danubialis* 4, *brachyrhynchos* 2, *acurostris* 7, *juncorum* 4.
 237. (709—713) *Caricicola aquatica cariceti* 3, *limicola* 3, *striata* 4, *longirostris* 4, *crassirostris* 3.
 238. (714—715) *Cisticola schoeniola crassirostris* 4, *tenuirostris* 3.
 239. (716—717) *Aedon familiaris Bruchii* 2, *brachyrhynchos* 2.
 240. (718—724) *Aedon galactodes communis* 3, *major* 2, *brachyrhynchos* 3, *macrorhynchos* 1, *brachypteros* 2, *gracilis* 2, *meridionalis* 2.
 241. (725—730) *Troglodytes europaeus domesticus* 5, *tenuirostris* 7, *bifasciatus* 2, *crassirostris* 1, *pygmaeus* 2, *taeniotos* 5.
 242. (731) *Troglodytes sylvestris* 3.
 243. (732—733) *Troglodytes Naumanii punctatus* 4, *maculatus* 2.
 244. (734) *Troglodytes borealis* 2.

Paridae.

245. (735—741) *Sitta caesia major* 2, *pinetorum* 7, *longirostris* 1, *advena* 4, *pygmaea* 1, *hungariae* 2, *septentrionalis* 4.
 246. (742—744) *Sitta europaea caesia* 2, *sordida* 2, *foliorum* 4.
 247. (745) *Sitta uralensis* 2.
 248. (746) *Sitta syriaca* 3.
 249. (747—750) *Parus major robustus* 17, *perniciosus* 7, *intercedens* 1, *paradoxus* 1.
 250. (751—753) *Parus cyanotos eximius* 2, *accedens* 3, *pallidus* 14.
 251. (754—756) *Parus ater pinetorum* 7, *abietum* 5, *carbonarius* 5.
 252. (757—758) *Cyanistes cyanus major* 2, *minor* 2.
 253. (759) *Cyanistes violaceus* 1.
 254. (760—763) *Cyanistes coeruleus glaucopterus* 6, *megarhynchos* 8, *coerulescens* 7, *meridionalis* 4.
 255. (764) *Baeolophus bicolor* 2.
 256. (765) *Poëcila sibirica* 2.
 257. (766) *Poëcila melanothorax* 1.
 258. (767) *Poëcila lugubris* 1.

259. (768) *Poëcila lugens* 1.
 260. (769) *Poëcila alpestris* 4.
 261. (770—771) *Poëcila borealis vulgaris* 5, *assimilis* 1.
 262. (772—773) *Poëcila salicaria accedens* 3, *murina* 4.
 263. (774—777) *Poëcila palustris vulgaris* 7, *subpalustris* 5, *sordida* 5.
 2 longirostris.
 264. (778) *Poëcila stagnatilis* 5.
 265. (779) *Lophophanes rufescens* 6.
 266. (780—781) *Lophophanes cristatus mitratus* 6, *septentrionalis* 6.
 267. (782—784) *Mecistura caudata longicauda* 9, *pinetorum* 7, *microrhynchos* 4.
 268. (785—787) *Calamophilus hiarnicus russicus* 3, *arundinaceus* 2, *dentatus* 2.
 269. (788—789) *Aegithalus pendulinus macrourus* 2, *polonicus* 2.
 270. (790—792) *Regulus crocecephalus verus* 9, *septentrionalis* 6, *cryocephalus* 1.
 271. (793—795) *Regulus pyrocephalus communis* 6, *Nilsonii* 5, *brachyrhynchos* 3.
 272. (796) *Regulus griseus* 1.
 273. (797) *Regulus Satrapa* 1.
 274. (798) *Phyllobasileus modestus* 1.

Motacillidae.

275. (799—805) *Motacilla alba vulgaris* 12, *major* 5, *minor* 2, *fasciata* 8, *brachyrhynchos* 12, *sylvestris* 9, *septentrionalis* 11.
 276. (806—808) *Motacilla cervicalis alticeps* 8, *planiceps* 4, *pratensis* 8.
 277. (809) *Motacilla Yarellii* 7.
 278. (810) *Motacilla lugubris* 2.
 279. (811) *Motacilla leucoptera* 2.
 280. (812) *Motacilla capensis* 2.
 281. (813—817) *Pallenura sulphurea communis* 10, *montana* 6, *rivalis* 6, *macroura* 7, *albicollis* 1.

(Fortsetzung folgt.)

Literarisches.

Vierter Jahresbericht der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen, bearbeitet von Dr. H. B. Meyer und Dr. F. Helm mit einer Karte des Königreichs Sachsen nebst Anhängen über das Vorkommen des Rosenstaars in Europa im Jahre 1889 und in früheren Jahren, sowie über die Verbreitung der Kreuzotter im Königreich Sachsen, Dresden 1889.

Dieser Bericht bringt nach einer Einleitung und der Liste der 122 Beobachter im allgemeinen Theile das Verzeichniss der 111 Beobachtungsstationen nebst Notizen über ihre Lage u. dgl., ferner Aufzeichnungen und Tabellen über die Witterung des Jahres 1888 und Bemerkungen über den Vogelzug. Im speciellen Theile werden die gemachten Beobachtungen über die einzelnen Vogelarten mitgetheilt. Der sehr rationell und sorgfältig gearbeitete Jahresbericht bietet wieder viel werthvolles und Interessantes. Von Wichtigkeit sind auch die Anhänge: Die Wanderungen des Rosenstaars (*Postor roseus*) nach Europa, speciell die Wanderung 1889 und; Ueber die Verbreitung der Kreuzotter im Königreich Sachsen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm. 574-575](#)