

Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm.

(Fortsetzung.)

226. (681) *Losculiro tellaracistris* 3.
 227. (682—683) *Calamoherpe turdoïdes lacustris* 7, *stagnatilis* 5.
 228. (684—685) *Calamoherpe major megarhynchos* 3, *microrhynchos* 2.
 229. (686) *Calamoherpe longirostris* 1.
 230. (687—689) *Calamoherpe arundinacea alnorum* 14, *arbustorum* 12,
salicaria 5.
 231. (690—693) *Calamoherpe pinetorum hydrophilos* 15, *piscinarum* 7
orientalis 1, *ambigua* 4.
 232. (694—696) *Calamolherpe Brehmii crassirostris* 5, *canneti* 9, *pygmaea* 3.
 233. (697—699) *Calamolherpe palustris major* 4, *philomela* 5, *musica* 4.
 234. (700) *Cettia sericea* 2.
 235. (701) *Caricicola melanopogon* 3.
 236. (702—708) *Caricicola phragmitis tritici* 10, *subphragmitis* 4, *schoenibaenus* 6, *danubialis* 4, *brachyrhynchos* 2, *acurostris* 7, *juncorum* 4.
 237. (709—713) *Caricicola aquatica cariceti* 3, *limicola* 3, *striata* 4, *longirostris* 4, *crassirostris* 3.
 238. (714—715) *Cisticola schoeniela crassirostris* 4, *tenuirostris* 3.
 239. (716—717) *Aedon familiaris Bruchii* 2, *brachyrhynchos* 2.
 240. (718—724) *Aedon galactodes communis* 3, *major* 2, *brachyrhynchos* 3, *macrorhynchos* 1, *brachypterus* 2, *gracilis* 2, *meridionalis* 2.
 241. (725—730) *Troglodytes europaeus domesticus* 5, *tenuirostris* 7, *hifasciatus* 2, *crassirostris* 1, *pygmaeus* 2, *taeniotos* 5.
 242. (731) *Troglodytes sylvestris* 3.
 243. (732—733) *Troglodytes Naumanii punctatus* 4, *maculatus* 2.
 244. (734) *Troglodytes horealis* 2.

Paridae.

245. (735—741) *Sitta caesia major* 2, *pinetorum* 7, *longirostris* 1, *advena* 4, *pygmaea* 1, *hungariae* 2, *septentrionalis* 4.
 246. (742—744) *Sitta europaea caesia* 2, *sordida* 2, *foliorum* 4.
 247. (745) *Sitta uralensis* 2.
 248. (746) *Sitta syriaca* 3.
 249. (747—750) *Parus major rohustus* 17, *perniciosus* 7, *intercedens* 1, *paradoxus* 1.
 250. (751—753) *Parus cyanotos eximius* 2, *accedens* 3, *pallidus* 14.
 251. (754—756) *Parus ater pinetorum* 7, *abietum* 5, *carbonarius* 5.
 252. (757—758) *Cyanistes cyanus major* 2, *minor* 2.
 253. (759) *Cyanistes violaceus* 1.
 254. (760—763) *Cyanistes coeruleus glaucopterus* 6, *megarhynchos* 8, *coerulescens* 7, *meridionalis* 4.
 255. (764) *Baeolaphus bicolor* 2.
 256. (765) *Poëcila sibirica* 2.
 257. (766) *Poëcila melanothorax* 1.
 258. (767) *Poëcila lugubris* 1.

259. (768) *Poëcila lugens* 1.
 260. (769) *Poëcila alpestris* 4.
 261. (770—771) *Poëcila borealis vulgaris* 5. *assimilis* 1.
 262. (772—773) *Poëcila salicaria accedens* 3. *murina* 4.
 263. (774—777) *Poëcila palustris vulgaris* 7. *subpalustris* 5. *sordida* 5.

2 *longirostris*.

264. (778) *Poëcila stagnatilis* 5.
 265. (779) *Lophophanes rufescens* 6.
 266. (780—781) *Lophophanes cristatus mitratus* 6. *septentrionalis* 6.
 267. (782—784) *Mecistura caudata longicauda* 9. *pinetorum* 7. *microrhynchos* 4.
 268. (785—787) *Calamophilus biarmicus russicus* 3. *arundinaceus* 2. *dentatus* 2.
 269. (788—789) *Aegithalos pendulinus macrourus* 2. *polonicus* 2.
 270. (790—792) *Regulus crococephalus verus* 9. *septentrionalis* 6. *crysocephalus* 1.
 271. (793—795) *Regulus pyrocephalus communis* 6. *Nilsonii* 5. *brachyrhynchos* 3.
 272. (796) *Regulus griseus* 1.
 273. (797) *Regulus Satrapa* 1.
 274. (798) *Phyllobasileus modestus* 1.

Motacillidae.

275. (799—805) *Motacilla alba vulgaris* 12. *major* 5. *minor* 2. *fasciata* 8. *brachyrhynchos* 12. *sylvestris* 9. *septentrionalis* 11.
 276. (806—808) *Motacilla cervicalis alticeps* 8. *planiceps* 4. *pratorum* 8.
 277. (809) *Motacilla Yarelii* 7.
 278. (810) *Motacilla lugubris* 2.
 279. (811) *Motacilla leucoptera* 2.
 280. (812) *Motacilla capensis* 2.
 281. (813—817) *Pallenura sulphurea communis* 10. *montana* 6. *rivalis* 6. *macroura* 7. *albicollis* 1.

(Fortsetzung folgt.)

Literarisches.

Vierter Jahresbericht der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen, bearbeitet von Dr. H. B. Meyer und Dr. F. Helm mit einer Karte des Königreichs Sachsen nebst Anhängen über das Vorkommen des Rosenstaares in Europa im Jahre 1889 und in früheren Jahren, sowie über die Verbreitung der Kreuzotter im Königreich Sachsen, Dresden 1889.

Dieser Bericht bringt nach einer Einleitung und der Liste der 122 Beobachter im allgemeinen Theile das Verzeichniss der 1t1 Beobachtungsstationen nebst Notizen über ihre Lage u. dgl., ferner Aufzeichnungen und Tabellen über die Witterung des Jahres 1888 und Bemerkungen über den Vogelzug. Im speciellen Theile werden die gemachten Beobachtungen über die einzelnen Vogelarten mitgetheilt. Der sehr rationell und sorgfältig gearbeitete Jahresbericht bietet wieder viel werthvolles und interessantes. Von Wichtigkeit sind auch die Anhänge: Die Wanderungen des Rosenstaares (*Postor roseus*) nach Europa, speciell die Wanderung 1889 und; Ueber die Verbreitung der Kreuzotter im Königreich Sachsen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm. 574-575](#)