


## Faunistische Notizen

### *Ocalea rivularis* MILLER, 1851 in Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae)

Michael Schülke, Berlin



Am 2. Dezember 2000 wurde eine Exkursion in den Landkreis Spree-Neiße im äußersten Südosten Brandenburgs durchgeführt, die eigentlich der Kontrolle einer Population von *Thinobius longipennis* (HEER, 1841) dienen sollte. Der Wasserspiegel der Neiße bei Zelz war jedoch so hoch, dass sämtliche von Mai bis September untersuchten Schotterbänke tief unter der Wasseroberfläche lagen. Auch an der steilen Uferböschung waren nur wenige Staphyliniden, unter ihnen keine Vertreter der Gattung *Thinobius* KIESENWETTER zu finden. Unter den wenigen am Steilufer gesammelten Tieren befand sich ein Exemplar der Gattung *Ocalea* ERICHSON, das sich bei näherer Untersuchung als *Ocalea rivularis* MILLER herausstellte. Besagtes Exemplar, ein Männchen, gehört zu der von LOHSE (1974) erwähnten dunklen und etwas kleineren Form, die in ihrer Verbreitung auf die Gebirge Mitteleuropas beschränkt sein soll. Exemplare der hellen und größeren Form lagen zum Vergleich aus Westfalen, aber auch aus Kärnten vor. Der taxonomische Status beider Formen ist zur Zeit noch unklar (TERLUTTER, pers. Mitteilung).

HORION (1967) gibt für Brandenburg zwei alte, bei Berlin und Finkenkrug gesammelte Stücke aus der Sammlung SCHILSKY an und hält das Vorkommen der Art für fraglich. Eine Nachsuche nach den betreffenden Exemplaren in der Sammlung des Museums für Naturkunde Berlin war nicht möglich, da das gesamte Material der Gattung gegenwärtig ausgeliehen ist. Das Vorkommen in Brandenburg kann hiermit jedoch bestätigt werden. Möglicherweise bezieht sich auch die Meldung von RUSCH (1994) für *Ocalea latipennis* SHARP, 1870 (Lug, LKr. Oberspreewald-Lausitz) auf die vorliegende Art. *Ocalea latipennis* ist *O. rivularis* sehr ähnlich und entspricht in der Färbung dunklen Stücken dieser Art. Begleitfauna am Fundort (Staphylinidae): *Rugilus orbiculatus* (PAYKULL, 1789), *Aloconota insecta* (THOMSON, 1856), *Cathyusa scitula* (ERICHSON, 1837), *Acrotona sylvicola* (KRAATZ, 1856), *Oxypoda rufa* KRAATZ, 1856.

HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band XI Staphylinidae 3. Teil Habrocerinae bis Aleocharinae (Ohne Subtribus Athetae). – Überlingen – Bodensee, I-XXIV, 1-419.

LOHSE, G.A. (1974): Staphylinidae II (S, 5-72, 221-304) in: Freude, H., Harde, K.W. & G.A. Lohse: Die Käfer Mitteleuropas, Goecke & Evers, Krefeld, Band 5, 3-381.

RUSCH, J. (1994): Bemerkenswerte Staphylinidenfunde aus der Niederlausitz – Teil III. – Natur und Landschaft in der Niederlausitz, Cottbus 15, 62-78.

**Anschrift des Verfassers:** Michael Schülke, Rue Ambroise Paré 11,  
D-13405 Berlin  
Mail : [mschuelke.berlin@t-online.de](mailto:mschuelke.berlin@t-online.de)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Märkische Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [2001\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Schülke Michael

Artikel/Article: [Oca/ea rivularis Miller, 1851 in Brandenburg \(Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae\) 38](#)