

Faunistische Notizen

Bryaxis curtisii curtisii (LEACH, 1817) in Brandenburg wiedergefunden (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae)



Michael Schülke, Berlin

Bryaxis curtisii (LEACH) ist eine in Europa weit verbreitete und relativ häufige Art, die in Mitteleuropa in zwei Subspezies, *Bryaxis curtisii curtisii* (LEACH): West-, Nord- und Mitteleuropa bis Böhmen, Bayern, Tirol und Norditalien und *Bryaxis curtisii orientalis* (KARAMAN, 1952): Schlesien, Mähren, Oberösterreich, Istrien, Südtalien, vorkommt. Aus Brandenburg liegt nach HORION (1949) nur ein Fund von NERESHEIMER und WAGNER aus dem Jahre 1929 vor (Buckow), auch KÖHLER und KLAUSNITZER (1998) kennen keine aktuellen Funde der Art aus Brandenburg.

Anlässlich einer Exkursion nach Pusack (LKr. Spree-Neiße) wurden am 1. Mai 2000 1♂, 1♀ der Art in einem feuchten Bruchwald nahe der ehemaligen Weißbrücke aus Laubstreu gesiebt (leg. WRASE). Die Belege gehören zu der westlichen Rasse *Bryaxis curtisii curtisii* (LEACH).

HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Band II: Palpicornia – Staphylinoidea (ausser Staphylinidae). – Vittorio Klostermann, Frankfurt a. Main, IV-XXIII, 1-388.

KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4: 1-185.

Anschrift des Verfassers: Michael Schülke
Rue Ambroise Paré 11
D-13405 Berlin
Mail : mschuelke.berlin@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Märkische Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [2001_1](#)

Autor(en)/Author(s): Schülke Michael

Artikel/Article: [Bryaxis curtisii curtisii \(Leach, 1817\) in Brandenburg wiedergefunden \(Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae\) 42](#)