Märkische Ent. Nachr.	ISSN 1438-9665	1. Dezember 2001	Band 3, Heft 2	S. 65-67

Neue Käferfunde aus Berlin (Teil 2)

Jens Esser, Berlin

Abstract

New findings of five rare beetles previously unknown from Berlin or missing more than 50 years were given. Their habitates are listed.

Einleitung

Anknüpfend an faunistische Publikationen der letzten Jahre für Berlin und Brandenburg (ESSER & MÖLLER (1998); ESSER (1998a & b); EICHLER, ESSER & PÜTZ (1999); ESSER (im Druck); EICHLER, ESSER & PÜTZ (im Druck) soll im folgenden ein kleiner Überblick über fünf bemerkenswerte Käferfunde in den letzten Monaten aus Berlin erfolgen.
Es ist zu hoffen, dass die in Deutschland allenthalben zu beobachtende Zuwendung zur Faunistik weiter anhält – ist sie doch Grundlage für viele weitere Studien, gerade zur Biologie der Arten.

Arten

Trachys scrobiculatus KIESENWETTER, 1857
Endlich auch ein Fund der selteneren Prachtkäferart (Buprestidae) aus Berlin: Berlin-Treptow, Johannisthal, ehemaliger Mauerstreifen, 26.05.2000, leg. Esser (3 Ex.). Die Tiere wurden von einem kurzen Nutzrasen gekäschert, in dem aber *Glechoma herderacea* wuchs. Der Fundort wird mittelfristig durch den Bau der Stadtautobahn auf diesem Gelände zerstört werden. Das Vorkommen Berlin/Brandenburg ist also nicht weiter fraglich (ESSER & MÖLLER, 1998).

Reesa vespulae (MILLERON, 1939)
Das Vorkommen dieser Speckkäferart (Dermestidae) war in Berlin/Brandenburg bislang nur unsicher – wenngleich doch sehr wahrscheinlich. Dem Kollegen Thomas Ziska gelang es jetzt zahlreicher Exemplare der Art in einer Plattenbauwohnung habhaft zu werden. Begleitend traten *Attagenus smirnovi* ZHANTIEV, 1973, *Anthrenus pimpinellae* (FABRICIUS, 1775), *A. verbasci* (LINNAEUS, 1767) und *A. museorum* (LINNAEUS, 1761) auf. Die Larven vollziehen ihre Entwicklung in diesem Fall offensichtlich einzeln in Bodennähe (wie auch überwiegend bei *A. smirnovi*) – es sind jedenfalls keine Larven aufgefallen und auch keine Schäden bemerkt worden: Berlin-Köpenick, seit Juni 2000 mehrfach belegt, leg. Ziska.

Meligethes egenus ERICHSON, 1845
Der Fund dieses Glanzkäfers (Nitidulidae) in Berlin war eine Überraschung. Das einzelne Männchen fand sich im Blütenstand einer *Mentha arvensis* (Ackerminze) auf dem Gelände des Ökowerks im Berliner Grunewald, auf dem ich mich dank der Unterstützung durch Andreas Meißner frei bewegen konnte. Begleitend trat *Longitarsus lycopi* (FOUDRAS, 1860) auf: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, 02.07.2000, leg. Esser. Es handelt sich um einen Wiederfund dieser Art in Berlin/Brandenburg (ESSER & MÖLLER, 1998), die nach 1884 (Berlin-Pankow, HORION 1960) nicht mehr nachgewiesen wurde

Gibbium psylloides (CZENPINSKY, 1778)
Ebenfalls überraschend war der Fund eines Exemplares dieses Diebskäfers (Ptinidae) zwischen den Fenstern einer Altbauwohnung in Berlin-Mitte. Sehr wahrscheinlich ist das Tier seiner Entwicklungsstätte in der Deckenfüllung der im obersten Geschoss liegenden Wohnung entwichen und dann im Fenster zu Tode gekommen: Berlin-Mitte, 21.08.2000, leg. Esser.
G. psylloides war nach 1950 nicht mehr aus Berlin/Brandenburg (ESSER & MÖLLER, 1998) gemeldet worden.

Anaspis lurida STEPHENS, 1832
Unter verschiedenen Käfern, welche die Doktorandin Christina Hasselmann mir zur Bestimmung vorlegte, befand sich ein männliches Exemplar dieser Art der Familie Scraptiidae. Es fiel bei der Untersuchung von Linden (als Straßenbaum), die zum Untersuchungszeitpunkt blühten, an: Berlin-Lichtenberg, Grünanlage an der Frankfurter Allee, 06.06.2000, leg. Hasselmann.
Es handelt sich um den ersten Fund dieser Art in Berlin/Brandenburg und im gesamten östlichen Deutschland (ESSER & MÖLLER, 1998, KÖHLER & KLAUSNITZER, 1998).

Dank

Ich danke Frau Christina Hasselmann und den Herren Andreas Meißner und Thomas Ziska (alle Berlin) für Ihre Unterstützung beim Zustandekommen der aufgeführten Nachweise.

Literatur

EICHLER, R., J. ESSER & A. PÜTZ (1999): Über neue und verschollene Käferarten aus Brandenburg und Berlin. Entom. Nachr. und Ber., Bd. **43**/3+4, S. 207-216.
EICHLER, R., J. ESSER & A. PÜTZ (im Druck): Neue Nachweise bemerkenswerter märkischer Käferarten (Coleoptera).
ESSER, J. & G. MÖLLER (1998): Teilverzeichnis Brandenburg. In: KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Entom. Nachr. und Ber., Beiheft **4**.

ESSER, J. (1998a): Interessante Käferfunde aus Deutschland (Col.). Entom. Nachr. und Ber., Bd. **42**/1+2; S. 95-97.
ESSER, J. (1998b): Neue Käferfunde aus Berlin. Entom. Nachr. und Ber., Bd. **42**/4, S. 241-242.
ESSER, J. (im Druck): Weitere Käferfunde aus Berlin und der Mark.
HORION, A. (1960): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. VII, S. 85/86. Überlingen.
KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Entom. Nachr. und Ber., Beiheft **4**.

Anschrift des Verfassers:

Jens Esser
Wilhelm-Kuhr-Str. 4
D-13187 Berlin
e-mail: jens_esser@yahoo.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Märkische Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: 2001_2

Autor(en)/Author(s): Esser Jens

Artikel/Article: Neue Käferfunde aus Berlin (Teil 2) 65-67