

Aktualisierte Checkliste der Staphyliniden Berlins und Brandenburgs mit Bemerkungen zur Bibliographie und Geschichte der Staphylinidenforschung in Berlin und Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae)



Michael Schülke, Berlin

Summary

Revised checklist of the staphylinid beetles of Berlin and Brandenburg, with remarks on the bibliography and the history of the staphylinid research in Berlin and Brandenburg (Coleoptera).

A revised checklist of the family Staphylinidae of Berlin and Brandenburg is presented. 1027 species of rove beetles are recorded for the study area, 957 of them with records since 1950, 64 with records between 1900 and 1950, four with records before 1900 only, two with records without date. Further 17 species are recorded as doubtful. For all species with changed names or status and with taxonomic problems, further informations are given. A short sketch of the history of the staphylinid research in Berlin and Brandenburg is given. An overview of relevant collections and collectors is given and a bibliography of the literature containing informations on staphylinids from Berlin and Brandenburg is compiled.

Zusammenfassung

Eine aktualisierte Checkliste der Familie Staphylinidae von Berlin und Brandenburg wird vorgelegt. 1027 Arten von Kurzflüglern können für das Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden, 957 von ihnen mit Belegen nach 1950, 64 mit Meldungen zwischen 1900 und 1950, vier Arten nur mit Nachweisen vor 1900 und zwei Arten mit Nachweisen ohne Datumsangabe. Nachweise von weiteren 17 Arten müssen als zweifelhaft betrachtet werden. Für alle Arten mit geändertem Namen oder Status, sowie taxonomischen Problemen, werden zusätzliche Informationen zusammengestellt. Die Geschichte der Erforschung der Staphylinidae von Berlin und Brandenburg wird in einer kurzen Übersicht dargestellt. Eine Übersicht der relevanten Sammlungen und Sammler wird zusammengestellt und die Literatur über Staphyliniden für Berlin und Brandenburg zusammengefasst.

Key words

Coleoptera, Staphylinidae, faunistics, Palaearctic, Germany, Berlin and Brandenburg, checklist, bibliography, collectors, collections.

1. Einleitung

Seit der Bearbeitung der märkischen Käfer durch ERICHSON (1837, 1839a) gibt es, abgesehen von den summarischen und nicht überprüfbaren Angaben von SCHILSKY (1888, 1909) und KUHN (1913), keine zusammenfassenden Darstellungen der Verbreitung von Staphyliniden in Berlin und Brandenburg. Die zahlreichen inzwischen publizierten Nachträge, angefangen bei DELAHON (1913ff.), NERESHEIMER & WAGNER (1915ff.), bis zu KÖRGE (1956ff.) beinhalten jeweils nur Neu- und Wieder-

funde seltener Arten. HORION (1963, 1965, 1967) hat viele Daten über die Familie zusammengetragen, in seinen Arbeiten fehlen aber ebenfalls alle Meldungen über von ihm als häufig eingeschätzte Arten, sowie ein großer Teil der Unterfamilie Aleocharinae (im Gebiet mit mehr als 400 Arten vertreten). Horion war kein Spezialist für Staphyliniden, er war also bei seinen Meldungen zumeist auf die Informationen anderer angewiesen. Über die aktuelle Verbreitung bereits lange aus Berlin und Brandenburg bekannter Arten ist oft nur wenig bekannt. So sind von den 1027 aus Berlin und Brandenburg sicher bekannten Arten der Familie Staphylinidae nur 364 Arten durch publizierte Funde nach 1999 dokumentiert (Tabelle 1). In zahlreichen Sammlungen, nicht zuletzt in den beiden in Berlin und Brandenburg befindlichen großen Forschungssammlungen, existiert eine Unmenge an Belegmaterial, das nicht oder nur zu kleinen Teilen ausgewertet oder zumindest nach aktuellen Maßstäben taxonomisch bearbeitet ist.

Eine detaillierte Faunistik der Staphyliniden Berlin-Brandenburgs ist derzeit nicht in Sicht, für die Subtribus Staphylinina (mit etwa 25 Arten in Berlin und Brandenburg vertreten) wird eine solche zusammenfassende Arbeit vorbereitet (FINKENWIRTH, UHLIG & GOLLKOWSKI, in Vorbereitung).

Drei Aspekte der folgenden Arbeit sollen im wesentlichen als Vorarbeit für spätere, detailliertere Arbeiten dienen:

- Die Erstellung einer aktuellen Checklist der Staphyliniden von Berlin und Brandenburg als taxonomisch-systematische Grundlage und vollständige Auswertung aller publizierten Nachweise.
- Die Erfassung der gesamten für die Staphylinidae von Berlin und Brandenburg relevanten Literatur.
- Die Erfassung aller Sammlungen und Sammler, die im Zusammenhang mit Staphyliniden aus Berlin und Brandenburg genannt werden, besonders in Bezug auf den Verbleib von Sammlungen und publizierten Belegexemplaren.

Geographische Bezugsgröße sind die Bundesländer Berlin und Brandenburg in ihren heutigen Grenzen (2007), Meldungen aus ehemals zur Mark Brandenburg (Neumark, östliche Niederlausitz) oder zum Bezirk Cottbus (Kreise Hoyerswerda und Weißwasser) gehörenden Gebieten bleiben unberücksichtigt.

Die Einbeziehung von ergänzenden Fundmeldungen wurde aus praktischen Gesichtspunkten hier unterlassen, sie werden an anderer Stelle publiziert.

2. Kurzer Abriss zur Geschichte der Staphylinidenforschung in Berlin und Brandenburg

Die ersten Meldungen von Staphyliniden aus Berlin und Brandenburg erfolgten schon sehr früh. Der Berliner Garnisonsprediger Johann Friedrich Wilhelm Herbst (1743-1807) publizierte in den Jahren 1783-1785 ein Verzeichnis seiner Insektensammlung, in dem in den Gattungen *Staphylinus*, *Oxyporus* und *Paederus* insgesamt 16 Arten mit der Herkunftsangabe „Berlin“ gemeldet und fünf (*Staphylinus unicolor* [heute: *Ocypus olens*], *S. obscurus* [unklarer Identität], *S. tricornis* [heute *Bledius tricornis*], *S. similis* [heute: *Stenus similis*] und *S. glaberrimus* [heute: *Acylophorus glaberrimus*]) erstmals beschrieben werden (HERBST 1784). Seine Sammlung befindet

sich zum Teil im Museum für Naturkunde Berlin, Einzelexemplare sind aber nur schwer zuzuordnen (MÜLLER & al. 2001).

Bereits um 1800 gab es in Berlin und der Mark Brandenburg eine Anzahl aktiver Käfersammler, die sich auch mit Staphyliniden beschäftigten. Dieser Umstand wurde dadurch gefördert, dass mit dem in Braunschweig geborenen Johann Carl Wilhelm Illiger (1775-1815) ein Zoologe Kustos der königlich-preußischen Sammlungen in Berlin und Direktor des Zoologischen Museums wurde, der sich neben vielen anderen Tiergruppen nicht nur mit Käfern sondern auch mit Staphyliniden befasste. Brandenburgisches Material aus dieser Zeit ist jedoch zum Teil nur noch schwer nachzuweisen, es wurde in die „Historische Sammlung“ des Museums für Naturkunde integriert (MÜLLER & al. 2001). Illiger, Knoch, Hellwig, von Hoffmansegg und andere, deren Sammlungen den Grundstein der Käfersammlung des heutigen Naturkundemuseums in Berlin (NMHUB) bildeten, sammelten selbst kaum in der Mark Brandenburg.

Ob in den Arbeiten von GRAVENHORST (1802, 1806) Staphyliniden aus der Mark Brandenburg beschrieben werden, ist nicht mit Sicherheit festzustellen, zahlreiche der von ihm aus den Sammlungen Hellwig, Kugelann und Knoch beschriebenen Staphyliniden werden entweder völlig ohne Fundortangaben oder mit der Angabe „Borussiae“ [Preußen] publiziert, womit wahrscheinlich nicht der Staat Preußen sondern die Provinzen Ost- und Westpreußen gemeint sind. Auch die Verzeichnisse der Käfer Preußens von KUGELANN (1792, 1794) und ILLIGER (1798, 1812), beziehen sich auf die Provinzen Ost- und Westpreußen, nicht auf den Staat Preußen als ganzes (BERCIO & FOLWACZNY 1979).

Der in Stralsund geborene Entomologe W. F. Erichson (1809-1849) wirkte ab 1828 in Berlin. Seine Sammeltätigkeit und die Bearbeitung der Käferfauna Brandenburgs (ERICHSON 1837, 1839a) bilden heute die Grundlage der Faunistik der Käfer von Berlin und Brandenburg. Ein unschätzbare Verdienst Erichsons ist auch die Klärung zahlreicher Namen älterer Autoren. Als einer der ersten verließ er sich nicht auf die Deutung von Beschreibungen sondern untersuchte zahlreiche Originale (Typen) unter anderem von Fabricius, Herbst, Illiger, Gravenhorst und Gyllenhal (ERICHSON 1837). Er verfasste außerdem die erste und einzige Gesamtrevision der Familie Staphylinidae (ERICHSON 1839b, 1840) und begründete die später von Kiesenwetter, Schaum, Kraatz, Seidlitz, Reitter und Weise fortgesetzte Reihe „Naturgeschichte der Insekten Deutschlands“, für die er zahlreiche Käferfamilien, von den Staphyliniden jedoch nur die Scaphidiinae bearbeitete (ERICHSON 1845). Das von ihm aufgestellte System der Familie Staphylinidae ist heute noch in vielen Bereichen gültig. Über andere Sammler aus Erichsons Zeit wissen wir nur wenig. ERICHSON (1837, 1839a) nennt für märkische Staphyliniden folgende Sammler: Fischer (Sammlungsverbleib unbekannt, aber zumindest die von Erichson beschriebenen Exemplare zum Teil im Museum für Naturkunde, Berlin [Uhlig 1995]), Guyot (Sammlungsverbleib unbekannt), Kunze (Sammlung im Naturkundemuseum Leipzig), Nordmann (Sammlung teilweise in St. Petersburg, teilweise im Museum Odessa), Kirstein, Ruthe, Schüppel und Weber (Sammlungen alle im Museum für Naturkunde, Berlin). Auch Staphyliniden aus dieser Zeit sind in der Sammlung des Museums für Naturkunde nur schwer zu identifi-

zieren, die betreffenden Sammlungen wurden bereits früh in der „Historischen Sammlung“ zusammengefasst (MÜLLER et al. 2002).

Ab Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde Berlin mit der Gründung der Berliner Entomologischen Gesellschaft und der Herausgabe der Berliner Entomologischen Zeitschrift (ab 1857) ein Zentrum der Koleopterologie. Einen Aufschwung brachte diese Entwicklung kurzzeitig auch für die Staphylinidenfauna der Mark Brandenburg. KRAATZ (1851) veröffentlichte eine Arbeit über von Erichson nicht für Brandenburg berücksichtigte Käfer, später bearbeitete er die Staphyliniden für die Naturgeschichte der Insekten Deutschlands (KRAATZ 1856, 1857a). Funde aus der Umgebung von Berlin wurden auch in Bachs „Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland“ berücksichtigt (BACH 1856, 1860), neben Kraatz wurden Staphyliniden aus Brandenburg von KIESENWETTER (1850), QUEDENFELDT (1884, 1885) und WEISE (1872, 1878) bearbeitet und publiziert.

NEUHAUS (1885) und SCHILSKY (1888) publizierten erste Gesamtverzeichnisse zur Käferfauna der Mark Brandenburg. Beide Verzeichnisse sind aber reine Namenslisten. Schilsky beschäftigt sich intensiv mit der Faunistik brandenburgischer Käfer, er veröffentlicht weitere Beiträge auch über Staphylinidae (SCHILSKY 1890, 1908) und eine zweite Auflage seines Verzeichnisses (SCHILSKY, 1909). Aus dieser Zeit liegt zahlreiches Staphylinidenmaterial aus Berlin und Brandenburg vor, das sich in den Sammlungen des Museums für Naturkunde in Berlin (Schilsky, Weise) und in der Sammlung des Deutschen Entomologischen Instituts (Sammlungen Kraatz, Weise) befindet.

Ab 1913 (bis 1941) wurden von Delahon (1863-1935) Nachträge und Ergänzungen zu Schilskys Verzeichnis publiziert, parallel dazu begannen Neresheimer (1880-1943) und Wagner (1884-1949) mit der Herausgabe einer Beitragsreihe unter dem Titel „Beiträge zur Coleopteren-Fauna der Mark Brandenburg“ (WAGNER 1915ff., WAGNER & NERESHEIMER 1916ff.) die mit der Zerstörung der von Wagner betreuten Sammlung der Naturschutzstelle des Magistrats von Berlin im Jahre 1936, der Vernichtung seiner Privatsammlung im Jahre 1945 und seinem Tod (1949) ein vorläufiges Ende fand. Die Meldungen von Delahon, Neresheimer und Wagner bildeten einen Schwerpunkt bei der Bearbeitung der Staphylinidae im Käferverzeichnis und der Faunistik von HORION (1955, 1963, 1965, 1967). Die Sammlung Delahon befindet sich heute im Museum für Naturkunde in Berlin, die Sammlung Neresheimer im Deutschen Entomologischen Institut in Müncheberg.

Beginnend im Jahre 1956 wurde die Reihe „Beiträge zur Coleopteren-Fauna der Mark Brandenburg“ von GRIEP & KORGE (1956), KORGE (1957ff.) sowie KORGE & SCHULZE (1966, 1971) fortgesetzt, sie endete mit dem 31. Beitrag (KORGE 1973).

In den Jahren zwischen 1963 und 1974 wurden sowohl die taxonomischen als auch die faunistischen Erkenntnisse über mitteleuropäische Staphyliniden neu zusammengefasst (LOHSE 1964, 1974, BENICK & LOHSE 1974, HORION 1963, 1965, 1967). Durch die damit erheblich verbesserte Bearbeitbarkeit von Staphyliniden erhöhte sich die Zahl der Bearbeiter in der nachfolgenden Zeit deutlich, durch den Bau der Berliner Mauer 1961 wurde allerdings für die Bearbeiter aus dem Westteil Berlins die Möglichkeit zu faunistischer Arbeit stark eingeschränkt. Es entstanden jedoch in grö-

ßerer Zahl Arbeiten über stadttökologische Themen. In der Folgezeit wurden Staphyliniden aus mehreren Brandenburgischen Schutzgebieten bearbeitet, so vom „Buhnenwerder“ bei Brandenburg (MARTIN & UHLIG 1986), vom „Dammer Moor“ bei Beeskow (UHLIG, MARTIN & ZERCHE 1986), aus dem NSG „Rietzer See“ (UHLIG & ZERCHE 1981) und aus dem NSG „Lange Dammwiesen und Annatal“ (SCHÜLKE 1990). Funddaten aus den auf dem Gebiet des heutigen Landes Brandenburg liegenden Bezirken der DDR [Berlin/Ost, Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam] publizierten (GOLLKOWSKI 1990, RUSCH 1986, SCHÜLKE 1984a, SCHÜLKE & UHLIG 1988, UHLIG 1977, ZERCHE 1980), für den Westteil Berlins wurden Neumeldungen und interessante Funde von KORGE (1989) zusammengefasst.

Nach der deutschen Wiedervereinigung und der Neubildung der Länder auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wurde die faunistische Forschung in Brandenburg neu intensiviert. Sowohl für Berlin (nur Westteil) als auch für Brandenburg wurden „Rote Listen“ vorgelegt (KORGE 1991, SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992), in zahlreichen, zum Teil neu entstehenden brandenburgischen Naturschutzgebieten wurden Erhebungen zum Arteninventar durchgeführt (BARNDT 2004ff., BEIER & KORGE 2001, EICHLER, ESSER & PÜTZ 2003, EICHLER & PÜTZ 2000, ESSER & KIELHORN 2005, KLEEBOERG 1995, 1999, MEISSNER 1997), eine Übersicht über Staphylinidenfunde in der schlecht besammelten Niederlausitz wurde von RUSCH (1992, 1994, 1995, 2000) publiziert. 2005 konnte die Rote Liste der Staphyliniden von Berlin in überarbeiteter Form vorgelegt werden (KORGE 2005).

Neben den hier genannten Bearbeitern, die sich mit brandenburgischen Käfern im allgemeinen oder mit brandenburgischen Staphyliniden im besonderen befassen, wird in zahlreichen Arbeiten systematisch-taxonomischen Inhalts Material aus Berlin-Brandenburg berücksichtigt, an jüngeren Arbeiten seien hier die Revisionen von ASSING (1996, 1997b, 1998a, 1999b, 2001, 2002, 2003c, 2006), GILDENKOV (2000a, 2000b, 2001a-c), JÁSZAY & HLAVÁČ (2006), PAŚNIK (2006a, 2006b), SCHÜLKE (1991, 2003, 2004, 2007), SCHÜLKE & KOCIAN (2000) und ZERCHE (1998, 1999) genannt. Den immer noch beträchtlichen Forschungsbedarf auf diesem Gebiet dokumentiert der Umstand, dass in den letzten Dekaden auch noch neue Staphyliniden aus Brandenburg beschrieben wurden (LOHSE 1984, SCHÜLKE 2007, VOGEL 2003).

3. Aktualisierte Checklist der Staphylinidae von Berlin und Brandenburg

Die bis 1998 vorliegenden Erkenntnisse zur Faunistik der Käfer von Berlin und Brandenburg wurden von Esser und Möller zusammengefasst und im Teilverzeichnis Berlin-Brandenburg des „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ publiziert (ESSER & MÖLLER 1998). Das Verzeichnis nennt 961 Arten der Familie Staphylinidae (inklusive Scaphidiinae, Dasycerinae und Pselaphinae), davon 870 Arten mit aktuellen Nachweisen; 87 mit Nachweisen vor 1950; vier Arten mit Nachweisen vor 1900), die Nachweise von vier weiteren Arten werden als fraglich betrachtet.

Die gegebene Darstellung war jedoch, zumindest was die hier behandelte Familie Staphylinidae betrifft, teilweise unzulänglich und unvollständig. Sie entspricht heute aus mehreren Gründen nicht mehr dem aktuellen Kenntnisstand. Die verwendete Nomenklatur des Gesamtverzeichnisses (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) entsprach

schon bei der Herausgabe nicht dem damals aktuellen Stand. Diesbezügliche Korrekturen durch die im Verzeichnis genannten Spezialisten wurden damals von den Herausgebern im Sinne einer falsch verstandenen „Stabilität“ der benutzten Namen nicht berücksichtigt. Die Auswertung der Literatur durch die Bearbeiter für Berlin und Brandenburg war sehr unvollständig, so blieben spezielle Arbeiten über Staphylinidenfunde aus dem Bundesland Brandenburg weitgehend unberücksichtigt (so z.B. die Arbeiten von RUSCH 1992, 1994, 1995, SCHÜLKE 1984a-c, SCHÜLKE & UHLIG 1988, UHLIG 1977, UHLIG & ZERCHE 1981). Die zum „Käferverzeichnis“ angelegte Datenbank mit Quellenangaben für alle Meldungen nennt bei den Staphylinidae praktisch nur die „Roten Listen“ von Berlin (KORGE 1991a) und Brandenburg (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) sowie unveröffentlichte Angaben der Autoren. Praktisch werden damit kaum verifizierbare Quellen genannt, da die beiden „Roten Listen“ keine konkreten Fundangaben beinhalten. Zudem kam es durch den Umstand, dass es sich bei der „Roten Liste“ für Brandenburg nicht um ein vollständiges Arteninventar handelt, zu Missverständnissen. In einigen Fällen wurden dadurch häufige Arten in der Liste von ESSER & MÖLLER (1998) nicht berücksichtigt.

Durch zahlreiche neue Arbeiten zur Käferfauna der Mark Brandenburg hat sich unser Kenntnis über die Verbreitung einzelner Arten inzwischen verbessert. Zahlreiche Arten konnten für das Gebiet der Bundesländer Berlin und Brandenburg neu nachgewiesen oder wieder gefunden werden. In zwei Fällen wurden bisher unbekannte Arten aus Berlin und Brandenburg beschrieben (SCHÜLKE 2007, VOGEL 2003).

Die vorliegende Checkliste soll im Wesentlichen zwei Zielen dienen. Zum einen sollen die aktuellen Kenntnisse über das Vorkommen von Staphyliniden in Berlin und Brandenburg zusammengefasst werden. Zu den Arten, die seit 1998 eine Veränderung in ihrem Namen oder Status erfahren haben, werden die entsprechenden Quellen aufgeführt und wenn nötig diskutiert. Insgesamt ergeben sich für 145 Arten Veränderungen zum Stand von 1998 (ESSER & MÖLLER 1998).

Alle nach Erscheinen der Bände 4 und 5 der „Käfer Mitteleuropas“ erfolgten Nachträge, Änderungen und Streichungen sind in der aktuellen Checkliste der Staphyliniden Mitteleuropas (ASSING & SCHÜLKE 2007) zu finden. Das „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ wird nachfolgend bei Änderungen, die das Gesamtverzeichnis betreffen (z.B. Änderungen von Artnamen) als KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) zitiert, im Fall einer Statusänderung die sich auf das Teilverzeichnis für Berlin und Brandenburg bezieht, als ESSER & MÖLLER (1998). Die Anzahl der für Berlin und Brandenburg nachgewiesenen Staphyliniden erhöht sich auf 1027 Arten, von denen für 957 Arten Nachweise seit 1950 vorliegen. Für 64 Arten existieren nur Nachweise vor 1950, vier Arten wurden nur vor 1900 gefunden, bei zwei Arten lassen die Fundmeldungen keine zeitliche Kategorisierung zu. Die Anzahl der für das Gebiet fraglichen Arten erhöht sich auf 17, bei vier Arten ist (bei Annahme der Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden Belege) eine Verschleppung anzunehmen, sie besitzen kein autochthones Vorkommen in Berlin und Brandenburg. 16 gemeldete Arten sind für die Fauna der Mark als Fehlmeldungen zu streichen.

In der folgenden Checkliste werden neben dem aktuellen Status der Art für die Fauna von Berlin-Brandenburg (Kategorisierung entsprechend KÖHLER & KLAUSNITZER

1998) der im Teilverzeichnis Berlin-Brandenburg des „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (ESSER & MÖLLER 1998) publizierte Stand, sowie der Status der Arten in den Roten Listen für Berlin (KORGE 2005), Brandenburg (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) und Deutschland (GEISER 1998) angegeben.

Als zusätzliche Information wurden alle Arten gekennzeichnet, für die die Publikation von zusätzlichen Verbreitungsangaben sinnvoll und notwendig erscheint. Außerdem sind die Arten angegeben, für die sämtliche Nachweise auf Grund möglicher Verwechslungen und Änderungen (z.B. der Aufspaltung einer Art in mehrere Taxa) unbedingt überprüft werden müssen. Das betrifft zum einen Nachweise, die als fraglich eingestuft werden müssen, zum anderen Arten, bei denen sich in jüngster Zeit herausgestellt hat, dass hier bisher mehrere Taxa unter einem Namen zusammengefasst wurden, die bisher aber nur zum Teil aus Berlin und Brandenburg nachgewiesen wurden (z. B.: *Lordithon trinotatus* und *L. bimaculatus*; *Mycetoporus nigricollis*, *M. dispersus* und *M. glaber*). Zu den betreffenden Arten und allen Arten, bei denen sich Name oder Status im Vergleich zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ verändert haben, werden im Anschluss an die Checklist ergänzende Informationen zusammengestellt.

Tabelle 1: Aktuelle Checklist der Staphylinidae von Berlin und Brandenburg

Spaltenüberschriften und Symbolik:

<u>Status:</u>	Aktueller Status des Vorkommens der Art in Berlin und Brandenburg mit folgender Symbolik: (.) nur vor 1900 nachgewiesen, (-) nur vor 1950 nachgewiesen, (+) nach 1950 nachgewiesen, (o) Nachweis ohne Zeitbezug, (/) Falschmeldung, (v) verschlepptes Einzelexemplar, nicht im Gebiet autochthon, (?) fraglicher Nachweis und (*) nach 1999 nachgewiesen [nur publizierte Meldungen, in separater Spalte].
<u>Artnamen:</u>	Aktueller Stand der Nomenklatur nach ASSING & SCHÜLKE (2007) und einigen inzwischen publizierten oder im Druck befindlichen Ergänzungen (ASSING 2007, im Druck, ASSING & WUNDERLE, im Druck).
<u>1998:</u>	Status der Art im Teilverzeichnis Berlin und Brandenburg von ESSER & MÖLLER (1998): (.) nur vor 1900 nachgewiesen, (-) nur vor 1950 nachgewiesen, (+) nach 1950 nachgewiesen, (/) Falschmeldung und (?) fraglicher Nachweis.
<u>RL B:</u>	Status der Art in der Roten Liste Berlins (KORGE 2005): (0) Ausgestorben oder verschollen, (1) Vom Aussterben bedroht, (2) Stark gefährdet, (3) Gefährdet, (G) Gefährdung anzunehmen, (R) Extrem selten, (V) Zurückgehend und (D) Daten defizitär.
<u>RL BB:</u>	Status der Art in der Roten Liste Brandenburgs (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992): (0) Ausgestorben oder verschollen, (1) Vom Aussterben bedroht, (2) Stark gefährdet, (3) Gefährdet und 4 (Potentiell gefährdet).
<u>RL D:</u>	Status der Roten Liste der Bundesrepublik Deutschland (GEISER 1998): (0) Ausgestorben oder verschollen, (1) Vom Aussterben bedroht, (2) Stark gefährdet, (3) Gefährdet, (G) Gefährdung anzunehmen, (R) Sehr seltene Arten oder Arten mit geographischer Restriktion, (V) Arten der Vorwarnliste, (D) Daten defizitär.
<u>Meldung:</u>	(+) Funde der Art in Berlin und Brandenburg sollten publiziert werden.
<u>Revision:</u>	(+) Sämtliche Meldungen der Art sind auf Grund von Verwechslungen oder aktueller taxonomischer Änderungen zu überprüfen.

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
Micropeplinae LEACH, 1815								
		<i>Micropeplus</i> LATREILLE, 1809						
1.	+	*	<i>caelatus</i> ERICHSON, 1839	+	1	1	2	+
2.	+		<i>fulvus</i> ERICHSON, 1840	+	3	3		+
3.	+		<i>longipennis</i> KRAATZ, 1859					+
4.	+		<i>marietti</i> JACQUELIN DU VAL, 1857	+		2		+
5.	+		<i>porcatus</i> (PAYKULL, 1789)	+	V	3		+
Scaphidiinae LATREILLE, 1807								
		<i>Scaphidium</i> OLIVIER, 1790						
6.	+	*	<i>quadrimaculatum</i> OLIVIER, 1790	+				+
		<i>Scaphisoma</i> LEACH, 1815						
7.	+	*	<i>agaricinum</i> (LINNÉ, 1758)	+				
8.	+	*	<i>assimile</i> ERICHSON, 1845	+				+
9.	+		<i>balcanicum</i> TAMANINI, 1954	+	2		3	+
10.	+	*	<i>boleti</i> (PANZER, 1793)	+				
	/		<i>subalpinum</i> REITTER, 1880	+				+
Piestinae ERICHSON, 1839								
		<i>Siagonium</i> KIRBY & SPENCE, 1815						
11.	+	*	<i>quadricorne</i> KIRBY & SPENCE, 1815	+			3	+
Osoriinae ERICHSON, 1837								
		<i>Thoracophorus</i> MOTSCHULSKY, 1837						
12.	+		<i>corticinus</i> MOTSCHULSKY, 1837	+	1	1	1	+
Phloeocharinae ERICHSON, 1839								
		<i>Phloeocharis</i> MANNERHEIM, 1830						
13.	+	*	<i>subtilissima</i> MANNERHEIM, 1830	+				
Pselaphinae LATREILLE, 1802								
		<i>Bibloporus</i> THOMSON, 1859						
14.	+		<i>bicolor</i> (DENNY, 1825)	+				
15.	+		<i>mayeti</i> GUILLEBEAU, 1888	+	2		2	+
16.	+		<i>minutus</i> RAFFRAY, 1914	+				
17.	+		<i>ultimus</i> GUILLEBEAU, 1892	+				+
		<i>Biblopectus</i> REITTER, 1882						
18.	+		<i>ambiguus</i> (REICHENBACH, 1816)	+				
	?		<i>minutissimus</i> (AUBE, 1833)		D			+
19.	+		<i>pusillus</i> (DENNY, 1825)	+	D			+
20.	+		<i>spinosus</i> RAFFRAY, 1914	+	D			+
21.	+		<i>tenebrosus</i> (REITTER, 1880)	+	D			+
		<i>Euplectus</i> LEACH, 1817						
22.	+		<i>bescidicus</i> REITTER, 1882	+				
23.	+	*	<i>bonvouloiri narentinus</i> REITTER, 1882		3		3	+
	?		<i>bonvouloiri rosae</i> RAFFRAY, 1910					+
24.	+		<i>brunneus</i> GRIMMER, 1841	+				
25.	-		<i>decipiens</i> RAFFRAY, 1910	-				+
26.	+		<i>duponti</i> AUBÉ, 1833	+	G		1	+

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
27.	+		<i>infirmus</i> RAFFRAY, 1910	+			2	+	
28.	+	*	<i>karsteni</i> (REICHENBACH, 1816)	+					
29.	+		<i>kirbii kirbii</i> DENNY, 1825	+	3		1	+	
30.	+	*	<i>mutator</i> FAUVEL, 1895	+	3			+	
31.	+	*	<i>nanus</i> (REICHENBACH, 1816)	+					
32.	+		<i>piceus</i> MOTSCHULSKY, 1835	+					
33.	+		<i>punctatus</i> MULSANT & REY, 1861	+					
34.	+	*	<i>sanguineus</i> DENNY, 1825	+					
35.	+	*	<i>signatus</i> (REICHENBACH, 1816)	+					
36.	+		<i>tholini</i> GUILLEBEAU, 1888	+	3		1	+	
Plectophloeus REITTER, 1891									
37.	+		<i>fischeri</i> (AUBÉ, 1833)	+					
38.	+		<i>nitidus</i> (FAIRMAIRE, 1858)	+	3			+	
39.	+	*	<i>nubigena</i> REITTER, 1876						
Saulcyella REITTER, 1901									
40.	+		<i>schmidtii</i> (MÄRKEL, 1845)	-				+	
Trimium AUBÉ, 1833									
41.	+		<i>brevicorne</i> (REICHENBACH, 1816)	-				+	
Trichonyx CHAUDOIR, 1845									
42.	+		<i>sulcicollis</i> (REICHENBACH, 1816)	+	3		3	+	
Amauronyx REITTER, 1882									
43.	-		<i>maerkelii</i> (AUBÉ, 1844)	-				+	
Batrisus AUBE, 1833									
44.	+	*	<i>formicarius</i> AUBE, 1833	+	3			+	
Batrisodes REITTER, 1882									
45.	+		<i>adnexus</i> (HAMPE, 1863)	+	2		2	+	
46.	+		<i>buqueti</i> (AUBE, 1833)	+	3		2	+	
47.	+		<i>delaporti</i> (AUBE, 1833)	+					
	?		<i>oculatus</i> (AUBE, 1833)		1		1	+	+
48.	+		<i>venustus</i> (REICHENBACH, 1816)	+	V			+	
Bythinus LEACH, 1817									
49.	+		<i>burrellii</i> DENNY, 1825	+					
50.	+		<i>macropalpus</i> AUBÉ, 1833	-	V			+	+
Bryaxis KUGELANN, 1794									
51.	+		<i>bulbifer</i> (REICHENBACH, 1816)	+					
52.	+		<i>clavicornis</i> (PANZER, 1809)	/	0		3	+	+
53.	+	*	<i>curtisii curtisii</i> (LEACH, 1817)	-				+	
54.	+		<i>nigripennis</i> (AUBÉ, 1844)					+	
55.	+	*	<i>puncticollis</i> (DENNY, 1825)	-	D			+	
Tychus LEACH, 1817									
56.	+		<i>niger</i> (PAYKULL, 1800)	+	D			+	
Rybaxis SAULCY, 1876									
57.	+	*	<i>longicornis</i> (LEACH, 1817)	+					

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Brachygluta THOMSON, 1859						
58.	+	<i>fossulata</i> (REICHENBACH, 1816)	+					
59.	+	<i>haematica</i> (REICHENBACH, 1816)	-				+	
	/	<i>xanthoptera</i> (REICHENBACH, 1816)	.				+	
		Reichenbachia LEACH, 1826						
60.	+	* <i>juncorum</i> LEACH, 1817	-				+	
		Fagniezia JEANNEL, 1950 [SIII]						
61.	+	* <i>impressa</i> (PANZER, 1805)	+				+	
		Pselaphaulax REITTER, 1909						
62.	+	<i>dresdensis</i> (HERBST, 1792)	-	3		3	+	
		Pselaphus HERBST, 1792						
63.	+	<i>heisei</i> HERBST, 1792	-				+	
		Tyrus AUBÉ, 1833						
64.	+	* <i>mucronatus</i> (PANZER, 1805)	+			3	+	
		Claviger PREYSSLER, 1790						
65.	+	<i>longicornis</i> MÜLLER, 1818	+				+	
66.	-	<i>testaceus</i> PREYSSLER, 1790	-				+	
		Proteininae ERICHSON, 1839						
		Metopsia WOLLASTON, 1854						
	/	<i>clypeata</i> (Müller, 1821)	+					
67.	+	* <i>similis</i> ZERCHE, 1998			4			
		Megarthus STEPHENS, 1829						
68.	+	<i>denticollis</i> (BECK, 1817)	+					
69.	+	* <i>depressus</i> (PAYKULL, 1789)	+					
	+	<i>hemipterus</i> ILLIGER, 1794					+	+
70.	+	<i>prosseni</i> SCHATZMAYR, 1904	+	3	3		+	
		Proteinus LATREILLE, 1797						
71.	+	<i>atomarius</i> ERICHSON, 1840	+		2		+	
72.	+	* <i>brachypterus</i> (FABRICIUS, 1792)	+					
73.	+	<i>laevigatus</i> HOCHHUTH, 1872	+					
		Omaliinae MACLEAY, 1825						
		Eusphalerum KRAATZ, 1857						
74.	.	<i>longipenne</i> (ERICHSON, 1839)		0			+	+
75.	-	<i>luteum</i> (MARSHAM, 1802)		D			+	+
76.	+	* <i>minutum</i> (FABRICIUS, 1792)	+					
	?	<i>primulae</i> (STEPHENS, 1834)						+
	?	<i>semicoleopratum</i> (PANZER, 1795)						+
77.	-	<i>sorbi</i> (GYLLENHAL, 1810)	-	0	0		+	+
	?	<i>tenenbaumi</i> (BERNHAEUER, 1932)						+
		Acrulia THOMSON, 1858						
78.	+	<i>inflata</i> (GYLLENHAL, 1813)	+				+	
		Acrolocha THOMSON, 1858						
79.	+	<i>minuta</i> (OLIVIER, 1795)	+	3	3			

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Phyllodrepa THOMSON, 1859						
80.	+	<i>floralis</i> (PAYKULL, 1789)	+					
81.	+	* <i>melanocephala</i> (FABRICIUS, 1787)	+	3	1	3	+	
82.	+	<i>melis</i> HANSEN, 1940	+		3	3	+	
83.	+	<i>nigra</i> (GRAVENHORST, 1806)	+		1	3	+	
84.	-	<i>puberula</i> BERNHAUER, 1903	-		0		+	
85.	-	<i>salicis</i> (GYLLENHAL, 1810)	-		0		+	
		Dropephylla MULSANT & REY, 1880						
86.	+	* <i>ioptera</i> (STEPHENS, 1834)	+					+
		Hapalaraea THOMSON, 1858						
87.	+	<i>pygmaea</i> (PAYKULL, 1800)	+	2	1		+	
		Hypopycna MULSANT & REY, 1880						
88.	+	<i>rufula</i> (ERICHSON, 1840)	+		1	3	+	
		Omalium GRAVENHORST, 1802						
89.	+	* <i>caesum</i> GRAVENHORST, 1806	+					
90.	+	<i>excavatum</i> STEPHENS, 1834	+					
91.	+	* <i>exiguum</i> GYLLENHAL, 1810	+	2	1		+	
92.	+	* <i>oxyacanthae</i> GRAVENHORST, 1806	-		0		+	
93.	+	* <i>rivulare</i> (PAYKULL, 1789)	+					
94.	+	<i>rugatum</i> MULSANT & REY, 1880	+	V	1		+	
		Phloeonomus HEER, 1839						
95.	+	* <i>punctipennis</i> THOMSON, 1867	+		4			
96.	+	* <i>pusillus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
		Phloeostiba THOMSON, 1858						
97.	+	* <i>lapponica</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	+				+	
98.	+	* <i>plana</i> (PAYKULL, 1792)	+				+	
		Paraphloeostiba STEEL, 1960						
99.	+	<i>gayndahensis</i> (MACLEAY, 1873)	+	D			+	
		Xylostiba GANGLBAUER, 1895						
100.	+	<i>monilicornis</i> (GYLLENHAL, 1810)					+	
		Xylodromus HEER, 1839						
101.	+	<i>affinis</i> (GERHARDT, 1877)	+		3		+	
102.	+	<i>concinus</i> (MARSHAM, 1802)	+		3		+	
103.	+	<i>depressus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
104.	+	<i>testaceus</i> (ERICHSON, 1840)	+	2	3	3	+	
		Orochares KRAATZ, 1857						
105.	-	<i>angustatus</i> (ERICHSON, 1840)	-		0		+	
		Deliphrum ERICHSON, 1839						
106.	+	<i>tectum</i> (PAYKULL, 1789)	+		1		+	
		Anthobium LEACH, 1819						
107.	+	* <i>atrocephalum</i> (GYLLENHAL, 1827)	+					
108.	+	<i>fuscum</i> (ERICHSON, 1839)	+	2	2	2		
109.	+	<i>melanocephalum</i> (ILLIGER, 1794)	-		0		+	
110.	+	* <i>unicolor</i> (MARSHAM, 1802)	+					

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Olophrum ERICHSON, 1839						
111.	+	<i>assimile</i> (PAYKULL, 1800)	+					
112.	+	<i>consimile</i> (GYLLENHAL, 1810)	+	2	2	3	+	
113.	+	* <i>fuscum</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
114.	+	* <i>piceum</i> (GYLLENHAL, 1810)	+					
		Arpedium ERICHSON, 1839						
115.	+	<i>quadrum</i> (GRAVENHORST, 1806)	+		3		+	
		Eucnecosum REITTER, 1909						
116.	+	<i>brachypterum</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		4		+	
		Acidota STEPHENS, 1829						
117.	+	* <i>crenata</i> (FABRICIUS, 1793)	+				+	
118.	+	<i>cruentata</i> MANNERHEIM, 1830	+				+	
		Lesteva LATREILLE, 1797						
119.	+	<i>hanseni</i> LOHSE, 1953	+		1		+	
120.	+	* <i>longoelytrata</i> (GOEZE, 1777)	+					
121.	+	<i>punctata</i> ERICHSON, 1839	+		4			
122.	+	* <i>sicula heeri</i> FAUVEL, 1871	+		1		+	
123.		Geodromicus REDTENBACHER, 1857						
	V	<i>nigrita</i> (MÜLLER, 1821)					+	+
		Anthophagus GRAVENHORST, 1802						
124.	-	<i>caraboides</i> (LINNÉ, 1758)	-		0		+	
	/	<i>angusticollis</i> MANNERHEIM, 1830						
125.	+	<i>praeustus</i> MÜLLER, 1821					+	
		Coryphium STEPHENS, 1834						
126.	+	<i>angusticolle</i> STEPHENS, 1834	+		4		+	
		Oxytelinae FLEMING, 1821						
		Syntomium CURTIS, 1828						
127.	+	* <i>aeneum</i> (MÜLLER, 1821)	+	1	1		+	
		Deleaster ERICHSON, 1839						
128.	+	<i>dichrous</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	R	2		+	
		Coprophilus LATREILLE, 1829						
129.	+	<i>striatulus</i> (FABRICIUS, 1793)	+					
		Manda BLACKWELDER, 1952						
130.	+	<i>mandibularis</i> (GYLLENHAL, 1827)	+	R	3	3	+	
		Planeustomus JACQUELIN DU VAL, 1857						
131.	-	<i>palpalis</i> (ERICHSON, 1839)	-		0		+	
		Ochtheophilus MULSANT & REY, 1856						
132.	+	* <i>omalinus</i> (ERICHSON, 1840)					+	+
		Thinodromus KRAATZ, 1857						
133.	+	<i>arcuatus</i> (STEPHENS, 1834)	+	1	1		+	
	/	<i>dilatatus</i> (ERICHSON, 1839)						
		Carpelimus LEACH, 1819						
134.	+	<i>bilineatus</i> STEPHENS, 1834						
135.	+	* <i>corticinus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
136.	+		<i>despectus</i> (BAUDI DI SELVE, 1870)	+	1	1		+	
137.	+	*	<i>elongatulus</i> (ERICHSON, 1839)	+					
138.	+		<i>exiguus</i> (ERICHSON, 1839)	+	1	1	2	+	
139.	+	*	<i>erichsoni</i> (SHARP, 1871)	+				+	+
140.	+	*	<i>foveolatus</i> (SAHLBERG, 1832)	+		1		+	
141.	+	*	<i>fuliginosus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	2	1		+	
142.	+	*	<i>ganglbaueri</i> (BERNHAEUER, 1901)	+		1		+	
143.	+		<i>gracilis</i> (MANNERHEIM, 1830)	+		3		+	
144.	-		<i>halophilus</i> (KIESENWETTER, 1844)	-		0		+	
145.	+		<i>heidenreichi</i> (L. BENICK, 1934)					+	
146.	+		<i>impressus</i> (LACORDAIRE, 1835)	-		0		+	
147.	+	*	<i>lindrothi</i> (PALM, 1943)	+		2		+	
148.	+		<i>manchuricus subtilicornis</i> (ROUBAL, 1946)	+		1		+	
149.	+		<i>nitidus</i> (BAUDI DI SELVE, 1848)	+		1		+	
150.	+	*	<i>obesus</i> (KIESENWETTER, 1844)	+	3	3		+	
151.	+		<i>pusillus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
152.	+	*	<i>rivularis</i> (MOTSCHULSKY, 1860)	+					
153.	-		<i>subtilis</i> (ERICHSON, 1839)	-		0		+	+
154.	+	*	<i>zealandicus</i> (SHARP, 1900)		D			+	
Aploderus STEPHENS, 1833									
155.	+		<i>caelatus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
156.	+		<i>caesus</i> (ERICHSON, 1839)	+	1	1	2	+	
Oxytelus GRAVENHORST, 1802									
157.	+		<i>fulvipes</i> ERICHSON, 1839	+	3	0		+	
158.	+	*	<i>laqueatus</i> (MARSHAM, 1802)	+		3			
159.	+		<i>migrator</i> FAUVEL, 1904					+	
160.	+		<i>piceus</i> (LINNÉ, 1767)	+	2	0		+	
161.	+		<i>sculptus</i> GRAVENHORST, 1806	+					
Anotylus THOMSON, 1859									
162.	+		<i>affinis</i> (CZWALINA, 1871)	+	2	1	3	+	+
163.	+		<i>clypeonitens</i> (PANDELLE, 1867)	+		3		+	
164.	+		<i>complanatus</i> (ERICHSON, 1839)	+					
165.	+		<i>insecatus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
166.	-		<i>inustus</i> (GRAVENHORST, 1806)	-		0		+	
167.	+		<i>mutator</i> (LOHSE, 1963)					+	+
168.	+		<i>nitidulus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
	?		<i>politus</i> (ERICHSON, 1840)	+	R	1	2	+	+
169.	+		<i>pumilus</i> (ERICHSON, 1839)	+	0	0	0	+	+
170.	+		<i>rugifrons</i> (HOCHHUTH, 1849)	+	2	2		+	
171.	+	*	<i>rugosus</i> (FABRICIUS, 1775)	+					
172.	+		<i>sculpturatus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
173.	+		<i>speculifrons</i> (KRAATZ, 1857)	+	R	1		+	
174.	+	*	<i>tetracarينات</i> (BLOCK, 1799)	+					

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Platystethus MANNERHEIM, 1830						
175.	+	<i>alutaceus</i> THOMSON, 1861	+		3		+	
176.	+	<i>arenarius</i> (GEOFFROY, 1785)	+					
177.	-	<i>capito</i> HEER, 1839	-		0		+	
178.	+	<i>cornutus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
179.	+	<i>degener</i> MULSANT & REY, 1878	+		3	3	+	
180.	+	<i>nitens</i> (SAHLBERG, 1832)	+	2	3		+	
181.	+	* <i>nodifrons</i> (MANNERHEIM, 1830)	+	3	1	3	+	
		Bledius LEACH, 1819						
182.	+	<i>atricapillus</i> (GERMAR, 1825)	+		1		+	+
183.	+	<i>baudii</i> FAUVEL, 1872	+	1	1	3	+	
184.	+	<i>crassicollis</i> LACORDAIRE, 1835	+	3	1		+	
185.	?	<i>denticollis</i> FAUVEL, 1872	+	1	1	2	+	+
186.	+	<i>dissimilis</i> ERICHSON, 1840	+		1		+	
187.	+	* <i>erraticus</i> ERICHSON, 1839	+		2		+	
188.	+	<i>femoralis</i> (GYLLENHAL, 1827)	+		1		+	
189.	+	<i>fergussoni</i> JOY, 1912	+	0	1		+	
190.	+	<i>filipes</i> Sharp, 1911					+	+
191.	+	* <i>gallicus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
192.	-	<i>limicola</i> TOTTENHAM, 1940	-		0		+	+
193.	+	<i>longulus</i> ERICHSON, 1839	+		3			
194.	+	<i>nanus</i> ERICHSON, 1840	-		0		+	
195.	+	* <i>occidentalis</i> BONDROIT, 1907	+	2	1	3	+	
196.	+	* <i>opacus</i> (BLOCK, 1799)	+					
197.	+	* <i>pallipes</i> (GRAVENHORST, 1806)	+		2			
198.	+	<i>procerulus</i> ERICHSON, 1840	+	1	1	3	+	
199.	+	<i>pusillus</i> ERICHSON, 1839	+	1	1	1	+	+
200.	+	<i>pygmaeus</i> ERICHSON, 1839	-		0		+	+
201.	+	<i>subterraneus</i> ERICHSON, 1839	+					
202.	+	<i>terebrans</i> SCHIÖDTE, 1866	+		1		+	
203.	+	<i>tibialis</i> HEER, 1839	+	0	2	3	+	
204.	+	* <i>tricornis</i> (HERBST, 1784)	+	2	2	3	+	
		Thinobius KIESENWETTER, 1844						
	/	<i>atomus</i> FAUVEL, 1871	-					
205.	-	<i>brevipennis</i> KIESENWETTER, 1850	+	0	1	3	+	+
206.	+	* <i>ciliatus</i> KIESENWETTER, 1844	-		0		+	+
207.	+	* <i>flagellatus</i> LOHSE, 1984	-	0	0	3	+	+
208.	+	* <i>longipennis</i> (HEER, 1841)					+	+
209.	-	<i>pusillimus</i> (HEER, 1839)	-	0	0	3	+	+
		Oxyporinae FLEMING, 1821						
		Oxyporus FABRICIUS 1775						
210.	+	<i>maxillosus</i> FABRICIUS, 1793	+		1		+	
211.	+	* <i>rufus</i> (LINNE, 1758)	+					

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
Steninae MACLEAY, 1825								
	Stenus LATREILLE, 1797							
212.	-	<i>ampliventris</i> SAHLBERG, 1890	-		0		+	+
213.	+	<i>argus</i> GRAVENHORST, 1806	+		3			
214.	+	<i>ater</i> MANNERHEIM, 1830	+	1	1		+	
215.	+	<i>aterrimus</i> ERICHSON, 1839	+		3		+	
216.	+	<i>atratus</i> ERICHSON, 1839	+		3			
217.	+	<i>bifoveolatus</i> GYLLENHAL, 1827		2			+	
218.	+	<i>biguttatus</i> (LINNÉ, 1758)	+					
219.	+	<i>bimaculatus</i> GYLLENHAL, 1810	+					
220.	+	<i>binotatus</i> LJUNGH, 1804	+		4			
221.	+	<i>bohemicus</i> MACHULKA, 1947	+	2	2	3	+	
222.	+	* <i>boops</i> LJUNGH, 1810	+					
223.	+	<i>brunnipes</i> STEPHENS, 1833	+					
224.	+	<i>calcaratus</i> SCRIBA, 1864	+		2		+	
225.	+	* <i>canaliculatus</i> GYLLENHAL, 1827	+					
226.	+	<i>carbonarius</i> GYLLENHAL, 1827	+					
227.	+	<i>cautus</i> ERICHSON, 1839	+	3	2		+	
228.	+	<i>cicindeloides</i> (SCHALLER, 1783)	+					
229.	+	<i>circularis</i> GRAVENHORST, 1802	+	3	3		+	
230.	+	* <i>clavicornis</i> (SCOPOLI, 1763)	+					
231.	+	* <i>comma</i> LECONTE, 1863	+					
232.	+	<i>crassus</i> STEPHENS, 1833	+		2		+	
233.	+	* <i>europaeus</i> PUTHZ, 1966	+	1	1		+	
	+	<i>excubitor</i> ERICHSON, 1839			1		+	
234.	+	<i>flavipalpis</i> THOMSON, 1860	+		3		+	
235.	+	<i>flavipes</i> STEPHENS, 1833	+					
236.	+	<i>formicetorum</i> MANNERHEIM, 1843	+					
237.	+	* <i>fornicatus</i> STEPHENS, 1833	+	2	2		+	
238.	+	<i>fossulatus</i> ERICHSON, 1840	-					
239.	+	* <i>fulvicornis</i> STEPHENS, 1833	+					
240.	+	<i>fuscicornis</i> ERICHSON, 1840	+		1		+	
241.	+	<i>fuscipes</i> GRAVENHORST, 1802	+					
242.	+	<i>gallicus</i> FAUVEL, 1873	+	2	2	2	+	
243.	+	* <i>geniculatus</i> GRAVENHORST, 1806	+	V	4			
244.	+	<i>glabellus</i> THOMSON, 1870	+	1	1	1	+	
245.	+	* <i>guttula</i> MÜLLER, 1821	.	1	0		+	
246.	+	* <i>humilis</i> ERICHSON, 1839	+					
	/	<i>incanus</i> ERICHSON, 1839					+	+
247.	+	* <i>impressus</i> GERMAR, 1824	+					
248.	+	<i>incrassatus</i> ERICHSON, 1839	+					
249.	+	<i>intermedius</i> REY, 1884	-	2	0		+	
250.	+	* <i>juno</i> (PAYKULL, 1789)	+					
251.	+	<i>kiesenwetteri</i> ROSENHAUER, 1856	+	1	1	2	+	

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
252.	+		<i>latifrons</i> ERICHSON, 1839	+					
253.	-		<i>longipes</i> HEER, 1839	-		0		+	
254.	+		<i>longitarsis</i> THOMSON, 1851	+	2	1		+	
255.	+		<i>ludyi</i> FAUVEL, 1886	+		2		+	
256.	+		<i>lustrator</i> ERICHSON, 1839	+		4			
257.	+	*	<i>melanarius</i> STEPHENS, 1833	+					
258.	+		<i>melanopus</i> (MARSHAM, 1802)	+		1		+	
	/		<i>mendicus</i> ERICHSON, 1840						
259.	+		<i>morio</i> GRAVENHORST, 1806	+	2	1		+	
260.	-		<i>nanus</i> STEPHENS, 1833	-		0		+	
261.	+	*	<i>nigritulus</i> GYLLENHAL, 1827	+					
262.	+		<i>nitens</i> STEPHENS, 1833	+	3	3			
263.	+	*	<i>nitidiusculus nitidiusculus</i> STEPHENS, 1833	+		3			
264.	+	*	<i>ochropus</i> KIESENWETTER, 1858	+		3			
265.	+		<i>opticus</i> GRAVENHORST, 1806	+	3	2			
266.	+		<i>pallipes</i> GRAVENHORST, 1802	+		2			
267.	-		<i>pallitarsis</i> STEPHENS, 1833	-		0		+	
268.	+		<i>palposus</i> ZETTERSTEDT, 1838	+	1	0	2	+	
269.	+		<i>palustris</i> ERICHSON, 1839	+					
270.	+		<i>picipennis</i> ERICHSON, 1840	+		2		+	
271.	-		<i>picipes picipes</i> STEPHENS, 1833	-		0		+	
272.	-		<i>proditor</i> ERICHSON, 1839	-		0		+	
273.	+		<i>providus</i> ERICHSON, 1839	+					
274.	-		<i>pubescens</i> STEPHENS, 1833	-		0		+	
275.	+		<i>pumilio</i> ERICHSON, 1839	+	1	1	3	+	
276.	+	*	<i>pusillus</i> STEPHENS, 1833	+					
277.	+	*	<i>scrutator</i> ERICHSON, 1840	+	2	1	3	+	
278.	+	*	<i>similis</i> (HERBST, 1784)	+		4			
279.	+		<i>solutus</i> ERICHSON, 1840	+	3	3	3		
280.	-		<i>stigmula</i> ERICHSON, 1840	-				+	
281.	.		<i>subdepressus</i> MULSANT & REY, 1861	.				+	+
282.	-		<i>sylvester</i> ERICHSON, 1839	-	0	0	3	+	
283.	+		<i>tarsalis</i> LJUNGH, 1810	+	3				
	<i>Dianous</i> LEACH, 1819								
284.	+		<i>coerulescens</i> (GYLLENHAL, 1810)	+		2		+	
	<i>Euaesthetinae</i> THOMSON, 1859								
	<i>Edaphus</i> MOTSCHULSKY, 1856								
285.	+		<i>beszedesi</i> REITTER, 1914	+				+	
	<i>Euaesthetus</i> GRAVENHORST, 1806								
286.	+	*	<i>bipunctatus</i> (LJUNGH, 1804)	+		3			
287.	+	*	<i>laeviusculus</i> MANNERHEIM, 1844	+		4			
288.	+	*	<i>ruficapillus</i> (LACORDAIRE, 1835)	+					
289.	+	*	<i>superlatus</i> PEYERIMHOFF, 1937	+		1		+	

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
Paederinae FLEMING, 1821								
		<i>Paederidus</i> Mulsant & Rey, 1878						
290.	-	<i>ruficollis</i> (Fabricius, 1777)	-		0		+	
		<i>Paederus</i> Fabricius, 1775						
291.	+	<i>balcanicus</i> Koch, 1938	+	R			+	
292.	+	<i>caligatus</i> Erichson, 1840	+	2	3	3	+	
293.	+	* <i>fuscipes</i> Curtis, 1826	+					
294.	-	<i>limnophilus</i> Erichson, 1840	-	0	0		+	
295.	+	<i>littoralis</i> Gravenhorst, 1802						
296.	+	* <i>riparius</i> (Linne, 1758)	+					
		<i>Astenus</i> Stephens, 1833						
	/	<i>brevelyratus</i> Lohse, 1987	+					
297.	+	* <i>gracilis</i> (Paykull, 1789)	+	3	2			
298.	+	<i>immaculatus</i> Stephens, 1833	+	2	1		+	
299.	+	<i>lyonessius</i> (Joy, 1908)	+	3	2	2	+	+
300.	+	<i>procerus</i> (Gravenhorst, 1806)	+	3	3		+	
301.	+	<i>pulchellus</i> (Heer, 1839)	+		3			
		<i>Rugilus</i> Leach, 1819						
302.	+	* <i>angustatus</i> (Geoffroy, 1785)		0	2		+	
303.	+	* <i>erichsonii</i> (Fauvel, 1867)	+					
304.	-	<i>geniculatus</i> (Erichson, 1839)	-	0	0		+	+
305.	+	<i>mixtus</i> (Lohse, 1956)					+	
306.	+	* <i>orbiculatus</i> (Paykull, 1789)	+					
307.	+	* <i>rufipes</i> (Germar, 1836)	+					
308.	+	<i>similis</i> (Erichson, 1839)	+		1		+	
309.	-	<i>subtilis</i> (Erichson, 1840)	-		0		+	
		<i>Medon</i> Stephens, 1833						
310.	+	<i>apicalis</i> (Kraatz, 1857)	+	0	1		+	
311.	+	* <i>brunneus</i> (Erichson, 1839)	+		2		+	
312.	+	<i>castaneus</i> (Gravenhorst, 1802)	+		2		+	
313.	+	<i>dilutus</i> (Erichson, 1839)	+	R	1	1	+	
314.	+	<i>fuscus</i> (Mannerheim, 1830)	+	R	1		+	
315.	+	<i>piceus</i> (Kraatz, 1858)	+		1	3	+	
316.	+	<i>ripicola</i> (Kraatz, 1854)	+		1		+	
317.	+	<i>rufiventris</i> (Nordmann, 1837)	+	2	1	1	+	
		<i>Hypomedon</i> Mulsant & Rey, 1878						
318.	+	<i>debilicornis</i> (Wollaston, 1857)	+				+	
		<i>Sunius</i> Stephens, 1829						
319.	+	<i>bicolor</i> (Olivier, 1795)	+	3	3		+	
320.	+	* <i>melanocephalus</i> (Fabricius, 1793)	+				+	
		<i>Pseudomedon</i> Mulsant & Rey, 1878						
321.	+	<i>obscurus</i> (Erichson, 1840)	+		2		+	
322.	+	* <i>obsoletus</i> (Nordmann, 1837)	+				+	

Tabelle 1					Checklist				
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
	Lithocharis DEJEAN, 1833								
323.	+	*	nigriceps KRAATZ, 1859	+					
324.	+		ochracea (GRAVENHORST, 1802)	+	2	1		+	
	Scopaeus ERICHSON, 1840								
325.	+	*	laevigatus (GYLLENHAL, 1827)	+					
326.	+		minimus (ERICHSON, 1839)	+	0	1	2	+	+
327.	+		minutus ERICHSON, 1840	+	3	2		+	+
328.	+		pusillus KIESENWETTER, 1843	+	R	1	3	+	
329.	-		ryei WOLLASTON, 1872	-		2		+	
330.	+		sulcicollis (STEPHENS, 1833)	+		2		+	
	Domene FAUVEL, 1873								
	V		scabricollis (ERICHSON, 1840)	+		1			
	Lobrathium MULSANT & REY, 1878								
331.	+	*	multipunctum (GRAVENHORST, 1802)	+					
	Tetartopeus CZWALINA, 1888								
332.	+	*	quadratus (PAYKULL, 1789)	+				+	
333.	+	*	rufonitidus (REITTER, 1909)	+				+	
334.	+	*	sphagnetorum (MUONA, 1977)	+	0	1	2	+	
335.	+		terminatus (GRAVENHORST, 1802)	+					
	Lathrobium GRAVENHORST, 1802								
336.	+	*	brunnipes (FABRICIUS, 1793)	+					
337.	+		castaneipenne KOLENATI, 1846	+	R	1	2	+	
338.	+	*	elongatum (LINNÉ, 1767)	+					
339.	+	*	fovulum STEPHENS, 1833	+					
340.	+	*	fulvipenne (GRAVENHORST, 1806)	+					
341.	+	*	geminum KRAATZ, 1857	+					
342.	+	*	impressum HEER, 1841	+					
343.	+		laevipenne HEER, 1839	+		1		+	
344.	+		longulum GRAVENHORST, 1802	+					
345.	+		pallidipenne HOCHHUTH, 1851	+	3	2	3	+	
346.	+		pallidum NORDMANN, 1837	+		1		+	
347.	+		rufipenne GYLLENHAL, 1813	+	1	3		+	
348.	+		spadiceum ERICHSON, 1840	+	R	1	3	+	
	Achenium LEACH, 1819								
349.	+		humile (NICOLAI, 1822)	+		1		+	
	Ochthephilum STEPHENS, 1829								
350.	+		collare (REITTER, 1884)	+		1		+	+
351.	+	*	fracticorne (PAYKULL, 1800)	+					
Staphylininae LATREILLE, 1802									
	Leptacinus ERICHSON, 1839								
352.	+		batychrus (GYLLENHAL, 1827)	+					
353.	+		formicetorum MÄRKEL, 1841	+					
354.	+	*	intermedius DONISTHORPE, 1936	+					
355.	+	*	pusillus (STEPHENS, 1833)	+					

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
356.	+	*	<i>sulcifrons</i> (STEPHENS, 1833)	+					
			Phacophallus COIFFAIT, 1956						
357.	+		<i>parumpunctatus</i> (GYLLENHAL, 1827)	+		3			
			Gauropterus THOMSON, 1860						
358.	+		<i>fulgidus</i> (FABRICIUS, 1787)	+					
			Nudobius THOMSON, 1860						
359.	+		<i>lentus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
			Gyrophypnus LEACH, 1819						
360.	+	*	<i>angustatus</i> STEPHENS, 1833	+					
361.	+		<i>atratus</i> (HEER, 1839)	+				+	
362.	+	*	<i>fracticornis</i> (MÜLLER, 1776)	+					
363.	+		<i>punctulatus</i> (PAYKULL, 1789)	+					
364.	o		<i>wagneri</i> (SCHEERPELTZ, 1926)					+	+
			Megalinus MULSANT & REY, 1877						
365.	+		<i>glabratus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		4			
			Hypnogyra CASEY, 1906						
366.	+		<i>angularis</i> (GANGLBAUER, 1895)	+	3	2	3	+	
			Leptophius COIFFAIT, 1983						
367.	+		<i>flavocinctus</i> (HOCHHUTH, 1849)					+	
			Xantholinus DEJEAN, 1821						
368.	+		<i>coiffaiti</i> FRANZ, 1966	+	D			+	+
369.	+		<i>dvoraki</i> COIFFAIT, 1956	+				+	
370.	+	*	<i>elegans</i> (OLIVIER, 1795)	+		2		+	
371.	+	*	<i>gallicus</i> COIFFAIT, 1956	+		3		+	+
372.	+	*	<i>laevigatus</i> JACOBSEN, 1849	+					
373.	+	*	<i>linearis</i> (OLIVIER, 1795)	+					
374.	+	*	<i>longiventris</i> HEER, 1839	+					
375.	+	*	<i>tricolor</i> (FABRICIUS, 1787)	+					
			Atrecus JACQUELIN DU VAL, 1856						
376.	+		<i>affinis</i> (PAYKULL, 1789)	+					
			Othius STEPHENS, 1829						
377.	+	*	<i>angustus</i> STEPHENS, 1833	+					
378.	+	*	<i>punctulatus</i> (GOEZE, 1777)	+					
379.	+	*	<i>subuliformis</i> STEPHENS, 1833	+					
			Neobisnius GANGLBAUER, 1895						
380.	+		<i>lathrobioides</i> (BAUDI DI SELVE, 1848)	+	D	1		+	
381.	+	*	<i>procerulus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+	3	2			
382.	+		<i>villosulus</i> (STEPHENS, 1833)	+	3	2		+	
			Erichsonius FAUVEL, 1874						
383.	+		<i>cinerascens</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
384.	+		<i>signaticornis</i> (MULSANT & REY, 1853)	+	2	2	3	+	
385.	+	*	<i>subopacus</i> (HOCHHUTH, 1851)	+	1	2	3	+	

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
	<i>Hesperus</i> FAUVEL, 1874								
386.	+		<i>rufipennis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	2	1	2	+	
	<i>Philonthus</i> STEPHENS, 1829								
387.	+	*	<i>addendus</i> SHARP, 1867	+		3		+	
388.	+		<i>albipes</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	3			+	
389.	+		<i>alpinus</i> EPPELSHEIM, 1875	+		2		+	
390.	+	*	<i>atratus</i> (GRAVENHORST, 1802)						
391.	+	*	<i>carbonarius</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
392.	+		<i>caucasicus</i> NORDMANN, 1837	+	V	1		+	
393.	+	*	<i>cognatus</i> STEPHENS, 1832	+					
394.	+		<i>concinus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
395.	+		<i>confinis</i> STRAND, 1941	+	R	1		+	
396.	+		<i>coprophilus</i> JARRIGE, 1949	+		1		+	
397.	+		<i>corruscus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	3	3		+	
398.	+		<i>corvinus</i> ERICHSON, 1839	+	3	3	3	+	
399.	+	*	<i>cruentatus</i> (GMELIN, 1790)	+					
	?		<i>cyanipennis</i> (FABRICIUS, 1793)					+	
400.	+		<i>debilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
401.	+	*	<i>decorus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
402.	+	*	<i>discoideus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
403.	+		<i>ebeninus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	1	1	1	+	
404.	+	*	<i>fumarius</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
405.	+		<i>furcifer</i> RENKONEN, 1937	+	3	3	3	+	
406.	+		<i>intermedius</i> (LACORDAIRE, 1835)	+	3	3		+	
407.	+		<i>jurgans</i> TOTTENHAM, 1937	+				+	
408.	+	*	<i>laminatus</i> (CREUTZER, 1799)	+					
409.	+	*	<i>lepidus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		4		+	
410.	+		<i>longicornis</i> STEPHENS, 1832	+					
411.	+		<i>mannerheimi</i> FAUVEL, 1869	+	3	2		+	
412.	+		<i>marginatus</i> (MÜLLER, 1764)	+					
413.	+	*	<i>micans</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
414.	+	*	<i>micantoides</i> BENICK & LOHSE, 1956	+				+	
415.	+	*	<i>nigrita</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
416.	+		<i>nitidicollis</i> (LACORDAIRE, 1835)	+	V	2		+	
417.	+	*	<i>nitidus</i> (FABRICIUS, 1787)	+	1	2		+	
418.	+		<i>parvicornis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
419.	+	*	<i>politus</i> (LINNE, 1758)	+					
420.	+		<i>pseudovarians</i> STRAND, 1941	+				+	
421.	+	*	<i>punctus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
422.	+	*	<i>quisquiliarius</i> (GYLLENHAL, 1810)	+					
423.	+		<i>rectangulus</i> SHARP, 1874	+					
424.	+		<i>rotundicollis</i> (MENETRIES, 1832)	+				+	
425.	+	*	<i>rubripennis</i> STEPHENS, 1832	+					
426.	-		<i>rufipes</i> (STEPHENS, 1832)	-	0	0		+	+

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
427.	+	*	<i>salinus</i> KIESENWETTER, 1844	+		2		+	
428.	+		<i>sanguinolentus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
429.	+		<i>spinipes</i> SHARP, 1874	+				+	
430.	+		<i>splendens</i> (FABRICIUS, 1793)	+					
431.	+	*	<i>succicola</i> THOMSON, 1860	+					
432.	+	*	<i>tenuicornis</i> MULSANT & REY, 1853	+					
433.	+	*	<i>umbratilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
434.	+		<i>varians</i> (PAYKULL, 1789)	+					
435.	+		<i>ventralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	2	1		+	
<i>Rabigus</i> MULSANT & REY, 1876									
436.	-		<i>pullus</i> (NORDMANN, 1837)	-	0	0	2	+	
437.	+		<i>tenuis</i> (FABRICIUS, 1793)	+	1	1		+	
<i>Gabronthus</i> TOTTENHAM, 1955									
438.	+		<i>thermarum</i> (AUBÉ, 1850)	+				+	
<i>Bisnius</i> STEPHENS, 1829									
439.	+		<i>cephalotes</i> (GRAVENHORST, 1802)	+				+	
440.	+		<i>fimetarius</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
441.	+		<i>nigriventris</i> (THOMSON, 1867)	+		2		+	
442.	+		<i>nitidulus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
443.	+		<i>parcus</i> (SHARP, 1874)	+		1		+	
444.	+		<i>pseudoparcus</i> (BRUNNE, 1976)	+		1		+	
445.	+		<i>puella</i> (NORDMANN, 1837)	+		1		+	
446.	+		<i>scribae</i> (FAUVEL, 1867)	+	0	1	1	+	
447.	+	*	<i>sordidus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
448.	+		<i>sparsus</i> (LUCAS, 1846)					+	
449.	+		<i>spermophili</i> (GANGLBAUER, 1897)	+		2	3	+	
450.	+	*	<i>subuliformis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		4			
<i>Gabrius</i> STEPHENS, 1829									
451.	+		<i>appendiculatus</i> SHARP, 1910	+					
452.	+	*	<i>austriacus</i> SCHEERPELTZ, 1947	+		2	3	+	
453.	+	*	<i>breviventer</i> (SPERK, 1835)	+					
454.	-		<i>exiguus</i> (NORDMANN, 1837)	-		0		+	
455.	+		<i>lividipes</i> (BAUDI DI SELVE, 1848)	+		1		+	
456.	+		<i>nigritulus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
457.	+	*	<i>osseticus</i> (KOLENATI, 1846)	+					
458.	+		<i>sphagnicola</i> (SJÖBERG, 1950)	+		1		+	
459.	+	*	<i>splendidulus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
460.	+		<i>toxotes</i> JOY, 1913	+		2		+	
461.	+	*	<i>trossulus</i> (NORDMANN, 1837)	+					
<i>Creophilus</i> LEACH, 1819									
462.	+		<i>maxillosus</i> (LINNÉ, 1758)	+					
<i>Ontholestes</i> GANGLBAUER, 1895									
463.	+	*	<i>murinus</i> (LINNE, 1758)	+					
464.	+		<i>tessellatus</i> (GEOFFROY, 1785)	+					

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Emus LEACH, 1819						
465.	+	* <i>hirtus</i> (LINNÉ, 1758)	+		1		+	
		Platydacus THOMSON, 1858						
466.	+	<i>chalconcephalus</i> (FABRICIUS, 1801)	+		1		+	
467.	+	* <i>fulvipes</i> (SCOPOLI, 1763)	+		1		+	
468.	+	<i>latebricola</i> (GRAVENHORST, 1806)	+	2	1		+	
469.	+	* <i>stercorarius</i> (OLIVIER, 1795)	+					
		Dinothenarus THOMSON, 1858						
470.	+	* <i>fossor</i> (SCOPOLI, 1771)	+	0	1		+	
471.	+	<i>pubescens</i> (DE GEER, 1774)	+	3	1		+	
		Staphylinus LINNÉ, 1758						
472.	+	<i>caesareus</i> CEDERHJELM, 1798	+		3		+	
473.	+	* <i>dimidiaticornis</i> GEMMINGER, 1851	+	2	3		+	
474.	+	* <i>erythropterus</i> LINNE, 1758	+					
		Ocypus LEACH, 1819						
475.	+	<i>aeneocephalus</i> (DE GEER, 1774)	+	1			+	
476.	+	* <i>brunnipes</i> (FABRICIUS, 1781)	+					
477.	+	<i>fuscatus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+				+	
478.	+	<i>nitens</i> (SCHRANK, 1781)	+					
479.	+	* <i>olens</i> (MÜLLER, 1764)	+					
480.	+	* <i>ophthalmicus</i> (SCOPOLI, 1763)	+					
481.	+	<i>picipennis picipennis</i> (FABRICIUS, 1793)	+	3	3		+	
	V	<i>tenebricosus</i> GRAVENHORST, 1846						
		Tasgius STEPHENS, 1829						
482.	+	* <i>ater</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
483.	+	* <i>melanarius</i> (HEER, 1839)	+					
484.	+	<i>morsitans</i> (ROSSI, 1790)	+		2		+	
485.	+	<i>pedator</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	2	1		+	
486.	+	* <i>winkleri</i> (BERNHAEUER, 1906)	+		4		+	
		Heterothops STEPHENS, 1829						
487.	+	* <i>dissimilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
488.	+	* <i>minutus</i> WOLLASTON, 1860	?				+	
489.	+	* <i>niger</i> KRAATZ, 1868	+					
490.	+	<i>praevius</i> ERICHSON, 1839	+	3	1		+	+
491.	+	<i>quadripunctulus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+		2			
492.	+	<i>stiglundbergi</i> ISRAELSON, 1979					+	
		Euryporus ERICHSON, 1839						
493.	+	<i>picipes</i> (PAYKULL, 1800)	+	3	1		+	
		Velleius LEACH, 1819						
494.	+	<i>dilatatus</i> (FABRICIUS, 1787)	+		3	3	+	
		Quedius STEPHENS, 1829						
	/	<i>aridulus</i> Jansson, 1939	+					
495.	+	* <i>balticus</i> KORGE, 1960	+	3	3	3	+	

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
496.	+	*	<i>boopoides</i> MUNSTER, 1923					+	+
497.	+	*	<i>boops</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
498.	+		<i>brevicornis</i> (THOMSON, 1860)	+	2	2	2	+	
499.	+		<i>brevis</i> ERICHSON, 1840	+				+	
500.	+		<i>cinctus</i> (PAYKULL, 1790)	+					
501.	+	*	<i>cruentus</i> (OLIVIER, 1795)	+					
502.	+	*	<i>curtipennis</i> BERNHAUER, 1908	+		3			
503.	+	*	<i>fulgidus</i> (FABRICIUS, 1793)	+	1	3		+	
504.	+	*	<i>fuliginosus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
505.	+		<i>fulvicollis</i> (STEPHENS, 1833)	+		1		+	
506.	+		<i>fumatus</i> (STEPHENS, 1833)	+					
507.	+		<i>invreae</i> GRIDELLI, 1924	+		3	3	+	
508.	+	*	<i>lateralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		3			
509.	+	*	<i>levicollis</i> (BRULLÉ, 1832)	+					
510.	-		<i>limbatus</i> (HEER, 1839)	-		0		+	
511.	+		<i>longicornis</i> KRAATZ, 1857	+					
512.	+	*	<i>lucidulus</i> ERICHSON, 1839					+	
513.	+	*	<i>maurorufus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
514.	+		<i>maurus</i> (SAHLBERG, 1830)	+	D	3			
515.	+	*	<i>mesomelinus mesomelinus</i> (MARSHAM, 1802)	+					
516.	+		<i>microps</i> GRAVENHORST, 1847	+	2	1	3	+	
517.	+	*	<i>molochinus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
518.	+	*	<i>nemoralis</i> BAUDI DI SELVE, 1848	+		3		+	
519.	+		<i>nigriceps</i> KRAATZ, 1857	+		3		+	
520.	+	*	<i>nigrocaeruleus</i> FAUVEL, 1876	+		4		+	
521.	+	*	<i>nitipennis</i> (STEPHENS, 1833)	+					
522.	+	*	<i>ochripennis</i> (MÉNÉTRIÉS, 1832)	+		2		+	
523.	+	*	<i>persimilis</i> MULSANT & REY, 1876	+	3	3	3	+	
524.	+	*	<i>picipes</i> (MANNERHEIM, 1830)	+	3	2			
525.	-		<i>plagiatus</i> MANNERHEIM, 1843	-		0		+	
526.	+		<i>puncticollis</i> (THOMSON, 1867)	+					
527.	+		<i>reitteri</i> GRIDELLI, 1925	+		1	3	+	+
	?		<i>richteri</i> KORGE, 1966	?		1		+	+
528.	+	*	<i>scintillans</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
529.	+		<i>scitus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+	3	4			
530.	+	*	<i>semiaeneus</i> (STEPHENS, 1833)	+		1		+	
	V	*	<i>simplicifrons</i> FAIRMAIRE, 1862						+
531.	+		<i>suturalis</i> KIESENWETTER, 1845	-		0		+	
532.	+		<i>truncicola</i> FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856	+	2	1	3	+	
533.	+	*	<i>umbrinus</i> ERICHSON, 1839						
534.	+		<i>vexans</i> EPPELSHEIM, 1881	+	3	2	3	+	
535.	+		<i>xanthopus</i> ERICHSON, 1839	+					

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		<i>Acylophorus</i> NORDMANN, 1837						
536.	+	<i>glaberrimus</i> (HERBST, 1784)	+	1	1	3	+	
537.	+	* <i>wagenschieberi</i> KIESENWETTER, 1850	+	0	2	3	+	
		<i>Atanygnathus</i> JAKOBSON, 1909						
538.	+	* <i>terminalis</i> (ERICHSON, 1839)	+	0	1	2	+	
		Habrocerinae Mulsant & Rey, 1877						
		<i>Habrocerus</i> ERICHSON, 1839						
539.	+	<i>capillaricornis</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
		Trichophyinae THOMSON, 1858						
		<i>Trichophya</i> MANNERHEIM, 1830						
540.	+	<i>pilicornis</i> (GYLLENHAL, 1810)	+	3	3		+	
		Tachyporinae MACLEAY, 1825						
		<i>Ischnosoma</i> STEPHENS, 1829						
541.	+	* <i>longicorne</i> (MÄKLIN, 1847)	+	3				
542.	+	* <i>splendidum</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
		<i>Mycetoporus</i> MANNERHEIM, 1830						
543.	+	<i>ambiguus</i> LUZE, 1901	+		1		+	
544.	+	* <i>baudueri</i> Mulsant & Rey, 1875	+				+	
545.	+	<i>bimaculatus</i> LACORDAIRE, 1835	+	R	1	3	+	
546.	+	* <i>clavicornis</i> (STEPHENS, 1832)	+					
	?	<i>despectus</i> Strand, 1969					+	+
547.	+	* <i>eppelsheimianus</i> FAGEL, 1968	+				+	
548.	+	* <i>erichsonianus</i> FAGEL, 1965	+				+	
549.	+	* <i>forticornis</i> FAUVEL, 1875	+	V			+	
550.	+	<i>glaber</i> (SPERK, 1835)		2	3		+	+
551.	+	* <i>lepidus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
552.	+	* <i>longulus</i> MANNERHEIM, 1830	+					
	-	<i>maerkelii</i> Kraatz, 1857						
553.	+	* <i>mulsanti</i> GANGLBAUER, 1895	+				+	
	/	<i>nigricollis</i> Stephens, 1835	+					+
	?	<i>piceolus</i> REY, 1883					+	+
554.	+	<i>punctus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
555.	+	* <i>rufescens</i> (STEPHENS, 1832)	+					
	/	<i>solidicornis</i> Wollaston, 1864	+					+
	?	<i>subpronus</i> REITTER, 1909					+	+
		<i>Bryophacis</i> REITTER, 1909						
556.	+	<i>crassicornis</i> (MÄKLIN, 1847)	+	1	1		+	
		<i>Bryoporus</i> KRAATZ, 1857						
557.	+	<i>cernuus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+	D			+	
		<i>Carphacis</i> GOZIS, 1886						
558.	+	<i>striatus</i> (OLIVIER, 1795)	+		3	2	+	
		<i>Lordithon</i> THOMSON, 1859						
559.	+	<i>exoletus</i> (ERICHSON, 1839)	+					

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
560.	+	*	<i>lunulatus</i> (LINNÉ, 1760)	+					
561.	+		<i>pulchellus</i> (MANNERHEIM, 1830)	+	0	1	2	+	
562.	+	*	<i>thoracicus</i> (FABRICIUS, 1777)	+					
563.	+		<i>trinotatus</i> (ERICHSON, 1839)	+				+	+
<i>Bolitobius</i> LEACH, 1819									
564.	+	*	<i>castaneus</i> (STEPHENS, 1832)	+				+	
565.	+	*	<i>cingulatus</i> MANNERHEIM, 1830	+				+	
<i>Parabolitobius</i> LI et al., 2000									
566.	+	*	<i>formosus</i> (GRAVENHORST, 1806)	-		0		+	
567.	+		<i>inclinans</i> (GRAVENHORST, 1806)	+				+	
<i>Sepedophilus</i> GISTEL, 1856									
568.	+		<i>binotatus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	1	1	1	+	
569.	+	*	<i>bipunctatus</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
	/		<i>constans</i> (FOWLER, 1888)		R		2	+	+
570.	+		<i>immaculatus</i> (STEPHENS, 1832)	+					
571.	+		<i>littoreus</i> (LINNÉ, 1758)	+					
572.	+	*	<i>marshami</i> (STEPHENS, 1832)	+					
573.	+	*	<i>nigripennis</i> (STEPHENS, 1832)	+			2	+	
574.	+	*	<i>obtusius</i> (LUZE, 1902)	+					
575.	+	*	<i>pedicularius</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
576.	+	*	<i>testaceus</i> (FABRICIUS, 1793)	+					
577.	+	*	<i>transcaspicus</i> (BERNHAEUER, 1917)	+	2	1	2	+	+
<i>Tachyporus</i> GRAVENHORST, 1802									
578.	+	*	<i>abdominalis</i> (FABRICIUS, 1781)	+					
579.	+	*	<i>atriceps</i> STEPHENS, 1832	+					
580.	+	*	<i>chrysomelinus</i> (LINNE, 1758)	+					
581.	+		<i>corpulentus</i> SAHLBERG, 1876	+	1	1		+	
582.	+		<i>dispar</i> (PAYKULL, 1789)	+					
583.	+	*	<i>hypnorum</i> (FABRICIUS, 1775)	+					
584.	+	*	<i>nitidulus</i> (FABRICIUS, 1781)	+					
585.	+		<i>obtusius</i> (LINNE, 1767)	+					
586.	+	*	<i>pallidus</i> SHARP, 1871	+		1		+	
587.	+		<i>pulchellus</i> MANNERHEIM, 1843	+	R	1	3	+	
588.	+	*	<i>pusillus</i> GRAVENHORST, 1806	+					
589.	+	*	<i>quadriscopulatus</i> PANDELLE, 1869	+			3	+	
590.	+		<i>ruficollis</i> GRAVENHORST, 1802	?				+	
591.	+	*	<i>scitulus</i> ERICHSON, 1839	+					
592.	+	*	<i>solutus</i> ERICHSON, 1839	+					
593.	+		<i>tersus</i> ERICHSON, 1839	+	1	1		+	
594.	+	*	<i>transversalis</i> GRAVENHORST, 1806	+					
<i>Lamprinodes</i> LUZE, 1901									
595.	+	*	<i>sagittatus</i> (GRAVENHORST, 1806)	+	3	3		+	
<i>Lamprinus</i> HEER, 1839									
596.	+		<i>erythropterus</i> (PANZER, 1796)	+		1		+	

Tabelle 1			Checklist					
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		<i>Tachinus</i> GRAVENHORST, 1802						
597.	+	<i>bipustulatus</i> (FABRICIUS, 1793)	+	0	1	2	+	
598.	+	<i>corticinus</i> GRAVENHORST, 1802	+					
599.	+	<i>fimetarius</i> GRAVENHORST, 1802	+					
600.	+	<i>humeralis</i> GRAVENHORST, 1802	+		2		+	
601.	+	<i>laticollis</i> GRAVENHORST, 1802	+					
602.	+	<i>lignorum</i> (LINNE, 1758)	+					
603.	+	<i>marginellus</i> (FABRICIUS, 1781)	+					
604.	+	<i>pallipes</i> (GRAVENHORST, 1806)	+	1	1		+	
605.	-	<i>proximus</i> KRAATZ, 1855	-				+	
606.	-	<i>rufipennis</i> GYLLENHAL, 1810	-		0		+	
607.	+	<i>rufipes</i> (LINNE, 1758)	+					
608.	+	<i>scapularis</i> STEPHENS, 1832	+	2	2		+	
609.	+	<i>subterraneus</i> (LINNE, 1758)	+					
		<i>Coproporus</i> KRAATZ, 1857						
610.	+	<i>immigrans</i> SCHÜLKE, 2007					+	
		<i>Cilea</i> JACQUELIN DU VAL, 1856						
611.	+	<i>silphoides</i> (LINNE, 1767)	+					
Aleocharinae FLEMING, 1821								
		<i>Deinopsis</i> MATTHEWS, 1838						
612.	+	<i>erosa</i> (STEPHENS, 1832)	+	3	3		+	
		<i>Gymnusa</i> GRAVENHORST, 1806						
613.	+	<i>brevicollis</i> (PAYKULL, 1800)	+	2	2		+	
		<i>Myllaena</i> ERICHSON, 1837						
614.	+	<i>brevicornis</i> (MATTHEWS, 1838)					+	
615.	+	<i>dubia</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
616.	+	<i>elongata</i> (MATTHEWS, 1838)	+	1		3	+	
617.	+	<i>gracilis</i> (MATTHEWS, 1838)	+	V	4	3	+	
618.	+	<i>infusata</i> KRAATZ, 1853	+		4			+
619.	+	<i>intermedia</i> ERICHSON, 1837	+					
620.	+	<i>kraatzii</i> SHARP, 1871					+	+
621.	+	<i>minuta</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
		<i>Pronomaea</i> ERICHSON, 1837						
622.	.	<i>picea</i> HEER, 1841						
623.	-	<i>rostrata</i> ERICHSON, 1837	-		0		+	+
		<i>Oligota</i> MANNERHEIM, 1830						
624.	+	<i>granaria</i> ERICHSON, 1837	+	3	0		+	
625.	+	<i>inflata</i> (MANNERHEIM, 1830)	-		0		+	
626.	+	<i>parva</i> KRAATZ, 1862	+				+	
627.	+	<i>pumilio</i> KIESENWETTER, 1858	+					
628.	+	<i>pusillima</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
		<i>Holobus</i> SOLIER, 1849						
629.	-	<i>apicatus</i> (ERICHSON, 1837)	-		0		+	
630.	+	<i>flavicornis</i> (LACORDAIRE, 1835)	+					

Tabelle 1					Checklist			
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Cypha LEACH, 1819						
631.	+	<i>discoidea</i> (ERICHSON, 1839)	+	3	4		+	
632.	-	<i>laeviuscula</i> (MANNERHEIM, 1830)	-		0		+	
633.	+	* <i>longicornis</i> (PAYKULL, 1800)	+					
634.	-	<i>ovulum</i> (HEER, 1839)	-		0		+	
635.	+	<i>pulicaria</i> (ERICHSON, 1839)	+	1	1	3	+	
636.	+	<i>punctum</i> (MOTSCHULSKY, 1858)	+		1		+	
637.	+	<i>seminulum</i> (ERICHSON, 1839)	+	1	1	2	+	
638.	+	<i>tarsalis</i> (LUZE, 1902)	+	3	2	3	+	
		Hygronoma ERICHSON, 1837						
639.	+	<i>dimidiata</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
		Brachida MULSANT & REY, 1872						
640.	-	<i>exigua</i> (HEER, 1839)	-		0		+	
		Encephalus STEPHENS, 1832						
641.	+	<i>complicans</i> STEPHENS, 1832	+	2	3		+	
		Gyrophæna MANNERHEIM, 1830						
642.	+	<i>affinis</i> MANNERHEIM, 1830	+					
643.	+	<i>bihamata</i> THOMSON, 1867	+					
644.	+	<i>fasciata</i> (MARSHAM, 1802)	+					
645.	+	<i>gentilis</i> ERICHSON, 1839	+		2		+	
646.	+	<i>hanseni</i> STRAND, 1946					+	
647.	+	<i>joyi</i> WENDELER, 1924	+		4			
648.	+	<i>joyioides</i> WÜSTHOFF, 1937	+					
649.	+	<i>lucidula</i> ERICHSON, 1837	+		4	3	+	
650.	+	<i>manca</i> ERICHSON, 1839	+					
651.	+	<i>minima</i> ERICHSON, 1837	+		2		+	
652.	+	<i>nana</i> (PAYKULL, 1800)	+					
653.	+	<i>polita</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		1		+	
654.	+	<i>poweri</i> CROTCH, 1867	-		0		+	
655.	+	<i>pseudonana</i> STRAND, 1939	+					
656.	+	<i>pulchella</i> HEER, 1839	+		2			
657.	+	<i>rosskotheni</i> WÜSTHOFF, 1937	+	R		2	+	
658.	+	<i>rousi</i> DVORAK, 1966	+		2	2	+	
659.	+	<i>rugipennis</i> MULSANT & REY, 1861	+		1		+	
660.	+	<i>strictula</i> ERICHSON, 1839	+					
661.	+	<i>williamsi</i> STRAND, 1935					+	
		Placusa ERICHSON, 1837						
662.	+	* <i>atrata</i> (MANNERHEIM, 1830)	+					
663.	+	<i>complanata</i> ERICHSON, 1839	+	2			+	
664.	+	* <i>depressa</i> MÄKLIN, 1845	+		3		+	
665.	+	<i>incompleta</i> SJÖBERG, 1934	+	D		3	+	
666.	+	* <i>pumilio</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		2		+	
667.	+	* <i>tachyporoides</i> (WALTZ, 1838)	+					

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Silusa ERICHSON, 1837						
668.	+	<i>rubiginosa</i> ERICHSON, 1837	+	3	2		+	
669.	-	<i>rubra</i> ERICHSON, 1839	-				+	
		Cyphea FAUVEL, 1863						
670.	+	<i>curtula</i> (ERICHSON, 1837)	+	3	1	2	+	
		Homalota MANNERHEIM, 1830						
671.	+	* <i>plana</i> (GYLLENHAL, 1810)	+					
		Anomognathus SOLIER, 1849						
672.	+	* <i>cuspidatus</i> (ERICHSON, 1839)	+					
		Thecturota CASEY, 1894						
673.	+	<i>marchii</i> (DODERO, 1922)	+		4		+	
		Leptusa KRAATZ, 1856						
674.	+	<i>fumida</i> (ERICHSON, 1839)	+					
675.	+	<i>norvegica</i> STRAND, 1941					+	
676.	+	<i>pulchella</i> (MANNERHEIM, 1830)	+				+	
677.	+	<i>ruficollis</i> (ERICHSON, 1839)	+		0		+	
		Euryusa ERICHSON, 1837						
678.	+	* <i>castanoptera</i> KRAATZ, 1856	+		0		+	
679.	-	<i>coarctata</i> MÄRKEL, 1845	-	0	0	2	+	
680.	+	<i>optabilis</i> HEER, 1839	+	3	2		+	
681.	+	<i>sinuata</i> ERICHSON, 1837	+	2	2	3	+	
		Tachyusida MULSANT & REY, 1872						
682.	+	<i>gracilis</i> (ERICHSON, 1837)	+		1		+	
		Phymatura SAHLBERG, 1876						
683.	+	<i>brevicollis</i> (KRAATZ, 1856)	+		1		+	
		Bolitochara MANNERHEIM, 1830						
684.	+	<i>bella</i> MÄRKEL, 1845	+					
685.	+	<i>lucida</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		2		+	
686.	+	<i>mulsanti</i> SHARP, 1875	+					
687.	+	<i>obliqua</i> ERICHSON, 1837	+		1		+	
688.	+	<i>pulchra</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
		Autalia LEACH, 1819						
689.	+	<i>impressa</i> (OLIVIER, 1795)	+		0		+	
690.	+	<i>longicornis</i> SCHEERPELTZ, 1947	+				+	
691.	.	<i>puncticollis</i> SHARP, 1864					+	
692.	+	<i>rivularis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
		Cordalia JACOBS, 1925						
693.	+	* <i>obscura</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
		Falagria LEACH, 1819						
694.	+	* <i>caesa</i> ERICHSON, 1837	+					
695.	+	* <i>sulcatula</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
		Myrmecocephalus MACLEAY, 1873						
696.	+	* <i>concinus</i> (ERICHSON, 1839)	+	D	1		+	

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Falagrioma CASEY, 1906						
697.	+	* <i>thoracica</i> (STEPHENS, 1832)	+		2		+	
		Anaulacaspis GANGLBAUER, 1895						
698.	+	* <i>nigra</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		2		+	
		Tachyusa ERICHSON, 1837						
699.	+	<i>coarctata</i> ERICHSON, 1837	+					
700.	+	<i>concinna</i> (Heer, 1839)					+	
701.	+	<i>constricta</i> ERICHSON, 1837	+					
		Thinonoma THOMSON, 1859						
702.	+	* <i>atra</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
		Ischnopoda STEPHENS, 1835						
703.	+	<i>leucopus</i> (MARSHAM, 1802)	+		2		+	
704.	+	<i>umbratica</i> (ERICHSON, 1837)	+	V				
705.	+	* <i>scitula</i> ERICHSON, 1837	+	2	2		+	
		Dasygnypeta LOHSE, 1974						
706.	+	<i>velata</i> (ERICHSON, 1837)	+	2	3		+	
		Gnypeta THOMSON, 1858						
707.	+	<i>carbonaria</i> (MANNERHEIM, 1830)	+	2	2		+	
708.	+	<i>ripicola</i> (KIESENWETTER, 1844)	+	3	2		+	
		Brachyusa MULSANT & REY, 1874						
709.	+	<i>concolor</i> (ERICHSON, 1839)	+	2	1		+	
		Dacrila MULSANT & REY, 1874						
710.	+	<i>fallax</i> (KRAATZ, 1856)	+	2	2	3		
		Callicerus GRAVENHORST, 1802						
711.	+	<i>obscurus</i> GRAVENHORST, 1802	+		3		+	
		Schistoglossa KRAATZ, 1856						
712.	+	<i>aubei</i> (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)	+	2	2	3	+	
713.	+	<i>curtipennis</i> (SHARP, 1869)	+	1	1	3	+	
714.	+	<i>drusilloides</i> (SAHLBERG, 1876)	+				+	
715.	+	<i>gemina</i> (ERICHSON, 1837)	+	2	2		+	+
716.	+	<i>pseudogemina</i> BENICK, 1981	+				+	
717.	+	<i>viduata</i> (ERICHSON, 1837)	+				+	
		Boreophilia BENICK, 1973						
718.	+	<i>hercynica</i> (RENKONEN, 1936)	+		1		+	
		Hydrosmecta THOMSON, 1858						
719.	+	* <i>delicatula</i> (Sharp, 1869)					+	
	+	<i>linkei</i> (BENICK, 1969)	?		1		+	
720.	+	* <i>longula</i> (HEER, 1839)					+	
721.	+	* <i>subtilissima</i> (KRAATZ, 1854)					+	
		Aloconota THOMSON, 1858						
722.	+	* <i>gregaria</i> (ERICHSON, 1839)	+					
723.	+	* <i>insecta</i> (THOMSON, 1856)	+					
724.	+	* <i>languida</i> (ERICHSON, 1837)	+	3	2		+	
725.	+	<i>planifrons</i> (WATERHOUSE, 1863)	+	R	1	3	+	

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
726.	+		<i>sulcifrons</i> (STEPHENS, 1832)	+	2	2			
727.	+		<i>ultima</i> (BENICK & LOHSE, 1959)	+	R	1	2	+	
	<i>Pycnota</i> MULSANT & REY, 1874								
728.	+		<i>paradoxa</i> (MULSANT & REY, 1861)	+				+	
	<i>Enalodroma</i> THOMSON, 1859								
729.	+		<i>hepatica</i> (ERICHSON, 1839)	+				+	
	<i>Amischa</i> THOMSON, 1858								
730.	+	*	<i>analís</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
731.	+		<i>bifoveolata</i> (MANNERHEIM, 1830)	+	R	4		+	
732.	+	*	<i>decipiens</i> (SHARP, 1869)	+				+	
	/		<i>forcipata</i> MULSANT & REY, 1873					+	
733.	+	*	<i>nigrofusca</i> (STEPHENS, 1832)	+					
	<i>Amidobia</i> THOMSON, 1858								
734.	+		<i>talpa</i> (HEER, 1841)	+					
	<i>Nehemitropia</i> LOHSE, 1971								
735.	+		<i>lividipennis</i> (MANNERHEIM, 1830)	+					
	<i>Notothecta</i> THOMSON, 1858								
736.	+		<i>confusa</i> (MÄRKEL, 1845)	+	0	0	2	+	
737.	+	*	<i>flavipes</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
	<i>Lyprocorrhe</i> THOMSON, 1859								
738.	+		<i>anceps</i> (ERICHSON, 1837)	+					
	<i>Neohilara</i> LOHSE, 1971								
739.	+		<i>subterranea</i> (MULSANT & REY, 1853)	+		2		+	
	<i>Alaobia</i> THOMSON, 1858								
740.	+		<i>scapularis</i> (SAHLBERG, 1831)	+	2	2	3	+	
	<i>Dochmonota</i> THOMSON, 1859								
741.	+	*	<i>clancula</i> (ERICHSON, 1837)	+	3	3	3	+	
742.	+		<i>rudiventris</i> (EPPELSHEIM, 1886)	+	1	1	2	+	
	<i>Tomoglossa</i> KRAATZ, 1856								
743.	+	*	<i>brakmani</i> SCHEERPELTZ, 1963					+	
744.	+		<i>luteicornis</i> (ERICHSON, 1837)	+	1	1	3	+	+
	<i>Ousipalia</i> GOZIS, 1886								
745.	+	*	<i>caesula</i> (ERICHSON, 1839)	+					
	<i>Geostiba</i> THOMSON, 1858								
746.	+	*	<i>circellaris</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
	<i>Dinaraea</i> THOMSON, 1858								
747.	+		<i>aequata</i> (ERICHSON, 1837)	+					
748.	+	*	<i>angustula</i> (GYLLENHAL, 1810)	+					
749.	+		<i>linearis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+		3			
	<i>Paranopleta</i> BRUNDIN, 1954								
750.	-		<i>inhabilis</i> (KRAATZ, 1856)	-				+	
	<i>Dadobia</i> THOMSON, 1858								
751.	+		<i>immersa</i> (ERICHSON, 1837)	+		2		+	

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Plataraea THOMSON, 1858						
752.	+	*	<i>brunnea</i> (FABRICIUS, 1798)	+				
753.	-		<i>dubiosa</i> (G. BENICK, 1935)	-	0		+	
		Liogluta THOMSON, 1858						
754.	+	*	<i>alpestris</i> (HEER, 1839)	+				
755.	+	*	<i>granigera</i> (KIESENWETTER, 1850)	+	2			
756.	+		<i>microptera</i> THOMSON, 1867	+				
757.	+		<i>pagana</i> (ERICHSON, 1839)	+	2			
		Atheta THOMSON, 1858						
758.	+	*	<i>acutiventris</i> Vogel, 2003				+	
759.	+		<i>aeneicollis</i> (SHARP, 1869)	+	1		+	
760.	+		<i>aeneipennis</i> (THOMSON, 1856)	+	1	1	+	
761.	+		<i>amicula</i> (STEPHENS, 1832)	+				
762.	+	*	<i>ampliocollis</i> (MULSANT & REY, 1874)	+				
763.	+		<i>aquatica</i> (THOMSON, 1852)	+				
764.	+		<i>aquatilis</i> (THOMSON, 1867)	+	1		+	
765.	+		<i>arctica</i> (THOMSON, 1856)	+	1	3	3	+
766.	-		<i>atomaria</i> (KRAATZ, 1856)	-	0		+	
767.	+		<i>atramentaria</i> (GYLLENHAL, 1810)	+				
768.	-		<i>autumnalis</i> (ERICHSON, 1839)	-	0		+	
769.	+		<i>basicornis</i> (MULSANT & REY, 1852)	+	2	0	3	+
770.	+		<i>benickiella</i> BRUNDIN, 1948	+	2			
771.	+		<i>boletophila</i> (THOMSON, 1856)	+	2	1	2	+
772.	+		<i>boreella</i> BRUNDIN, 1948	+	3	2	3	+
773.	+		<i>botildae</i> BRUNDIN, 1954	+	1		+	
774.	+		<i>britanniae</i> BERNHAUER & SCHEER-PELTZ, 1926	+	V	3	+	
	?		<i>britteni</i> Joy, 1913	+				+
775.	+		<i>cadaverina</i> (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)	+				
776.	+	*	<i>canescens</i> (SHARP, 1869)	+	3	2		
777.	+		<i>cauta</i> (ERICHSON, 1837)	+	2	1	+	
778.	+		<i>celata</i> (ERICHSON, 1837)	+				
779.	+		<i>cinnamoptera</i> (THOMSON, 1856)	+	3	3		
780.	+		<i>clientula</i> (ERICHSON, 1839)	+	1	1	+	
781.	+	*	<i>coriaria</i> (KRAATZ, 1856)	+				
782.	+		<i>corvina</i> (THOMSON, 1856)	+		1	+	
783.	+	*	<i>crassicornis</i> (FABRICIUS, 1793)	+				
784.	+		<i>cribrata</i> (KRAATZ, 1856)	+	R	1/2	+	
785.	+		<i>dadopora</i> THOMSON, 1867	+				
786.	+	*	<i>debilis</i> (ERICHSON, 1837)	+	V	3		
787.	+		<i>deformis</i> (KRAATZ, 1856)	+	0	0	+	
788.	+		<i>dilaticornis</i> (KRAATZ, 1856)					
789.	+		<i>divisa</i> (MÄRKEL, 1845)	+				

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
790.	+	*	<i>elongatula</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
791.	+	*	<i>europaea</i> LIKOVSKÝ, 1984					+	
792.	+	*	<i>euryptera</i> (STEPHENS, 1832)	+					
793.	-		<i>excellens</i> (KRAATZ, 1856)	-		0		+	
794.	+		<i>fallaciosa</i> (SHARP, 1869)	+	2	1		+	
795.	+	*	<i>fungi</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
796.	+		<i>fungicola</i> (THOMSON, 1852)	+		1		+	
797.	+		<i>fungivora</i> (THOMSON, 1867)	+	1			+	
798.	+	*	<i>gagatina</i> (BAUDI DI SELVE, 1848)	+					
799.	-		<i>ganglbaueri</i> BRUNDIN, 1948	-		0		+	
800.	+	*	<i>glabricula</i> THOMSON, 1867	+	2	2	3		
801.	+	*	<i>graminicola</i> (GRAVENHORST, 1806)	+					
802.	-		<i>grisea</i> (THOMSON, 1852)	-		0		+	
803.	+		<i>gyllenhalii</i> (THOMSON, 1856)	+	3	2			
804.	+	*	<i>harwoodi</i> WILLIAMS, 1930	+		3			
805.	+		<i>hybrida</i> (SHARP, 1869)	+		1	3	+	
806.	+		<i>hygrobia</i> (THOMSON, 1856)	+	1	1	3	+	
807.	+		<i>hygrotopora</i> (KRAATZ, 1856)					+	
808.	+		<i>hypnorum</i> (KIESENWETTER, 1850)	+					
809.	+		<i>incognita</i> (SHARP, 1869)	+		2			
810.	+		<i>indubia</i> (SHARP, 1869)					+	
811.	+		<i>inquinula</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
812.	+		<i>intermedia</i> (THOMSON, 1852)	+	1	1		+	
813.	+	*	<i>ischnocera</i> (Thomson, 1870)					+	
814.	+		<i>laevana</i> (MULSANT & REY, 1852)	+	2	2			
815.	-		<i>laticeps</i> (THOMSON, 1856)	-		0		+	
816.	+	*	<i>laticollis</i> (STEPHENS, 1832)	+					
817.	+		<i>liliputana</i> (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)	+	R	1	2	+	
818.	+		<i>longicornis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
819.	+		<i>luridipennis</i> (MANNERHEIM, 1830)	+					
820.	+	*	<i>luteipes</i> (ERICHSON, 1837)	+		2			
821.	+		<i>macrocera</i> (THOMSON, 1856)					+	
822.	+		<i>malleus</i> JOY, 1913	+					
823.	+	*	<i>marcida</i> (ERICHSON, 1837)	+					
	?		<i>melanaria</i> (MANNERHEIM, 1830)					+	+
824.	+		<i>melanocera</i> (THOMSON, 1856)	+					
825.	+		<i>monticola</i> (THOMSON, 1852)					+	
826.	+		<i>myrmecobia</i> (KRAATZ, 1856)	+	2	2			
827.	+		<i>negligens</i> (MULSANT & REY, 1873)	+	D	2			
828.	+		<i>nidicola</i> (JOHANSEN, 1914)	+		2			
829.	+		<i>nigra</i> (KRAATZ, 1856)	+					
830.	+		<i>nigripes</i> (THOMSON, 1856)	+	1	1		+	
831.	+		<i>nigritula</i> (GRAVENHORST, 1802)					+	

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
832.	+		<i>oblita</i> (ERICHSON, 1839)	+					
833.	-		<i>obtusangula</i> JOY, 1913	-		0		+	
834.	+	*	<i>occulta</i> (ERICHSON, 1839)	+		4			
835.	+	*	<i>orbata</i> (ERICHSON, 1837)	+					
836.	+		<i>orphana</i> (ERICHSON, 1837)	+	3	2			
837.	+		<i>palleola</i> (ERICHSON, 1837)	+	3	1		+	
838.	+		<i>pallidicornis</i> (THOMSON, 1856)	+					
839.	+	*	<i>palustris</i> (KIESENWETTER, 1844)	+					
840.	+		<i>pandionis</i> SCHEERPELTZ, 1958		1	1	1	+	
841.	+		<i>paracrassicornis</i> BRUNDIN, 1954		D			+	
842.	+		<i>parapicipennis</i> BRUNDIN, 1954					+	
843.	+		<i>parca</i> (MULSANT & REY, 1873)	-		0		+	
844.	+		<i>pervagata</i> BENICK, 1975	+	1	1	2	+	
845.	+		<i>picipes</i> (THOMSON, 1856)	+	3	1		+	
846.	+		<i>pilicornis</i> (THOMSON, 1852)	+		2			
847.	+		<i>pittionii</i> SCHEERPELTZ, 1950	+		3			
848.	+	*	<i>pseudoelongatula</i> BERNHAUER, 1907					+	
849.	+		<i>puncticollis</i> BENICK, 1938	+		1		+	
850.	+		<i>putrida</i> (KRAATZ, 1856)					+	
851.	+		<i>ripicola</i> HANSEN, 1932					+	
852.	+		<i>ravilla</i> (ERICHSON, 1839)	+					
853.	-		<i>scotica</i> (ELLIMAN, 1909)	-		0		+	
854.	+	*	<i>sequanica</i> (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)	+	2	2			
855.	+		<i>sodalis</i> (ERICHSON, 1837)	+					
856.	+		<i>sodermani</i> BERNHAUER, 1931	+	2	1	2	+	
857.	+		<i>sordidula</i> (ERICHSON, 1837)					+	
858.	+		<i>strandiella</i> BRUNDIN, 1954	+	1	1	3	+	
859.	+		<i>subsINUATA</i> (ERICHSON, 1839)	+	0	1		+	
860.	+		<i>subtilis</i> (SCRIBA, 1866)	+		1		+	
861.	+		<i>terminalis</i> (GRAVENHORST, 1806)	+	3	2			
862.	-		<i>tibialis</i> (HEER, 1839)	-		0		+	
863.	+		<i>tmolosensis</i> BERNHAUER, 1940	+	3	2	3		
864.	+	*	<i>triangulum</i> (KRAATZ, 1856)	+					
865.	+		<i>trinotata</i> (KRAATZ, 1856)	+					
866.	+	*	<i>vaga</i> (HEER, 1839)	+					
867.	.		<i>varendorffiana</i> BERNHAUER & SCHEERPELTZ, 1926	.				+	
868.	+	*	<i>vilis</i> (ERICHSON, 1837)	+	3	1		+	
869.	+		<i>voeslauensis</i> BERNHAUER, 1944	+	1	1	3	+	
870.	+		<i>volans</i> (SCRIBA, 1859)	+					
871.	+		<i>xanthopus</i> (THOMSON, 1856)	+					
872.	+	*	<i>zosteræ</i> (THOMSON, 1856)	+		3			

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Acrotona THOMSON, 1859						
873.	+	*	<i>aterrima</i> (GRAVENHORST, 1802)	+				
874.	+		<i>benicki</i> (ALLEN, 1940)	+	2	2		
	/		<i>convergens</i> (STRAND, 1958)				+	+
875.	+	*	<i>exigua</i> (ERICHSON, 1837)	+	D			
876.	+	*	<i>muscorum</i> (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860)	+	3	2		
877.	+		<i>obfuscata</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	3	3		
878.	+		<i>parens</i> (MULSANT & REY, 1852)	+	3			
879.	+	*	<i>parvula</i> (MANNERHEIM, 1830)	+				
880.	-		<i>piceorufa</i> (MULSANT & REY, 1873)	-		0	+	+
881.	+	*	<i>pseudotenera</i> (CAMERON, 1933)				+	
882.	+	*	<i>pygmaea</i> (GRAVENHORST, 1802)	+				
883.	+	*	<i>sylvicola</i> (KRAATZ, 1856)	+				
884.	+		<i>troglydites</i> (MOTSCHULSKY, 1858)	+		2		
		Alevonota THOMSON, 1858						
885.	+	*	<i>elegantula</i> (BRISOUT, 1863)					+
886.	+		<i>egregia</i> (RYE, 1876)	+	V	2	+	
887.	+		<i>gracilentia</i> (ERICHSON, 1839)	+	1	1	3	+
888.	?		<i>rufotestacea</i> (KRAATZ, 1856)	+	3	2	+	+
		Alianta THOMSON, 1858						
889.	+		<i>incana</i> (ERICHSON, 1837)	+				
		Pachnida MULSANT & REY, 1874						
890.	+	*	<i>nigella</i> (ERICHSON, 1837)	+				
		Trichiusa CASEY, 1894						
891.	+		<i>immigrata</i> LOHSE, 1984	+				
		Thamiaraea THOMSON, 1858						
892.	+	*	<i>cinnamomea</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	3	2	3	+
893.	+		<i>hospita</i> (MÄRKEL, 1845)	+	2	1	2	+
		Drusilla LEACH, 1819						
894.	+	*	<i>canaliculata</i> (FABRICIUS, 1787)	+				
		Zyras STEPHENS, 1835						
895.	+		<i>collaris</i> (PAYKULL, 1800)	+			+	
896.	+		<i>haworthi</i> (STEPHENS, 1832)	+	R	2	3	+
		Pella STEPHENS, 1835						
897.	+		<i>cognata</i> (MÄRKEL, 1842)	+				
898.	+		<i>funesta</i> (GRAVENHORST, 1806)	+		4		
899.	+	*	<i>humeralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+				
900.	+		<i>laticollis</i> (MÄRKEL, 1845)	+	3	4		
		Pella STEPHENS, 1835						
901.	+	*	<i>limbata</i> (PAYKULL, 1789)	+				
902.	+	*	<i>lugens</i> (GRAVENHORST, 1802)	+	V	1	+	
		Myrmoezia MULSANT & REY, 1874						
903.	+		<i>plicata</i> (ERICHSON, 1837)				+	

Tabelle 1				Checklist				
	Status	Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
		Lomechusoides TOTTENHAM, 1939						
904.	+	<i>strumosus</i> (FABRICIUS, 1775)	+	3	3		+	
		Lomechusa GRAVENHORST, 1806						
905.	+	<i>emarginata</i> (PAYKULL, 1789)	+				+	
906.	+	<i>paradoxa</i> GRAVENHORST, 1806	+	2	1	3	+	
907.	+	<i>pubicollis</i> BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860	+		2		+	
		Dinarda LEACH, 1819						
908.	+	<i>dentata</i> (GRAVENHORST, 1806)	+				+	+
909.	+	<i>hagensii</i> WASMANN, 1889	+		3		+	+
910.	+	<i>maerkelii</i> KIESENWETTER, 1843	+		4		+	+
		Phloeopora ERICHSON, 1837						
	/	<i>aliena</i> LOHSE, 1984	+			1		+
	/	<i>bernhaueri</i> Lohse, 1984	+					+
911.	+	<i>concolor</i> (KRAATZ, 1856)	+		1		+	
912.	+	<i>corticalis</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
913.	+	<i>nitidiventris</i> FAUVEL, 1900	+			2	+	+
	/	<i>opaca</i> BERNHAUER, 1902	+	3	2	2		+
914.	+	<i>scribae</i> EPELSHEIM, 1884	+				+	
915.	+	<i>teres</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
916.	+	<i>testacea</i> (MANNERHEIM, 1830)	+					
		Ilyobates KRAATZ, 1856						
917.	+	<i>bennetti</i> DONISTHORPE, 1914	+				+	
918.	+	<i>nigricollis</i> (PAYKULL, 1800)	+		4		+	
		Calodera MANNERHEIM, 1830						
919.	+	<i>aethiops</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
920.	+	<i>cochlearis</i> ASSING, 1996					+	+
921.	+	<i>nigrita</i> MANNERHEIM, 1830	+		4		+	
922.	+	<i>protensa</i> MANNERHEIM, 1830	+	3	3	3	+	
923.	+	<i>riparia</i> ERICHSON, 1837	+	V			+	
924.	+	<i>rubens</i> ERICHSON, 1837	+	0	1	2	+	
925.	+	<i>rufescens</i> KRAATZ, 1856	+	2	1	3	+	
926.	+	<i>uliginosa</i> ERICHSON, 1837	+	2	3	3	+	
		Tetralaucopora BERNHAUER, 1928						
927.	+	<i>longitarsis</i> (ERICHSON, 1839)					+	
928.	+	<i>rubicunda</i> (ERICHSON, 1837)	+		3		+	
		Amarochara THOMSON, 1858						
929.	+	<i>bonnairei</i> (FAUVEL, 1865)	+	D	1	2	+	
		Amarochara THOMSON, 1858						
930.	+	<i>forticornis</i> (LACORDAIRE, 1835)	+		2		+	
931.	-	<i>umbrosa</i> (ERICHSON, 1837)	-		0		+	
		Ocalea ERICHSON, 1837						
932.	+	<i>badia</i> ERICHSON, 1837	+					
	/	<i>latipennis</i> SHARP, 1870					+	+

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
933.	+	*	<i>picata</i> (STEPHENS, 1832)	+	1				
934.	+	*	<i>rivularis</i> MILLER, 1852					+	
Meotica Mulsant & Rey, 1873									
935.	+		<i>exilis</i> (GRAVENHORST, 1806)	+	D				
936.	+		<i>exillima</i> SHARP, 1915	+	D		3	+	
937.	+	*	<i>filiformis</i> (MOTSCHULSKY, 1860)		D			+	
938.	+		<i>marchica</i> BENICK, 1953					+	
939.	+		<i>pallens</i> (REDTENBACHER, 1849)		3			+	
Ocyusa Kraatz, 1856									
940.	+		<i>maura</i> (ERICHSON, 1837)	+					
941.	+	*	<i>picina</i> (AUBÉ, 1850)	+					
Cousya Mulsant & Rey, 1875									
942.	+	*	<i>longitarsis</i> (THOMSON, 1867)	+	3	3	3	+	
943.	+		<i>nigrata</i> (FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856)					+	
Zoosetha Mulsant & Rey, 1874									
944.	+		<i>inconspicua</i> (ERICHSON, 1839)	+	1	1	2	+	
Poromniusa Ganglbauer, 1895									
945.	-		<i>crassa</i> (EPPELSHEIM, 1883)	-		0		+	
946.	+		<i>procidua</i> (ERICHSON, 1837)	+		3		+	
Mniusa Mulsant & Rey, 1875									
947.	+		<i>incrassata</i> (MULSANT & REY, 1852)	+		1		+	
Hygropora Kraatz, 1856									
948.	+		<i>cunctans</i> (ERICHSON, 1837)	+	2	1	2	+	
Oxypoda Mannerheim, 1830									
949.	+	*	<i>abdominalis</i> (MANNERHEIM, 1830)	+					
950.	+	*	<i>acuminata</i> (STEPHENS, 1832)	+					
951.	+		<i>alternans</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
952.	+	*	<i>annularis</i> (MANNERHEIM, 1830)	+					
953.	+		<i>bicolor</i> Mulsant & Rey, 1853	+		2		+	
954.	+	*	<i>brachyptera</i> (STEPHENS, 1832)	+					
955.	+	*	<i>brevicornis</i> (STEPHENS, 1832)	+					
956.	-		<i>doderoi</i> BERNHAUER, 1902	-	0	0	3	+	
957.	+		<i>elongatula</i> AUBÉ, 1850	+					
958.	+		<i>exoleta</i> ERICHSON, 1839	+					
959.	-		<i>ferruginea</i> ERICHSON, 1839	-		0		+	
960.	+	*	<i>filiformis</i> REDTENBACHER, 1849	+	V	4		+	
961.	+		<i>flavicornis</i> KRAATZ, 1856	+	3	3		+	
962.	+		<i>formiceticola</i> MÄRKEL, 1841	+					
963.	+		<i>funnebris</i> KRAATZ, 1856	+		2		+	
964.	+	*	<i>haemorrhoea</i> (MANNERHEIM, 1830)	+					
965.	+		<i>induta</i> Mulsant & Rey, 1861	+	3	2		+	
966.	+		<i>lentula</i> ERICHSON, 1837	+	1	1	3	+	
967.	+	*	<i>longipes</i> Mulsant & Rey, 1861	+					

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
968.	+		<i>mutata</i> SHARP, 1871	+		1		+	
969.	+		<i>nigrocincta</i> MULSANT & REY, 1875	+	1	1	2	+	
970.	+	*	<i>opaca</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
971.	+	*	<i>praecox</i> ERICHSON, 1839	+					
972.	+		<i>pratensicola</i> LOHSE, 1970	+		2		+	
973.	+	*	<i>procerula</i> MANNERHEIM, 1830	+					
974.	+		<i>recondita</i> KRAATZ, 1856	+	3	3	3	+	
975.	+	*	<i>rufa</i> KRAATZ, 1856	+		1	3	+	
976.	-		<i>rugulosa</i> KRAATZ, 1856	-		0		+	
977.	+		<i>soror</i> THOMSON, 1855	+	3	3	3	+	
978.	+	*	<i>spectabilis</i> MÄRKEL, 1845	+		4		+	
979.	+	*	<i>tarda</i> SHARP, 1871	+					
980.	+	*	<i>testacea</i> ERICHSON, 1837	-		0		+	
981.	+	*	<i>togata</i> ERICHSON, 1837	+					
982.	+	*	<i>vicina</i> KRAATZ, 1856	+		4		+	
983.	+	*	<i>vittata</i> MÄRKEL, 1842	+					
			<i>Ischnoglossa</i> KRAATZ, 1856						
984.	+		<i>prolixa</i> (GRAVENHORST, 1802)	+				+	
			<i>Dexiogyia</i> THOMSON, 1858						
985.	+		<i>corticina</i> (ERICHSON, 1837)	+				+	
986.	+		<i>forticornis</i> (STRAND, 1939)	+		1		+	+
			<i>Thiasophila</i> KRAATZ, 1856						
987.	+		<i>angulata</i> (ERICHSON, 1837)	+					+
988.	+		<i>canaliculata</i> MULSANT & REY, 1875	+		2		+	
989.	+		<i>inquilina</i> (MÄRKEL, 1845)	+	2	1	2	+	
990.	+		<i>lohsei</i> ZERCHE, 1987	+		2		+	+
			<i>Crataraea</i> THOMSON, 1858						
991.	+		<i>suturalis</i> (MANNERHEIM, 1830)	+				+	
			<i>Haploglossa</i> KRAATZ, 1856						
992.	+		<i>gentilis</i> (MÄRKEL, 1845)	+	2	1	3	+	
993.	+		<i>marginalis</i> (GRAVENHORST, 1806)	+	3	2	3	+	
994.	+		<i>nidicola</i> (FAIRMAIRE, 1853)	+	3	3	3	+	
995.	+		<i>picipennis</i> (GYLLENHAL, 1827)	+	D	2		+	
996.	+	*	<i>villosula</i> (STEPHENS, 1832)	+		4			
			<i>Tinotus</i> SHARP, 1883						
997.	+		<i>morion</i> (GRAVENHORST, 1802)	+					
			<i>Aleochara</i> GRAVENHORST, 1802						
998.	+	*	<i>bilineata</i> GYLLENHAL, 1810	+					
999.	+	*	<i>binotata</i> KRAATZ, 1856	+					
1000.	+	*	<i>bipustulata</i> (LINNÉ, 1760)	+					
1001.	+	*	<i>brevipennis</i> GRAVENHORST, 1806	+					
1002.	+		<i>cuniculorum</i> KRAATZ, 1858	+	D	2	3	+	
1003.	+	*	<i>curtula</i> (GOEZE, 1777)	+					
1004.	+		<i>erythroptera</i> GRAVENHORST, 1806	+		1		+	

Tabelle 1				Checklist					
	Status		Artname	1998	RL B	RL BB	RL D	Meldung	Revision
1005.	+		<i>fumata</i> GRAVENHORST, 1802	+	R	2		+	
1006.	+		<i>funebria</i> WOLLASTON, 1864	+	3	3		+	
1007.	+		<i>haematoptera</i> KRAATZ, 1858					+	
1008.	+	*	<i>haematoptera</i> KRAATZ, 1856	-		0		+	
1009.	+		<i>inconspicua</i> AUBÉ, 1850	+					
1010.	+		<i>intricata</i> MANNERHEIM, 1830	+	V				
1011.	+		<i>laevigata</i> GYLLENHAL, 1810	+	2	2		+	
1012.	+		<i>lanuginosa</i> GRAVENHORST, 1802	+					
1013.	+		<i>lygaea</i> Kraatz, 1862					+	
1014.	+		<i>major</i> FAIRMAIRE, 1858	+				+	
1015.	+		<i>moerens</i> GYLLENHAL, 1827	+	2	1	3	+	
1016.	+		<i>moesta</i> GRAVENHORST, 1802	+	2	1		+	
1017.	+		<i>peusi</i> WAGNER, 1949	+		1		+	
1018.	+		<i>ruficornis</i> GRAVENHORST, 1802						
1019.	+		<i>sanguinea</i> (LINNÉ, 1758)	+	3	4		+	
1020.	+		<i>signata</i> (SAHLBERG, 1876)		2			+	
1021.	+		<i>spadicea</i> (ERICHSON, 1837)	+					
1022.	+	*	<i>sparsa</i> HEER, 1839	+					
1023.	-		<i>spissicornis</i> Erichson, 1839	-		0		+	
1024.	+		<i>stichai</i> LIKOVSKÝ, 1965	+	D	1		+	
1025.	+		<i>tristis</i> GRAVENHORST, 1806		3			+	
1026.	o		<i>verna</i> SAY, 1833					+	
1027.	+	*	<i>villosa</i> MANNERHEIM, 1830		D			+	

4. Bemerkungen zu einzelnen Arten

Micropeplus longipennis KRAATZ, 1859

Erst in jüngster Zeit aus dem Neißetal im äußersten Südosten Brandenburgs nachgewiesen (BARNDT, KORGE & PLATEN 2002, BARNDT 2004).

Scaphisoma subalpinum REITTER 1880

Nach ESSER (2005) existiert für die bei ESSER & MÖLLER (1998) aus Brandenburg gemeldete Art kein Beleg, die Art wurde deshalb für die Fauna der Mark wieder gestrichen. Auch für die Meldung von SCHILSKY (1889) existiert kein Beleg.

Biblopectus minutissimus (AUBE, 1833)

Nach ESSER & MÖLLER (1998) aus Berlin und Brandenburg unbekannt, lassen sich auch sonst keine Meldungen für die im südlichen Mitteleuropa verbreitete Art finden. Korge verzeichnet sie ohne weiteren Kommentar in der Neuauflage der Roten Liste Berlins (KORGE 2005). Das Vorkommen der Art im Stadtgebiet Berlin scheint unwahrscheinlich, die Art wird deshalb bis zur Überprüfung von Belegen als fraglich eingestuft.

***Euplectus bonvouloiri* REITTER, 1881**

Nach ESSER & MÖLLER (1998) aus Berlin und Brandenburg unbekannt. Die Art wurde aber bereits von PÜTZ (1989) aus der Umgebung von Eisenhüttenstadt als *E. bonvouloiri* ssp. *narentinus* gemeldet (det. Besuchet), später von KÖHLER (2000) ohne Angabe einer Subspezies und von ESSER (2002) und KORGE (2005) als *E. bonvouloiri* ssp. *rosae*. Die Angaben zur Verbreitung beider Formen bei BESUCHET (1974) und ESSER (2002) lassen an der Deutung als Subspezies Zweifel aufkommen. Am Vorkommen von *E. bonvouloiri* in Brandenburg ist nicht zu zweifeln, die von Esser in Berlin gesammelten Belege sind aber zu überprüfen.

***Euplectus mutator* FAUVEL, 1895**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *Euplectus fauveli*.

***Plectophloeus nubigena* REITTER, 1876**

Erstmals von Esser in der Berliner Jungfernheide gefunden (ESSER 2007).

***Saulcyella schmidtii* (MÄRKEL, 1845)**

Kannten ESSER & MÖLLER (1998) nur alte Belege der Art, wurden inzwischen mehrere neue Funde der Art aus Brandenburg gemeldet (KÖHLER 2000, EICHLER, ESSER & PÜTZ 2002, 2003).

***Trimium brevicorne* (REICHENBACH, 1816)**

ESSER & MÖLLER (1998) kannten nur alte Belege der Art, inzwischen wurden aktuelle Meldungen bekannt (EICHLER, ESSER & PÜTZ 1999, DREGER & al. 2002, KORGE 2005).

***Batrisodes oculatus* (AUBÉ, 1833)**

Nach ESSER & MÖLLER (1998) aus Berlin und Brandenburg unbekannt. KORGE (2005) meldet ohne weitere Angaben die Art in der Berliner Roten Liste. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Determination und des Umstandes, dass die Art auch aus dem restlichen Ostdeutschland bis auf einen alten Fund aus Thüringen unbekannt ist, ist die Meldung als fraglich zu betrachten.

***Bythinus macropalpus* AUBÉ, 1833**

ESSER & MÖLLER (1998) kannten nur alte Belege der Art. Inzwischen erfolgten Meldungen aus der Umgebung von Cottbus durch EICHLER & PÜTZ (2000) und aus Berlin durch KORGE (2005).

***Bryaxis clavicornis* (PANZER, 1809)**

Mit Bezug auf HORION (1949a), der die alten Meldungen aus Brandenburg (SCHILSKY 1888, 1909) als fraglich betrachtete und keine neuen Meldungen kannte, von ESSER & MÖLLER (1998) als Fehlmeldung betrachtet. Wagner meldet die Art nach einem Exemplar aus Berlin-Biesdorf (WAGNER 1949c), der von Rosinsky gesammelte Beleg ist nach Angaben von KORGE (2005) vernichtet. Bei Untersuchungen im Gebiet der Lausitzer Neiße von Barndt in mehreren Exemplaren wiedergefunden (BARNDT, KORGE & PLATEN 2002, BARNDT 2004).

***Bryaxis curtisii curtisii* (LEACH, 1817)**

ESSER & MÖLLER (1998) kannten nur alte Belege aus Brandenburg. Inzwischen mehrfach im Oberspreewald (EICHLER, ESSER & PÜTZ 2003) und im Neißegebiet bei Pusack (SCHÜLKE 2001a) wiedergefunden.

***Bryaxis nigripennis* (AUBÉ, 1844)**

Die Art war bisher aus Berlin und Brandenburg unbekannt (ESSER & MÖLLER 1998). Im Jahr 1999 von Eichler bei Forst und Pusack an der Neiße neu nachgewiesen (EICHLER, ESSER & PÜTZ 2002).

***Bryaxis puncticollis* (DENNY, 1825)**

ESSER & MÖLLER (1998) kannten aus Berlin und Brandenburg nur alte Meldungen. Von KORGE (2005) wird für Berlin die Datenlage als mangelhaft eingeschätzt. Im Jahr 2000 bei Neusorgefeld südwestlich von Luckau wieder gefunden (DREGER & al. 2002).

***Brachygluta haematica* (REICHENBACH, 1816)**

Auch von dieser Art waren nur alte Meldungen aus Brandenburg bekannt (ESSER & MÖLLER 1998). Inzwischen mehrfach wieder gefunden, von Schneider 1999 in der Döberitzer Heide (BEIER & KORGE 2001, ESSER & SCHNEIDER 2002) und von Eichler im Jahre 2000 im Oberspreewald (EICHLER, ESSER & PÜTZ 2003).

***Brachygluta xanthoptera* (REICHENBACH, 1816)**

Die Art ist für die Fauna des heutigen Brandenburg zu streichen, der einzige bekannte Fundort Sorau in der Niederlausitz (HORION 1949a) liegt heute in Polen.

***Reichenbachia juncorum* LEACH, 1817**

HORION (1949a) bezeichnete die Art als in ganz Deutschland nicht selten. ESSER & MÖLLER (1998) kannten aber keine aktuellen Funde aus Berlin und Brandenburg. Die Art wurde erst 2001 von Deichsel bei Fahrland nördlich von Potsdam wieder gefunden (ESSER, BÜCHE & DEICHSEL, 2006).

***Fagniezia impressa* (PANZER, 1805)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Trissemus impressus*.

***Pselaphaulax dresdensis* (HERBST, 1792)**

Auch von *P. dresdensis* waren ESSER & MÖLLER (1998) nur alte Meldungen bekannt. Nach KORGE (2005) bezieht sich aber die Meldung von *Pselaphus heisei* durch MÖLLER & SCHNEIDER (1991) auf diese Art. Das gemeldete Exemplar wurde bereits 1970 von Barndt auf der Berliner Pfaueninsel gesammelt.

***Pselaphus heisei* HERBST, 1792**

Ebenfalls nur nach alten Meldungen aus Berlin und Brandenburg bekannt (ESSER & MÖLLER 1998). In der jüngsten Vergangenheit mehrfach wieder gefunden (EICHLER, ESSER & PÜTZ 1999, DREGER & AL. 2002, BARNDT 2004).

***Metopsia clypeata* (MÜLLER, 1821) und *Metopsia similis* ZERCHE, 1998**

Durch ZERCHE (1998) wurde die Identität von *Metopsia clypeata* (MÜLLER, 1821) geklärt. Der Name gehört zu einer in Westeuropa und dem westlichen Mitteleuropa

vorkommenden, in Brandenburg nicht heimischen Art. Unsere Art wurde unter dem Namen *Metopsia similis* neu beschrieben.

***Megarthus depressus* (PAYKULL, 1789) und *Megarthus prosseni* SCHATZMAYR, 1904**

Durch CUCCODORO & LÖBL (1997) wurden die nordpaläarktischen Vertreter der Gattung *Megarthus* revidiert. Dabei wurde im Fall von *Megarthus depressus* ein dauerlicher Namenstausch notwendig, der noch im Nachhinein für Verwechslungen sorgt. So bezieht sich der Eintrag von *Megarthus depressus* (PAYKULL) in der Roten Liste von Brandenburg (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE, 1992) auf die heute *M. prosseni* SCHATZMAYR genannte Art, nicht auf die heute als *M. depressus* bekannte, früher als *M. sinuatocollis* bezeichnete (KORGE 2005). Desgleichen gilt für das „Käferverzeichnis“: für „*Megarthus depressus* (PAYKULL) lies *M. prosseni* SCHATZMAYR und für *M. sinuatocollis* (LACORDAIRE) lies *M. depressus* (PAYKULL).

***Megarthus hemipterus* ILLIGER, 1794**

Hier existiert nur die Angabe von ERICHSON (1839a), der die Art aus der Mark ohne nähere Angaben als selten meldet. HORION (1963) hält diese Angabe auf Grund des Fehlens neuer Nachweise für fraglich.

***Proteinus laevigatus* HOCHHUTH, 1872**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *P. macropterus* (GRAVENHORST, 1806).

***Eusphalerum longipenne* (ERICHSON, 1839)**

Die Art wurde von ERICHSON (1839a) unter anderem aus Brandenburg beschrieben „Von Herrn Schüppel in der hiesigen Gegend einmal gefunden, ...“, HORION (1963) nennt zwei weitere alte Belege aus Berlin, worauf sich wohl auch die Einstufung der Art in die Kategorie „0“ bei KORGE (2005) bezieht. Fehlt bei ESSER & MÖLLER (1998).

***Eusphalerum luteum* (MARSHAM, 1802)**

HORION (1963) [als *Anthobium ophthalmicum*] und ESSER & MÖLLER (1998) kannten keine Belege der Art aus Berlin und Brandenburg. KORGE (2005) meldet sie nach alten Exemplaren (gesammelt 1935) aus Spandau. Die Art ist in den umliegenden Gebieten nicht nur in montanen Regionen verbreitet, so wurde sie aktuell bei Baumkronenuntersuchungen in der Umgebung von Leipzig nachgewiesen (Sammlung Schülke). Ein Vorkommen in Brandenburg kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.

***Eusphalerum semicoleoptratum* (PANZER, 1795) und *E. primulae* (STEPHENS, 1834) und *E. tenenbaumi* (BERNHAEUER, 1932)**

Die drei genannten Arten werden von ERICHSON (1939a) [als *Anthobium abdominale* und *A. triviale*] bzw. SCHILSKY (1909) [als *A. florale*] aus Brandenburg gemeldet. HORION (1963) diskutiert die auf Material von Schüppel basierenden [als *A. abdominale* und *A. primulae*] bzw. im Fall von *E. tenenbaumi* [als *A. florale*] unbelegten Meldungen und hält sie alle für zweifelhaft. Auf Grund der Gesamtverbreitung der Arten ist ein Vorkommen in Brandenburg nicht gänzlich auszuschließen.

***Dropephylla ioptera* (STEPHENS, 1834)**

Die Art wird bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Phyllodrepa ioptera* geführt.

Anmerkung: JÁSZAY & HLAVÁČ (2006) beschreiben unter dem Namen *Dropephylla koltzei* eine neue, bisher mit *D. vilis* (ERICHSON, 1840) konfundierte Art, die auch in Norddeutschland (Bremen, Schleswig-Holstein) vorkommt. Da SCHILSKY (1909) *Phyllodrepa vilis* auch aus Brandenburg meldet, was HORION (1963) als fraglich betrachtet, sollte auf die Art geachtet werden.

***Omalius oxyacanthae* GRAVENHORST, 1806**

SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) kannten nur alte Nachweise der Art. Inzwischen wurde sie bei Döberitz (BEIER & KORGE 2001) und Storkow (BARNDT 2007) wieder aufgefunden.

***Xylostiba monilicornis* (GYLLENHAL, 1810)**

HORION (1963) und ESSER & MÖLLER (1998) kannten noch keine Nachweise dieser boreomontanen Art aus Brandenburg. Von Pütz wurde sie 1999 im Schlaubetal erstmals für Brandenburg nachgewiesen (EICHLER, ESSER & PÜTZ 2002).

***Xylodromus concinnus* (MARSHAM, 1802)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *Xylodromus brunneipennis* (STEPHENS, 1834).

***Anthobium melanocephalum* (ILLIGER, 1794)**

HORION (1963), SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) kannten nur alte Meldungen der Art aus Berlin und Brandenburg. Ein Wiederfund wurde jedoch bereits durch RUSCH (1992) publiziert.

***Lesteva sicula heeri* FAUVEL, 1871**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *Lesteva sicula* ERICHSON, 1840 gemeldet. Das Ignorieren von geographischen Rassen bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) führt leicht zu Verwechslungen (siehe auch *Euplectus bonvouloiri*). *Lesteva sicula sicula* ERICHSON ist in Italien und Nordafrika verbreitet (SMETANA 2004).

***Geodromicus nigrita* (MÜLLER, 1821)**

Nach NERESHEIMER & WAGNER (1942) wurde bei Briesnig ein Exemplar einer *Geodromicus*-Art auf einer Sandbank der Neiße von Purdel gesammelt und als *G. suturalis* gemeldet. Da *G. suturalis* (LACORDAIRE, 1835) weder im benachbarten Sachsen noch im weiteren Verlauf der Sudeten vorkommt, nimmt HORION (1963) eine Verwechslung mit dem weit verbreiteten *G. nigrita* (MÜLLER, 1821) an. Der Verbleib des Exemplars ist unbekannt, die Sammlung Purdels wurde im 2. Weltkrieg vernichtet (HORION 1949c). Bis auf weiteres ist der Nachweis als fraglich zu betrachten, wahrscheinlich ist die Art in Brandenburg nicht autochthon. *Geodromicus nigrita* wurde auch von WEISE (1872) aus der Mark gemeldet, der Fundort (Sommerfeld) liegt aber heute in Polen. Die Neunachweise von *Thinobius*-, *Hydrosmehta*- und *Ochtheophilus*-Arten in den letzten Jahren lassen aber das Vorkommen nicht ausgeschlossen erscheinen.

***Anthophagus angusticollis* MANNERHEIM, 1830**

HORION (1963) hält die Meldungen von ERICHSON (1839a) für zweifelhaft, ebenso die Herkunft eines angeblich aus der Berliner Jungfernheide stammenden Stückes in Sammlung Delahon (MNHUB). Das von HORION (1963) zitierte Exemplar mit der Fundangabe „Jungfernheide, I.1921, leg. Reineck“ gehört nicht zu *A. angusticollis* sondern zu einer Art der Untergattung *Anthophagus* s.str., wahrscheinlich zu *A. alpinus* (FABRICIUS). Diese Art kommt in Deutschland nur in den Alpen vor. Es ist also von einer Fundortverwechslung auszugehen.

***Anthophagus praeustus* MÜLLER, 1821**

HORION (1963) und ESSER & MÖLLER (1998) kannten noch keine Belege der Art aus Berlin und Brandenburg. Eine erste Meldung erfolgte durch RUSCH (1992) aus Eichow bei Vetschau.

***Ochtheophilus omalinus* (ERICHSON, 1840)**

Bis vor kurzem waren Vertreter der Gattung *Ochtheophilus* aus Brandenburg gänzlich unbekannt. Die meist montan verbreiteten Arten leben auf Sand- und Schotterbänken und in Spritzmoos. *Ochtheophilus omalinus* wurde an der Neiße auf Sandbänken in der Gesellschaft von *Hydrosmecta*- und *Thinobius*-Arten gesammelt (EICHLER, ESSER & PÜTZ 1999, SCHÜLKE 2001c).

***Thinodromus dilatatus* (ERICHSON, 1839)**

Die Art wurde von ERICHSON (1839a) unter anderem nach einem angeblich von Schüppel bei Potsdam gesammelten Exemplar beschrieben. HORION (1963) hält diesen Fund für eine Fehlmeldung (Fundortverwechslung). Die nächsten bekannten Fundorte liegen in Sachsen (Leipzig) und Sachsen-Anhalt (Halle/Saale). Ein Vorkommen der Art im Einzugsgebiet der Havel erscheint sehr unwahrscheinlich. Ich schließe mich der Meinung Horions an.

***Carpelimus bilineatus* STEPHENS, 1832 und *Carpelimus erichsoni* (SHARP, 1871)**

Die Deutung der bisher als *Carpelimus bilineatus* STEPHENS, *C. erichsoni* (SHARP) oder *C. augustae* (BERNHAEUER) bezeichneten Arten hat in der jüngsten Vergangenheit mehrfach gewechselt. Laut GILDENKOV (2001b) und MAKRANCZY (2002) müssen die beiden bei uns vorkommenden Arten die Namen *C. bilineatus* und *C. erichsoni* tragen. Nach GILDENKOV (2001b) ist *C. augustae* ein Synonym von *C. erichsoni*, nach MAKRANCZY (2002) ein Synonym von *C. bilineatus*. GILDENKOV (2001), der umfangreiches Material untersucht hat, meldet beide Arten auch aus Brandenburg. Die bisherigen Meldungen von *C. bilineatus* aus Berlin und Brandenburg (ESSER & MÖLLER 1998, ESSER & KIELHORN 2005, KÖRGE 2005) betreffen wohl die häufigere, jetzt *C. erichsoni* zu nennende Art.

***Carpelimus heidenreichi* (L. BENICK, 1934)**

Weder HORION (1963), SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) noch ESSER & MÖLLER (1998) kannten Funde dieser Art aus Brandenburg. Die Erstmeldung erfolgte durch RUSCH (1992), der sie bei Rathenow und in der Niederlausitz fing.

***Carpelimus impressus* (LACORDAIRE, 1835)**

Von *Carpelimus impressus* waren ESSER & MÖLLER (1998) nur alte Meldungen bekannt. Sie beziehen sich in ihrer Liste nur auf die Einstufung der Art in der Roten Liste Brandenburgs (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992). HORION (1963) bezeichnet die Art als weit verbreitet und gibt keine konkreten Fundangaben. Neue Funde wurden inzwischen von RUSCH (1992) und EICHLER & PÜTZ (2000) aus der Niederlausitz südwestlich von Cottbus publiziert.

***Carpelimus manchuricus subtilicornis* (ROUBAL, 1946)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *C. subtilicornis*. Durch GILDENKOV (2001b) wurde sie als Subspezies zu dem aus China beschriebenen *C. manchuricus* (BERNHAEUER) gezogen.

***Carpelimus zealandicus* (SHARP, 1900)**

Carpelimus zealandicus ist eine sich in Europa schnell ausbreitende Adventivart, die bis 1998 aus Brandenburg noch nicht bekannt war. Eine erste Meldung aus Berlin erfolgte durch ESSER (2002).

***Oxytelus migrator* FAUVEL, 1904**

Von ESSER & MÖLLER (1998) nicht berücksichtigt. Die aus Ostasien stammende Adventivart wurde aber bereits aus Berlin gemeldet, wo sie 1982 bis 1986 in einer Lichtfalle gefangen wurde (SCHÜLKE & UHLIG 1988).

***Anotylus mutator* (LOHSE, 1963)**

Die ebenfalls von ESSER & MÖLLER (1998) nicht berücksichtigte Art wurde erstmals durch RUSCH (1992) aus der Niederlausitz gemeldet. Die Überprüfung des vorhandenen Sammlungsmaterials von *Anotylus sculpturatus* (GRAVENHORST) sollte weitere Belege der Art erbringen.

***Anotylus politus* (ERICHSON, 1840)**

Von KORGE (1973) nach einem Weibchen aus dem Berliner Grunewald gemeldet. Dieser Fund bildet auch die Basis für die Meldungen der Art bei KORGE (1991a, 2005) und SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992). Aus Deutschland sind keine weiteren Meldungen der Art bekannt, ihr Vorkommen in Berlin ist höchst zweifelhaft.

***Bledius denticollis* FAUVEL, 1872**

Die meisten alten Meldungen dieser Art haben sich bereits als Fehlbestimmungen herausgestellt. HORION (1963) weist auf die unsicheren Belege hin und meldet für Brandenburg nur das Oderufer bei Bellinchen. Die Richtigkeit der Meldung ist als fragwürdig einzustufen, der Fundort liegt außerdem auf dem polnischen Ufer der Oder. KORGE (1991a, 2005) meldet die Art auch aus dem Stadtgebiet von Berlin. Die Belege wurden bisher nicht überprüft.

***Bledius filipes* SHARP, 1911**

Für *Bledius filipes* kannten SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) keine Meldungen aus Berlin und Brandenburg, obwohl HORION (1963) die Art als „Wohl im ganzen Gebiet; bes[onders] in ebenen und niedrigen Vorgebirgslagen; im allg[emeinen] nur stellenw[eise] und n[icht] h[äufig]; in der norddeutschen Ebene

... weiter verbreitet und im allg[emeinen] h[äufig]“ meldet. Eine konkrete Meldung aus Brandenburg erfolgte durch RUSCH (1992) aus Lebus und Lübben.

***Bledius limicola* TOTTENHAM, 1940**

Von RUSCH (1992) aus Repten östlich von Calau gemeldet. Das aktuelle Vorkommen dieser halophilen Art in Brandenburg erscheint fraglich, von den ehemaligen Salzstellen bei Mellensee und Sperenberg liegen allerdings alte Belege vor. Da es sich bei dem gemeldeten Fundort nicht um ein salzbeeinflusstes Habitat handelt ist wohl von einer Verwechslung mit *B. tricornis* (Herbst) auszugehen.

***Bledius nanus* ERICHSON, 1840**

Obwohl die Art nach HORION (1963) in Brandenburg im Allgemeinen nicht selten sein soll, kannten SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) keine aktuellen Meldungen aus Berlin und Brandenburg. Ein Wiederfund wurde aber bereits von RUSCH 1992 publiziert, inzwischen wurde die Art mehrfach in alten Tongruben wieder gefunden (Sammlung Schülke).

***Bledius pygmaeus* ERICHSON, 1839**

BARNDT, KORGE & PLATEN (2002) und BARNDT (2005a) melden Wiederfunde dieser in Brandenburg als „verschollen“ geltenden Art aus Lebus.

***Thinobius atomus* FAUVEL, 1871**

Die Belege der aus Berlin und Brandenburg gemeldeten Exemplare von *T. atomus* erwiesen sich bei Überprüfung als zu *T. pusillimus* oder *T. flagellatus* gehörend (SCHÜLKE 1991). Leider wurde die Art von ESSER & MÖLLER (1998) wieder aufgeführt, was von KÖHLER (2000) berichtigt wurde. *Thinobius atomus* kommt in Berlin und Brandenburg nach bisheriger Kenntnis nicht vor.

***Thinobius brevipennis* KIESENWETTER, 1850**

Der letzte belegte Fund der Art aus Brandenburg stammt aus dem Jahr 1944 (SCHÜLKE 1991), die von ESSER & MÖLLER (1998) vorgenommene Kategorisierung ist nicht zutreffend.

***Thinobius ciliatus* KIESENWETTER, 1844**

Bis zum Jahr 2000 war nur die alte, unbelegte Meldung Lohses für Brandenburg bekannt (LOHSE 1964, SCHÜLKE 1991, ESSER & MÖLLER 1998), die Art wurde bis dahin unter dem Namen *T. praetor* SMETANA geführt. Inzwischen wurde sie an der Neiße in der Umgebung von Zelz mehrfach in Gesellschaft von *T. longipennis* und mehreren *Hydrosmeeta*-Arten wieder gefunden (SCHÜLKE 2001c, EICHLER, ESSER & PÜTZ 2002).

***Thinobius flagellatus* LOHSE, 1984**

Obwohl einige alte Belege der Art aus Berlin und Brandenburg vorlagen (SCHÜLKE 1991), fehlten aktuelle Belege, so dass die Art in den „Roten Listen“ (KORGE 2005, SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) als „verschollen“ geführt wurde. Inzwischen konnte zum Teil durch gezielte Nachsuche eine Anzahl von Neufunden erbracht werden (SCHÜLKE 2001c, BEIER & KORGE 2001, EICHLER, ESSER & PÜTZ 2002), die das aktuelle Vorkommen der Art sowohl im Einzugsgebiet der Elbe/Havel als auch der Oder belegen.

***Thinobius longipennis* (HEER, 1841)**

Auch von *Thinobius longipennis* erwiesen sich bei einer Überprüfung die alten Belege sämtlich als Fehlbestimmungen, weshalb das Vorkommen der Art in Brandenburg als unwahrscheinlich angesehen wurde (SCHÜLKE 1991). Inzwischen konnten durch gezielte Suche nach *Thinobius* an der Neiße jedoch gesicherte Nachweise erbracht werden (SCHÜLKE 2001c, EICHLER, ESSER & PÜTZ 2002).

***Stenus bifoveolatus* GYLLENHAL, 1827**

Die Art wurde bei ESSER & MÖLLER (1998) übersehen. Horion gibt sie als überall verbreitet und nicht selten an (HORION 1963). Für Berlin und Brandenburg gibt es nur wenige konkrete Meldungen (z.B. GRIEP 1957, KLEEBOG 1995).

***Stenus excubitor* ERICHSON, 1839**

Nach einem oder mehreren von Schüppel angeblich bei Berlin gefangenen Exemplaren beschrieben (ERICHSON 1839a). PUTHZ (1967) hat den Typus untersucht und die Identität und Synonymie der Art geklärt. Alte Meldungen von *S. excubitor* (vor PUTHZ 1967) beziehen sich auf *S. gallicus*, *S. excubitor* ist die Art, die LOHSE (1964) als *S. rossicus* BERNHAUER bezeichnet. KORGE (1962a) meldete sie unter dem Namen *S. silesiacus* BENICK, 1921 aus der Umgebung von Glambeck. Auch PUTHZ (1971) führt sie in seiner Faunistik der mitteleuropäischen Steninen für Brandenburg. SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) führten die Art deshalb als „Vom Aussterben bedroht“, was von ESSER & MÖLLER (1998) nicht übernommen wurde.

***Stenus guttula* MÜLLER, 1821**

HORION (1963) nennt Meldungen aus Eberswalde (QUEDENFELDT 1884) und Berlin-Lübars (leg. Korge 1962). Letzteres war eine Falschmeldung, die KORGE (1991a, 2005) später berichtigt hat. Für Brandenburg wurde die Art daraufhin als „verschollen“ eingestuft (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992), was von ESSER & MÖLLER (1998) übernommen wurde. Inzwischen liegt eine Anzahl von aktuellen Funden aus Berlin und Brandenburg vor: Koselmühlenfließ bei Koschendorf (südwestlich von Cottbus) (EICHLER, ESSER & PÜTZ, 1999), Spechthausen bei Eberswalde (SCHÜLKE 2001c), Berlin-Pankow (KORGE 2005, ESSER, BÜCHE & DEICHSEL 2006).

***Stenus incanus* ERICHSON, 1839**

Ohne Herkunftsangabe von ERICHSON (1839a) in „Die Käfer der Mark Brandenburg“ beschrieben. Nach HORION (1963) befindet sich in Sammlung Kraatz (DEI) ein altes Stück aus „Berlin“, in Sammlung Delahon (MNHUB) Stücke aus Luckenwalde. Das aus „Berlin“ stammende Exemplar (es stammt aus Sammlung Weise) gehört nach PUTHZ (1971) zu *S. melanarius*. Er führt *S. incanus* nicht für Brandenburg. Die sechs Exemplare aus Sammlung Delahon, alle mit der Fundangabe „Luckenw.“, wurden ebenfalls überprüft. Es handelt sich um Exemplare von *S. morio*, bei denen die Kiele auf den ersten Abdominaltergiten nur schwach ausgebildet sind. *Stenus incanus* ist für die Fauna von Berlin und Brandenburg zu streichen.

***Stenus intermedius* REY, 1884**

SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) sowie ESSER & MÖLLER (1998) kannten nur alte Meldungen der Art. KORGE (1965) meldet sie aber unter dem Namen *S. problemati-*

cus aus Stolpe an der Oder und gibt sie auch für Berlin als „stark gefährdet“ an (KORGE 2005), ohne konkrete Funde zu nennen.

***Stenus mendicus* ERICHSON, 1840**

Die Meldungen von KORGE (1962a, 1962b) erwiesen sich als Fehlbestimmungen (PUTHZ 1965a). Die Art wird hier nur der Vollständigkeit halber mit aufgenommen.

***Stenus subdepressus* MULSANT & REY, 1861**

Die Meldung in ESSER & MÖLLER (1998) bezieht sich auf ein im MNHUB befindliches, von Puthz determiniertes Exemplar mit der Fundortangabe „Finsterw. Stockm.“. Ein Koleopterologe mit diesem Namen findet sich in HORN & al. (1990) und in der Online-Datenbank des DEI nicht. Dort ist lediglich ein Bienenzüchter mit Namen Beda Stockmann (gestorben 1856) verzeichnet. Der Zeitpunkt des Fundes lässt sich also nicht genau feststellen.

***Paederus littoralis* GRAVENHORST, 1802**

Die Art wurde von ESSER & MÖLLER (1998) übersehen, sie ist in Berlin und Brandenburg weit verbreitet aber nicht häufig. Aktuelle Meldungen erfolgten lediglich durch RUSCH (1992). KORGE (2005) verzeichnet die Art auch in der „Roten Liste“ Berlins.

***Astenus brevelytratus* LOHSE, 1987**

Astenus brevelytratus erwies sich als Synonym von *A. lyonessius* JOY (ASSING, 1999c).

***Astenus lyonessius* (JOY, 1908)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *A. longelytratus*, ebenfalls ein Synonym von *A. lyonessius* JOY (ASSING, 1999c).

***Rugilus angustatus* (GEOFFROY, 1785)**

Fehlt bei ESSER & MÖLLER (1998), Meldungen aus Berlin und Brandenburg liegen aber vor, aktuell von RUSCH (1992), EICHLER, ESSER & PÜTZ (1999), RENNER (2002) und KORGE (2005).

***Rugilus mixtus* (LOHSE, 1956)**

Bisher aus Berlin und Brandenburg unbekannt, wurde die Art von Barndt im Schlaubetal gefunden (BARNDT, KORGE & PLATEN 2002, BARNDT 2005a).

***Hypomedon debilicornis* (WOLLASTON, 1857)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *Chloecharis debilicornis*.

***Domene scabricollis* (ERICHSON, 1840)**

Von KORGE (1962a) aus Eberswalde-Eichwerder nach einem Tier gemeldet, das von Goetze am 17.VII.1956 gesammelt wurde, worauf sich auch HORION (1965) und SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) beziehen. Der Fundort ist soweit von den nächsten bekannten Vorkommen der Art entfernt, die im Harz, Erzgebirge und Schlesien liegen, dass von einer Verschleppung oder Fundortverwechslung auszugehen ist. Wenn die Art in Brandenburg vorkommen sollte, wäre ein Vorkommen in der Niederlausitz zu erwarten.

***Lobrathium multipunctum* (GRAVENHORST, 1802)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *Lathrobium multipunctum*.

Gattung *Tetartopeus* CZWALINA, 1888

Die vier bei uns vorkommenden Art der Gattung (*quadratus*, *rufonitidus*, *sphagnetorum*, *terminatus*) werden bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Lathrobium*-Arten (*quadratum*, *rufonitidum*, *sphagnetorum*, *terminatum*) geführt.

***Lathrobium geminum* KRAATZ, 1857**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *L. volgense*, der Name *L. geminum* wurde inzwischen von der International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) wieder eingesetzt (ASSING & SCHÜLKE 2007).

***Gyrophypnus punctulatus* (PAYKULL, 1789)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Gyrophypnus liebei* SCHEERPELTZ geführt. Inzwischen stellte sich heraus, dass es sich bei *G. liebei* um ein Synonym von *G. angustatus* handelt (ASSING 2003c, ASSING & SCHÜLKE 2007). Der präokkupierte Name *Gyrophypnus punctulatus* (PAYKULL, 1789) wurde inzwischen durch eine Entscheidung der Nomenklaturkommission geschützt (ICZN 2007).

***Gyrophypnus wagneri* (SCHEERPELTZ, 1926)**

Erst durch ASSING (2003c) von *G. angustatus* abgetrennt und für Deutschland nachgewiesen. Die aus Brandenburg vorliegenden Exemplare sind ohne Datumsangabe, die Kategorisierung bleibt deshalb fraglich. Vermutlich wurden die Exemplare in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesammelt.

***Megalinus glabratus* (GRAVENHORST, 1802)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Xantholinus glabratus*.

***Megalinus flavocinctus* (HOCHHUTH, 1849)**

Die Art war bisher aus dem Gebiet unbekannt, wurde jedoch kürzlich in Komposthaufen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg nachgewiesen. Die Gattung *Leptophius* in der die Art noch im letzten Supplement zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna verzeichnet war (ASSING & SCHÜLKE 2007), wurde inzwischen als Synonym zu *Megalinus* eingezogen (ASSING 2007). Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Xantholinus flavocinctus* geführt.

***Hypnogyra angularis* (GANGLBAUER, 1895)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Hypnogyra glabra*.

***Xantholinus coiffaiti* FRANZ, 1966**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Xantholinus sublinearis* geführt.

***Xantholinus dvoraki* COIFFAIT, 1956**

Die Meldungen aus Berlin und Brandenburg beziehen sich auf *Xantholinus roubali* COIFFAIT, 1956, der sich inzwischen als Synonym zu *X. dvoraki* erwiesen hat (GUSAROV 2002, ASSING & SCHÜLKE 2007).

***Xantholinus elegans* (OLIVIER, 1795)**

Auf Grund der mehrfachen Umbenennungen sind Fundangaben nicht immer zuver-

lässig. Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) wurde die Art als *Xantholinus semirufus* geführt.

***Xantholinus gallicus* COIFFAIT, 1956**

Die Meldungen aus Berlin und Brandenburg beziehen sich auf *Xantholinus rhenanus* COIFFAIT, 1962, der sich inzwischen als Synonym zu *X. gallicus* erwiesen hat (CICERONI 2001, ASSING & SCHÜLKE 2001).

***Othius angustus* STEPHENS, 1833**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Othius melanocephalus* geführt.

***Othius subuliformis* STEPHENS, 1833**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Othius myrmecophilus* geführt.

***Philonthus atratus* (GRAVENHORST, 1802)**

Die Art ist trotz ihres Fehlens bei ESSER & MÖLLER (1998) in Berlin und Brandenburg weit verbreitet und häufig. Aktuelle Meldungen existieren z. B. bei BARNDT (2004, 2005b, 2007), KLEEBOERG (1995), KÖRGE (1991a, 2005) oder RUSCH (1992).

***Philonthus cyanipennis* (FABRICIUS, 1793)**

HORION (1939) zitiert einen Fund aus Brandenburg (Glambeck, leg. Husler, teste Neresheimer), den er allerdings in seiner Faunistik (HORION 1965) nicht wieder anführt ohne dafür eine Begründung zu geben.

HORN & al. (1990) und die Online-Datenbank des DEI führen einen J. Husler, dessen Sammlung sich in der ZSSM befindet. STIESY (1990) nennt ohne weitere Angaben auch einen F. Husler als Mitglied des Berliner Entomologenvereins „Orion“. Ob es sich bei einem der beiden genannten Sammler um den von HORION (1939) zitierten handelt, konnte nicht abschließend geklärt werden. Eine Nachfrage nach Sammlungsmaterial in der Zoologischen Staatssammlung München erbrachte keinen Beleg (Baehr, Mail vom 20.09.2007). Die Meldung ist also als unbelegt und fraglich einzustufen. Immerhin ist ein Vorkommen der transpaläarktisch verbreiteten Art in Brandenburg nicht auszuschließen.

***Philonthus rufipes* (STEPHENS, 1832)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Philonthus immundus* geführt.

Gattung *Bisnius* STEPHENS, 1829

Die 12 in der Checklist genannten Gattungsvertreter sind bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Gattungsnamen *Philonthus* zu finden.

***Bisnius sparsus* (LUCAS, 1846)**

Ein Nachweis der sich langsam nach Osten ausbreitenden Art aus Berlin und Brandenburg war ESSER & MÖLLER (1998) noch unbekannt. Sie wurde aber bereits von RUSCH (1992) aus der Niederlausitz gemeldet.

***Gabrius appendiculatus* SHARP, 1910**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Gabrius subnigritulus* geführt.

***Gabrius austriacus* SCHEERPELTZ, 1947**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Gabrius velox*, der nach SCHILLHAMMER & LOTT (2001) aber einer anderen, in Berlin und Brandenburg nicht vorkommenden Art zukommt.

***Gabrius breviventer* (SPERK, 1835)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Gabrius coxalus* geführt.

***Dinothenarus fossor* (SCOPOLI, 1771)**

Bei LOHSE & LUCHT (1989) und KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) unter dem Namen *Staphylinus fossor* geführt, bei LOHSE (1964) als *Parabemus fossor*.

***Ocypus nitens* (SCHRANK, 1781)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Ocypus nero* geführt.

***Ocypus tenebricosus* (GRAVENHORST, 1846)**

Die montan vor allem im östlichen Mitteleuropa verbreitete Art wurde früher mit *O. olens* konfundiert und vielfach falsch gemeldet. Wenn der von KORGE (1958) aus Fürstenwalde gemeldete Beleg richtig determiniert ist, wovon ich ausgehe, muss wohl mit einer Verschleppung oder Fundortverwechslung gerechnet werden. Fürstenwalde ist sehr weit von den nächsten bekannten Fundorten der Art im südlichen Sachsen entfernt.

Gattung *Tasgius* STEPHENS, 1829

Die unter dem Namen *Tasgius* zusammengefassten Arten sind bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als Vertreter der Gattung *Ocypus* LEACH aufgeführt.

***Heterothops minutus* WOLLASTON, 1860**

Von ESSER & MÖLLER (1998) für Berlin und Brandenburg als fraglich gemeldet. Die Art wurde aber bereits von SCHÜLKE (1984b) erstmals für Brandenburg gemeldet, weitere Nachweise erfolgten durch SCHÜLKE (1990), RUSCH (1992), ESSER & KIELHORN (2005) und KORGE (2005).

***Heterothops stiglundbergi* ISRAELSON, 1979**

Die Art fehlt bei ESSER & MÖLLER (1998), sie wurde aber bereits mehrfach aus Berlin und Brandenburg nachgewiesen, so von SCHÜLKE (1984a, 1984b, 1990), RUSCH (1992) und KORGE (2005).

***Quedius aridulus* JANSSON, 1939**

Die bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als valid geführte Art ist zu streichen, sie erwies sich als Synonym von *Q. persimilis* MULSANT & REY (ASSING 1999d).

***Quedius boopoides* MUNSTER, 1923**

ESSER & MÖLLER (1998) kannten noch keine Nachweise der Art aus Berlin und Brandenburg. Es liegen aber mehrere aktuelle Meldungen vor: SCHÜLKE (1990), RUSCH (1992), BEIER & KORGE (2001) und BARNDT (2005b).

***Quedius fulgidus* (FABRICIUS, 1793)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) unter dem Namen *Quedius assimilis*.

***Quedius levicollis* (BRULLE, 1832)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) unter dem Namen *Quedius tristis*.

***Quedius lucidulus* ERICHSON, 1839**

ESSER & MÖLLER (1998) kannten keine Belege aus Berlin und Brandenburg. Aus der Niederlausitz liegt aber zumindest eine aktuelle Meldung von RUSCH (1992) vor.

***Quedius richteri* KORGE, 1966**

Nach zwei schlecht erhaltenen, immaturen Individuen aus dem Gellmersdorfer Forst bei Stolpe/Oder beschrieben (KORGE 1966) und nie wieder gefunden. Das Vorkommen einer weiteren *Quedius*-Art in Brandenburg ist höchst unwahrscheinlich, die Identität der Typen bleibt fraglich.

***Quedius simplicifrons* FAIRMAIRE, 1862**

BARNDT, KORGE & PLATEN (2002) melden diese littorale Art, die aus Deutschland nur von der Nordseeküste bekannt ist, aus dem Kreis Elbe-Elster. Die Art, die auch von der Ostseeküste und den deutschen Binnensalzstellen bisher vollkommen unbekannt ist, besitzt sicher kein autochthones Vorkommen in Brandenburg. Leider geben die Autoren nicht an, ob es sich um ein männliches Exemplar handelt, der Beleg ist zu überprüfen.

***Quedius suturalis* KIESENWETTER, 1845**

Von *Quedius suturalis* kannten weder SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992), noch ESSER & MÖLLER (1998) aktuelle Belege aus Brandenburg. Ein Wiederfund wurde von RUSCH (1992) aus der Niederlausitz publiziert. SOMMER & al. (1994) melden die Art auch aus Serwest und Golzow im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.

***Quedius umbrinus* ERICHSON, 1839**

Fehlt in der Liste von ESSER & MÖLLER (1998). Aktuell in Berlin und Brandenburg weit verbreitet und nicht selten: SCHÜLKE (1990, 2001c), RUSCH (1992), EICHLER, ESSER & PÜTZ (2002), BARNDT (2004, 2005b).

***Mycetoporus maerkelii* KRAATZ, 1857**

Fehlt bei SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998). Aus Brandenburg nur ein Mal von NERESHEIMER & WAGNER (1928) nach einem bei Eberswalde-Spechthausen gesammelten Exemplar gemeldet. Beide Sammler gelten als ausgesprochen zuverlässig und haben zu der angegebenen Zeit wohl nicht außerhalb von Brandenburg gesammelt, der Fundort macht eine Verschleppung unwahrscheinlich. Der Beleg in Sammlung Neresheimer wurde von L. Zerche (DEI) überprüft. Die Art ist boreomontan verbreitet und besitzt im Norden und Osten Europas und in Sibirien ein mehr oder weniger geschlossenes Verbreitungsgebiet über dessen Ausdehnung noch wenig bekannt ist. Ein Vorkommen in der norddeutschen Tiefebene ist nicht völlig ausgeschlossen, ähnliche Verbreitungsgebiete in Nord- und Osteuropa besitzen unter den Tachyporinae zum Beispiel *Ischnosoma bergrothi* (HELLÉN, 1925), *Sepedophilus wankowiczi* PANDELLÉ, 1869 oder *Tachinus marginatus* (FABRICIUS, 1793). Die drei genannten Arten besitzen allerdings in den mittel- und südeuropäischen Gebirgen keine Reliktareale und sind aus Brandenburg bisher unbekannt.

***Mycetoporus bimaculatus* LACORDAIRE, 1835**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *Mycetoporus ruficornis*.

***Mycetoporus despectus* STRAND, 1969**

Die Verbreitung von *Mycetoporus despectus* ist bisher auf Grund der schwierigen Bestimmung der Art nur ungenügend bekannt. Das Verbreitungsgebiet in Mitteleuropa scheint sich auf den äußersten Norden (Dänemark, Schleswig-Holstein) und das Alpengebiet zu beschränken. Belege aus anderen Gebieten erwiesen sich bisher stets als Fehlmeldungen. Die Art wurde bisher nur ein einziges Mal von RUSCH (2000) aus der Niederlausitz gemeldet. Der Beleg wurde bisher nicht überprüft, ein Vorkommen der Art im Süden Brandenburgs ist aber höchst zweifelhaft.

***Mycetoporus eppelsheimianus* FAGEL, 1968**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Mycetoporus brucki* geführt.

***Mycetoporus glaber* (SPERK, 1835) und *Mycetoporus nigricollis* STEPHENS, 1835**

Mycetoporus glaber wurde erst vor kurzem von *M. nigricollis* abgetrennt (SCHÜLKE & KOCIAN 2000). Die Art ist in Brandenburg weit verbreitet aber selten. Alle alten Belege von *M. nigricollis* sollten überprüft werden, da neben *M. glaber* auch noch eine weitere Art der *nigricollis*-Gruppe, *M. dispersus* SCHÜLKE & KOCIAN 2000, in Brandenburg vorkommen könnte. Die nächsten Funde der Art sind aus Sachsen-Anhalt bekannt, sie kommt aber auch in Skandinavien vor. Der aus Großbritannien beschriebene *Mycetoporus nigricollis* ist in West- und Südeuropa weit verbreitet und kommt in Brandenburg wahrscheinlich nicht vor, alle überprüften alten Meldungen beziehen sich auf *M. glaber*.

***Mycetoporus piceolus* REY, 1883**

Von RUSCH (1993) aus der Niederlausitz gemeldet. Die Identität der Art ist bisher nicht geklärt, alle Fundmeldungen sind als fraglich zu betrachten.

***Mycetoporus solidicornis* WOLLASTON, 1864 und *Mycetoporus subpronus* REITTER, 1909**

Mycetoporus solidicornis wurde von den Kanarischen Inseln beschrieben und hat mit den beiden von früheren Autoren als Rassen dieser Art angesehenen *M. reichei* (PANDELLÉ, 1869) und *M. subpronus* nichts zu tun. Ob *M. reichei* und *M. subpronus* valide Arten oder nur extreme Färbungsvarianten einer Art sind, ist zu überprüfen. Dass es sich um geographische Rassen einer Art handelt, ist auf Grund ihrer Verbreitung unwahrscheinlich. Mit einem Vorkommen von *M. reichei* in Brandenburg ist nicht zu rechnen, *M. subpronus* könnte aber im Gebiet vorkommen. Die Art ist auch in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen gefunden worden. RUSCH (2000) meldet *M. solidicornis* von mehreren Fundorten in der Niederlausitz. Ob es sich bei diesen Exemplaren um *M. subpronus* handelt, muss überprüft werden.

***Lordithon trinotatus* (ERICHSON, 1839)**

Das Vorkommen von *L. trinotatus* in Brandenburg ist unstrittig, die Art ist hier weit verbreitet und nicht selten. Alte Belege sind aber auf die jüngst abgetrennte Art

L. bimaculatus (SCHRANK, 1798) zu überprüfen, die auch in Thüringen und Sachsen vorkommt (SCHÜLKE 2000).

Gattung *Parabolitobius* LI, ZHAO & SAKAI, 2000

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch in der Gattung *Bolitobius* zu finden.

***Parabolitobius formosus* (GRAVENHORST, 1806)**

SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) kannten von *P. formosus* nur die alten Meldungen von HORION (1967). Die Art wurde deshalb in der „Roten Liste“ in der Kategorie „verschollen“ geführt, die Kategorisierung (-) bei Esser & Möller (1998) war nicht zutreffend, da der betreffende Fund bereits aus dem Jahr 1896 stammt. In den Jahren 1999 und 2000 von Barndt im Niederlausitzer Neißegebiet und im NSG Schadewitz westlich von Calau wieder gefunden (BARNDT, KÖRGE & PLATEN 2002, BARNDT 2004).

***Sepedophilus constans* (FOWLER, 1888)**

Sepedophilus constans ist in eine boreomontan verbreitete Art, die in Mitteleuropa das Alpengebiet und zumindest einige Mittelgebirge besiedelt. Ihre genaue Verbreitung ist noch schlecht bekannt, die meisten Nachweise stammen aus Flussauen und von Bachufern. Von KÖRGE (2005) und ESSER & KIELHORN (2005) auch aus Berlin gemeldet. Die letzteren Exemplare erwiesen sich bei Überprüfung als zu *S. transcaspicus* gehörend (ESSER, BÜCHE & DEICHSEL 2006), bei den von KÖRGE (2005) gemeldeten Tieren vom Hahneberg in Berlin-Spandau handelt es sich je um ein Männchen von *S. testaceus* und *S. marshami*. Die Art ist also für Berlin und Brandenburg zu streichen. Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) unter dem seit langem bekannten Synonym *S. stoeckli* (LOKAY, 1913) geführt.

***Sepedophilus nigripennis* (STEPHENS, 1832)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) unter den Namen *S. lividus* (ERICHSON, 1839) und *S. nigripennis* doppelt geführt. Beide Taxa erwiesen sich als identisch (SCHÜLKE, 1999c).

***Sepedophilus transcaspicus* (BERNHAEUER, 1917)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *S. lokayi* (SMETANA, 1969) geführt.

***Tachinus rufipes* (LINNAEUS, 1758)**

Die bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *T. signatus* GRAVENHORST, 1802 geführte Art muss seit kurzem wieder den Namen *T. rufipes* tragen (SCHÜLKE 2005b, ASSING & SCHÜLKE 2007).

***Coproporus immigrans* SCHÜLKE, 2007**

Erst 2005 in Berlin aufgefundene Adventivart, die in Mittel- und Nordeuropa bereits mehrfach, besonders in Rindenkompost gefunden aber bisher mit dem sehr ähnlichen *C. colchicus* (KRAATZ, 1858) verwechselt wurde (SCHÜLKE 2007).

***Myllaena brevicornis* (MATTHEWS, 1838)**

HORION (1967) gibt für *Myllaena brevicornis* keine konkreten Funddaten, er bezeichnet die Art als „In der norddeutschen Ebene im allg[emeinen] nur stellenw[eise] und

n[icht] h[äufig], nach Osten (Mecklenb[urg]. bis Preußen) ausgesprochen s[elten], nur sehr wenige Meldungen“.

Da aus Berlin keine Nachweise vorlagen bei KORGE (1991a) nicht geführt, bei SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) deren „Roten Liste“ kein Gesamtverzeichnis der Arten darstellt, nicht geführt da die bereits von SCHILSKY (1909) als „märkisch“ gemeldete Art nicht für bedroht gehalten wurde. Nachweise aus dieser Zeit wurden von UHLIG & ZERCHE (1981) publiziert. Von ESSER & MÖLLER (1998) auf Grund des Fehlens in den „Roten Listen“ nicht für Berlin und Brandenburg geführt.

Myllaena brevicornis ist hauptsächlich im Südosten Brandenburgs weiter verbreitet, neue Meldungen aus der Niederlausitz (RUSCH 1993, EICHLER & PÜTZ 2000) und dem Oder/Neißegebiet (SCHÜLKE 2001c, BARNDT 2004).

***Myllaena infusata* KRAATZ, 1853**

Belege der Art sollten auf das Vorkommen der erst jüngst aus Deutschland nachgewiesenen *Myllaena masoni* MATTHEWS, 1883 überprüft werden.

***Myllaena kraatzi* SHARP, 1871**

Bisher aus Berlin und Brandenburg unbekannt (ESSER & MÖLLER 1998). RUSCH (1993) meldet zwei Funde aus Dubring und Buchwäldchen. Dubring liegt heute in Sachsen (LKr. Kamenz), aus dem Dubringer Moor wird die Art auch von VOGEL (1978, 1998b) gemeldet. Die Belege aus Buchwäldchen (gesammelt 1983 und 1991) wurden von Vogel überprüft (Vogel, Mitteilung vom 19.09.2007).

***Pronomaea rostrata* ERICHSON, 1837 und *Pronomaea picea* HEER, 1841**

Aus Berlin und Brandenburg liegt nur altes Material der Gattung vor. Auf Grund der Gefahr einer Verwechslung mit *Pronomaea picea* Heer, 1841 (= *korgei* LOHSE 1974) sollten alle Belege überprüft werden. *Pronomaea rostrata* wurde von Neresheimer und Wagner an zahlreichen Lokalitäten in Brandenburg gesammelt, von *P. picea* liegt nur ein undatiertes Einzelstück mit dem Fundort „Berlin“ vor (ASSING, im Druck).

***Oligota inflata* (MANNERHEIM, 1830)**

SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) kannten keine aktuellen Funde der Art, was auch von ESSER & MÖLLER (1998) übernommen wurde. Es existieren aber einige Meldungen der Art aus Brandenburg von RUSCH (1993), der die Art in seinem Heimatort Altdöbern sammelte und von SOMMER & al. (1994) aus Britz (N Eberswalde). Aktuell von BEIER & KORGE (2001) auch aus Döberitz gemeldet.

***Gyrophaena hansenii* STRAND, 1946 und *Gyrophaena williamsi* STRAND, 1935**

Ein Vorkommen der beiden seltenen Arten in Berlin und Brandenburg war ESSER & MÖLLER (1998) nicht bekannt. Beide Arten wurden aber bereits aus Brandenburg gemeldet. RUSCH (1990, 1993) nennt Funde aus der Niederlausitz aus den Jahren 1986 bis 1989. Belege aus Saßleben, Wormlage, Ogrosen und Eichow wurden von Vogel überprüft (Vogel, Mitteilung vom 19.09.2007).

***Gyrophaena manca* ERICHSON, 1839**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *G. angustata* geführt.

***Gyrophæna poweri* CROTCH, 1867**

SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) kannten nur die alten Meldungen von DELAHON (1913a, 1932b). Neue Meldungen erfolgten aber bereits durch RUSCH (1990, 1993).

***Leptusa norvegica* STRAND, 1941**

Bisher aus Berlin und Brandenburg unbekannt. Der Erstnachweis erfolgte durch NICOLAI & MACHANDER (2000) aus Kieferntotholz.

***Autalia puncticollis* SHARP, 1864**

HORION (1967) kannte kaum Nachweise der seltenen Art aus Deutschland. Auch aus Brandenburg waren bisher keine Belege bekannt (ESSER & MÖLLER 1998). Bei einer Revision der Gattung lag Assing allerdings Material aus Berlin vor (1♂ leg. Ruthe MNHUB) (ASSING 1997b). Ruthe sammelte um die Mitte des 19. Jahrhunderts, der Fund dürfte somit deutlich vor 1900 erfolgt sein.

***Tachyusa concinna* (HEER, 1839)**

Nach PAŠNIK (2006a) ist *T. concinna* eine valide Art, kein Synonym von *T. coarctata*. Er meldet aus Berlin und Brandenburg folgende Fundorte (Schreibweisen jeweils berichtigt), die alle in der näheren oder weiteren Umgebung von Berlin liegen: „Alt Ruppín, Tornowsee“, „Brodowin“, „Münchehofe, Elsengrund“, „Strausberg“, „Brieselang“, „Finkenkrug“, „Nauen“, „Berlin“, „Berlin-Köpenick“, „Berlin-Kladow, Wannsee“, „Berlin-Rahnsdorf, Müggelsee“ und „Luckenwalde“.

***Schistoglossa gemina* (ERICHSON, 1837)**

Schistoglossa gemina ist in Berlin und Brandenburg weit verbreitet und nicht selten. Alte Funde sollten aber auf Verwechslungen mit den beiden erst 1998 für Brandenburg neu nachgewiesenen Arten *S. pseudogemina* BENICK, 1981 und *S. drusilloides* (SAHLBERG, 1876) überprüft werden. Alle drei Arten können zusammen oder mit anderen *Schistoglossa*-Arten gemeinsam vorkommen (MEISSNER 1998a, 1998b, SCHÜLKE 1999b, BEIER & KORGE 2001).

***Hydrosmeeta delicatula* (SHARP, 1869) und *Hydrosmeeta subtilissima* (KRAATZ, 1854)**

Beide Arten waren aus Berlin und Brandenburg unbekannt (ESSER & MÖLLER 1998). Sie wurden bei der Suche nach *Thinobius*-Arten an der Neiße erstmals nachgewiesen (SCHÜLKE 2001c). *Hydrosmeeta subtilissima* wurde bereits vorher vom sächsischen Teil der Neiße gemeldet (VOGEL 1978).

***Hydrosmeeta linkei* (G. BENICK, 1969)**

Die Art wurde von UHLIG & ZERCHE (1981) nach einem im NSG „Rietzer See“ bei Brandenburg gesammelten Männchen als Neufund für Brandenburg gemeldet. ESSER & MÖLLER (1998) bezweifeln den Artstatus von *H. linkei*, Untersuchungen dazu wurden bisher aber nicht publiziert, so dass vom Vorhandensein einer validen Art auszugehen ist. Anhand der bei *Meotica* gemachten Erfahrungen (VOGEL 1991, ASSING & al. 1998) ist zwar zu Vermuten, dass sich einige der von G. Benick, Lohse und Scheerpeltz beschriebenen *Hydrosmeeta* (bzw. *Hydrosmeetina*) als Synonyme herausstellen. Im Gegensatz zu *Meotica* wurde aber wenigstens ein Teil der Arten

unter Verwendung der männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmale beschrieben.

***Hydrosmecta longula* (HEER, 1939)**

Von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) wurde die Art für Brandenburg nicht erwähnt, obgleich sie schon von WAGNER (1915a) erstmals aus der Mark gemeldet wurde (Oderufer bei Fürstenberg/Oder [= Eisenhüttenstadt]). Wie sich inzwischen herausgestellt hat, ist sie in Brandenburg aber nicht selten und an sandigen Ufern zumindest der Oder/Neiße und Elbe und auch in Kiesgruben weit verbreitet (RUSCH 1993, BEIER & KORGE 2001, SCHÜLKE 2001c, EICHLER, ESSER & PÜTZ 2002).

***Aloconota languida* (ERICHSON, 1837) und *Aloconota ultima* (G. BENICK & LOHSE, 1959)**

Die beiden Arten werden bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) unter dem Gattungsnamen *Disopora* THOMSON, 1858 geführt.

***Amischa forcipata* MULSANT & REY, 1873**

ESSER & MÖLLER (1998) kannten keine Belege aus Berlin und Brandenburg. Von RUSCH (1993) aus der Niederlausitz (Altdöbern) gemeldet. Das Belegexemplar wurde von Vogel überprüft, es gehört zu *Amischa decipiens* (Vogel, Mitteilung vom 19.09.2007).

***Tomoglossa brakmani* SCHEERPELTZ, 1963**

Die Art war bisher nur von wenigen Salzstellen in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt bekannt. Der Erstnachweis für Brandenburg erfolgte durch BARNDT (2007), der die Art im NSG Luchwiesen bei Philadelphia nachweisen konnte.

***Tomoglossa luteicornis* (ERICHSON, 1837)**

Tomoglossa luteicornis ist in Berlin und Brandenburg ebenfalls sehr selten (KORGE 1991a, 2005, SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992), aus neuerer Zeit existiert nur die Meldung von RUSCH (2000) aus Schlabendorf. Auf Grund der Verwechslungsmöglichkeit mit *T. brakmani* sollten alle Belege der Art überprüft werden.

***Plataraea dubiosa* (G. BENICK, 1935)**

Von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) als verschollen geführte Art. Rusch (1994) meldete einen Wiederfund nach einem von Eichler bei Forst gesammelten Exemplar. Die Determination konnte jedoch von V. Assing (Hannover) nicht bestätigt werden (Eichler, persönliche Mitteilung).

***Atheta acutiventris* VOGEL, 2003**

Atheta acutiventris wurde erst vor kurzem aus Spanien, den Niederlanden und Deutschland beschrieben (VOGEL 2003). Auch aus Brandenburg lag zur Beschreibung ein Exemplar aus Neusorgefeld südwestlich von Luckau vor.

***Atheta britteni* JOY, 1913**

ESSER & MÖLLER (1998) beziehen sich bei *Atheta britteni* auf ein weibliches Exemplar, das Korge 1952 in Glambeck bei Joachimstal gesammelt und zuerst als *Atheta debilis* gemeldet hatte (KORGE 1956a, KORGE & SCHULZE 1971). Sowohl BRUNDIN

(1944) der die Untergattung revidierte als auch BENICK & LOHSE (1974) geben an, dass die Art in Mitteleuropa nicht vorkommt, bis heute existieren keine weiteren Meldungen aus Deutschland. Die Determination von weiblichen Exemplaren der Untergattung *Philhygra* MULSANT & REY, 1873, ist auf Grund des Fehlens einer sklerotisierten Spermathek schwierig, der brandenburgische Fund kann deshalb nicht als gesicherter Nachweis betrachtet werden.

***Atheta cribrata* (KRAATZ, 1856)**

Die Art taucht in der „Roten Liste“ Brandenburgs (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) doppelt auf, in Kategorie 1 als *Atheta cribrata*, in Kategorie 2 als *Pachyatheta cribrata*.

***Atheta europaea* LIKOVSKÝ, 1984**

ESSER & MÖLLER (1998) kannten keine Nachweise der Art aus Berlin und Brandenburg. RUSCH (1993) meldet die Art von verschiedenen Fundorten in der Niederlausitz, von dort und aus dem Fläming wurde sie inzwischen auch von BARNDT, KORGE & PLATEN (2002) und BARNDT (2006) gemeldet.

***Atheta hygrotopora* (KRAATZ, 1856)**

Die Art wurde von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) als nicht gefährdet eingestuft und taucht deshalb in der „Roten Liste“ nicht auf, was ESSER & MÖLLER (1998) als Fehlen der Art in Berlin und Brandenburg interpretierten. Aktuelle Meldungen fehlen aber bis auf den Nachweis vom Rietzer See bei Brandenburg (UHLIG & ZERCHE 1981).

***Atheta indubia* (SHARP, 1869)**

Atheta indubia war noch bis vor kurzem aus Berlin und Brandenburg unbekannt (ESSER & MÖLLER 1998). Eine erste Meldung erfolgte durch RUSCH (1993) aus Lug in der Niederlausitz, wo die Art im Autokescher gefangen wurde.

***Atheta ischnocera* (THOMSON, 1870)**

Auch von *Atheta ischnocera* lagen bisher aus Brandenburg keine Nachweise vor (ESSER & MÖLLER 1998). Die Erstmeldung erfolgte durch RENNER (2002), der die Art am Werbellin-See gefangen hat.

***Atheta macrocera* (THOMSON, 1856)**

Von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) als nicht gefährdet eingestuft, deshalb nicht in der „Roten Liste“ vertreten. ESSER & MÖLLER (1998) interpretierten das als Fehlen der Art in Brandenburg. *Atheta macrocera* wurde aber bereits von NERESHEIMER & WAGNER (1935a) und WAGNER (1949c) von der Oder bei Frankfurt/Oder und Lebus, von UHLIG & ZERCHE (1981) vom Rietzer See bei Brandenburg und von RUSCH (1993) von zwei Fundorten in der Niederlausitz gemeldet. Ein Wiederfund in der Umgebung Berlins wurde durch BEIER & KORGE (2001) aus Döberitz publiziert.

***Atheta melanaria* (MANNERHEIM, 1830)**

Bisher aus Brandenburg unbekannt (ESSER & MÖLLER 1998), wurde die Art erstmals von RUSCH (1993) nach einem von Eichler bei Forst gesammelten Exemplar gemeldet. Nach Vogel (mündl. Mitt.) ist das Vorkommen der Art in Brandenburg unwahr-

scheinlich, die Meldung bleibt zweifelhaft. Das Belegexemplar konnte bisher nicht überprüft werden.

***Atheta monticola* (THOMSON, 1852)**

Bisher ebenfalls aus Brandenburg unbekannt (ESSER & MÖLLER 1998). Die Erstmeldung der Art erfolgte aus der Neißeau bei Zerna durch Barndt (BARNDT, KORGE & PLATEN 2002, BARNDT 2004).

***Atheta nigracula* (GRAVENHORST, 1802)**

Fehlt bei ESSER & MÖLLER (1998). Von RUSCH (1993) von zahlreichen Fundorten aus der Niederlausitz gemeldet, die betreffenden Exemplare wurden von Vogel überprüft (Vogel, Mitteilung vom 19.09.2007). Die Art wird von KORGE (2005) auch für Berlin als nicht gefährdet geführt.

***Atheta pandionis* SCHEERPELTZ, 1958**

Die Erstmeldung dieses Bewohners von Raubvogelhorsten erfolgte durch KIELHORN & KORGE (1990) aus dem Berliner Grunewald. Diese Meldung wurde von ESSER & MÖLLER (1998) offenbar übersehen.

***Atheta paracrassicornis* BRUNDIN, 1954**

Fehlt bei ESSER & MÖLLER (1998). Die Art wurde bereits von RUSCH (1993) aus dem Spreewald und der Niederlausitz gemeldet, nach KORGE (2005) ist sie auch aus dem Stadtgebiet von Berlin bekannt.

***Atheta parapicipennis* BRUNDIN, 1954**

Erst 1954 aus Skandinavien beschrieben (BRUNDIN 1954) und erstmals von RUSCH (1993) von drei Fundorten in der Niederlausitz gemeldet, fehlt bei ESSER & MÖLLER (1998).

***Atheta parca* (MULSANT & REY, 1873)**

SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) kannten keine aktuellen Funde von *Atheta parca*, was auch von ESSER & MÖLLER (1998) übernommen wurde. Inzwischen wurden aber mehrere Meldungen publiziert, so von RUSCH (1993) aus Zwietow südlich von Calau und von SCHÜLKE (1999b) aus Seilershof bei Gransee.

***Atheta pseudoelongatula* BERNHAUER, 1907**

Die aus Japan beschriebene Art wurde erst vor kurzem aus Mitteleuropa nachgewiesen (VOGEL 2007). Der einzige, bisher aus Brandenburg vorliegende Fund stammt aus der Umgebung von Schwedt.

***Atheta putrida* (KRAATZ, 1856)**

Von ESSER & MÖLLER (1998) noch nicht für Brandenburg angegeben, erstmals durch RUSCH (1993) bei Neudöbern in der Niederlausitz und Barndt im NSG Neißeau Zerna aufgefunden (BARNDT, KORGE & PLATEN 2002, BARNDT 2004).

***Atheta ripicola* HANSSEN, 1932**

Die Art war ESSER & MÖLLER (1998) aus Brandenburg noch nicht bekannt. Die erste Meldung erfolgte durch EICHLER, ESSER & PÜTZ (1999) aus dem NSG Eichwald bei Frankfurt/Oder. Aktuell auch von Barndt in einem Auwaldrest bei Lebus aufgefunden (BARNDT, KORGE & PLATEN 2002, BARNDT 2005a).

***Atheta scotica* (ELLIMAN, 1909)**

SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) kannten nur alte Funde aus Brandenburg, die Art wurde deshalb als „verschollen“ betrachtet, was von ESSER & MÖLLER (1998) übernommen wurde. BARNDT (2007) meldet von der Marstallwiese bei Storkow ein „♀ cf. *scotica*“. Angesichts der Unsicherheit der Bestimmung von Weibchen der Untergattung *Philhygra* muss diese Meldung durch das Auffinden männlicher Exemplare abgesichert werden.

***Atheta sordidula* (ERICHSON, 1837)**

Bei der Bearbeitung der Roten Liste Brandenburgs (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) nicht als gefährdet eingestuft, was von ESSER & MÖLLER (1998) als Fehlen der Art gedeutet wurde. Aus Berlin und Brandenburg liegen aber mehrere aktuelle Meldungen vor: UHLIG & ZERCHE (1981) vom Rietzer See bei Brandenburg, RUSCH (1993) von vier Fundorten in der Niederlausitz, BEIER & KORGE (2001) aus Döberitz und von GOSSNER (2004) aus Berlin. Auch KORGE (2005) gibt die Art für Berlin als nicht gefährdet an.

***Atheta vaga* (HEER, 1839)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Atheta nigricornis*.

***Atheta voeslauensis* BERNHAUER, 1944**

Bei SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) unter dem Namen *Atheta griepi* SCHEERPELTZ, 1954 aus Brandenburg gemeldet. Die Art erwies sich inzwischen als Synonym von *Atheta voeslauensis* BERNHAUER (ASSING 1999a). Aktuelle Fundmeldungen publizierten KORGE (1989) aus Berlin und SOMMER & al. (1994) aus dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.

***Acrotona convergens* (STRAND, 1958)**

Aus Brandenburg bisher nur von RUSCH (1993) aus Casel und Neudöbern (Niederlausitz) gemeldet. Bei der Überprüfung stellten sich die Belege als zu *Acrotona pygmaea* gehörig heraus, die Art ist also für Brandenburg wieder zu streichen (Vogel, Mitteilung vom 19.09.2007). Meldungen aus den umliegenden Gebieten fehlen ebenfalls vollständig (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998).

***Acrotona piceorufa* (MULSANT & REY, 1873)**

Unter Bezug auf die ausdrückliche Erwähnung der „Mark Brandenburg“ bei BENICK & LOHSE (1974) von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) als „verschollen“ eingestuft, was von ESSER & MÖLLER (1998) übernommen wurde. Von RUSCH (1993) wurde die Art nach einem Exemplar aus Lug in der Niederlausitz gemeldet. Das Belegexemplar wurde von Vogel überprüft, es gehört zu *Acrotona parens* (Vogel, Mitteilung vom 19.09.2007).

***Acrotona pseudotenera* (CAMERON, 1833)**

Acrotona pseudotenera ist eine sich schnell ausbreitende Adventivart. Sie wurde erstmals von Terlutter bei Hohenleipisch am Licht gesammelt (RUSCH 2000) und von BEIER & KORGE (2001) auch aus Döberitz gemeldet.

***Acrotona troglodytes* (MOTSCHULSKY, 1858)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) unter dem Namen *Acrotona consanguinea*.

***Alevonota rufotestacea* (KRAATZ, 1856) und *Alevonota elegantula* (BRISOUT, 1863)**

Anlässlich einer aktuellen Revision der westpaläarktischen *Alevonota* konnten ASSING & WUNDERLE (im Druck) feststellen, dass neben *A. rufotestacea* auch die ähnliche Art *A. elegantula* in Mitteleuropa vorkommt. Der von EICHLER, ESSER & PÜTZ (2003) aus dem Oberspreewald publizierte Fund gehört zu *A. elegantula*. Die Überprüfung des Sammlungsmaterials im DEI und MNHUB ergab für *A. rufotestacea* keine Belege aus Brandenburg. Das Vorkommen dieser Art in Brandenburg bleibt also vorerst fraglich.

Gattung *Pella* STEPHENS, 1835

Die unter diesem Gattungsnamen geführten Arten sind bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch in der Gattung *Zyras* STEPHENS, 1835 zu finden.

***Myrmoecia plicata* (ERICHSON, 1837)**

Von dieser seltenen myrmekophilen Art war bisher aus Brandenburg kein sicherer Beleg bekannt (ESSER & MÖLLER 1998). Die nächsten bekannten Fundorte liegen in Thüringen. HORION (1967) diskutiert den Umstand, dass die Art von Erichson nach einem Exemplar aus der Kirsteinschen Sammlung in den „Käfern der Mark Brandenburg“ beschrieben wurde (ERICHSON 1837) und vermutet Fundortverwechslung. Eine zweite Meldung von GRIMM (1845) der die Art bei *Lasius flavus* gesammelt haben will, ist ebenfalls unbelegt. Der erste sichere Nachweis der Art erfolgte durch Barndt, der sie in einem Exemplar im NSG Oderberge bei Lebus nachweisen konnte (BARNDT, KORGE & PLATEN 2002, BARNDT 2005a).

Gattung *Phloeopora* ERICHSON, 1837

Die Arten *P. aliena* LOHSE, 1984, *P. bernhaueri* LOHSE, 1984 und *P. opaca* BERNHAUER, 1902 erweisen sich inzwischen als Synonyme und sind zu streichen (ASSING & SCHÜLKE 2007).

***Ilyobates bennetti* DONITHORPE, 1914**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Ilyobates subopacus* PALM, 1935.

***Calodera cochlearis* ASSING, 1996**

Die erst jüngst von *C. aethiops* abgetrennte Art ist in ihrer Verbreitung nur ungenügend bekannt. Bisher liegen Meldungen nur aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern vor (ASSING 1996, 2003b, HENNICKE & al. 1997, HENNICKE & MÜLLER-MOTZFELD 1998). BARNDT (2007) meldet einen ersten Fund aus Brandenburg (Luchwiesen bei Philadelphia, Marstallwiese bei Storkow).

***Calodera rubens* ERICHSON, 1837**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *Ityocara rubens*.

Gattung *Tetralaucopora* BERNHAUER, 1928

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als Vertreter der Gattung *Parocyusa* geführt.

***Tetralaucopora longitarsis* (ERICHSON, 1839)**

Die Art wird zwar von SCHILSKY (1909) als märkischer Käfer angegeben, Belege für diese Meldung existierten allerdings nicht (HORION 1967), sie wurde deshalb weder

bei KORGE (1991a), noch bei SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) oder ESSER & MÖLLER (1998) berücksichtigt. Eine Meldung aus dem südlichen Brandenburg (Buchwäldchen südöstlich von Calau) wurde aber bereits von RUSCH (1994) publiziert, eine weitere von KORGE, BARNDT & PLATEN (2002) aus dem NSG Elbaue Martinskirchen.

***Ocalea rivularis* MILLER, 1852 und *Ocalea latipennis* SHARP, 1870**

Aus Brandenburg existierten lange Zeit nur die von HORION (1967) wohl zu Recht als zweifelhaft eingestuften Meldungen aus „Berlin“ und „Finkenkrug“. Die Art wurde deshalb nicht in der „Roten Liste“ Brandenburgs geführt (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) und auch von ESSER & MÖLLER (1998) nicht für Berlin und Brandenburg gemeldet. Inzwischen erfolgten jedoch einige Nachweise aus dem Gebiet der Niederlausitzer Neiße (SCHÜLKE 2001b, BARNDT 2004), sowie aus den Kreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster (BARNDT, KORGE & PLATEN 2002). Auch die Meldung von *Ocalea latipennis* aus Lug (Niederlausitz) durch RUSCH (1994) bezieht sich auf *O. rivularis*, wie Vogel bei der Überprüfung des Belegs aus Sammlung Rusch feststellen konnte (Vogel, Mitteilung vom 19.09.2007).

***Meotica filiformis* (MOTSCHULSKY, 1860)**

Die Art wurde von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) als nicht gefährdet betrachtet und deshalb nicht in die „Rote Liste“ Brandenburgs aufgenommen. ESSER & MÖLLER (1998) interpretierten dies offenbar als Fehlen der Art. Aus Brandenburg liegen aber unter dem Namen *M. apicalis* BENICK, 1953, einige Meldungen vor, so von GRIEP (1957) und GRIEP & KORGE (1957) aus der Umgebung von Potsdam, von KORGE (1960a) aus Berlin-Spandau, von PUTHZ (1967b) aus Berlin-Tiefwerder und Brieselang und von UHLIG & ZERCHE (1981) vom Rietzer See bei Brandenburg. Bei KORGE (1991a) wird die Art überraschenderweise nicht für Berlin geführt. Eine aktuelle Meldung aus Brandenburg publizierten EICHLER, ESSER & PÜTZ (2002) unter dem Namen *M. capitalis* MULSANT & REY.

***Meotica marchica* G. BENICK, 1953**

Ebenfalls von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) als nicht gefährdet betrachtet und deshalb nicht in die „Rote Liste“ Brandenburgs aufgenommen, fehlt bei ESSER & MÖLLER (1998). Aus Berlin und Brandenburg liegen aber neben den Typen der Arten *M. marchica*, *M. neresheimeri* BENICK, 1953 und *M. wagneri* BENICK, 1953 (beides Synonyme von *M. marchica*), die alle nach Material aus Herzfelde bei Berlin beschrieben wurden, weitere Meldungen vor: UHLIG & ZERCHE (1981) vom Rietzer See und RUSCH (2000) von Schlabendorf und Grünwalde in der Niederlausitz.

***Meotica pallens* (REDTENBACHER, 1849)**

Wie die beiden vorgenannten Arten von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) als nicht gefährdet betrachtet und deshalb nicht in die „Rote Liste“ Brandenburgs aufgenommen, fehlt bei ESSER & MÖLLER (1998). Auch von *M. pallens* liegen aber aus Brandenburg mehrere ältere Meldungen (unter den Namen *M. hansenii* SCHEERPELTZ, 1954 und *M. lohsei* BENICK, 1953) vor, so von GRIEP (1957) aus dem Moosfenn bei Potsdam (KORGE 1956a), von Kleinmachnow und Berlin-Mariendorf (KORGE & GRIEP 1957) von KORGE (1963b) aus Berlin-Spandau, von UHLIG & ZERCHE (1981) vom Rietzer See bei Brandenburg, von KORGE (1991a) aus Berlin und von RUSCH

(1994) aus Lug und Rettchensdorf in der Niederlausitz. Aktuelle Meldungen unter dem heute verwendeten Namen publizierten EICHLER, ESSER & PÜTZ (2000) aus dem NSG Koselmühlenfließ bei Cottbus und KORGE (2005) für Berlin.

***Ocyusa picina* (AUBÉ, 1850)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *Deubelia picina*.

***Cousya longitarsis* (THOMSON, 1867)**

Die Art wurde erst kürzlich in die Gattung *Cousya* versetzt und ist bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Chilomorpha longitarsis* zu finden.

***Cousya nigrata* FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856)**

Die bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Ocyusa nigrata* geführte Art ist offenbar erst in jüngerer Zeit von Westen nach Brandenburg eingewandert. *Cousya nitidiventris* FAGEL, 1958 ist dazu wahrscheinlich synonym, alle untersuchten mitteleuropäischen Belege gehören nur zu einer Art (ASSING & SCHÜLKE 2007). HORION (1967) und SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) kannten noch keine Funde aus Brandenburg. Erstmals von RUSCH (2000) als *Ocyusa nitidiventris* aus Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaften gemeldet.

***Poromniusa crassa* (EPPELSHEIM, 1883)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Eurymniusa crassa*.

***Poromniusa procidua* (ERICHSON, 1837)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Zoosetha procidua*.

***Oxypoda testacea* ERICHSON, 1837**

SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) kannten aus Brandenburg nur alte Meldungen und stuften die Art als „verschollen“ ein, was von ESSER & MÖLLER (1998) übernommen wurde. Inzwischen liegen zwei aktuelle Meldungen der Art aus Brandenburg vor: von BEIER & KORGE (2001) auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Döberitz und von EICHLER, ESSER & PÜTZ (2002) aus der Umgebung von Hennigsdorf.

***Aleochara funebris* (WOLLASTON, 1864)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch unter dem Namen *Aleochara albovillosa*.

***Aleochara haematoptera* KRAATZ, 1858**

HORION (1967) kannte nur alte Belege der Art (unter dem Namen *A. ripicola* Mulsant & Rey, 1874) besonders aus dem Oder-Gebiet (Frankfurt/Oder, Zellin (heute in Polen) und Ratzdorf). SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) aus Brandenburg unbekannt, auch von ESSER & MÖLLER (1998) nicht gemeldet. Von RUSCH (1994) unter dem Namen *A. haematodes* ssp. *ripicola* nach einem von Eichler bei Forst gesammelten Exemplar gemeldet.

***Aleochara haemoptera* KRAATZ, 1856**

Von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) als „verschollen“ geführt, was von ESSER & MÖLLER (1998) übernommen wurde. Inzwischen zweimal wieder gefunden. RUSCH (2000) meldet die Art aus Reddern in der Niederlausitz, ESSER (2005) und BARNDT (2006) aus dem Schlosspark Wiesenburg im Fläming.

***Aleochara lygaea* KRAATZ, 1862**

Die Art war bisher aus Brandenburg unbekannt. DEICHSEL (2006) meldet einen ersten Fund aus dem Stadtgebiet von Berlin.

***Aleochara ruficornis* GRAVENHORST, 1802**

HORION (1967) nennt keine konkreten Funde der von ihm als weit verbreitet angesehenen Art. Von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) als nicht gefährdet eingestuft und deshalb in der „Roten Liste“ Brandenburgs nicht verzeichnet, von ESSER & MÖLLER (1998) übersehen. Konkrete Funde aus Brandenburg nennen NERESHEIMER & WAGNER (1931, 1935) und KORGE (1965).

***Aleochara signata* (SAHLBERG, 1876)**

Ebenfalls erst seit kurzer Zeit aus Brandenburg bekannt. KORGE (1991a) meldet sie aus Berlin als „*Aleochara* (unbeschriebene Art)“, ASSING & SCHÜLKE (2001), BARNDT, KORGE & PLATEN (2002) und BARNDT (2005a) melden sie unter dem Namen *A. tertiaria* SEMENOV, 1998 von drei Fundorten in Berlin und Brandenburg.

***Aleochara spadicea* (ERICHSON, 1837)**

Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch als *Rheochara spadicea* geführt.

***Aleochara tristis* GRAVENHORST, 1806**

Von SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) als nicht gefährdet angesehen und deshalb nicht in der „Roten Liste“ Brandenburgs verzeichnet, was ESSER & MÖLLER (1998) als Fehlen der Art interpretierten. HORION (1967) nennt für die nicht seltene Art keine konkreten Fundorte, aus Berlin und Brandenburg liegen aber mehrere neuere Meldungen vor, so von UHLIG & ZERCHE (1981) aus dem NSG Rietzer See, von RUSCH (1994) von sieben Fundorten in der Niederlausitz und im Spreewald, von BEIER & KORGE (2001) vom ehemaligen Truppenübungsplatz Döberitz und von KORGE (2005) aus Berlin.

***Aleochara verna* SAY, 1833**

Ältere Meldungen sind auf Grund von Determinationsschwierigkeiten und Namenswechsel nicht zu verwenden. Die Untergattung *Coprochara* MULSANT & REY wurde von MAUS (1998) revidiert. Er meldet die Art nach einem im DEI befindlichen Exemplar aus Berlin, ohne ein Datum anzugeben.

***Aleochara villosa* MANNERHEIM, 1830**

Von dieser Art waren SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992) und ESSER & MÖLLER (1998) keine konkreten Meldungen aus Berlin und Brandenburg bekannt. HORION (1967) nennt für sie keine konkreten Fundorte aus Berlin und Brandenburg. Inzwischen liegen aber mehrere neuere Meldungen vor, so von RUSCH (1994) von drei Fundorten in der Niederlausitz, von EICHLER, ESSER & PÜTZ (2003) aus Burg/Spreewald und von ESSER (2005) aus Berlin-Buch (Schlosspark).

5. Sammler und Sammlungen im Zusammenhang mit Staphyliniden aus Berlin und Brandenburg

Bei der Suche nach Belegexemplaren einiger für Berlin und Brandenburg fraglicher Arten stellte sich die Suche nach dem Verbleib der entsprechenden Exemplare als Problem heraus. Im Folgenden werden deshalb Listen der Sammler und Sammlungen zusammengestellt, die in Publikationen über Staphyliniden Berlins und Brandenburgs

genannt werden. Die Liste der Sammler umfasst gegenwärtig über 200 Namen (siehe Tabelle 4 und 5). Soweit möglich wurden zu den jeweiligen Sammlungen und Sammlern folgende Daten erfasst:

- von wem und wann wurden Daten aus den betreffenden Sammlungen publiziert,
- in welchem Zeitraum wurden die publizierten Funde gemacht,
- in welchen Sammlungen befinden sich die publizierten Belege, bzw. wo befinden sich die betreffenden Sammlungen heute,
- aus welchen Gebieten der Bundesländer Berlin und Brandenburg stammt das publizierte Material.

Zusätzliche Angaben zu Lebensdaten von Sammlern und zum Verbleib von Sammlungen können den im Literaturverzeichnis (7.3.) genannten Publikationen entnommen werden. Leider gibt es über märkische Koleopterologen nur wenige publizierte Informationen. Als zusammenfassende Arbeiten können HORN & KAHLE (1935-37), HORN & al. (1990), GAEDICKE (1995), für Staphyliniden-Spezialisten auch die kurzen Lebensläufe in HERMAN & SMETANA (2001) genutzt werden.

Als problematisch erwies sich of die Suche nach Informationen über Material, das im Verlauf ökologischer Untersuchungen an Instituten und Hochschulen bearbeitet und publiziert wurde. Offenbar ist es unter Ökologen, die zumeist keine Erfahrungen mit Staphyliniden haben, noch immer nicht üblich anzugeben, ob und von wem ihre Determinationen überprüft wurden und wo sich betreffendes Belegmaterial befindet.

Die Existenz von Sammlungen, aus denen keine Angaben publiziert wurden, wurde nicht explizit überprüft. In den Jahren 1986, 1987, 1989, 1990, 1991 und 2005 fanden die Jahrestagungen der Staphylinidologen in Berlin oder Brandenburg statt. In der Regel fanden im Rahmen der Tagungen auch Exkursionen statt, Belegmaterial befindet sich in den Sammlungen der Teilnehmer (UHLIG, SCHULZE & ZERCHE 1986, ZERCHE & UHLIG 1987, RUSCH & UHLIG 1990, UHLIG 1990, ZERCHE & UHLIG 1991). Ergänzungen und Hinweise, die helfen, Lücken im Sammlungsverbleib zu schließen, sind an die Adresse des Autor ausdrücklich erwünscht.

5.1. Institutionelle Sammlungen

Die folgenden Institutionen besitzen umfangreiche und wichtige Sammlungen, Sammlungsteile oder Belegmaterial von Sammlern, die in Berlin und Brandenburg Staphylinidae gesammelt haben. Sie werden auch im Sammlungsverbleib in der Tabelle der Sammler (Tabelle 5) genannt. In einigen dieser Institutionen befindet sich außerdem umfangreiches unpubliziertes Material.

Tabelle 2: Institutionelle Sammlungen mit umfangreichem Material aus Berlin und Brandenburg

Tabelle 2			Institutionelle Sammlungen
Sammlung	Ort	Bemerkungen	
Museum für Naturkunde Berlin (MNHUB)	Berlin	Sammlungen und Einzelstücke aus Berlin und Brandenburg	

Tabelle 2		Institutionelle Sammlungen
Sammlung	Ort	Bemerkungen
Deutsches Entomologisches Institut (DEI)	Müncheberg	Sammlungen und Einzelstücke aus Berlin und Brandenburg
Museum der Natur und Umwelt Cottbus (MNUC)	Cottbus	Material aus dem Spreewald und aus Bergbaufolgelandschaften
Potsdam-Museum, Abt. Natur und Umwelt (PMNU)	Potsdam	Sammlungen Griep, Kempf und andere
Entomologischer Verein Orion Berlin	Berlin	Bestimmungssammlung Mark Brandenburg
Heidemuseum Spremberg	Spremberg	Material aus Bergbaufolgelandschaften in der Niederlausitz
Technische Universität Berlin	Berlin	Sammlung bei Auflösung des Zoologischen Instituts aufgelöst, Verbleib der Käfer unbekannt
Freie Universität Berlin, Institut für Biologie, AG Zoologie	Berlin	Material aus mehreren Sammlungen, unter anderem die Sammlungen Lipp und Lauterbach
Landesforstanstalt Brandenburg, Eberswalde (LFAE)	Eberswalde	Material aus ökologischen Untersuchungen der LFAE, Sammlung Apel, Sammlung Richter
Field Museum of Natural History, Chicago (FMNH)	Chicago	Sammlungen M. Bernhauer und L. Benick mit Belegmaterial aus Berlin und Brandenburg, beide sammelten selbst nicht in Berlin oder Brandenburg
Museum d'Histoire Naturelle, Genf	Genf	Sammlungen G. Benick und G. A. Lohse mit Belegmaterial aus Berlin und Brandenburg, beide sammelten selbst nicht in Berlin oder Brandenburg
Zoologische Staatssammlung München	München	Sammlung E. A. H. v. Kiesenwetter mit Typen aus Brandenburg beschriebener Arten, z.B. von Kraatz gesammeltes Material
Naturhistorisches Museum Wien	Wien	Sammlung Scheerpeltz mit Belegmaterial aus diversen Sammlungen, Scheerpeltz sammelte selbst nicht in Berlin oder Brandenburg

5.2. Privatsammlungen von Staphyliniden-Spezialisten

In der folgenden Tabelle werden einige Privatsammlungen von Spezialisten der Familie Staphylinidae verzeichnet, in denen sich Belegmaterial aus Berlin und Brandenburg befindet.

Tabelle 3: Sammlungen von Staphyliniden-Spezialisten mit umfangreichem Material aus Berlin und Brandenburg

Tabelle 3		Sammlungen von Spezialisten
Sammlung	Standort	Bemerkungen
Sammlung V. Assing	Hannover	Belegmaterial (besonders Aleocharinae) aus diver-

		sen Sammlungen
Sammlung A. Kleeberg	Berlin	Belegmaterial aus diversen Aufsammlungen aus Brandenburg
Sammlung H. Korge	Berlin	Belegmaterial aus diversen Aufsammlungen in Berlin und Brandenburg
Sammlung V. Puthz	Schlitz	Steninae und Euaesthetinae aus diversen Sammlungen, sammelte selbst in Berlin/Brandenburg 1959-61
Sammlung M. Schülke	Berlin	Belegmaterial (besonders Tachyporinae) aus diversen Sammlungen
Sammlung J. Vogel	Görlitz	Aleocharinae aus diversen Sammlungen sammelte selbst auch in der Niederlausitz

5.3. Sammler

Tabelle 4 und 5 verzeichnen alle Sammler, die in Publikationen über Staphyliniden aus Berlin und Brandenburg genannt werden. Fehlende Vornamen werden durch „(?)“ ersetzt. Auf die Publikation zusätzlicher Lebensdaten wird verzichtet, hier sei auf die im Literaturverzeichnis (3) genannten Arbeiten und auf die Online-Datenbanken des DEI:

- http://www.zalf.de/home_zalf/institute/dei/php/biograph/biograph.php und
- http://www.zalf.de/home_zalf/institute/dei/php/biograph/verbleib.php

verwiesen.

Alle Daten zu Sammelzeiten und -Orten beziehen sich ausschließlich auf Meldungen von Staphyliniden. Angaben zum Verbleib von Sammlungen oder Belegexemplaren betreffen nur die Staphylinidae der betreffenden Sammlungen bzw. die Belege für publizierte Fundangaben.

Tabelle 4: Verzeichnis der in Publikationen genannten Sammler (Quellen und Zeiten)

Spaltenüberschriften und Symbolik:

- Sammler: Name und Initialen der Vornamen, unbekannte Vornamen werden durch „(?)“ ersetzt.
- Zitiert von: Arbeiten in denen der betreffende Sammler zitiert wird, Arbeiten in denen Sammler nur unter Bezug auf andere Publikationen zitiert werden (häufig HORION 1963, 1965, 1967) werden zumeist nicht wiederholt.
- Sammel-Zeitraum: Angabe des Jahres oder des Zeitraums innerhalb dessen die publizierten Funde gemacht wurden.

Tabelle 4		Sammler (Quellen und Zeiten)
Sammler	Zitiert von	Sammel-Zeitraum
Apel, K.-H.	ASSING (1996)	1984
Arndt, D.	KORGE (1973), KORGE (1989)	1970-1986
Arnold, H.	KORGE (1958)	1918

Tabelle 4		Sammler (Quellen und Zeiten)
Sammler	Zitiert von	Sammel-Zeitraum
Arnold, U.	SCHÜLKE (1990), ASSING (1996, 1999b, 2001c)	1984-1987
Barndt, D.	BARNDT (diverse), BARNDT, KORGE & PLATEN (2002), KORGE (1973, 1989), KORGE & SCHULZE (1971), MÖLLER & SCHNEIDER (1991)	ab 1950
Bartsch, M.	NERESHEIMER & WAGNER (1924)	1923
Behne, L.	SCHÜLKE & UHLIG (1988), GILDENKOV (2001a), ZERCHE (2003)	ab 1981
Beier, W.	BEIER & KORGE (2001)	1995-2001
Bischoff, H.	GILDENKOV (2001a)	1945
Boettcher, G.	ASSING (2003b), BRUNDIN (1944), PAŠNIK (2006b)	keine Angabe
Böhme, J.	BÖHME (1996)	1990-1995
Bubam, W.	KORGE (1960a, 1960b, 1961, 1963b), KORGE & SCHULZE (1971)	1958-1960
Burger, F.	RUSCH (1992, 1993, 1994, 2000)	zwischen 1983-1993
Cajar, A.	SCHÜLKE (1984a, 1984b)	1980-1983
Calix, A.	KRAATZ (1855, 1862b), CALIX (1871)	vor 1855 bis vor 1871
Cleve, K.	KORGE (1963a)	1962
Daase, (?)	GOSSNER (2004)	2003
Dahl, F.	SCHULZE (1918), DAHL (1912)	1907-1910
Deichsel, R.	DEICHSEL (2006), ESSER, BÜCHE & DEICHSEL (2006)	2001-2003
Delahon, P.	SCHÜLKE & KOCIAN (2000), ASSING (2001), BRUNDIN (1944), DELAHON (1913ff.), KORGE (1960a), SCHILSKY (1908), ZERCHE (1998), HORION (1935, 1949a), WAGNER (1949c)	1898-1932
Delkeskamp, K.	SCHÜLKE & UHLIG (1988)	1960
Deppe, (?)	ASSING (2001)	keine Angabe
Dieckmann, L.	SCHÜLKE & UHLIG (1988), HORION (1960), KORGE (1960a), SMETANA (1958)	1952-1990
Diehr, J.	KORGE (1989)	1979-1987
Dreger, F.	DREGER & al. (2002)	2000
Dunger, W.	VOGEL & DUNGER (1991)	ab 1962
Durst, H.J.	KORGE (1958)	1958
Eber, W.	KORGE (1973)	1969-1971
Eichler, (?)	WEISE (1872)	1870/71
Eichler, R.	EICHLER, ESSER & PÜTZ (1999, 2002, 2003), EICHLER & PÜTZ (2000), RUSCH (1992, 1993, 1994, 2000), EICHLER & GOLLKOWSKI (2005)	ab 1982
Eisner, O.	SCHÜLKE (1990)	1985
Erichson, W.F.	ASSING (1996, 1998a), ERICHSON (1837ff.)	ohne Angaben
Esser, J.	SCHÜLKE (2007), ASSING (2003b), EICHLER, ESSER & PÜTZ (2002, 2003), ESSER (2002ff.), ESSER, BÜCHE & DEICHSEL (2006),	ab 1997
Fiedler, H.	FIEDLER (1998, 2002)	1993-2000
Fischer, (?)	ERICHSON (1837, 1839a), WEISE (1872), UHLIG (1995)	vor 1840
Fischer, E.	ASSING (1996), QUEDENFELDT (1884), BENICK (1950)	vor 1884

Tabelle 4		Sammler (Quellen und Zeiten)
Sammler	Zitiert von	Sammel-Zeitraum
Fix, W.	ZERCHE (1980)	1977
Frankenberger, H.	ASSING (1999b)	ohne Angaben
Freymuth, W.	WAGNER (1915a), NERESHEIMER & WAGNER (1916a)	1915
Gasche, D.	SCHÜLKE (1984a), SCHÜLKE & UHLIG (1988, 1989a, 1989c), ASSING (2006)	1982-1984
Gebert, J.	RUSCH (1992)	1983-1991
Glitschka, (?)	NERESHEIMER & WAGNER (1940)	vor 1940
Götze, (?)	KORGE (1962a)	1956
Gollkowski, V.	GOLLKOWSKI (1990), RUSCH (1992)	1985-1986
Göllner, U.	PAŠNIK (2006b), GILDENKOV (2001a)	1981
Gottwald, S.	KORGE (1989)	1982
Graehn, G.	SCHÜLKE (1990)	1985
Greiner, J.	SCHÜLKE (2003), ASSING (1996), GILDENKOV (2001a)	1918
Griep, E.	SCHÜLKE & UHLIG (1988), GRIEP (diverse), KORGE (1956a, 1958), HORION (1960), KORGE & GRIEP (1957), NERESHEIMER & WAGNER (1939), SCHEERPELTZ (1954a), UHLIG (1977), WAGNER (1949c)	1928-1956
Grimm, B.	GRIMM (1845), HORION (1949A), KRAATZ (1851)	vor 1846
Grondke, A.	RUSCH (1993), RUSCH (2000)	vor 1993-1997
Grube, R.	BEIER & KORGE (2001)	1993
Grünberg, B.	ASSING (2003b)	1995
Gruttke, H.	GRUTTKE (1992), KORGE (1989)	1979-1989
Günther, R.	SCHÜLKE & UHLIG (1988), PAŠNIK (2006b)	1982-1986
Guyot, (?)	ERICHSON (1837, 1839a)	vor 1840
Habelmann, P.S.	KRAATZ (1862a), QUEDENFELDT (1884), HUBENTHAL (1917b), SCHILSKY (1891)	vor 1862
Häcker, S.	KORGE (1973), KORGE & SCHULZE (1971)	1969
Harold, E. v.	PUTHZ (1976a)	1878
Harold	HORION (1963)	-
Heinig, U.	SCHÜLKE (1984a, 1990), SCHÜLKE & UHLIG (1988), ASSING (1999b), HEINIG (1981)	ab 1977
Hendrich, L.	SCHÜLKE (2001c), KORGE (1989)	ab 1983
Hennings, O.	ASSING (2003c), NERESHEIMER & WAGNER (1924, 1929, 1935a), WAGNER (1949c), HENNINGS (1919)	1918-1934
Herbst, J.F.W.	HERBST (1783)	vor 1784
Hertzel, (?)	PUTHZ (1967b)	1961
Hieke, F.	SCHÜLKE (1984a, 1999c), ASSING (1999b), ESSER & KIEL-HORN (2005), PUTHZ (1971)	ab 1968
Hiekel, I.	RUSCH (1992, 1993, 1994)	1986-1991
Hoffmann, W.	RUSCH (1992), RUSCH (2000)	1988-1994
Höhne, W.	NERESHEIMER & WAGNER (1924), PAŠNIK (2006a)	1923
Husler, J. [F.? [Identität unsicher]	HORION (1939)	keine Angaben
Jaeger, B.	SCHÜLKE (1984a)	1979-1983
Jaeschke, G.	SCHÜLKE & UHLIG (1989c), JAESCHKE (1987)	1984-1987
John, G.	ASSING (1999b)	1920

Tabelle 4		Sammler (Quellen und Zeiten)
Sammler	Zitiert von	Sammel-Zeitraum
Kallies, E.-A.	METZGER & KALLIES (1964)	vor 1965
Kalisch, C.	STEIN (1867), HOFMANN (2001)	1867
Kämmerer, T.P.	KORGE & GRIEP (1957)	keine Angabe
Kantak, F.	PAŠNIK (2006a)	1920
Kaufmann, K.	(SCHÜLKE (1984a)	1973
Kegel, B.	KEGEL & ZIMMERMANN (1992)	1985
Kempf, L.	UHLIG & ZERCHE (1981) [als Kämpf]	1972-1979
Kielhorn, K.-H.	KIELHORN & KORGE (1990)	1989
Kirstein, (?)	ERICHSON (1837, 1839a)	vor 1840
Kläger, H.	SCHÜLKE (1991)	um 1920
Kleeberg, A.	KLEEGERG (diverse), KLEEGERG & SCHMIDT (1999)	ab 1994
Klima, F.	SCHÜLKE (1990, 1998a)	1986-1994
Klinke, P.	KORGE (1973)	1971
Klitschka, T.	HORION (1956), KORGE (1965)	1924-1927
Knapp, (?)	KORGE (1965)	1962
Knöfel, B.	ASSING (1999b), UHLIG, MARTIN & ZERCHE (1986)	1978
Kock, F.	HORION (1965), KORGE (1961, 1962a, 1963a, 1973), KORGE & SCHULZE (1971)	1923-1943
Konow, F.W.	SCHÜLKE (2004), ASSING (1998a, 2002, 2003a), GILDENKOV (2001a)	1881-1897
Korge, H.	BEIER & KORGE (2001), KORGE (diverse), HORION (1957a, 1965, 1969), KORGE & SCHULZE (1966, 1971), LOHSE (1984), MÖLLER & SCHNEIDER (1991)	ab 1950
Korschefsky, R.	BRUNDIN (1944)	
Kraatz, G.	SCHÜLKE (1991), ASSING (1996, 1998a, 2003b), SCRIBA & KRAATZ (1872)	keine Angaben
Kricheldorff, A.	HORION (1949a)	keine Angaben
Kuhnt, P.	ROSS (1934)	keine Angaben
Kuntzen, H.A.E.	ASSING (1996)	1910
Kunze, G.	ERICHSON (1837, 1839a)	vor 1840
Kuttig, G.	KUTTIG (1985)	1981-1983
Kwast, E.	RUSCH (1992)	keine Angaben
Landsberger, B.	RUSCH (1992, 1993)	1988 oder 1989
Langer, M.	SCHÜLKE (1999c)	1977
Lass, M.	SCHÜLKE & UHLIG (1988), SCHÜLKE (2003), ASSING (1996), GILDENKOV (2001a)	1923, 1931, 1936
Liebenow, K.	SCHÜLKE (1984a), SCHÜLKE & UHLIG (1988), UHLIG (1977)	ab 1972
Liebig, W.-H.	RUSCH (1992)	keine Angaben
Ludy, F.	WEISE (1872)	1871/72
Martin, D.	UHLIG & ZERCHE (1981)	1972-1979
Mathyl, M.	SCHÜLKE (1984a)	1982
Matzke, (?)	SCHÜLKE (1990)	1970
Mayer, L.	STEIN (1867)	1867
Mehnert, M.	VOGEL (2007)	2004
Meißner, A.	ASSING (2003b), MEIßNER (1998a, 1998b)	1993-1995
Meißner, O.	MEIßNER (1910)	1910
Metzger, R.	METZGER & KALLIES (1964)	vor 1965

Tabelle 4		Sammler (Quellen und Zeiten)
Sammler	Zitiert von	Sammel-Zeitraum
Micke, K.J.P.W.	NERESHEIMER & WAGNER (1918a, 1918b, 1949c)	1912-1917
Möller, G.	ASSING (1998a), BEIER & KORGE (2001), KORGE (1989), MÖLLER & SCHNEIDER (1991, 1994), MÖLLER (1989, 1990), HOFMANN (2001)	ab 1983
Möller, K.	MÖLLER (2000), MÖLLER & JAKOBITZ (2003)	1995-2003
Moritz, B.	QUEDENFELDT (1884)	vor 1884
Müller, F.H.	NERESHEIMER & WAGNER (1916a, 1916b, 1919, 1920a), WAGNER (1915b), ZERCHE (1998)	1915-1916
Müller, (?) [ob mit Müller H. identisch ?]	ASSING (1999b)	keine Angaben
Neresheimer, J.	SCHÜLKE (1991), SCHÜLKE & KOCIAN (2000), ASSING (1996, 1998a, 2001, 2002, 2006), BENICK (1953), GILDENKOV (2000a, 2000b, 2001a), KORGE (1956a), HEDICKE (1922), HORION (1949a, 1960), KORGE & GRIEP (1957), NERESHEIMER & WAGNER (1916ff.), WAGNER (1915a, 1915b, 1949c), ZERCHE (1998, 1999), ZUMPT & REBMANN (1932), BENICK (1916, 1917b, 1947)	1915-1943
Neuhaus, G. H.	NEUHAUS (1886)	1835-1856
Nickel, B.	ASSING (2006), ESSER & KIELHORN (2005)	ab 2001
Nicolai, V.	NICOLAI & MACHANDER (2000)	1995
Nordmann, A. v.	ERICHSON (1837, 1839a), NORDMANN 1837	vor 1837
Nuss, I.	KORGE (1973)	1972-1973
Peus, F.F.C.	WAGNER (1949c)	1947
Plötner, J.	ASSING (1999b, 2001)	1992
Preidel, K.	HEINIG (1987, 1993)	keine Angaben
Purdel, F.	NERESHEIMER & WAGNER (1942), WAGNER (1949c)	1938-1944
Puthz, V.	ASSING (2003b), KORGE (1962a), PUTHZ (1967b)	1959-1961
Pütz, A.	SCHÜLKE (1984a, 1984c, 2001c, 2004), ASSING (2006), EICHLER & PÜTZ (2000), EICHLER, ESSER & PÜTZ (1999, 2002, 2003), ZERCHE (1998), PÜTZ (1989)	ab 1981
Quedenfeldt, M.	QUEDENFELDT (1884)	
Reineck, G.	SCHÜLKE (1991), DELAHON (1927c, 1930a, 1933a), KORGE & SCHULZE (1966), REINECK (1930), ZERCHE (1998)	1919-1927
Renner, K.	RENNER (2002)	2002
Ressler, H.	ZERCHE (1998)	1979
Rettig, W.	KORGE (1956a)	1927
Richter, D.	ASSING (1998a), HORION (1965, 1969), KORGE (1960a, 1961, 1962a, 1963a, 1965), KORGE & SCHULZE (1966)	1959-1966
Rink, U.	KORGE (1989)	1986-1987
Rosinsky, H.	WAGNER (1949c)	1938
Rost, C. [K.]	QUEDENFELDT (1884)	vor 1884
Rößner, E.	SCHÜLKE & UHLIG (1988)	1984-1985
Rottstock, (?)	SCHÜLKE (1984a)	1980
Rusch, J.	SCHÜLKE & UHLIG (1988, 1989a, 1989c), RUSCH (1985ff.)	1983-2000
Ruthe, J.F.	ASSING (1996), ERICHSON (1837, 1839a), KRAATZ (1851)	vor 1840 bis vor 1851
Schallehn, L.	KORGE (1956a), KORGE & GRIEP (1957), NERESHEIMER &	1921-1937

Tabelle 4		Sammler (Quellen und Zeiten)
Sammler	Zitiert von	Sammel-Zeitraum
	WAGNER (1924), PUTHZ (1967c)	
Schaum, H.R.	ROSS (1934)	ohne Angaben
Schilsky, F.J.	SCHILSKY (1889, 1890, 1891)	vor 1890
Schirmer, C.	SCHIRMER (1897)	vor 1897
Schmidt, (?) [Pastor, Identität unklar]	HORION (1963), QUEDENFELDT (1884)	vor 1884
Schmidt, J.	KLEEBERG & SCHMIDT (1999)	1994
Schneider, M.	BEIER & KORGE (2001), ESSER & SCHNEIDER (2002), MÖLLER & SCHNEIDER (1994)	1990-1999
Schöne, A.	ASSING & SCHÜLKE (2007)	keine Angaben
Schönefeld, P.	SCHÜLKE (1984a)	1978
Schröckel, (?)	QUEDENFELDT (1884)	
Schubert, K.	SCHÜLKE & UHLIG (1988), SCHÜLKE (1997, 2003), ASSING (1996), PAŠNIK (2006a, 2006b), ZERCHE (1998), GILDENKOV (2001a), PUTHZ (1965b)	
Schukatschek, M. [oder H.]	ASSING (1999b, 2001, 2002), BRUNDIN (1944, 1948), KORGE (1956a, 1960a), HORION (1935, 1949a, 1954a), NERESHEIMER & WAGNER (1920a, 1935a, 1939, 1942), WAGNER (1949c), BENICK (1949a), JACOBS & HORION (1936)	vor 1920-1940
Schülke, M.	SCHÜLKE (1984ff.), ASSING (1996, 1999b, 2003b), HEINIG (1989), GILDENKOV (2001a)	ab 1979
Schulz, U.	DREGER & al. (2002), VOGEL (2003)	2000
Schulze, A.	SCHÜLKE (1984a)	1977-1978
Schulze, J.	SCHÜLKE (1984a, 1990, 1997, 1999c), SCHÜLKE & UHLIG (1989a, 1989c), HEINIG (1989), KORGE & SCHULZE (1971), PAŠNIK (2006a), UHLIG (1977), UHLIG & ZERCHE (1981), KORGE (1963a)	ab 1959
Schumacher, F.	HUBENTHAL (1917a)	vor 1917
Schüppel, J.F.	ERICHSON (1837, 1839a)	vor 1840
Schwarz, A.	SCHÜLKE (1984a), ASSING (1998a, 1999b)	ab 1974
Schwarz, J.	MEISSNER (1991)	1989-1990
Schwarz, O.	BRUNDIN (1942), KORGE (1956a)	vor 1942
Siering, G.	BEIER & KORGE (2001)	1999-2000
Skoraszewsky, W.	KORGE (1956a), HORION (1957a), KORGE & GRIEP (1957), WAGNER (1949b)	1932-1948
Sommer, M.	ASSING (1999b), ZERCHE (2003)	1993
Stein, J.P.E.F. [= Stein, F. ?]	KRAATZ (1851)	vor 1851
Steinhäuser, R.	NERESHEIMER & WAGNER (1940)	vor 1940
Stichel, W.	STICHEL (1926)	1921-1922
Stöckel, G.	ZERCHE (1980)	1973-1974
Stockmann, (?)	KORGE & SCHULZE (1966), PUTHZ (1966b)	keine Angaben
Strübing, F.H.G.L.	STRÜBING (1860)	keine Angaben
Taeger, T.	DREGER & al. (2002)	2000
Thiele, G.	NERESHEIMER & WAGNER (1939), HORION (1949a)	1937
Ude, M.	ASSING (1999b)	1910

Tabelle 4		Sammler (Quellen und Zeiten)
Sammler	Zitiert von	Sammel-Zeitraum
Uhlig, M.	SCHÜLKE (1984a, 1997, 1999c, 2003, 2005a), ASSING (1996, 1999b, 2001, 2006), HEINIG (1989), PAŠNIK (2006a, 2006b), UHLIG (1977), UHLIG & ZERCHE (1981), ZERCHE (1998, 1999), GILDENKOV (2001a)	ab 1971
Ulbrich, E.	ZANETTI (1980)	1962
Ulrich, (?)	SCHULZE (1918)	1910
Vöge, K.	NERESHEIMER & WAGNER (1924)	1923
Wagenschieber, W.	KRAATZ (1851)	vor 1851
Wagner, H. [K.H.]	SCHÜLKE (1991, 1997), BENICK (1953), BRUNDIN (1944), HEDICKE (1922), HORION (1949a, 1949b, 1956), KORGE (1956a, 1958, 1959, 1960a, 1961), KORGE & GRIEP (1957), KORGE & SCHULZE (1966, 1971), MÖLLER & SCHNEIDER (1991), NERESHEIMER & WAGNER (1916ff.), PAŠNIK (2006a), WAGNER (1915ff.), ZUMPT & REBMANN (1932); BENICK (1916, 1917a, 1917b, 1947), PUTHZ (1991)	1915-1949
Wallukat, G.	UHLIG & ZERCHE (1981)	1972-1979
Wanach, B.	NERESHEIMER & WAGNER (1924), WANACH (1912)	vor 1912
Weber, G.	ERICHSON (1837, 1839a)	vor 1840
Weggen, M. [AG Buhnenwerder]	MARTIN & UHLIG (1986)	1978-1980
Weidehase, (?)	HORION (1949a), KRAATZ (1851)	vor 1851
Weise, J.	SCHÜLKE (1991), ASSING (2003b), QUEDENFELDT (1884), WEISE (1872, 1878)	1870-1877
Wellmer, (?) [oder Wellner]	KRAATZ (1851), HOFMANN (2001)	vor 1851
Wendeler, H.	SCHÜLKE & UHLIG (1988), SCHÜLKE (1991), ASSING (1996, 1998a), PAŠNIK (2006a), SCHULZE (1918)	1917
Wendt, H.	SCHÜLKE & UHLIG (1988), PAŠNIK (2006a, 2006b), UHLIG & ZERCHE (1981)	1972-1986
Werner, E.	KORGE (1989)	1986
Wiesner, T.	RUSCH (1992)	1987 oder 1989
Winkelmann, H.	SCHÜLKE (1998a, 2004), ASSING (1999b)	ab 1983
Woltemade, (?)	MÖLLER & SCHNEIDER (1991)	1981
Wrase, D.	SCHÜLKE (1984a, 1984b, 2005a), ASSING (2003b, 2006), PAŠNIK (2006b), GILDENKOV (2001a)	ab 1977
Zerche, L.	SCHÜLKE & UHLIG (1988), ASSING (1996, 2001), GILDENKOV (2000a, 2000b), UHLIG & ZERCHE (1981), ZERCHE (1980, 1987, 1994, 1998, 2003), GILDENKOV (2001a)	ab 1977
Zimmermann, F.	HORION (1965), KORGE (1960a, 1961, 1963b)	1958-1962
Zimmermann, G.	KORGE (1963a, 1965, 1989), KORGE & SCHULZE (1971)	1962-1975
Zumpt, F. [F.K.E.]	ZUMPT (1930)	1928-1929
Zwick, P.	KORGE (1965)	1962

Tabelle 5: Verzeichnis der in Publikationen genannten Sammler (Verbleib und Sammelgebiete)

Spaltenüberschriften und Symbolik:

- Sammler:** Name und Initialen der Vornamen, unbekannte Vornamen werden durch „(?)“ ersetzt.
- Verbleib:** Verbleib der zitierten Sammlungen oder Belegexemplare. Für die Angabe des Sammlungsverbleibs wurden folgende Abkürzungen für institutionelle Sammlungen verwendet:
- DEI Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg
 - FMNH Field Museum of Natural History, Chicago
 - HMS Heidemuseum Spremberg
 - HNHM Hungarian Natural History Museum, Budapest
 - LFAE Landesforstanstalt Brandenburg, Eberswalde
 - LMJG Landesmuseum Joanneum Graz
 - MHNG Museum d'Histoire Naturelle, Genf
 - MMW Müritzeum – Naturhistorische Landessammlungen, Waren/Müritz
 - MNHUB Museum für Naturkunde, Berlin
 - MNUC Museum der Natur und Umwelt Cottbus
 - NHMB Naturhistorisches Museum Basel
 - NHMW Naturhistorisches Museum Wien
 - NME Naturkundemuseum Erfurt
 - NML Naturkundemuseum Leipzig
 - NMNHW National Museum of Natural History, Washington
 - NMP Nationalmuseum Prag
 - PMNU Potsdam-Museum, Abteilung Natur und Umwelt
 - SMFM Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main
 - SMNG Staatliches Museum für Naturkunde, Görlitz
 - SMNS Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart
 - SMTD Staatliche Naturhistorische Sammlungen, Museum für Tierkunde, Dresden
 - ÜMB Übersee Museum Bremen
 - WMNM Westfälisches Museum für Naturkunde, Münster
 - ZIRAS Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg
 - ZMO Zoological Museum Odessa
 - ZSSM Zoologische Staatssammlung, München
- Sammelgebiete:** Angabe der Gebiete, in denen das zitierte Material gesammelt wurde. Die Angabe „Mark Brandenburg“ weist darauf hin, dass Material aus verschiedenen Gegenden Brandenburgs publiziert wurde.

Tabelle 5 Sammler (Sammlungsverbleib und Sammelgebiete)		
Sammler	Verbleib	Sammelgebiete
Apel, K.-H.	LFAE, Beleg im DEI	Umgebung Lübben
Arndt, D.	Sammlung Arndt (Berlin)	Berlin
Arnold, H.	Sammlung unbekannt, Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Umgebung Fürstenwalde
Arnold, U.	Belege in Sammlung Schülke (Berlin) und im MNHUB	Mark Brandenburg
Barndt, D.	Sammlung Barndt (Berlin), Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Mark Brandenburg
Bartsch, M.	Sammlung unbekannt	Umgebung Berlin
Behne, L.	DEI, Belege auch in Sammlung Schülke (Berlin)	Mark Brandenburg
Beier, W.	Sammlung Beier (Potsdam), Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Umgebung Döberitz

Tabelle 5 Sammler (Sammlungsverbleib und Sammelgebiete)		
Sammler	Verbleib	Sammelgebiete
Bischoff, H.	MNHUB	Umgebung Mellensee
Boettcher, G.	Sammlung Staphylinidae 1920 vereinzelt, Belege im NMP	Umgebung Berlin
Böhme, J.	Sammlung Böhme (Neuhofen)	Mark Brandenburg
Bubam, W.	Sammlung unbekannt, Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Berlin
Burger, F.	NME, Belege in Sammlung Burger (Weimar), wahrscheinlich in Sammlung Rusch (SMNG)	Niederlausitz
Cajar, A.	Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Berlin
Calix, A.	Sammlung unbekannt	Umgebung Berlin
Cleve, K.	Keine Käfersammlung, Belege von Beifängen in Sammlung Korge	Berlin
Daase, (?)	Sammlung unbekannt, [Arbeit an der TU Berlin]	Berlin
Dahl, F.	Sammlung unbekannt [MNHUB?]	Umgebung Chorin
Deichsel, R.	Sammlung Deichsel (Berlin)	Berlin
Delahon, P.	MNHUB	Umgebung Luckenwalde
Delkeskamp, K.	MNHUB	Berlin
Deppe, (?)	MNHUB	Berlin
Dieckmann, L.	DEI	Mark Brandenburg
Diehr, J.	MNHUB	Berlin
Dreger, F.	LFAE, Belege eventuell in Sammlung Köhler (Bornheim) oder im DEI	Umgebung Luckau
Dunger, W.	Museum Görlitz, Belege in Sammlung Vogel (Görlitz)	Niederlausitz
Durst, H.J.	Sammlung unbekannt, Belege in Sammlung Korge	Berlin
Eber, W.	Sammlung unbekannt Beleg in Sammlung Korge	Berlin
Eichler, (?)	Sammlung unbekannt	Potsdam
Eichler, R.	Sammlung Eichler (Forst)	Niederlausitz, Spreewald
Eisner, O.	Sammlung unbekannt, Belege wahrscheinlich im MNHUB	Umgebung Berlin
Erichson, W.F.	MNHUB	Mark Brandenburg
Esser, J.	Sammlung Esser (Berlin)	Mark Brandenburg
Fiedler, H.	Sammlung Fiedler (Berlin)	Mark Brandenburg
Fischer, (?) [eventuell Fischer, C.]	Sammlung unbekannt, Belege zumindest zum Teil im MNHUB	Berlin
Fischer, E.	Sammlung vereinzelt, Belege im MNHUB, ÜMB	Berlin
Fix, W.	Sammlung Fix (Seifersdorf)	Umgebung Berlin
Frankenberger, H.	Sammlung vereinzelt, Belege im SMTD	Umgebung Berlin
Freymuth, W.	Sammlung unbekannt	Umgebung Berlin
Gasche, D.	Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Frankfurt/Oder
Gebert, J.	Belege in Sammlung Rusch (SMNG)	Niederlausitz
Glitschka	Sammlung unbekannt	Umgebung Berlin
Götze, (?)	Sammlung unbekannt, Beleg eventuell in Samm-	Umgebung Eberswalde

Tabelle 5 Sammler (Sammlungsverbleib und Sammelgebiete)		
Sammler	Verbleib	Sammelgebiete
	lung Gäbler, H. (Verbleib unbekannt)	
Gollkowski, V.	Sammlung Gollkowski (Oelsnitz)	Umgebung Forst/Neiße
Göllner, U.	MNHUB	Berlin
Gottwald, S.	Sammlung Gottwald (Berlin)	Berlin
Graehn, G.	Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Berlin
Greiner, J.	MNHUB	Mark Brandenburg
Griep, E.	PMNU, Belege auch im NHMW	Umgebung Potsdam
Grimm, B.	LMJG	Umgebung Berlin
Grondke, A.	MNUC, Belege eventuell auch in Sammlung Rusch (SMNG)	Niederlausitz
Grube, R.	keine Sammlung von Staphylinidae, Belege in Sammlung Beier (Potsdam) oder Sammlung Korge (Berlin)	Umgebung Döberitz
Grünberg, B.	Sammlung Schülke (Berlin)	Uckermark
Gruttke, H.	Sammlung unbekannt	Berlin
Günther, R.	MNHUB	Berlin
Guyot, (?)	Sammlung unbekannt	Umgebung Berlin
Habelmann, P.S.	Sammlung vereinzelt	Umgebung Berlin
Häcker, S.	Sammlung unbekannt, Beleg in Sammlung Korge	Berlin
Harold, E. v.	MNHUB, ZSSM	Berlin
Harold	Nicht existent, es handelt sich um „Studenten von Herold“	
Heinig, U.	Sammlung Heinig (Berlin), Belege teilweise Sammlung Schülke (Berlin)	Mark Brandenburg
Hendrich, L.	Belege in Sammlung Korge (Berlin) und Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Berlin
Hennings, O.	NHMB (Sammlung Frey), einzelne Belege im NHMW (Sammlung Scheerpeltz), Sammlung Assing (Hannover)	Umgebung Berlin
Herbst, J.F.W.	MNHUB, Teile schon zu Lebzeiten Herbsts vernichtet	Umgebung Berlin
Hertzel, (?)	Sammlung unbekannt	Umgebung Luckenwalde
Hieke, F.	MNHUB	Mark Brandenburg
Hiekel, I.	MNUC, Belege eventuell auch in Sammlung Rusch (Museum Görlitz)	Niederlausitz
Hoffmann, W.	Sammlung Hoffmann (Hoyerswerda), Belege auch in Sammlung Rusch (SMNG)	Niederlausitz
Höhne, W.	MNHUB, DEI	Umgebung Eberswalde
Husler, J. [F.?] [Identität unsicher]	ZSSM	Umgebung Angermünde
Jaeger, B.	MNHUB, einzelne Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Berlin
Jaeschke, G.	Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Berlin
John, G.	zumindest Belege im MNHUB	Umgebung Berlin
Kallies, E.-A.	Sammlung unbekannt	Umgebung Potsdam
Kalisch, C.	Käfersammlung unbekannt, Belege im DEI	Umgebung Berlin
Kämmerer, T.P.	Sammlung vereinzelt, Beleg in Sammlung Korge (Berlin)	Mark Brandenburg
Kantak, F.	MNHUB	Umgebung Döberitz

Tabelle 5 Sammler (Sammlungsverbleib und Sammelgebiete)		
Sammler	Verbleib	Sammelgebiete
Kaufmann, K.	MNHUB	Umgebung Zossen
Kegel, B.	Sammlung unbekannt [Arbeit an der TU Berlin]	Berlin
Kempf, L.	PMNU, Belege im MNHUB, DEI	Umgebung Brandenburg
Kielhorn, K.-H.	Belege in Sammlung Korge	Berlin
Kirstein, (?)	MNHUB	Mark Brandenburg
Kläger, H.	Sammlung vereinzelt, Teile via Greiner an MNHUB, Belege im SMFM	Umgebung Berlin
Kleeberg, A.	Sammlung Kleeberg (Berlin)	Mark Brandenburg
Klima, F.	Belege in Sammlung Schülke (Berlin), wahrscheinlich auch in Sammlung A. Klima (Gera)	Umgebung Berlin
Klinke, P.	Sammlung unbekannt, Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Berlin
Klitschka, T.	NMNHWS, Belege in Sammlung Horion (ZSSM oder Sammlung Kless (Konstanz))	Umgebung Berlin
Knapp, (?)	Sammlung unbekannt	Berlin
Knöfel, B.	MNHUB	Umgebung Beeskow
Kock, F.	Sammlung Korge (Berlin)	Umgebung Berlin
Konow, F.W.	MNHUB, MMW	Umgebung Fürstenberg/Havel
Korge, H.	Sammlung Korge (Berlin)	Mark Brandenburg
Korschevsky, R.	DEI, NMNHWS, Verbleib der Staphylinidae unbekannt	Umgebung Berlin
Kraatz, G.	DEI, Tauschmaterial in zahlreichen Sammlungen, Belege auch im NMP	Umgebung Berlin
Kricheldorf, A.	Sammlung 1945 vernichtet	Umgebung Berlin
Kuhnt, P.	Sammlung vereinzelt	keine Angaben
Kuntzen, H.A.E.	MNHUB	Berlin
Kunze, G.	NML	Umgebung Berlin
Küttig, G.	Sammlung unbekannt	Umgebung Prenzlau
Kwast, E.	Teile im HMS, Belege in Sammlung Rusch (SMNG)	Niederlausitz
Landsberger, B.	MNUC, Belege eventuell auch in Sammlung Rusch (SMNG)	Niederlausitz
Langer, M.	Sammlung Gollkowski (Oelsnitz)	Umgebung Berlin
Lass, M.	MNHUB	Umgebung Berlin
Liebenow, K.	Sammlung Liebenow (Brandenburg)	Umgebung Brandenburg
Liebig, W.-H.	bearbeitet Hymenoptera, Belege wahrscheinlich in Sammlung Rusch (SMNG)	Niederlausitz
Ludy, F.	Sammlung vereinzelt	Umgebung Eberswalde
Martin, D.	MNHUB, DEI	Umgebung Brandenburg
Mathyl, M.	Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Spremberg
Matzke, (?)	Sammlung unbekannt	Umgebung Strausberg
Mayer, L.	Sammlung unbekannt	Umgebung Potsdam
Mehnert, M.	Sammlung Gollkowski (Oelsnitz), Belege in Sammlung Vogel (Görlitz)	Umgebung Schwedt
Meißner, A.	Sammlung Meißner im Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V.	Nuthe-Nieplitz-Niederung
Meißner, O.	Sammlung unbekannt	Umgebung Potsdam

Tabelle 5 Sammler (Sammlungsverbleib und Sammelgebiete)		
Sammler	Verbleib	Sammelgebiete
Metzger, R.	Sammlung unbekannt	Umgebung Potsdam
Micke, K.J.P.W.	Sammlung 1931 nach Kanada verkauft, Verbleib unbekannt, Einzelstücke auch im DEI	Mark Brandenburg
Möller, G.	Sammlung Möller (Berlin), Belege auch in Sammlung Köhler (Bornheim)	Mark Brandenburg
Möller, K.	LFAE, Belege eventuell auch in Sammlung Köhler (Bornheim) oder im DEI	Mark Brandenburg
Moritz, B.	Sammlung vereinzelt	Umgebung Berlin
Müller, F.H.	MNHUB	Mark Brandenburg
Müller, (?) [identisch mit Müller F.H. ?]	MNHUB	Umgebung Berlin
Neresheimer, J.	DEI, Einzelexemplare im MHNG (Sammlung Benick)	Mark Brandenburg
Neuhaus, G. H.	Sammlung an Museum Frankfurt/Oder, war bereits 1935 fast völlig vernichtet, das Museum wurde im 2. Weltkrieg zerstört.	Umgebung Freienwalde, Liebenwalde und Oranienburg
Nickel, B.	Sammlung Nickel (Berlin), Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Mark Brandenburg
Nicolai, V.	Sammlung unbekannt, [Arbeit an der TU Berlin]	Nuthe-Nieplitz-Niederung
Nordmann, A. v.	ZIRAS, ZMO	Umgebung Berlin
Nuss, I.	Sammlung unbekannt, Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Berlin
Peus, F.F.C.	MHNG, teilweise WMNM	Umgebung Berlin
Plötner, J.	MNHUB	Umgebung Berlin
Preidel, K.	1. Sammlung größtenteils vernichtet, 2. Sammlung in Sammlung Heinig (Berlin)	Umgebung Berlin
Purdell, F.	Sammlung vernichtet	Umgebung Forst/Neiße
Puthz, V.	Sammlung Puthz (Schlitz)	Berlin
Pütz, A.	Sammlung Pütz (Eisenhüttenstadt), Einzeltiere auch in Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Eisenhüttenstadt, Frankfurt/Oder, Cottbus
Quedenfeldt, M.	Sammlung teilweise vereinzelt, Teile im MNHUB, DEI (Sammlung Kraatz)	Umgebung Berlin
Reineck, G.	SMFM, Einzelstücke auch im MNHUB, DEI, Museum Erfurt	Mark Brandenburg
Renner, K.	Sammlung Renner (Bielefeld)	Umgebung Bad Freienwalde, Werbellinsee
Ressler, H.	MNHUB	Umgebung Elsterwerda
Rettig, W.	Sammlung unbekannt, Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Umgebung Eberswalde
Richter, D.	LFAE, Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Umgebung Eberswalde
Rink, U.	Sammlung unbekannt, Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Berlin
Rosinsky, H.	MNHUB, zitierter Beleg wahrscheinlich vernichtet	Berlin
Rost, C. [K.]	Sammlung vereinzelt	Mark Brandenburg
Rößner, E.	Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Kyritz
Rottstock, (?)	Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Berlin
Rusch, J.	SMNG, Einzeltiere auch MNHUB, Sammlung	Niederlausitz

Tabelle 5 Sammler (Sammlungsverbleib und Sammelgebiete)		
Sammler	Verbleib	Sammelgebiete
	Schülke (Berlin)	
Ruthe, J.F.	MNHUB	Umgebung Berlin
Schallehn, L.	SMFM, Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Umgebung Angermünde
Schaum, H.R.	Verbleib der Staphylinidae unbekannt	keine Angaben
Schilsky, F.J.	MNHUB	Umgebung Berlin
Schirmer, C.	Sammlung vereinzelt	Umgebung Berlin
Schmidt, (?) [Identität unklar]	Sammlung unbekannt	Umgebung Klosterfelde
Schmidt, J.	Belege in Sammlung Kleeberg (Berlin)	Umgebung Seelow
Schneider, M.	Sammlung Schneider (Berlin)	Umgebung Döberitz
Schöne, A.	Sammlung Schöne (Dessau)	ohne nähere Angaben
Schönefeld, P.	MNHUB, Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Gransee
Schricket, (?)	Sammlung vereinzelt, Teile im DEI	Umgebung Berlin
Schubert, K.	MNHUB	Berlin
Schukatschek, M. [oder H.]	Sammlung vernichtet, Belege im MNHUB, DEI und anderen Sammlungen	Umgebung Frankfurt/Oder
Schülke, M.	Sammlung Schülke (Berlin) Aleocharinae vor 1995 teilweise MNHUB, DEI, Sammlung Vogel (Görlitz), Sammlung Assing (Hannover)	Mark Brandenburg
Schulz, U.	FH Eberswalde, Belege in Sammlung Vogel (Görlitz)	Umgebung Luckau
Schulze, A.	Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Umgebung Berlin
Schulze, J.	Sammlung Schulze (Berlin)	Mark Brandenburg
Schumacher, F.	Sammlung teilweise vernichtet, Rest im MNHUB	Mark Brandenburg
Schüppel, J.F.	MNHUB	Mark Brandenburg
Schwarz, A.	Sammlung Schwarz (Berlin), DEI, Belege in Sammlung Schülke (Berlin)	Mark Brandenburg
Schwarz, J.	Sammlung unbekannt, Belege in Sammlung Korge	Berlin
Schwarz, O.	Sammlung vereinzelt, Teile im DEI	Havelland
Siering, G.	Sammlung unbekannt	Umgebung Döberitz
Skoraszewsky, W.	Sammlung Korge (Berlin)	Berlin
Sommer, M.	DEI	Umgebung Eberswalde
Stein, J.P.E.F. [= Stein, F. ?]	MNHUB	Umgebung Berlin
Steinhäuser, R.	Entomologischer Verein Orion; Berlin	Umgebung Berlin
Stichel, W.	Sammlung unbekannt	Berlin
Stöckel, G.	Sammlung Stöckel (Neustrelitz)	Umgebung Gransee
Stockmann, (?)	Sammlung unbekannt, Belege im MNHUB	Umgebung Finsterwalde
Strübing, F.H.G.L.	Sammlung via Hainmüller an MMW	Umgebung Berlin
Taeger, T.	LFAE, Belege eventuell auch in Sammlung Köhler (Bornstedt) oder im DEI	Umgebung Luckau
Thiele, G.	Sammlung unbekannt	Umgebung Berlin
Ude, M.	MNHUB	Umgebung Berlin
Uhlig, M.	MNHUB	Mark Brandenburg
Ulbrich, E.	SMNS	Havelland
Ulrich, (?)	Sammlung unbekannt	Berlin

Tabelle 5 Sammler (Sammlungsverbleib und Sammelgebiete)		
Sammler	Verbleib	Sammelgebiete
Vöge, K.	Sammlung unbekannt	„Chorinchen“
Wagenschieber, W.	MNHUB, Belege in Sammlung Kiesenwetter (ZSSM und Sammlung Kraatz (DEI))	Umgebung Berlin
Wagner, H. [K.H.]	Sammlung (privat und Naturschutzstelle des Magistrats, Berlin) vernichtet, Belege im DEI, MHNG (Sammlung Benick), Sammlung Korge (Berlin)	Mark Brandenburg
Wallukat, G.	MNHUB, DEI	Umgebung Brandenburg
Wanach, B.	Sammlung unbekannt	Umgebung Rüdersdorf
Weber, G.	MNHUB	Mark Brandenburg
Weggen, M. [AG Buhnenwerder]	MNHUB, DEI	Umgebung Brandenburg
Weidehase, (?)	Sammlung unbekannt	Berlin
Weise, J.	MNHUB, DEI, Belege HNHM	Mark Brandenburg
Wellmer, (?) [oder Wellner]	DEI	Umgebung Berlin
Wendeler, H.	MNHUB	Umgebung Berlin
Wendt, H.	MNHUB	Mark Brandenburg
Werner, E.	Sammlung Gienskey (Körba)	Berlin
Wiesner, T.	Sammlung unbekannt, Belege wahrscheinlich in Sammlung Rusch (SMNG)	Niederlausitz
Winkelmann, H.	Belege in Sammlung Korge (Berlin) und Sammlung Schülke (Berlin)	Berlin
Woltemade, (?)	Sammlung unbekannt	Berlin
Wrase, D.	Sammlung Schülke (Berlin), teilweise MNHUB, DEI	Mark Brandenburg
Zerche, L.	DEI	Mark Brandenburg
Zimmermann, F.	Belege in Sammlung Korge (Berlin)	Berlin
Zimmermann, G.	Sammlung Zimmermann (Darmstadt)	Berlin
Zumt, F. [F.K.E.]	Verbleib unbekannt, Coleoptera teilweise verteilt	Oderberg
Zwick, P.	Limnologische Flußstation (Schlitz) [ob auch Coleoptera?]	Berlin

6. Danksagung

Ohne die Unterstützung zahlreicher Freunde und Fachkollegen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ihnen allen habe ich für ihre schnelle und unkomplizierte Hilfe zu danken: Für Unterstützung bei der Suche nach schwer zu beschaffender Literatur danke ich H. Korge (Berlin), M. Uhlig (Berlin), L. Behne und L. Zerche (beide Müncheberg), für Informationen zu Sammlungen und Sammlern M. Baehr (München), F. Burger (Weimar), R. Eichler (Forst), J. Esser (Berlin), J. Gebert (Schleife-Rohne), R. Grube (Potsdam), K.H. Kielhorn (Berlin), H. Korge (Berlin), E. Kwast (Senftenberg), A. Meißner (Berlin), K. Möller (Eberswalde), M. Uhlig (Berlin), J. Vogel (Görlitz), L. Zerche (Müncheberg). Eine umfangreiche, bisher unveröffentlichte Sammlung von Lebensdaten über märkische Koleopterologen stellte S. Gottwald (Berlin) zur Verfügung, V. Assing (Hannover) zwei im Druck befindliche Manuskripte über die Gattungen *Pronomaea* und *Alevonota*. Für die Möglichkeit Be-

lege aus der Sammlung des MNHUB zu untersuchen, danke ich M. Uhlig (Berlin), L. Zerche (Müncheberg) überprüfte Belege in der Sammlung des DEI, J. Vogel (Görlitz) Aleocharinae aus der Sammlung Rusch. Für wertvolle Anregungen zu dieser Checkliste danke ich M. Uhlig (Berlin), dem ich auch Teile der Arbeit zur Korrektur vorlegen konnte. Die Übersetzung der englischen Zusammenfassung korrigierte V. Assing (Hannover).

7. Literatur

Nachfolgendes Literaturverzeichnis wurde zu dem Zweck verfasst, einen möglichst vollständigen Überblick über die die Staphyliniden von Berlin und Brandenburg betreffenden Publikationen zu geben. Neben Katalogen und faunistischen Arbeiten wurden auch Arbeiten taxonomischen Charakters mit aufgenommen, wenn sie Material aus dem Untersuchungsgebiet beinhalten. Ein möglichst hoher Grad an Vollständigkeit wurde angestrebt, es ist aber anzunehmen, dass in weiteren Arbeiten taxonomischen und ökologischen Inhalts Staphyliniden aus Brandenburg behandelt werden und auch weitere kleine Mitteilungen zum Thema existieren. Hinweise auf Ergänzungen und Berichtigungen an die Adresse des Autors sind deshalb ausdrücklich erwünscht. Die Literaturangaben beschränken sich auf Arbeiten, die das heutige Gebiet der Bundesländer Berlin und Brandenburg betreffen. Es fehlen deshalb Arbeiten, die sich ausschließlich mit der Fauna der Neumark (z.B. des Naturschutzgebietes Bellinchen an der Oder) oder der östlichen Niederlausitz (Sommerfeld, Sorau) befassen. Einige wenige Arbeiten lagen zur Auswertung nicht vor, sie wurden im Literaturverzeichnis entsprechend gekennzeichnet.

7.1. Bibliographien mit speziellen Bezügen auf Arbeiten über die Entomofauna Berlins und Brandenburgs

- HEDICKE, H. (1934/35): Bibliographie der märkischen faunistischen Literatur. I. Insecta. – Märkische Tierwelt **1** (1-4): 1-56.
- SCHENKLING, S. (1939). Faunistischer Führer durch die Coleopteren-Literatur. - Die wichtigste Käfer-Literatur nach geographischen Gebieten geordnet. Band I: Europa Lieferung 5. – Neubrandenburg: G. Feller, S. 257-320.
- SCHENKLING, S. (1940). Faunistischer Führer durch die Coleopteren-Literatur. - Die wichtigste Käfer-Literatur nach geographischen Gebieten geordnet. Band I: Europa Lieferung 6. – Neubrandenburg: G. Feller, S. 321-416.

7.2. Originalarbeiten mit Meldungen von Staphyliniden aus dem heutigen Berlin und Brandenburg

- ASSING, V. (1996): A revision of the European species of *Calodera* MANNERHEIM (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Beiträge zur Entomologie **46** (1): 3-24.
- ASSING, V. (1997a): A revision of *Othius* STEPHENS, 1829. III. The species of the Western Palaearctic region exclusive of the Atlantic islands (Coleoptera: Staphylinidae, Xantholininae). – Nova Supplementa Entomologica **10**: 3-130.

- ASSING, V. (1997b): Review of the Palaearctic species of *Autalia* LEACH in SAMOUELLE, 1819 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). - Entomologische Blätter **93**: 69-85.
- ASSING, V. (1998a): A revision of the Palaearctic species of *Zoosetha* MULSANT & REY and *Poromniusa* GANGLBAUER (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde Berlin, Deutsche Entomologische Zeitschrift **45** (1): 73-94.
- ASSING, V. (1998b): Gattung *Acrotona* THOMSON – In: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15), Jena: 181-182.
- ASSING, V. (1998c): Gattung *Calodera* MANNERHEIM – In: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15), Jena: 184-187.
- ASSING, V. (1999a): Zur Synonymie einiger Arten der Gattung *Atheta* THOMSON, Untergattung *Ceritaxa* MULSANT & REY (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter **95** (1): 47-51.
- ASSING, V. (1999b) A revision of *Ilyobates* KRAATZ, 1856 (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae, Oxypodini). – Beiträge zur Entomologie **49** (2): 295-342.
- ASSING, V. (2001): A revision of *Callicerus* GRAVENHORST, 1802, *Pseudosemiris* MACHULKA, 1935, and *Saphocallus* SHARP, 1888 (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae, Athetini). – Beiträge zur Entomologie **51** (2): 247-334.
- ASSING, V. (2002): A taxonomic and phylogenetic revision of *Amarochara* THOMSON. I. The species of the Holarctic region (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae, Oxypodini). – Beiträge zur Entomologie **52** (1): 111-204.
- ASSING, V. (2003a): A revision of *Zoosetha* MULSANT & REY and *Poromniusa* GANGLBAUER. II. A new species from Spain and additional records (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). – Zootaxa **310**: 1-8.
- ASSING, V. (2003b): A revision of *Calodera* MANNERHEIM. II. A new species, new synonyms, and additional records (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). – Beiträge zur Entomologie **53** (1): 217-230.
- ASSING, V. (2003c): On the taxonomy of *Gyrohypnus* LEACH: new synonyms, new species, and a key to the Western Palaearctic and Middle Asian representatives of the genus (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae). – Entomologische Blätter **99** (1-3): 55-81.
- ASSING, V. (2006): A revision of Western Palaearctic *Medon*: the species of the Atlantic Islands, the Western Mediterranean, and Europe, except for the Southeast (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). – Bonner zoologische Beiträge **54** (1) [2005]: 25-95.
- ASSING, V. (im Druck): A revision of the species of *Pronomaea* ERICHSON of the Western Palaearctic region, including Middle Asia (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Pronomaeini). – Beiträge zur Entomologie **57** (2).
- ASSING, V. & P. WUNDERLE (im Druck): On the *Alevonota* species of the Western Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Athetini). – Beiträge zur Entomologie **57** (2).

- ASSING, V., FRISCH, J., KAHLEN, M., LÖBL, I., LOHSE, G.A., PUTHZ, V., SCHÜLKE, M., TERLUTTER, H., UHLIG, M., VOGEL, J., WILLERS, J., WUNDERLE, P. & L. ZERCHE (1998): 23. Familie: Staphylinidae. - In: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15), Jena: 119-197.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (1999): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter **95** (1): 1-31.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (2001): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). II. – Entomologische Blätter **97** (2-3): 121-176.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (2007): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). III. – Entomologische Blätter **102** (1-3): 1-78.
- BACH, M. (1856): Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. Dritter Band. – Coblenz: J. Hölscher, 1-317.
- BACH, M. (1860): Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preußischen Rheinlande. Vierter Band. – Coblenz: Verlag von J. Hölscher, 2, 1-308.
- BACH, M. (1866): Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. Nachträge, Zusätze und Verbesserungen zum 4. Bande der Käferfauna. - Coblenz: Verlag von J. Hölscher, 293-308.
- BARNDT, D. (2004): Beitrag zur Arthropodenfauna des Lausitzer Neißegelbietes zwischen Preschen und Pusack – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **6** (2): 7-46.
- BARNDT, D. (2005a): Beitrag zur Arthropodenfauna der Oderhänge und der Oderaue von Lebus – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera part., Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **7** (1): 1-52.
- BARNDT, D. (2005b): Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Schlaubetal und Umgebung – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **7** (2): 45-102.
- BARNDT, D. (2006): Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Hoher Fläming (Brandenburg/Landkreis Potsdam-Mittelmark) – Faunenanalyse und Bewertung – (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **8** (2): 163-215.
- BARNDT, D. (2007): Beitrag zur Arthropodenfauna der Binnensalzwiesen von Storkow und Philadelphia (Brandenburg/Landkreis Oder-Spree) – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Saltatoria, Araneae, Isopoda u. a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **9** (1): 1-54.

- BARNDT, D., KORGE, H. & R. PLATEN (2002): Neu- und Wiederfunde von Käfern, Webspinnen und Weberknechten für Brandenburg (Coleoptera, Araneae, Opiliones). – Märkische Entomologische Nachrichten **4** (2): 3-38.
- BEIER, W. & H. KORGE (2001): Biodiversität der Wirbellosenfauna im Gebiet des ehemaligen GUS-Truppenübungsplatzes Döberitz bei Potsdam (Land Brandenburg). Teil I: Käfer (Insecta, Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten, Sonderheft 1: 1-150.
- BENICK, G. (1953): Studien über die Gattung *Meotica* MULS. et REY (Col. Staph.). – Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg **31**: 53-80.
- BENICK, G. & G. A. LOHSE (1974): Fam. Staphylinidae II (Tribus Callicerini). In: FREUDE, H., HARDE, K.W. & G.A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 4, Krefeld: Goecke & Evers, 72-220.
- BENICK, L. (1915): Über *Stenus morio* GRAV. und *melanarius* STEPH., nebst Beschreibung einer neuen deutschen Art (Col.). – Entomologische Mitteilungen **4** (7-9): 226-234.
- BENICK, L. (1916): *Stenus glabellus* THOMS. (*subglaber* THOMS.), ein für die deutsche Fauna neuer Staphylinide. – Entomologische Blätter **12** (10-12): 237-241.
- BENICK, L. (1917a): *Stenus ampliventris* var. *wagneri* BENICK nov. var. (S. 262-264) in: Wagner, H.: Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg V. – Entomologische Mitteilungen **6** (7-9): 259-273.
- BENICK, L. (1917b): Ueber *Stenus cautus* ER., *vafellus* ER. und *macrocephalus* AUBÉ (*corsicus* BENICK), eine bibliographische und Typen-Studie (Col., Staphyl.). – Entomologische Mitteilungen **6** (10-12): 332-341.
- BENICK, L. (1939): *Bledius spect. spectabilis* KR. und *spect. germanicus* H. WAGNER und die Rassenfrage. – Entomologische Blätter **35** (1): 25-26.
- BENICK, L. (1947): Lebensgebiet und Verbreitung des *Stenus glabellus* THOMS. (Col. Staph.). – Forschungen der Geographischen Gesellschaft und des Naturhistorischen Museums in Lübeck **41**: 75-83.
- BENICK, L. (1949a): Über *Stenus declaratus* Er. und *simillimus* L. BCK. n. sp. – Koleopterologische Zeitschrift **1** (2): 95-103.
- BENICK, L. (1949b): *Stenus circularis* GR. und seine Nahverwandten (Col. Staph.). – Entomologische Blätter **41-44** [1945-1948]: 117-130.
- BENICK, L. (1950): *Stenus tarsalis* LJ. und seine Sippe (Col., Staph.). – Opuscula Entomologica **15**: 113-119.
- BESUCHET, C. (1974): Familie Pselaphidae. In: FREUDE, H., HARDE, K.W. & G.A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 4, Krefeld: Goecke & Evers, 305-362.
- BÖHME, J. (1996): Käfer in der Bodenstreu mitteleuropäischer Laubwälder (Insecta: Coleoptera). – Entomologische Blätter **92** (1-2): 37-63.
- BORCHERT, W. (1938): Die Verbreitung der Käfer Deutschlands. Tatsachen und Folgerungen. – Schönebeck, 2, 1-137, 1-9, 93 Karten.
- BRUNDIN, L. (1944): Monographie der paläarktischen Arten der *Atheta*-Untergattung *Hygroecia* (Coleoptera, Staphylinidae). – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien **53** (2)[1942]: 129-300, Tafel XIII-XL.

- BRUNDIN, L. (1948): *Microdota*-Studien (Col. Staphylinidae). – Entomologisk Tidskrift **69** (1-2): 8-66, Tafel I-XIII.
- CALIX, A. (1871): Fang des *Acylophorus wagenschieberi*. – Berliner Entomologische Zeitschrift **14** (3-4): 418.
- DAHL, F. (1912): Über die Fauna des Plagefenngebietes. – Beiträge zur Naturdenkmalpflege **3**: 341-638 (Coleoptera: 488-542).
- DEICHSEL, R. (2006): Species change in an urban setting - ground and rove beetles (Coleoptera: Carabidae and Staphylinidae) in Berlin. – Urban Ecosystems **9**: 161-179.
- DELAHON, P. (1913a): Nachträge zum Schilskyschen Verzeichnis der Käfer Deutschlands von 1909 und einige sonstige Bemerkungen über deutsche Käfer. (Col.). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1913**: 529-539.
- DELAHON, P. (1913b): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark brandenburg. (Col.). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1913**: 637-643.
- DELAHON, P. (1914): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus der Mark. (Col.). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1914**: 620-623.
- DELAHON, P. (1915): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1915**: 394-396.
- DELAHON, P. (1917): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1917**: 30-32.
- DELAHON, P. (1919): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). VIII. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1919**: 281-284.
- DELAHON, P. (1920): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). IX. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1920**: 355-360.
- DELAHON, P. (1921): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). X. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1921**: 77-79.
- DELAHON, P. (1922): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XI. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1922**: 76-80.

- DELAHON, P. (1923): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XII. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1923**: 91-94.
- DELAHON, P. (1924): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XIII – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1924**: 259-264.
- DELAHON, P. (1925): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XIV. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1925**: 305-308.
- DELAHON, P. (1926a): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XV. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1926**: 205-211.
- DELAHON, P. (1926b): 437. *Trogophloeus gracilis* MANNH. – Entomologische Blätter **22** (3): 139.
- DELAHON, P. (1926c): 438. *Stenus incrassatus* ER. – Entomologische Blätter **22** (3): 139-140.
- DELAHON, P. (1926d): 439. *Atheta indocilis* HEER. – Entomologische Blätter **22** (3): 140.
- DELAHON, P. (1926e): 440. *Zyras humeralis* GRAV. – Entomologische Blätter **22** (3): 140.
- DELAHON, P. (1926f): 467. Im Haufen von *Formica rufa*. – Entomologische Blätter **22** (4): 189.
- DELAHON, P. (1927a): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XVI. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1927**: 148-155.
- DELAHON, P. (1927b): 494. *Stenus incrassatus* ER. – Entomologische Blätter **23** (2): 90.
- DELAHON, P. (1927c): 495. *Quedius ochripennis* MÉN. var. *nigrocoeruleus* FAUV. – Entomologische Blätter **23** (2): 90.
- DELAHON, P. (1929): Kleinere Beiträge zur Systematik, Zoogeographie und Oekologie. Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. – Coleopterologisches Centralblatt **3** (5-6): 259.
- DELAHON, P. (1930a): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XVIII. – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **1** (2): 19-22.

- DELAHON, P. (1930b): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XIX. – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **1** (9): 130-135.
- DELAHON, P. (1930c): 595. *Oxytelus fulvipes*. – Entomologische Blätter **26** (4): 184.
- DELAHON, P. (1930d): 597. *Atheta fungi* GRAV. – Entomologische Blätter **26** (4): 184.
- DELAHON, P. (1930e): 598. *Callicerus obscurus* GRAV. – Entomologische Blätter **26** (4): 185.
- DELAHON, P. (1931): 631. *Quedius ochripennis* MÉN. var. *nigrocoeruleus* FAUV. – Entomologische Blätter **27** (4): 188.
- DELAHON, P. (1932a): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XX. – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **3** (3): 39-44.
- DELAHON, P. (1932b): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XXI. – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **3** (7): 97-102.
- DELAHON, P. (1932c): 679. *Tachinus fimetarius* GRAV. – Entomologische Blätter **28** (4): 184.
- DELAHON, P. (1933a): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XXII. – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **4** (3): 34-42.
- DELAHON, P. (1933b): 747. *Tachyporus chrysomelinus* L. – Entomologische Blätter **29** (4): 191.
- DELAHON, P. (1934): Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). XXIII. – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **5** (9-10): 72-79.
- DELAHON, P. (1941): Nachträge zu Schilskys systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.). – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **10** (3): 20-23.
- DREGER, F., KÖHLER, F., SCHULZ, U. & T. TAEGER (2002): 728. Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Brandenburgs im Rahmen von Biodiversitätsuntersuchungen in Kiefernwäldern (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte **46** (2): 130.

- DRUGMAND, D. (1994): Le groupe d'espèces proches de *Xantholinus jarrigei* COIFFAIT, un véritable imbroglio systématique (Coleoptera, Staphylinidae). – Bulletin de la Société entomologique de France **99** (3): 241-252.
- EICHLER, R., ESSER, J. & A. PÜTZ (1999): Über neue und verschollene Käferarten aus Brandenburg (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte **43** (3-4): 207-216.
- EICHLER, R., ESSER, J. & A. PÜTZ (2002): Neue Nachweise bemerkenswerter märkischer Käferarten (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten **4** (1): 27-48.
- EICHLER, R., ESSER, J. & A. PÜTZ (2003): Ergebnisse koleopterologisch-faunistischer Untersuchungen im Oberspreewald (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten **5** (2): 15-29.
- EICHLER, R. & V. GOLLKOWSKI (2005): 821. *Emus hirtus* (LINNÉ, 1758) – ein aktueller Nachweis für Sachsen (Col., Staphylinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **49** (3-4): 236-237.
- EICHLER, R. & A. PÜTZ (2000): Ein Beitrag zur Käferfauna des NSG Greifenhainer Fließ und des NSG Koselmühlenfließ südwestlich von Cottbus (Landkreis Spree-Neiße) (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten **2** (2): 23-44.
- ERICHSON, W.F. (1837): Die Käfer der Mark Brandenburg. Erster Band. Erste Abtheilung. – Berlin: F.H. Morin, I-VIII, 1-384.
- ERICHSON, W.F. (1839a): Die Käfer der Mark Brandenburg. Erster Band. Zweite Abtheilung. – Berlin: F.H. Morin, 385-740.
- ERICHSON, W.F. (1839b): Genera et species staphylinorum insectorum coleopterorum familiae. — Berolini: F.H. Morin, 1-400.
- ERICHSON, W.F. (1840): Genera et species staphylinorum insectorum coleopterorum familiae. — Berolini: F.H. Morin, 401-954, Tafeln I-V.
- ERICHSON, W.F. (1845): Naturgeschichte der Insekten Deutschlands. Erste Abtheilung. Coleoptera. Dritter Band. Lieferung 1-2. – Berlin: Verlag der Nicolaischen Buchhandlung, 1-320.
- ESSER, J. (2002): Neue Käferfunde aus Berlin (Teil 3). – Märkische Entomologische Nachrichten **4** (2): 45-47.
- ESSER, J. (2005): Nachträge und Korrekturen zur Käferfauna der Mark Brandenburg und Berlins. – Märkische Entomologische Nachrichten **7** (1): 53-60.
- ESSER, J. (2007): Einige Nachweise faunistisch interessanter Käferarten aus Berlin und Brandenburg. – Märkische Entomologische Nachrichten **9** (1): 61-63.
- ESSER, J., BÜCHE, B. & R. DEICHSEL (2006): Nachweise bemerkenswerter Käferarten aus der Mark Brandenburg und Berlin. – Märkische Entomologische Nachrichten **8** (2): 223-232.
- ESSER, J. & K.-H. KIELHORN (2005): Ergebnisse der Untersuchungen zur Insektenfauna auf der Berliner Bahnbrache Biesenhorster Sand – Käfer (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten, Sonderheft 3: 29-76.

- ESSER, J. & G. MÖLLER (1998): Teilverzeichnis Berlin-Brandenburg in: Köhler F. & B. Klausnitzer (Hrsg.): Entomofauna Germanica. Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte Beiheft **4**: 1-185.
- ESSER, J. & M. SCHNEIDER (2002): Käferfunde aus der Mark Brandenburg – faunistisch bemerkenswerte Arten. – Märkische Entomologische Nachrichten **4** (2): 39-44.
- FIEDLER, H. (1998): Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Krummen Lake (Berlin-Grünau). – Novius **24**: 573-578.
- FIEDLER, H. (2002): Zur Coleopteren-Fauna der Krummen Lake (Berlin-Grünau): Erster Nachtrag (1998-2000). – Märkische Entomologische Nachrichten **4** (1): 17-26.
- FRISCH, J. (1997): A revision of some West Palaearctic species of *Scopaeus* Erichson (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae). – Revue Suisse de Zoologie **104** (3): 523-557.
- FRISCH, J. (1998): A revision of some West Palaearctic species of *Scopaeus* Erichson (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae). – Revue Suisse de Zoologie **105** (1): 89-124.
- GILDENKOV, M. Y. (2000a): Obsor palearktitsheskikh vidov roda *Thinodromus* (Coleoptera, Staphylinidae). Soobshtshenie 2. Soologithseskij Shurnal **79** (8): 918-927. [russisch]
- GILDENKOV, M. Y. (2000b): A review of Palaearctic species of the genus *Thinodromus* (Coleoptera, Staphylinidae): Communication 2. – Entomological Review **80** (7): 831-841. [englische Übersetzung von GILDENKOV 2000a]
- GILDENKOV, M. Y. (2001a): Phylogenetic relations in the Oxytelinae subfamily. The Palaearctic *Thinodromus* fauna (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae). – Smolensk: SSPU Publishing house 1-202 [in russisch].
- GILDENKOV, M. Y. (2001b): The Palaearctic *Carpelimus* fauna (Coleoptera: Staphylinidae) The problems of species and the formation of species. 1: The history of studying, morpho-ecological features, the system of genus, the description of species. – Smolensk: SSPU Publishing house 1-303 [in russisch].
- GILDENKOV, M. Y. (2001c): The Palaearctic *Carpelimus* fauna (Coleoptera: Staphylinidae). The species and speciation problems. Attributive keys for Palaearctic species, *Carpelimus*'s illustrations are represented in descriptions (part 1) and attributive keys, the phylogenetic relations in genus, the problems of species and the formation of species. – Smolensk: SSPU Publishing house 1-175 [in russisch].
- GOLKOWSKI, V. (1990): 384. Interessante Käferfunde aus dem Kreis Forst (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **34** (2): 93-94.
- GOSSNER, M. (2004): Untersuchung ausgewählter Arthropodengruppen für eine faunistisch ökologische Bewertung des Anbaus von Douglasie (*Pseudotsuga menziesii*) und Amerikanischer Roteiche (*Quercus rubra*) (Coleoptera, Heteroptera, Neuropterida, Aranea). - Universität Weihenstephan, Dissertation (Dr. rer. silv.), 1-327.

- GRIEP, E. (1936): Die Käferfauna eines Potsdamer Getreidespeichers. – Märkische Tierwelt **2**: 19-23.
- GRIEP, E. (1937): Coleopterologische Beobachtungen. – Entomologische Zeitschrift (Frankfurt a. M.) **50**: 475-479.
- GRIEP, E. (1957): Bemerkenswerte Käferfunde im Moosfenn bei Potsdam (1933-1956). – Mitteilungsblatt für Insektenkunde **1**: 118-126.
- GRIMM, B. (1845): Die Myrmecophilen in Berlin's nächster Umgebung. – Entomologische Zeitung (Stettin) **6** (4): 123-128, (5): 131-136.
- GRUTTKE, H. (1992): Zur Ökologie und städtischen Verbreitung von *Ocypus olens* (MÜLLER). – Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **21**: 79-82.
- HÄNEL, K. (1934): 775. *Quedius mesomelinus* a. *Jaenneri*. – Entomologische Blätter **30** (2): 89.
- HEDICKE, H. (1922): Hymenopterenfauna des Groß-Machnower Weinberg bei Mittenwalde (Mark). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1922** (3): 249-287.
- HEINIG, U. (1981): Ein Kabelgraben als Käferfalle. – Novius **3**: 31-32.
- HEINIG, U. (1989): Auswertung weiterer Käferfamilien Teil 1. – Novius **8**: 156-157.
- HENNINGS, O. (1919): 117. *Tachinus subterraneus* var. *bicolor*. – Entomologische Blätter **15** (7-9): 184.
- HERBST, J. F. W. (1784): Kritisches Verzeichniß meiner Insektensammlung. – Archiv der Insektengeschichte **5** (2): 129-151, Tafeln 29-30.
- HERMAN L. H. (1986): Revision of *Bledius*. Part IV. Classification of species groups, phylogeny, natural history, and catalogue (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). – Bulletin of the American Museum of Natural History **184**: 1-367.
- HERMAN, L. H. (2001): Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second millenium. – Bulletin of the American Museum of Natural History **265**: 1-4218.
- HOFMANN, G. (2001): Das Verbreitungsbild von *Anemadus strigosus* (KR.) (Col., Cholevidae), *Thoracophorus corticinus* MOTSCH. (Col., Staphylinidae) und *Megopis scabricornis* (SCOP.) (Col., Cerambycidae) – eine Folge ihrer Sommerthermophilie? – Mitteilungen des entomologischen Vereins Stuttgart **36**: 91-107.
- HORION, A. (1935): Nachtrag zu Fauna Germanica Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. – Krefeld: H. Goecke, I-VIII, 1-358.
- HORION, A. (1939): Studien zur deutschen Käferfauna III. Weitere Beispiele für das sporadische und periodische Auftreten thermophiler Käfer in Deutschland. – Entomologische Blätter **35** (1): 3-18.
- HORION, A. (1944): Studien zur deutschen Käferfauna IV. Einige faunistisch bemerkenswerte Staphylinidae aus der Unterfamilie Tachyporinae. – Entomologische Blätter **40** (1-2): 15-22.
- HORION, A. (1949a): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band II: Palpicornia – Staphylinoidea (ausser Staphylinidae). – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, I-XXIII, 1-388.

- HORION, A. (1949b): Die mitteleuropäischen Atheten der Untergattungen *Oreostiba*, *Hygroecia* und *Metaxia* nach den Arbeiten von Dr. Lars Brundin bis 1943. – Koleopterologische Zeitschrift **1** (1): 67-72.
- HORION, A. (1950a): Diskontinuierliche Ost-West-Verbreitung mitteleuropäischer Käfer. – Verhandlungen des 8. Internationalen Kongresses für Entomologie, Stockholm, 408-417.
- HORION, A. (1950b): Adventivarten aus faulenden Pflanzenstoffen, besonders aus Komposthaufen. – Koleopterologische Zeitschrift **1** (3): 203-215.
- HORION, A. (1954a): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland (1. Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“). – Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **1** (1-3): 1-22.
- HORION, A. (1954b): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“. – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) **64**: 368-402.
- HORION, A. (1955): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben. – Stuttgart: Verlag Alfred Kernen I-X, 1-536.
- HORION, A. (1957a): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. III. Reihe (5. Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **4** (1-2): 431-444.
- HORION, A. (1957b): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. 3. Reihe (6. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“). – Entomologische Blätter **52** (3): 108-123.
- HORION, A. (1960): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. IV. Reihe (7. Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **50**: 119-162.
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IX: Staphylinidae 1. Teil: Micropeplinae bis Euaesthetinae. – Überlingen-Bodensee: Aug. Feyel, I-XII, 1-412.
- HORION, A. (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band X: Staphylinidae 2. Teil: Paederinae bis Staphylininae. – Überlingen-Bodensee: P.C.W. Schmidt, I-XV, 1-335.
- HORION, A. (1966): Neue und bemerkenswerte Käfer in Deutschland. 8. Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“. – Entomologische Blätter **61** (3): 134-181.
- HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band XI: Staphylinidae 3. Teil: Habrocerinae bis Aleocharinae (Ohne Subtribus Athetae). – Überlingen-Bodensee: P.C.W. Schmidt, I-XXIV, 1-419.
- HORION, A. (1969): Neunter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer. – Entomologische Blätter **65** (1): 1-47.
- HUBENTHAL, W. (1917a): 19. *Bledius tricornis*. – Entomologische Blätter **13** (4-6): 137.
- HUBENTHAL, W. (1917b): 21. *Velleius dilatatus*. – Entomologische Blätter **13** (4-6): 138.

- IHSSEN, G. (1937): II. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Ilyobates* KR. – Entomologische Blätter **33** (1): 11-15.
- JACOBS, W. & A. HORION (1936): 1030. *Oligota parva*. – Entomologische Blätter **32** (3): 129-130.
- JAESCHKE, G. (1987): Untersuchung zur Artzusammensetzung und Dominanz verkehrstoter Insekten – erste Ergebnisse. – Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg **23** (2-3): 70-83.
- JÁSZAY, T. & P. HLAVÁČ (2006): A revision of the Palaearctic species of the genus *Dropephylla* (Coleoptera: Staphylininae: Omaliinae). – Entomological Problems **36** (1): 31-62.
- KEGEL, B. & J. ZIMMERMANN (1993): Zur diurnalen Aktivität von Kurzflügelkäfern (Staphylinidae) eines Winterroggenfeldes. – Zoologische Beiträge (N.F.) **34** (3) [1992]: 435-446.
- KEMPF, L. (1989): 3 Jahre Schülerexpeditionen der Kreisarbeitsgemeinschaft „Junge Naturschutzhelfer“ im Kreis Neuruppin (Coleoptera). – Veröffentlichungen Potsdam-Museum **30**: 33-44.
- KIELHORN, K.-H. & H. KORGE (1990): *Atheta pandionis* SCHEERPELTZ 1958 aus dem Berliner Grunewald, ein Neufund für die Fauna Mitteleuropas (Coleopt. Staphylinidae), S. 119-121 in: STISY, L.: 100 Jahre Orion Berlin – Entomologische Gesellschaft. – Berlin: Entomologische Gesellschaft Orion, 1-136.
- KIESENWETTER, E. A. H. VON (1847): *Ocalea castanea*, ERICHSON (Nr. 45) in: KÜSTER, H.: Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Achtes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, 1-100.
- KIESENWETTER, E. A. H. VON (1850): Funfzig Diagnosen unbeschriebener oder wenig bekannter Europäischer Käfer. – Entomologische Zeitung (Stettin) **11** (7): 217-225.
- KLEEBOERG, A. (1995): Zur Käferfauna des Kaniswall im NSG „Gosener Wiesen“ unter besonderer Berücksichtigung der Lauf- und Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Carabidae und Staphylinidae). – Novius **18**: 368-386.
- KLEEBOERG, A. (1999): Faunistisch bemerkenswerte Funde von Kurzflügelkäfern im NSG „Milaseen“ (Dahme-Seengebiet, Brandenburg) (Coleoptera: Staphylinidae). – Märkische Entomologische Nachrichten **1** (1): 55-61.
- KLEEBOERG, A. & J. SCHMIDT (1999): Laufkäfer- und Kurzflügelkäferfunde in der Sölle-Kette Lietzen-Döbberin (Ost-Brandenburg) (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). – Märkische Entomologische Nachrichten **1** (1): 49-54.
- KLIMASZEWSKI, J. (1979): A revision of the Gymnusini and Deinopsini of the world. Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae. – Agriculture Canada Monograph Nr. **25**: 1-169.
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“. – Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (1): 60-84.
- KÖHLER F. & B. KLAUSNITZER (1998): Entomofauna Germanica. Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **4**: 1-185.

- KORGE, H. (1956a): Teil I: Adephaga und Staphylinidae in: GRIEP, E. & H. KORGE (1956): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg XXI. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **3** (1): 56-69.
- KORGE, H. (1956b): Eine neue *Oxypoda* aus dem Spandauer Stadtforst (Col. Staphylinidae). - Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **3** (2-4): 262-263.
- KORGE, H. (1958): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg XXIII. - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **17** (6): 98-104.
- KORGE, H. (1959): *Oxypoda*-Studien (Col., Staphylinidae). - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **18** (4): 58-65.
- KORGE, H. (1960a): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg XXIV. - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **19** (1): 13-16 (2): 34-36.
- KORGE, H. (1960b): Eine neue deutsche *Quedius*-Art von der Ostseeküste (Col. Staphylinidae). - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **19** (3): 52-53.
- KORGE, H. (1960c): Weitere Bemerkungen zur Gruppe des *Quedius molochinus* GRAV. (Col. Staphylinidae). - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **19** (4): 67-69.
- KORGE, H. (1961): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg XXV. - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **20** (2): 21-27.
- KORGE, H. (1962a): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg XXVI. - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **21** (5-6): 73-83.
- KORGE, H. (1962b): Zwei für Deutschland neue *Stenus*-Arten. - Entomologische Nachrichten **6** (7): 73-78.
- KORGE, H. (1963a): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg (Teil XXVII). - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **22** (4): 76-78.
- KORGE, H. (1963b): Das Naturschutzgebiet Teufelsbruch in Berlin-Spandau. III. Die Käferfauna. - Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin (N.F.) **3** (2): 67-102.
- KORGE, H. (1965): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg XXVIII. - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **24** (2): 33-38.
- KORGE, H. (1967): „Urwald-Relikte“ an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Entomologische Beobachtungen im Zoologischen Garten Berlin. - Berliner Naturschutzblätter **33**: 209-218.
- KORGE, H. (1973): Beiträge zur Kenntnis der märkischen Koleopterenfauna (Teil XXXI). - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **32**: 49-61.
- KORGE, H. (1975): Untersuchung einer parthenogenetischen Population von *Atheta fungi* (GRAVENHORST, 1806). - Entomologische Blätter **71** (3): 165-172.
- KORGE, H. (1982): Übrige Tiergruppen. - In: BERSTORF, G., BURGHARDT, D., KORGE, H. und L. STIESY: Die Tierwelt des Freizeitparks in Berlin-Marienfelde (ab 1980) (vor 1980 Mülldeponie der B.S.R.). - Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. (BLN), 1-57 [lag nicht zur Auswertung vor].

- KORGE, H. (1989): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt von Berlin (West). Teil I: Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae). – Berliner Naturschutzblätter **33** (1): 28-40. [Nachdruck (S. 57-77) in: STISY, L. (1990): 100 Jahre Orion Berlin – Entomologische Gesellschaft. – Berlin: Entomologische Gesellschaft Orion, 1-136.]
- KORGE, H. (1991a): Liste der Kurzflüglerkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) von Berlin (West) mit Kennzeichnung der verschollenen und gefährdeten Arten (Rote Liste), S. 277-317 in: AUHAGEN, A., PLATEN, R. & H. SUKOPP: Rote Listen der gefährdeten Tiere und Pflanze in Berlin. – Schriftenreihe des Fachbereichs Landschaftsentwicklung der TU Berlin, Sonderheft **6**: 1-478.
- KORGE, H. (1991b): Zoologische Beobachtungen auf dem Truppenübungsplatz Döberitz. – Berliner Naturschutzblätter **35** (4): 165-168.
- KORGE, H. (2002): Veränderungen in der Tierwelt von Berlin-Brandenburg am Beispiel der Käfer (Coleoptera). – Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin (N.F.) **41**: 89-91.
- KORGE, H. (2005): Rote Liste und Gesamtartenliste der Kurzflügelkäfer (Coleoptera: Staphylinidae) von Berlin, S. 1-34. – In: Der Landesbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.): Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere von Berlin. CD-ROM.
- KORGE, H. & E. GRIEP (1957): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg XXII. – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft (N.F.) **16** (3-4): 40-45.
- KORGE, H. & J. SCHULZE (1966): Beiträge zur Kenntnis der märkischen Koleopterenfauna (Teil XXIX). – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **25** (4): 57-67.
- KORGE, H. & J. SCHULZE (1971): Beitrag zur Kenntnis der märkischen Koleopterenfauna (Teil XXX). – Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft in der BRD **29** (4): 43-48, (5-6): 53-57.
- KRAATZ, G. (1851): Verzeichnis märkischer in Erichson's Käfern der Mark Brandenburg nicht angegebenen Käfer. – Entomologische Zeitung (Stettin) **12**: 283-286, 291-295.
- KRAATZ, G. (1855): Ueber Staphylini. – Entomologische Zeitung (Stettin) **16**: 20-28.
- KRAATZ, G. (1856): Naturgeschichte der Insekten Deutschlands. Coleoptera. II. Band: Staphylinii. Lieferung 1 und 2. Berlin: Nicolai, 1-376.
- KRAATZ, G. (1857a): Naturgeschichte der Insekten Deutschlands. Coleoptera. II. Band: Staphylinii. Lieferung 3 bis 6. Berlin: Nicolai VIII, 377-1080.
- KRAATZ, G. (1857b): Kleinere Mittheilungen [*Batrisus formicarius*]. – Berliner Entomologische Zeitschrift **1**: 172-174.
- KRAATZ, G. (1858): Ueber *Oligota apicata* ER. und Verwandte. – Berliner Entomologische Zeitschrift **2**: 350-352.
- KRAATZ, G. (1859): Synonymische Bemerkungen IV. [*Homalota hygrobia*]. – Berliner Entomologische Zeitschrift **3**: 89-90.
- KRAATZ, G. (1861): Synonymische Bemerkungen. – Berliner Entomologische Zeitschrift **5**: 407-412.

- KRAATZ, G. (1862a): Neue *Aleochara*-Arten nebst einigen Bemerkungen zu bekannten. – Berliner Entomologische Zeitschrift **6**: 316-320.
- KRAATZ, G. (1862b): Beiträge zur europäischen Käfer-Fauna. – Berliner Entomologische Zeitschrift **6**: 263-273.
- KRAATZ, G. (1868): Ueber verschiedene, auf deutsche Staphylinen bezügliche Bemerkungen des Herrn Fauvel. – Berliner Entomologische Zeitschrift **12**: 339-348.
- KRAATZ, G. (1870): Fußnoten zu: REITTER, E.: Beschreibung zweier neuer deutscher Pselaphiden. – Berliner Entomologische Zeitschrift **14**: 213-216, Tafel I, Abb. 6-7.
- KRAATZ, G. (1875): Synonymische Bemerkungen – A. Ueber deutsche Käfer. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **19** (2): 433.
- KRAATZ, G. (1889): Bemerkungen über *Homalota*-Arten. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1889** (2): 396.
- KUHNT, P. (1913): Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. – Stuttgart: Schweizerbart, I-VII, 3, 1-1138.
- KÜSTER, H. (1853): Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Siebenundzwanzigstes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, 1-100, 2 Tafeln.
- KUTTIG, G. (1985): Ein Beitrag zur Käfer-Fauna (Coleoptera) in Feldgehölzen des Kreises Prenzlau. – Zoologischer Rundbrief Neubrandenburg **4**: 53-56.
- KUTZSCHER, C. (1994): 76. Bemerkenswertes zum Hornissenkäfer *Velleius dilatatus* F., 1787 (Col, Staphylinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **38** (1): 63-64.
- LIKOVSKÝ, Z.. (1974): Fam. Staphylinidae II (237. Gattung: *Aleochara* GRAVENHORST 1802). In: FREUDE, H., HARDE, K.W. & G.A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 4, Krefeld: Goecke & Evers, 293-304.
- LÖBL, I. (1970): Revision der paläarktischen Arten der Gattungen *Scaphisoma* LEACH und *Caryoscapa* GANGLBAUER der Tribus Scaphisomini (Col. Scaphidiidae). – Revue Suisse de Zoologie **77** (4): 727-799.
- LOHSE, G.A. (1964): Fam. Staphylinidae I (Micropeplinae bis Tachyporinae). – In: FREUDE, H., HARDE, K.W. & G.A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 4, Krefeld: Goecke & Evers, 1-264.
- LOHSE, G.A. (1974): Fam. Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae, exklusive Tribus Callicerini). In: FREUDE, H., HARDE, K.W. & G.A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 4, Krefeld: Goecke & Evers, 1-72, 221-292.
- LOHSE, G.A. (1982): 13. Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer. – Entomologische Blätter **78** (2-3): 115-126.
- LOHSE, G.A. (1984): *Trichiusa immigrata* n. sp., eine neue Adventivart aus Mitteleuropa. – Entomologische Blätter **80** (2-3): 163-165.
- LOHSE, G.A. (1989): Ergänzungen und Berichtigungen zu Band 4. 23. Familie Staphylinidae (I) (Piestinae bis Tachyporinae). – In: LOHSE, G.A. & W.H. LUCHT (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. 1. Supplementband mit Katalogteil, Krefeld: Goecke & Evers, 121-183.

- MARTIN, D. & M. UHLIG (1986): Die Spinnen- und Kurzflüglerfauna (Araneae et Staphylinidae) der Silbergrasrasen (Corynephoreten) des Bühnenwerder, Stadtkreis Brandenburg, Bezirk Potsdam (Arachnida; Insecta, Coleoptera). – Faunistische Abhandlungen **14** (2): 31-35.
- MARUYAMA, M. (2006): Revision of the Palearctic species of the myrmecophilous genus *Pella* (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – National Science Museum Monographs Nr. **32**: 2, I-III, 1-207.
- MAUS, C. (1998): Taxonomical contributions to the subgenus *Coprochara* Mulsant & Rey, 1874 of the genus *Aleochara* Gravenhorst, 1802 (Coleoptera: Staphylinidae). – Koleopterologische Rundschau **68**: 81-100.
- MEISSNER, A. (1991): Typisierung und Bewertung von Wiesenflächen auf Grund der Erfassung räuberischer Coleopteren (Coleoptera: Staphylinidae/Carabidae). – Berlin: Technische Universität, 1-118.
- MEISSNER, A. (1997): Überwinterungsstrategien von Kurzflügel- und Laufkäfern (Coleoptera: Staphylinidae, Carabidae) in einem Niedermoor mit Überflutung im Winter. – Arbeitsberichte Landschaftsökologie Münster **18**: 115-131.
- MEISSNER, A. (1998a): Ökologie und Phänologie von *Schistoglossa pseudogemina* Benick und *Schistoglossa drusilloides* Sahlberg (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter **94** (1-2): 65-73.
- MEISSNER, A. (1998b): Die Bedeutung der Raumstruktur für die Habitatwahl von Lauf- und Kurzflügelkäfern (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Freiland-ökologische und experimentelle Untersuchung einer Niedermoorzönose – Berlin: Dissertationsschrift Technische Universität Berlin, 4, 1-184.
- MEISSNER, O. (1912): Bemerkenswerte entomologische Ereignisse des Jahres 1910 in Potsdam. – Entomologisches Jahrbuch **21**: 88-94
- METZGER, R. & E.-A. Kallies (1964): Die Coleopteren des Naturschutzgebietes „Moosfenn“ bei Potsdam. – Veröffentlichungen des Bezirksheimatmuseums Potsdam **9**: 7-25.
- MÖLLER, G. (1989): 2085. Bemerkenswerte Käferfunde aus Berlin-West (Liod., Orthop., Staph., Dermest., Nitid., Rhizoph., Cryptoph., Phalacr., Lathrid., Colyd., Coccin., Tenebr.). – Entomologische Blätter **85** (1-2): 116-117.
- MÖLLER, G. (1990): Vergleichende Betrachtungen zur Saftflußfauna an Eichen aus faunistischer und ökologischer Sicht. – Berliner Naturschutzblätter **34** (1): 12-17.
- MÖLLER, G. & M. SCHNEIDER (1988): Holzinsekten in den Gatower Feldhecken. Vorschläge für eine verbesserte Gehölzpflge. – Berliner Naturschutzblätter **32** (4): 188-193.
- MÖLLER, G. & M. SCHNEIDER (1991): Kommentierte Liste ausgewählter Familien überwiegend Holz bewohnender Käfer von Berlin-West mit Ausweisung der gefährdeten Arten (Rote Liste). S. 373-420 in: AUHAGEN, A., PLATEN, R. & H. SUKOPP: Rote Listen der gefährdeten Tiere und Pflanze in Berlin. – Schriftenreihe des Fachbereichs Landschaftsentwicklung der TU Berlin, Sonderheft **6**: 1-478.

- MÖLLER, G. & M. SCHNEIDER (1994): Koleopterologisch-entomologische Betrachtungen zu Alt- und Totholzbiotopen in Berlin und Brandenburg – Teil 2. – Entomologische Nachrichten und Berichte **38** (4): 227-244.
- MÖLLER, K. (2000): Untersuchungen zur Beschreibung der Arthropodenfauna in Kiefernforsten Brandenburgs, im Mittelpunkt die epigäischen Laufkäfer- und Kurzflügler-Gemeinschaften (Coleoptera, Carabidae, Staphylinidae). – Mitteilungen der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (Gotha) **17/2000**: 19 Seiten.
- MÖLLER, K. & J. JAKOBITZ (2003): Artenarme Kiefernwälder? – Faunistische Raritäten in brandenburgischen Kiefernforsten. Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie **37** (4): 152-155.
- MÖLLER, K. & J. JAKOBITZ (2005): Seltene und gefährdete Insekten und Spinnen in ausgewählten Naturwäldern Brandenburgs. - Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie **39** (2) 81-91.
- MÜLLER, G., KLAUSNITZER, B. & M. UHLIG (1978): Probleme der Rasterkartierung der Käferfauna der DDR. – Entomologische Nachrichten **22**: 185-196.
- NERESHEIMER, J. (1926): Kleine Beiträge zur Käferfauna der Mark Brandenburg. II. Über die Lebensweise einiger seltener Elateriden. – Coleopterologisches Centralblatt **1** (2): 95-101.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1916a): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg III. – Entomologische Mitteilungen **5** (5-8): 156-163.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1916b): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg IV. – Entomologische Mitteilungen **5** (9-12): 223-228.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1918a): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg VI. – Entomologische Mitteilungen **7** (1-3): 17-30.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1918b): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg VII. – Entomologische Mitteilungen **7** (7-9): 130-134.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1919): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg VIII. – Entomologische Mitteilungen **8**: 65-75.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1920a): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg IX. - Entomologische Mitteilungen **9**: 16-18.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1920b): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg X. - Entomologische Mitteilungen **9**: 172-179.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1924): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg XII. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1924**: 153-161.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1928): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. XIII. – Coleopterologisches Centralblatt **3** (1-2): 50-59.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1929): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. XIV. – Coleopterologisches Centralblatt **3** (5-6): 240-252.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1931): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. XV. – Coleopterologisches Centralblatt **5** (6): 219-232.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1935a): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. XVI. – Entomologische Blätter **31** (3): 106-120.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1939): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg XVII. - Märkische Tierwelt **4**: 1-30.

- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1940): Beiträge zur Coleopteren-Fauna der Mark Brandenburg, XVIII. – Märkische Tierwelt **4**: 203-211.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1942): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg, XIX. – Entomologische Blätter **38** (5-6): 153-164.
- NEUHAUS, G. H. (1885): Catalogus Coleopterorum Marchicorum. – Monatliche Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks Frankfurt (Frankfurt/Oder) **3**: 35-41, 58-64, 67-74, 86-88, 124-127, 138-143.
- NICOLAI, V. & D. MACHANDER (2000): Kieferntotholz als Überwinterungshabitat für Arthropoden nebst Erstmeldung von *Leptusa norvegica* (Col., Staphylinidae) für Brandenburg. – Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (3): 171-174.
- NOHEL, P. (1973): *Micropeplus*-species represented in the Frey Museum. – Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing **24**: 229-231.
- NORDMANN, A. v. (1837): Symbolae ad monographiam staphylinorum. Ex Academiae Caesareae Scientiarum. Petropoli: Academiae Caesareae Scientiarum, **4**: 1-167.
- PANDELLE, M. L. (1869): Études monographique sur les staphylins européens de la tribu des Tachyporini ERICHSON. – Annales de la Société Entomologique de France **4** (9): 261-366.
- PACE, R. (1989): Monografia del genere *Leptusa* Kraatz (Coleoptera, Staphylinidae). – Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Iia Serie) Sezione Scienze della vita (A: Biologia) Nr. **8**: 3-306.
- PAŚNIK, G. (2006a): A revision of the world species of the genus *Tachyusa* ERICHSON, 1837 (Coleoptera, Staphylinidae: Aleocharinae). – Zootaxa **1146**: 1-152.
- PAŚNIK, G. (2006b): Taxonomy and phylogeny of the world species of the genus *Ischnopoda* STEPHENS, 1837 (Coleoptera, Staphylinidae: Aleocharinae). – Zootaxa **1179**: 1-96.
- PÜTZ, A. (1989): *Euplectus bonvoulieri narrentinus* REITTER, 1881, neu für die Fauna der DDR (Col., Pselaphidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **33** (2): 93-94.
- PUTHZ, V. (1965a): Über *Stenus mendicus* ER. und *morio* GRAV., eine Richtigstellung (Col., Staphylinidae). – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen **14** (9-10): 98-100.
- PUTHZ, V. (1965b): Nomenklatorische, systematische u. faunistische Bemerkungen über paläarktische Steninen (Col., Staphylinidae). – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **24** (2): 25-30.
- PUTHZ, V. (1966a): *Stenus cautus* ER., *europaeus* nov. spec. und *macrocephalus* AUBE (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter **62** (2): 111-120.
- PUTHZ, V. (1966b): Nomenklatorisches und Faunistisches über mitteleuropäische Steninen (Coleoptera, Staphylinidae). – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen **15** (11-12): 117-123.
- PUTHZ, V. (1967a): Über *Stenus geniculatus* GRAV. und ihm verwandte Arten, mit Beschreibung einer neuen spanischen Art (Coleoptera, Staphylinidae). – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen **16** (11-12): 110-115.

- PUTHZ, V. (1967b): 1821. Zur Faunistik deutscher und österreichischer Staphyliniden. – Entomologische Blätter **63** (1): 59-60.
- PUTHZ, V. (1967c): Die paläarktischen und afrikanischen *Stenus*-Typen der Sammlung des Zoologischen Museums Berlin, mit besonderer Berücksichtigung der Erichsonschen Arten (Coleoptera, Staphylinidae). – Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin **43**: 285-309.
- PUTHZ, V. (1971): Kritische Faunistik der bisher aus Mitteleuropa bekannten *Stenus*-Arten nebst systematischen Bemerkungen und Neubeschreibungen (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter **67** (2): 74-121.
- PUTHZ, V. (1972): Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Steninen (Col., Staph.). – Entomologische Blätter **68** (3): 150-152.
- PUTHZ, V. (1976a): Beiträge zur Kenntnis der Steninen CLIV. Dritter Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Steninen (Staphylinidae, Coleoptera). – Philippia **3** (1): 38-40.
- PUTHZ, V. (1976b): 1946. Staphyliniden-Beispiele für die Erfassung der europäischen Wirbellosen. – Entomologische Blätter **72** (3): 189-190.
- PUTHZ, V. (1991): Was ist *Stenus wagneri* L. BENICK? – oder: Die letzte mitteleuropäische Nuß bei *Stenus* geknackt! (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter **87** (3): 149-164.
- QUEDENFELDT, M. (1884b): Ueber einige für die Mark Brandenburg neue oder bisher in derselben selten beobachtete Käfer. – Berliner Entomologische Zeitschrift **28** (1): 137-142.
- QUEDENFELDT, M. (1885): Erwiderung auf Herrn J. Weise's Bemerkungen zu meiner Mittheilung „Ueber einige für die Mark Brandenburg neue oder bisher in derselben selten beobachtete Käfer“. – Entomologische Nachrichten (Berlin) **11**: 310-316.]
- REINECK, G. (1930): 5. Beitrag zur Lebens- und Entwicklungsweise von Coleopteren. – Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie **25**: 130-133.
- REITTER, E. (1909): Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. II. Band. – Stuttgart: K.G. Lutz, 1-392, Tafeln 41-80.
- RENNER, K. (2002): Bemerkenswerte Käferfunde als Ergebnisse einer erfolgreichen Exkursionssaison. – Coleo **3**: 1-8.
- RINK, U. (1991): Struktur und Phänologie der Fauna von Laufkäfern (Coleoptera: Carabidae) und Kurzflügelkäfern (Coleoptera: Staphylinidae) in immissionsbeeinflussten Kiefernbeständen des Berliner Grunewaldes und deren Belastung. Dissertation FU Berlin: 1-187 [lag nicht zur Auswertung vor].
- RÖSSNER, E. & H. KALZ (2002): Aktuelle Exkursionsergebnisse zur Untersuchung der Blatthornkäfer-Fauna der Hänge des Oderbruchs und an der Unteren Oder. – Märkische Entomologische Nachrichten **4** (1): 49-63.
- RUSCH, J. (1985): 230. Die Staphylinidenbesiedelung einer Waldbrandfläche. – Entomologische Nachrichten und Berichte **29** (3): 127-128.
- RUSCH, J. (1986): 254. Bemerkenswerte Staphylinidenfunde im Bezirk Cottbus. – Entomologische Nachrichten und Berichte **30** (2): 91.

- RUSCH, J. (1988): 310. *Gyrophæna pseudonana* STRAND – neu für die DDR (Col., Staphylinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **32** (1): 42-43.
- RUSCH, J. (1990): Untersuchungsergebnisse zum Vorkommen mitteleuropäischer Arten der Gattung *Gyrophæna* MANNH. in verschiedenen Pilzen (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **34** (6): 263-268
- RUSCH, J. (1992): Bemerkenswerte Staphylinidenfunde in der Niederlausitz Teil I. – Natur und Landschaft in der Niederlausitz **13**: 59-99.
- RUSCH, J. (1993): Bemerkenswerte Staphylinidenfunde in der Niederlausitz Teil II. – Natur und Landschaft in der Niederlausitz **14**: 57-88.
- RUSCH, J. (1994): Bemerkenswerte Staphylinidenfunde aus der Niederlausitz Teil III. – Natur und Landschaft in der Niederlausitz **15**: 62-78.
- RUSCH, J. (2000): Bemerkenswerte Staphylinidenfunde aus der Niederlausitz Nachträge (2. Teil). – Natur und Landschaft in der Niederlausitz **20**: 112-117.
- SCHEERPELTZ, O. (1929): Monographie der Gattung *Olophrum* ER. (Col. Staphylinidae). – Wien: A. Holzhausens Nachfolger, 1-257, Tafeln I-VI. [= Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien **79** (1): 1-257, Tafeln I-VI.]
- SCHEERPELTZ, O. (1949): Die bisher bekannt gewordene geographische Verbreitung und Ökologie des *Edaphus blühweissi* SCHEERP. (Col. Staphylinidae). – Wiener Entomologische Rundschau **1** (2): 29-32.
- SCHEERPELTZ, O. (1954a): Eine neue Art der Atheten-Untergattung *Ceritaxa* MULS. REY (Col. Staph.). – Koleopterologische Rundschau **32** (4-6): 144-145.
- SCHEERPELTZ, O. (1954b): Bestimmungstabelle der bis heute bekannt gewordenen paläarktischen Arten der Gattung *Meotica* MULS. REY (Col. Staphyl.). – Koleopterologische Rundschau **32** (4-6): 149-158.
- SCHEERPELTZ, O. (1960): Die mir bekannten paläarktischen Arten des Subgen. *Ceritaxa* MULS. ET REY der Großgattung *Atheta* C.G. THOMS., mit einer Bestimmungstabelle dieser Arten und Beschreibungen neuer Arten (Col. Staphylinidae). – Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing **11** (2): 599-626.
- SCHILOW, W. F. (1979): Material zu einer Revision der Gattung *Chilopora* KRAATZ der europäischen und kaukasischen Fauna (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Reichenbachia **17** (16): 121-128.
- SCHILSKY, J. (1888): Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark-Brandenburg. – Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung, I-VII, 1-159.
- SCHILSKY, J. (1889): Berichtigungen und Ergänzungen zum Verzeichnis der deutschen Käfer. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1889** (2): 337-344.
- SCHILSKY, J. (1890): Beiträge zur deutschen Käferfauna. V. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1890** (1): 177-185.
- SCHILSKY, J. (1891): VI. Beitrag zur Kenntniß der deutschen Käferfauna. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1891** (1): 153-157.

- SCHILSKY, J. (1908): Neue märkische Käfer und Varietäten aus der Gegend von Luckenwalde. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1908**: 599-604.
- SCHILSKY, J. (1909): Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Österreichs. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart: Verlag von Strecker & Schröder I-XIX, 1-221.
- SCHIRMER, C. (1897): Reiche Beute im Winter. – Entomologisches Jahrbuch **6**: 207-209.
- SCHOLZ, R. (1929): 555. *Arpedium tenue*. – Entomologische Blätter **25** (1): 54.
- SCHÜLKE, M. (1984a): – Neue und faunistisch bemerkenswerte Staphyliniden aus der DDR (Coleoptera). I. Staphylininae – Tachyporinae. – Entomologische Nachrichten und Berichte **28** (3): 93-100. (200)
- SCHÜLKE, M. (1984b): Beitrag zur Verbreitung einiger Arten der Gattung *Heterothops* STEPH. (Coleoptera, Staphylinidae) in der DDR. – Entomologische Nachrichten und Berichte **28** (5): 217-219.
- SCHÜLKE, M. (1984c): 190. *Falagria concinna* ER. (Col., Staphyl.) in der Mark Brandenburg. – Entomologische Nachrichten und Berichte **28** (5): 217. (202)
- SCHÜLKE, M. (1990): Zur Kurzflüglerfauna des NSG „Lange Dammwiesen und Unteres Annatal“ bei Strausberg, Bezirk Frankfurt/Oder (Coleoptera, Staphylinidae). – Novius **9**: 175-191.
- SCHÜLKE, M. (1991): Märkische *Thinobius* (Coleoptera, Staphylinidae: Oxytelinae). – Novius **12**: 252-264.
- SCHÜLKE, M. (1992): *Paederus balcanicus* KOCH im Stadtgebiet von Berlin (Coleoptera, Staphylinidae: Paederinae). – Novius **13** (1): 272-274.
- SCHÜLKE, M. (1997): Studien zur Systematik und Faunistik der Gattung *Tachyporus* GRAVENHORST. Teil 5: Zur Kenntnis der westpaläarktischen Arten der *Tachyporus atriceps* Stephens, 1832-Gruppe (Coleoptera, Staphylinidae). – Koleopterologische Rundschau **67**: 131.158.
- SCHÜLKE, M. (1998a): 2180. Neu- und Wiederfunde seltener Staphyliniden aus Berlin und Brandenburg (Staph.). – Entomologische Blätter **94** (1-2): 90.
- SCHÜLKE, M. (1998b): Gattung *Thinobius* KIESW.– In: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15), Jena: 128-129.
- SCHÜLKE, M. (1998c): Unterfamilie Tachyporinae – In: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15), Jena: 139-147.
- SCHÜLKE, M. (1999a): Hygrophile Staphyliniden aus Hochwassergenist an der Oder bei Frankfurt/Oder, Brandenburg (Coleoptera, Staphylinidae). – Märkische Entomologische Nachrichten **1**: 49-54
- SCHÜLKE, M. (1999b): Bemerkenswerte Staphyliniden-Arten aus einem Großseggenried bei Seilershof, Landkreis Oberhavel, Brandenburg (Coleoptera, Staphylinidae). – Märkische Entomologische Nachrichten **1**: 63-64.
- SCHÜLKE, M. (1999c) Über *Sepedophilus nigripennis* (STEPHENS, 1832) (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter **95** (1): 55-60.

- SCHÜLKE, M. (2000): Untersuchungen zur Systematik und Taxonomie der Gattung *Lordithon* THOMSON, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae, Tachyporinae). – Koleopterologische Rundschau **70**: 87-111.
- SCHÜLKE, M. (2001a): *Bryaxis curtisii curtisii* (LEACH, 1817) in Brandenburg wiedergefunden (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). – Märkische Entomologische Nachrichten **3** (1): 42.
- SCHÜLKE, M. (2001b): *Ocalea rivularis* MILLER, 1851 in Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). – Märkische Entomologische Nachrichten **3** (1): 38.
- SCHÜLKE, M. (2001c): Bemerkenswerte Funde von hygrophilen Staphylinoiden, besonders aus den Bundesländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt (Coleoptera: Staphylinidae, Histeridae). – Märkische Entomologische Nachrichten **3** (1): 43-55.
- SCHÜLKE, M. (2003): Zur Taxonomie und Verbreitung westpaläarktischer Arten der Gattungen *Bryoporus* KRAATZ und *Mycetoporus* MANNERHEIM (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Entomologische Blätter **99** (1-3): 27-54.
- SCHÜLKE, M. (2004): Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Bryophacis* REITTER, mit Bemerkungen zu *Bolitobius biseriatus* MANNERHEIM und *Bolitobius filicornis* WOLLASTON (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Linzer biologische Beiträge **36** (2): 1001-1054.
- SCHÜLKE, M. (2005a): *Tachyporus pallidus* SHARP, 1871 (Coleoptera, Staphylinidae) - auch im Stadtgebiet von Berlin. – Märkische Entomologische Nachrichten **7** (2): 112.
- SCHÜLKE, M. (2007): Drei neue Adventivarten der europäischen Staphyliniden-Fauna, mit Bemerkungen zu *Coproporus colchicus* KRAATZ (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Entomologische Blätter **102** (1-3): 173-201.
- SCHÜLKE, M. & A. KLEEBOG (1988): Zur Verbreitung von *Sepedophilus lokayi* (SMETANA, 1969) (Coleoptera, Staphylinidae). – Novius **7**: 107-109.
- SCHÜLKE, M. & M. KOCIAN (2000): Revision der Artgruppe des *Mycetoporus nigricollis* STEPHENS, 1835 (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Entomologische Blätter **96** (2): 81-126.
- SCHÜLKE, M. & M. UHLIG (1988): Faunistisch neue und bemerkenswerte Kurzflüglernerarten aus der DDR (Coleoptera, Staphylinidae, Micropeplinae – Tachyporinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **32** (1): 1-15.
- SCHÜLKE, M. & M. UHLIG (1989a): Zur Zoogeographie und systematischen Stellung von *Philonthus spinipes* SHARP, *Kirschenblatia kabardensis* BOLOV & KRYZHAN. und *Kirschenblatia buchari* BOHAČ (Coleoptera, Staphylinidae), S. 243-250, in: KLAUSNITZER, B. & W. DUNGER (Hrsg.): Verhandlungen des elften internationalen Symposiums für die Entomofaunistik Mitteleuropas (SIEEC) 19.-23. Mai 1986 Gotha 1989. - Dresden: S. 1-398.
- SCHÜLKE, M. & M. UHLIG (1989b): *Sepedophilus* – Studien 1: *S. pedicularius* (GRAVENHORST, 1802) (= *Tachyporus truncatellus* GRAVENHORST, 1806) und *S. obtusus* (LUZE, 1902). – Entomologische Blätter **85** (3): 147-164.

- SCHÜLKE, M. & M. UHLIG (1989c): Ergänzungen zur Verbreitung von *Philonthus spinipes* SHARP, 1874 (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **33** (4): 165-167.
- SCHÜLKE, M., M. UHLIG & L. ZERCHE (1992): Rote Liste der Kurzflügler (Staphylinidae), S. 155-174, 248-250 in: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (Hrsg.): Rote Liste, Gefährdete Tiere in Brandenburg. – Potsdam 1-288.
- SCRIBA, W. & G. KRAATZ (1872): Für Deutschland neue *Homalota*-Arten. – Berliner Entomologische Zeitschrift **15**: 149-161.
- SMETANA, A. (1958): Eine neue Art der Gattung *Ontholestes* GGLB. aus Deutschland. – Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **5** (3-4): 363-366.
- SCHULZE, P. (1917): Neuheiten der märkischen Insektenfauna 1915-16. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1916**: 576-586.
- SCHULZE, P. (1918): Die Neuheiten der märkischen Insektenfauna 1917 (einschließlich Eriophyiden und Ixodiden). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1918**: 277-292.
- SCHUMACHER, F. (1916): (Mitteilung über die Verbreitung von *Bledius tricornis* HERBST in Brandenburg). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **1916**: 358.
- SOMMER, M., TAEGER, A., WESTENDORFF, M. & J. ZIEGLER (1994): Arthropodenarten der Roten Liste Brandenburgs im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. – Brandenburgische Entomologische Nachrichten **2** (1): 63-77.
- STEIN, F. (1867): Kleinere Mittheilungen. – Berliner Entomologische Zeitschrift **11**: 417.
- STICHEL, W. (1926): Die Fauna der Pfaueninsel. – Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft **7**: 35-93, 12 Tafeln, 2 Karten.
- STRÜBING (1860): Kleinere Mittheilungen. 5. – Berliner Entomologische Zeitschrift **4**: 322-323.
- UHLIG, M. (1977): Beiträge zur Faunistik der Staphylinidae (Coleoptera). 1. Seltene Steninae, Paederinae, Xantholininae und Staphylininae aus der DDR. – Entomologische Nachrichten **21** (8): 75-168.
- UHLIG, M. (1993): Koleopterologischer Jahresbericht 1990 – Berlin. – Entomologische Blätter **89** (3): 167-172.
- UHLIG, M. (1995): *Atanygnathus lohsei* spec. nov. aus Namibia und *Atanygnathus terminalis* (ERICHSON, 1839) (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Atanygnathini). – Entomologische Blätter **91** (1-2): 96-104.
- UHLIG, M., MARTIN, D. & L. ZERCHE (1986): Beitrag zur Kurzflügler- und Spinnenfauna (Coleoptera: Staphylinidae; Arachnida: Araneae) des „Dammer Moores“ bei Beeskow im Bezirk Frankfurt (Oder). – Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg **22** (1): 6-16.
- UHLIG, M. & L. ZERCHE (1981): Beiträge zur Faunistik der Staphylinidae (Insecta, Coleoptera). 4. Das Naturschutzgebiet „Rietzer See“ bei Brandenburg (Bezirk Potsdam). – Faunistische Abhandlungen **8** (16): 147-176.

- ULLRICH, W. G. (1975): Monographie der Gattung *Tachinus* GRAVENHORST (Coleoptera: Staphylinidae), mit Bemerkungen zur Phylogenie und Verbreitung der Arten. Kiel: Christian-Alberts-Universität, 1-365, Tafeln I-LXI.
- VOGEL, J. (1998a): Gattung *Aleochara* GRAVENHORST. U.G. *Ceranota*. Bestimmungstabelle der mitteleuropäischen Arten – In: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15), Jena: 195-197.
- VOGEL, J. (2003): Eine neue Art der Gattung *Atheta* THOMSON aus Europa (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Entomologische Blätter **99** (1-3): 95-98.
- VOGEL, J. (2007): Drei neue *Atheta*-Arten für die Fauna von Deutschland (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Entomologische Blätter **102** (1-3): 165-172.
- VOGEL, J. & W. DUNGER (1991): Carabiden und Staphyliniden als Besiedler rekultivierter Tagebau-Halden in Ostdeutschland. – Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz **65** (3): 1-31.
- WAGNER, H. (1915a): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg I. – Entomologische Mitteilungen **4** (7-9): 240-245.
- WAGNER, H. (1915b): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg II. – Entomologische Mitteilungen **4** (10-12): 300-309.
- WAGNER, H. (1917): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg V. – Entomologische Mitteilungen **6** (7-9): 259-273.
- WAGNER, H. (1939): Einiges über die Käferfauna der Mark Brandenburg und der Niederlausitz im besonderen. – Der Märkische Naturschutz **40**: 193-201, **41**: 233-236, Tafel 27.
- WAGNER, H. (1941): I. Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna der Niederlausitz (Zugleich Reisebericht über die 2 ersten Exkursionen.). – Märkische Tierwelt **4** (4): 233-277.
- WAGNER, H. (1948): Aus der Praxis des Käfersammlers XLII. Ueber das sogenannte Klopftuch und seine Anwendung. – Koleopterologische Rundschau **31** (1-3): 1-13.
- WAGNER, H. (1949a): Beschreibung einer neuen deutschen *Aleochara* aus Hamsterbauen und kritische Bemerkungen zur Gattung. – Koleopterologische Zeitschrift **1** (1): 15-31.
- WAGNER, H. (1949b): 15. Interessante Funde aus der Mark Brandenburg. – Koleopterologische Zeitschrift **1** (1): 86-87.
- WAGNER, H. (1949c): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg XX. – Koleopterologische Zeitschrift **1** (2): 126-140.
- WANACH, B. (1907): Coleopterologische Notizen. – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) **21**: 103-104, 108, 113-114, 120-121, 136.
- WANACH, B. (1913): Sitzungsberichte des Berliner Entomologischen Vereins für das Jahr 1912. Sitzung vom 22. Februar. Seltenheiten aus dem Potsdamer Gebiet. – Berliner Entomologische Zeitschrift **58**: (19).
- WASMANN, E. (1887): Ueber die europäischen *Atemeles*. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **31** (1): 97-107.

- WEISE, J. (1872): Sammelberichte. 2. Aus der Mark für 1870 und 1871. – Berliner Entomologische Zeitschrift **16**: 157-159.
- WEISE, J. (1878): Sammelberichte. 2. Von J. Weise in Berlin (1877). A. Mark Brandenburg. – Deutsche Entomologische Zeitschrift **22** (1): 209.
- ZANETTI, A. (1980): Contributa alla conoscenza delle specie italiane del genere *Cryptobium* MANNH., con note sulle specie Europee e del Caucaso (Coleoptera, Staphylinidae). – Lavori de la Società Veneziana di Scienze Naturali **5**: 31-41.
- ZERCHE, L. (1980): Faunistisch interessante Staphylinidae aus der DDR (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten **24** (10-11): 145-165.
- ZERCHE, L. (1986): Revision der *Oxypoda formiceticola*-Gruppe der Untergattung *Demosoma* THOMSON, 1861 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). Beiträge zur Entomologie **36** (1): 79-98.
- ZERCHE, L. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Thiasophila* KRAATZ, 1856 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Entomologische Blätter **83** (2-3): 91-114.
- ZERCHE, L. (1989): Das Problem der Wirtsrassen bei mitteleuropäischen myrmecobionten Aleocharinen (Coleoptera, Staphylinidae), S. 238-243, in: KLAUSNITZER, B. & W. DUNGER (Hrsg.): Verhandlungen des elften internationalen Symposiums für die Entomofaunistik Mitteleuropas (SIEEC) 19.-23. Mai 1986, Gotha. – Dresden: S. 1-398.
- ZERCHE, L. (1990): Monographie der paläarktischen Coryphiini (Coleoptera, Staphylinidae, Omaliinae). – Berlin: Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik, 1-413.
- ZERCHE, L. (1994): Die Revision der *Oxypoda*-Typen aus der Sammlung Claudius Rey im Musée Guimet d'Histoire Naturelle de Lyon und einiger anderer Typen der Gattung sowie Beschreibung von vier neuen *Oxypoda*-Arten (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Coleoptera. Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen **6**: 1-36.
- ZERCHE, L. (1998): Phylogenetisch-systematische Revision der westpaläarktischen Gattung *Metopsia* WOLLASTON, 1854. – Beiträge zur Entomologie **48** (1): 3-101.
- ZERCHE, L. (1999) Die westpaläarktischen Arten der *Oxypoda*-Untergattung *Mycetodrepa* THOMSON (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae, Oxypodini). – Beiträge zur Entomologie **49** (2): 261-294.
- ZUMPT, F. (1930): Aus der Käferwelt des Brieselangs. – Naturdenkmalpflege und Naturschutz in Berlin und Brandenburg **5**: 135-139.
- ZUMPT, F. (1931a): Die Sperenberger Salzgewässer. – Naturdenkmalpflege und Naturschutz in Berlin und Brandenburg **10**: 346-352.
- ZUMPT, F. (1931b): Die Koleopterenfauna des Steppenheidebiotops von Bellinchen (Oder) und Oderberg (Fauna marchica). – Beiträge zur Naturdenkmalpflege **14**: 361-449.
- ZUMPT, F. & O. REBMANN (1932): Ökologische Studien im Sperenberger Salzgebiet. – Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere **24**: 768-801.

7.3. Literatur zum Verbleib von Sammlungen oder mit Bezug auf in Brandenburg tätige Sammler

- BRAASCH, D., FEILER, M. & M. KÜHLING (1995): Die private Sammlung des Potsdamer Entomologen Ludwig Kempf (1932-1994). - Brandenburgische Entomologische Nachrichten **3** (1): 9.
- DATHE, H. H. (2006): Chronologische Tafel zur Geschichte des Deutschen Entomologischen Instituts 1886-2006. – Beiträge zur Entomologie **56** (1): 5-22.
- EBERT, W., ROHLFIEN, K., PETERSEN, K. & G. FRIESE (1986): Einhundert Jahre Deutsches Entomologisches Institut. – Beiträge zur Entomologie **36** (1): 5-52.
- GAEDICKE, H. (1981): Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Instituts für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen – XIX (Coleoptera: Staphylinidae). – Beiträge zur Entomologie **31** (1): 175-232.
- GAEDICKE, R. (1995): Collectiones entomologicae (1961-1994). – Nova Supplementa Entomologica **6**: 3-83.
- HEINIG, U. (1987): Kurt Preidel – 90 Jahre. Entomologische Nachrichten und Berichte **31** (5): 234.
- HEINIG, U. (1993): Kurt Preidel – 95 Jahre. - Novius **15**: 334.
- HERMAN L. H. & A. SMETANA (2001): Biographical Scetches, S. 38-159 in: HERMAN, L. H.: Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second millenium. – Bulletin of the American Museum of Natural History **265**: 1-4218.
- HORION, A. (1949c): Übersicht über die in Deutschland noch vorhandenen Koleopteren-Sammler und Sammlungen. – Koleopterologische Zeitschrift **1** (1): 32-52.
- HORN, W. (1906): Prof. Dr. Gustav Kraatz. Ein Beitrag zur Geschichte der systematischen Entomologie. – Berlin: A. W. Schade, 1-135.
- HORN, W. (1909): Julius Schilsky, ein entomologisches Lebensbild. – Entomologische Blätter **5** (5): 97-102, 1 Tafel.
- HORN, W. (1912): Julius Schilsky †. – Entomologische Blätter **8** (10-12): 241-243, 1 Tafel.
- HORN, W. (1926): Über den Verbleib der entomologischen Sammlungen der Welt (ein Beitrag zur Geschichte der Entomo-Museologie). – Supplementa Entomologica **12**: 1-133.
- HORN, W. (1929): Nachträge und Verbesserungen zu meiner Arbeit „Ueber den Verbleib der entomologischen Sammlungen der Welt (Ein Beitrag zur Geschichte der Entomo-Museologie)“ Supplementa Entomologica Nr. 12, 1926. – Supplementa Entomologica **17**: 72-120.
- HORN, W. & I. KAHLE (1935-1937): Über entomologische Sammlungen, Entomologen und Entomo-Museologie (Ein Beitrag zur Geschichte der Entomologie). – Berlin: Deutsches Entomologisches Institut I-VI, 1-536, 38 Tafeln [Sonderdruck aus: Entomologische Beihefte **2**: 1-160, Tafel I-XVI; **3**: 161-296, Tafel XVII-XXVI; **4**: 297-536, Tafel XXVII-XXXVIII, I-VI.].
- HORN, W., KAHLE, I., FRIESE, G. & R. GAEDICKE (1990): Collectiones entomologicae. Eine Kompendium über den Verbleib entomologischer Sammlungen der Welt

- bis 1960. – Berlin: Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, 1-573.
- KLUG, F. (1850): Nekrolog [W. F. Erichson]. – Entomologische Zeitung (Stettin) **11** (2): 33-36.
- KORSCHESKY, W. (1951): Hans Wagner †. – Entomologische Blätter **45-46** [1949-1950]: 155-159.
- KRAATZ, G. (1860): Nekrolog [J. F. Ruthe]. – Berliner Entomologische Zeitschrift **4**: 101-102.
- KROEL, D. & K. ROHLFIEN (1995): Deutsches Entomologisches Institut. Kleiner Institutsführer. – Eberswalde: Deutsches Entomologisches Institut, 1-99.
- MÜLLER, C., JAEGER, B., KOMPANTSEV, A. V. & M. UHLIG (2001): Type and species catalogue of the minute tree-fungus beetles of the Museum für Naturkunde in Berlin, with general information on the Coleoptera collection, its curation and "Historical Collection" (Coleoptera, Polyphaga, Ciidae and Pterogeniidae). – Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Berlin, Zoologische Reihe **77** (2): 303-323.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1935b): Rechnungsrat a. D. D. Delahon †. – Entomologische Blätter **31** (2): 41-42.
- ROSS, E. (1933-35): Über bedeutende Koleopterologen und den Verbleib ihrer Sammlungen. – Internationale Entomologische Zeitschrift (Guben) **27**: 313-315, 389, 426-429, 467-470, 479-481, 504-506, 525-529, 537-540; **28**: 7-11, 72-74, 106-107, 155-157, 325-328, 432-434, 484-486, 494-496, 532-534, 543-546, 594-596.
- SACHTLEBEN, H. (1961): Nachträge zu "Walter Horn & Ilse Kahle": Über entomologische Sammlungen". – Beiträge zur Entomologie **11** (5-6): 481-540.
- SCHMIDT, (?) (1842): Mittheilungen über die Ratzeburg'sche, jetzt dem Staate gehörige Insectensammlung zu Neustadt Eberswalde. – Entomologische Zeitung (Stettin) **3**: 136-141.
- SCHMIDT, G. (1957): Erdmann Griep †. – Entomologische Blätter **53**: 133-134.
- SCHMIDT, G. (1963): Richard Korschewsky zum Gedenken. – Entomologische Blätter **59** (2): 129-131.
- SCHUMANN, H. (1992): Zur Geschichte der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. – DGaaE Nachrichten **6** (3): 104-116.
- STISY, L. (1990): 1. Teil: Vereinsgeschichte des Orion, S. 7-56 in: STISY, L.: 100 Jahre Orion Berlin – Entomologische Gesellschaft. – Berlin: Entomologische Gesellschaft Orion, 1-136.
- UHLIG, M. (1990): Bericht über den "5. Workshop Staphylinidae" in Gosen bei Berlin. – DGaaE-Nachrichten **4**: 85-86.
- UHLIG, M., SCHULZE, J. & L. ZERCHE (1986): Bericht über das 1. Arbeitstreffen der Staphylinidologen der DDR in Berlin. – Entomologische Nachrichten und Berichte **30** (6): 242.
- WAGNER, H. (1944): Dr. Julius Neresheimer †. – Entomologische Blätter **40** (1-2): 2-7.

- ZERCHE, L. (2003): Sammlung Coleoptera, S. 66-67 in: DATHE, H.H.: Jahresbericht 2000/2001 Deutsches Entomologisches Institut. – Eberswalde: Verein der Freunde und Förderer e.V., 1-80, 3 Tafelseiten.
- ZERCHE, L. & M. UHLIG (1987): Bericht über das 2. Arbeitstreffen der Staphylinidologen der DDR in Eberswalde. – Entomologische Nachrichten und Berichte **31** (4): 156.
- ZERCHE, L. & M. UHLIG (1992): Bericht über die 6. Tagung der Staphylinidologen. – Entomologische Nachrichten und Berichte. – **36** (1): 42.

7.4. Sonstige zitierte Literatur

- ASSING, V. (1999c): Über *Astenus longelytratus* PALM, *A. brevelytratus* LOHSE und *A. lyonessius* (JOY) (Col., Staphylinidae). – Entomologische Blätter **95** (1): 32-34.
- ASSING, V. (1999d): Zur Kenntnis und Synonymie einiger mitteleuropäischer Arten der Gattung *Quedius* STEPHENS (Col., Staphylinidae). – Entomologische Blätter **95** (1): 35-46.
- ASSING, V. (2007): On the Xantholinini of Turkey and adjacent regions (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae). – Zootaxa **1474**: 1-54.
- BERCIO, H. & B. FOLWACZNY (1979): Verzeichnis der Käfer Preußens. – Fulda: Parzeller & Co., I-XXI, 1-369, 1 Karte.
- BRUNDIN, L. (1954): Die paläarktischen Arten der *Atheta*-Untergattung *Dimetrota* MULS. et REY (Col., Staphylinidae). Eine systematische Studie. – Arkiv för Zoologi **5** (7): 369-434.
- CICERONI, A. (2001): Revisione del sottogenere *Xantholinus* s.str. DEJEAN, 1821 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Xantholinini). – Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona **25**: 83-94.
- GEISER, R. 1998: Rote Liste der Käfer (Coleoptera) exkl. Laufkäfer (Carabidae): Staphylinoida (Kurzflüglerartige). In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **55**: 178-194.
- GRAVENHORST J. L. C. (1802): Coleoptera Microptera Brunsvicensis nec non exoticorum quotquot exstant in collectionibus entomologorum Brunsvicensium in genera familias et species distribuit. – Brunsvigae: Carolus Reichard, I-LXVI, 1-206.
- GRAVENHORST J. L. C. (1806): Monographia Coleopterorum Micropteriorum. – Göttingae: Henricus Dieterich, 1-248.
- GUSAROV, V. I. (2002): *Xantholinus dvoraki* COIFFAIT, 1956, the only valid species of the subgenus *Meneidophallus* BORDONI, 1999, with remarkably variable internal sac of aedeagus (Coleoptera, Staphylinidae). – Zootaxa **21**: 1-11.
- HENNICKE, S., MARTSCHEI, T. & G. MÜLLER-MOTZFELD (1997): Erste Ergebnisse der Erfassung ausgewählter Arthropodengruppen der Stadt Greifswald (Araneae, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Saltatoria). – Insecta (Berlin) **5**: 51-100.

- HENNICKE, S. & G. MÜLLER-MOTZFELD (1998): Die Besiedlung innerstädtischer Grünflächen Greifswalds durch Kurzflügeldecken-Käfer (Coleoptera: Staphylinidae). – *Entomologia Generalis* **23** (1-2): 107-127.
- ICZN (2007): Opinion 2173 (Case 3299) *Staphylinus punctulatus* PAYKULL, 1789 (currently *Gyrohypnus punctulatus*; Insecta, Coleoptera, STAPHYLINIDAE): specific name conserved. – *Bulletin of Zoological Nomenclature* **64** (2): 134.
- ILLIGER, J. K. W. (1798): Verzeichniss der Käfer Preussens. Entworfen von Johann Gottlieb Kugelann, Apotheker in Osterode. Mit einer Vorrede des Professors und Pagenhofmeisters Hellwig in Braunschweig, und dem angehängten Versuche einer natürlichen Ordnungs- und Gattungs-Folge der Insecten. – Halle: J. J. Gebauer, I-XLII, 1-510, [1].
- ILLIGER, J. K. W. (1801): Nachtrag und Berichtigungen zum Verzeichnisse der Käfer Preussens. – *Magazin für Insektenkunde* **1**: 1-94.
- KUGELANN, J. G. (1792): Verzeichniss der in einigen Gegenden Preussens bis jetzt entdeckten Kaefer-Arten, nebst kurzen Nachrichten von denselben. – *Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie* **1**: 257-306.
- KUGELANN, J. G. (1794): Verzeichniss der in einigen Gegenden Preussens bis jetzt entdeckten Kaefer-Arten, nebst kurzen Nachrichten von denselben. – *Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie* **1**: 513-582.
- SCHILLHAMMER, H. & D. LOTT (2001): On the identity of *Gabrius velox* SHARP (Coleoptera, Staphylinidae). – *Entomologische Blätter* **97** (2-3): 195-197.
- SMETANA, A. (2004): Family Staphylinidae (exklusive Pselaphinae und Scaphidiinae) in: LÖBL, I. & A. SMETANA (Hrsg) (2004): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. 2: Hydrophiloidea-Histeroidea-Staphylinoidea. – Stenstrup: Apollo Books 1-942.
- SCHÜLKE, M. (2005b): Über *Staphylinus rufipes* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – *Entomologische Blätter* **100** (3): 201-204.
- VOGEL, J. (1978): Faunistisch bedeutsame und für die DDR neue Staphylinidae aus der Oberlausitz. - *Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz* **52**: 1-13.
- VOGEL, J. (1991): Zur Taxonomie mitteleuropäischer *Meotica*-Arten. – *Verhandlungen des Westdeutschen Entomologentages* **1990**: 155-156.
- VOGEL, J. (1998b): Das Dubringer Moor. - Görlitz: Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V., 1-128, 3 Karten.

Anschrift des Verfassers:

Michael Schülke
Rue Ambroise Paré 11
D-13405 Berlin
mschuelke.berlin@t-online.de