Märkische Ent. Nachr.	ISSN 1438-9665	1. Dezember 2012	Band 14, Heft 2	S. 281-283

Bemerkenswerte Käferfunde aus Brandenburg - Neufunde und Funde selten gemeldeter Arten (Coleoptera)

Tobias Mainda

Summary

Remarkable finds of beetles from Brandenburg: New species records and rarely recorded species (Coleoptera).
Anaspis humeralis (FABRICIUS, 1775) (Scraptiidae) is recorded from Brandenburg for the first time. Records of two other beetle species rarely recorded from Brandenburg are published.

Zusammenfassung

Der Neufund des Seidenkäfers (Scraptiidae) *Anaspis humeralis* (FABRICIUS, 1775) für Brandenburg sowie Nachweise zweier weiterer interessanter und bisher selten gemeldeter Arten aus Brandenburg werden publiziert.

1. Einleitung

Der Untersuchungsraum, der diesem Bericht zugrunde liegt, beschränkt sich auf den Landkreis Havelland im Bundesland Brandenburg. Die Einschätzung über Vorkommen und Häufigkeit der jeweiligen Art bezieht sich auf ESSER (2009).

2. Neugefundene Arten

Anaspis humeralis (FABRICIUS, 1775) (Abb. 1)
Eine bislang aus Brandenburg unbekannte Seidenkäferart (Scraptiidae). Wie ESSER (2009) schon vermutete, ist diese Käferart in Brandenburg beheimatet. Bestärkt war diese Vermutung sicherlich auch durch den Fund von BÄSE (2007), westlich von Rathenow in Sachsen-Anhalt. Nun wurde die Art durch den Autor für Brandenburg erstmals nachgewiesen.
Der Fund gelang durch Züchtung im Februar 2012. Aus einem eingetragenen Eichenast vom 21. Januar 2012 schlüpfte ein Käfer und konnte an der Fensterscheibe gefangen werden (1 Ex. leg./ coll. Mainda).
Der Eichenast stammte aus einem kleinen, relativ feuchten Waldgebiet, genannt Jäglitz. Selbiges liegt nördlich von Nauen im Havelländischen Luch und grenzt an die Siedlung Teufelshof. Der Baumbestand besteht hauptsächlich aus Ahorn und Weiden, jedoch auch aus Eichen, welche als Straßenbäume angepflanzt sind. In direkter Nähe befinden sich ein Graben sowie für das Gebiet typische Feuchtwiesen. Weitere Untersuchungen im Mai und Juni 2012, insbesondere durch Abkeschern der angrenzenden Wiese zur Blütezeit, brachten keine weiteren Exemplare hervor. Auch schlüpften keine weiteren Tiere aus dem besagten oder weiteren Ästen.

3. Neue Nachweise bisher selten gemeldeter Arten

Trox eversmanni (KRYNICKY, 1832)
Diese laut ESSER (2011) seltene Knochenkäferart (Trogidae) konnte nun in größerer Stückzahl im Havelländischen Luch nördlich von Nauen gefunden werden. In einem Dachsbau, welcher sich auf einem kleinen Flugsandfeld befindet, konnte die Art am 28.04.2012 (7 Ex. leg./coll. Mainda) und am 10.05.2012 (5 Ex. leg./coll. Mainda; 16 Ex. leg./coll. Esser) nachgewiesen werden. Die Anzahl der Tiere war so hoch, dass selbst vor dem Eingang zum Dachsbau die ersten Exemplare gefunden werden konnten. Als Beifang konnte *Trox scaber* (LINNÉ, 1767) nachgewiesen werden (6 Ex. leg./coll. Mainda; 1 Ex. leg./coll. Esser).

Lignyodes enucleator (PANZER, 1798) (Abb. 2)
Bisher war diese Rüsselkäferart (Curculionidae) für Brandenburg nur aus dem Elbe-Elstergebiet bekannt. Nun konnte die Art im Havelländischen Luch nördlich von Nauen, im Westen von Brandenburg nachgewiesen werden (10.05.2012, leg./coll. Mainda, 1 Ex.). Weitere Exemplare konnten ebenda unter einer Esche gekeschert werden (10.05.2012, leg./coll. Esser, 2 Ex.). An gleicher Stelle konnte eine weitere Rüsselkäferart, welche ebenfalls auf Esche lebt, nachgewiesen werden. *Stereonychus fraxini* (DE GEER, 1775) konnte beim Keschern unter den Eschen gefangen werden (10.05.2012, 1 Ex. leg./coll. Esser).
Es handelt sich bei dem Biotop um eine Feuchtwiese, welche als Viehweide genutzt wird. Der Wiesenrand wird von einigen Eschen begrenzt.

Abb. 1: *Anaspis humeralis* (FABRICIUS, 1775)
Foto: Christoph Benisch
www.kerbtier.de

Abb. 2: *Lignyodes enucleator* (PANZER, 1798)
Foto: Christoph Benisch
www.kerbtier.de

4. Danksagung

Jens Esser (Berlin) stellte seine Funddaten von *Trox eversmanni*, *Lignyodes enucleator* und *Stereonychus fraxini* zur Verfügung. Des Weiteren informierte er mich über die Verbreitung von *Lignyodes enucleator* in Brandenburg. Ihm sei an dieser Stelle für seine Unterstützung besonders gedankt. Außerdem danke ich Christoph Benisch (Mannheim) für die Bereitstellung der Bilder von *Anaspis humeralis* und *Lignyodes enucleator*.

5. Literatur

BARNDT, D. (2008): Beitrag zur Arthropodenfauna des Elbe-Elstergebietes (Land Brandenburg) mit besonderer Berücksichtigung des „Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft“ - Faunenanalyse und Bewertung - (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera part., Saltatoria, Araneae, Opiliones, Chilopoda, Diplopoda u.a.). – Märkische Entomologische Nachrichten 10, 1: 1-97

BÄSE, W. (2007): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsen-Anhalts und Brandenburgs. – Entomologische Nachrichten und Berichte 51, 1: 49-53.

ESSER, J. (2009): Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Brandenburgs und Berlins. – Märkische Entomologische Nachrichten, Sonderheft 5: 1-146.

ESSER, J. (2011): Zweiter Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Brandenburgs und Berlins: Neu- und Wiederfunde, Korrekturen und neue Funde wenig gemeldeter Arten. – Märkische Entomologische Nachrichten, 13, 2: 173-180.

Anschrift des Verfassers:

Tobias Mainda
Trappenweg 25
D-14641 Nauen
E-Mail: tmeinder@gmail.com

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Märkische Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: 2012_2

Autor(en)/Author(s): Mainda Tobias

Artikel/Article: Bemerkenswerte Käferfunde aus Brandenburg - Neufunde und Funde selten gemeldeter Arten (Coleoptera) 281-283