


Neu- und Wiederfunde sowie Ergänzungen zur Roten Liste und Gesamtartenliste der Blattkäfer (Chrysomelidae und Megalopodidae) Berlins von 2017



Uwe Heinig & Matthias Schöller

Summary

First records and new records as well as additions to the red list and comprehensive list of the leaf beetles (Chrysomelidae und Megalopodidae) of Berlin published in 2017

The comprehensive list of leaf beetles (Chrysomelidae and Megalopodidae) of Berlin (HEINIG & SCHÖLLER 2017) included 273 species. In the present publication, the following five species are listed as new compared to the comprehensive list of 2017: *Bruchidius siliquastri* (DELOBEL, 2007), *Bruchidius varius* (OLIVIER, 1795), *Cryptocephalus pygmaeus pygmaeus* FABRICIUS, 1792, *Galeruca interrupta* (ILLIGER, 1802), and *Psylliodes attenuata* (KOCH, 1803). *Gonioctena viminalis* (LINNÉ, 1758) was erroneously listed for Berlin, it was collected so far in Brandenburg only. Consequently the comprehensive list of leaf beetles of Berlin currently includes 277 species. *Lilioceris merdigera* (LINNÉ, 1758), rated as extinct in Berlin, was recorded again after more than 100 years. *Longitarsus nasturtii* (FABRICIUS, 1792) was recorded again after 65 years. *Aphthona erichsoni* (ZETTERSTEDT, 1838) has to be rated as extinct in Berlin. Records for a total of 79 species are listed after publication of the red list and comprehensive list of leaf beetles of Berlin (2017). Currently 54.5% and 29.6% of the species were recorded after the years 2000 and 2015, respectively. Moreover, collection localities are given in detail for those species where in the 2017 red list and comprehensive list merely the database CHRYFAUN was mentioned as source of the data.

Zusammenfassung

Die Gesamtartenliste der Blattkäfer (Chrysomelidae und Megalopodidae) von Berlin (HEINIG & SCHÖLLER 2017) umfasste 273 Arten. In der vorliegenden Arbeit werden folgende fünf Arten als neu gegenüber der Gesamtartenliste von 2017 verzeichnet: *Bruchidius siliquastri* (DELOBEL, 2007), *Bruchidius varius* (OLIVIER, 1795), *Cryptocephalus pygmaeus pygmaeus* FABRICIUS, 1792, *Galeruca interrupta* (ILLIGER, 1802), und *Psylliodes attenuata* (KOCH, 1803). *Gonioctena viminalis* (LINNÉ, 1758) wurde fälschlich aus Berlin gemeldet, diese Art wurde bislang nur in Brandenburg gefunden. Damit umfasst die Gesamtartenliste der Blattkäfer von Berlin jetzt 277 Arten. *Lilioceris merdigera* (LINNÉ, 1758) galt in Berlin als verschollen und wurde nach mehr als 100 Jahren erstmals wieder nachgewiesen. *Longitarsus nasturtii* (FABRICIUS, 1792) wurde nach 65 Jahren wieder in Berlin gefunden. *Aphthona erichsoni* (ZETTERSTEDT, 1838) muss in Berlin als ausgestorben gelten. Für insgesamt 79 Arten werden Nachweise nach Erscheinen der Roten Liste und Gesamtartenliste der Blattkäfer von Berlin (2017) gelistet. Aktuell wurden damit 54,5% der Arten nach dem Jahr 2000 und 29,6% der Arten nach dem Jahr 2015 nachgewiesen. Außerdem werden die Funddaten der Arten genannt, für die in der Roten Liste und Gesamtartenliste als Quelle lediglich Datenbank CHRYFAUN vermerkt wurde.

Einleitung

Die Rote Liste und Gesamtartenliste der Blattkäfer (Chrysomelidae und Megalopodidae) von Berlin erschien zunächst als Online-Publikation (HEINIG & SCHÖLLER 2017) und in gedruckter Form nun im vorliegenden Heft. Eine wichtige Datengrundlage für die Erstellung der Roten Liste war die Datenbank CHRYFAUN (SCHMITT et al. 2014), hier standen 1.585 Berliner Datensätze zur Verfügung. Die Fundorte aus diesen Datensätzen der letzten Nachweise wurden jedoch nicht in der Roten Liste publiziert, es wurde lediglich auf die Quelle verwiesen. Die Inhalte der Datenbank CHRYFAUN sind nicht öffentlich zugänglich und die detaillierten Funddaten sind auch nicht über das Verzeichnis und den Verbreitungsatlas der Käfer Deutschlands (BLEICH et al. 2020) abrufbar. Daher werden hier für alle Arten der Roten Liste und Gesamtartenliste der Blattkäfer Berlins für die ausschließlich CHRYFAUN als Quelle angegeben wurde die Funddaten gelistet. Außerdem werden Funde (überwiegend nach 2015) publiziert, die in der Roten Liste nicht mehr berücksichtigt werden konnten.

Neu- und Wiederfunde, Korrekturen

Bruchidius siliquastri (DELOBEL, 2007)

Neufund

Die Larven des Judasbaum-Samenkäfers entwickeln sich in den Schoten von Judasbäumen, Gattung *Cercis* (Abb. 1), die im Stadtgrün angepflanzt werden. Die Art stammt ursprünglich aus Ostasien (Neozoon) und hat sich in Mitteleuropa etabliert, in Deutschland wurde er 2011 erstmals nachgewiesen (HÖRREN et al. 2020). Die Berliner Funde sind die bislang nördlichsten, aus den angrenzenden Bundesländern liegen keine Funde vor (BLEICH et al. 2020). Fundorte: Köpenick, Bellevuepark, 24.04.2020, leg. und Coll. Esser (ESSER 2020); Steglitz-Zehlendorf, Botanischer Garten und Botanisches Museum, 16.XI.2019, Hülsen von *Cercis siliquastrum* eingetragen, leg. Hörren, aus Zucht am 17.XI.2019, det. et Coll. Hörren (HÖRREN et al. 2020).

Bruchidius varius (OLIVIER, 1795)

Neufund

Berlin-Französisch Buchholz, 05.IX.2019, leg. und Coll. Jens Esser (Lichtfalle) (ESSER 2019). Am 02.VI.2020 in Berlin-Pankow im Einsteinpark von einem weißblühenden Feuerdorn *Pyracantha* sp. (Rosaceae) geklopft (leg. und Coll. Matthias Schöller, 1 Weibchen). Die Larven des Klee-Samenkäfers entwickeln sich in Kleesamen *Trifolium* spp. Die Imagines besuchen Blüten, FUCHS und BUSSLER (2010) fanden sie auf Weißdorn *Crataegus* sp. Zum Zeitpunkt des Fundes in Berlin-Pankow war der Weißdorn bereits verblüht, die Imagines weichen dann offensichtlich auf Rosengewächse mit ähnlichen Blütenständen aus. In Deutschland war die Art früher nur im Südwesten zu finden, breitet sich in den letzten Jahren aber weiter nach Norden und Osten aus (RHEINHEIMER & HASSLER 2018). Mittlerweile liegen auch Funde aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vor (BLEICH et al., 2020).

Cryptocephalus pygmaeus pygmaeus FABRICIUS, 1792**Neufund**

Im Rahmen des GEO-Tages der Artenvielfalt am 25.VI.2016 in Berlin-Spandau, Eiskeller wurden auf einem Trockenrasen, auf dem u.a. Thymian wuchs, einer Fraßpflanze der Art, mehrere Exemplare des Thymian-Fallkäfers *Cryptocephalus pygmaeus pygmaeus* nachgewiesen (leg. und Coll. Uwe Heinig und Matthias Schöller). Es handelt sich um den Erstnachweis für das Berliner Gebiet. Im Sommer 2018 wurde die Art dann in einem Garten in Berlin-Reinickendorf, Ortsteil Tegel, der durch die Pflege heimischer Pflanzen ein Versuch ist, gegen das Insektensterben aktiv zu werden und wenig beachtete Gruppen wie Rüsselkäfer und Wanzen zu fördern (Langzeitbeobachtungen) an Sonnenröschen, Bohnenkraut und ebenfalls Thymian gefunden (26.VI.-3.VII., mehrere Exemplare zum Teil in Kopula (Abb. 2), Herbert Winkelmann, schriftl. Mitteilung). Das Auftreten von *Cryptocephalus pygmaeus pygmaeus* in Berlin deutet auf eine aktuelle Ausbreitung/Ansiedlung nach Norden hin, denn in den 20 Jahren davor wurde die Art nie in diesem Garten beobachtet.

Galeruca interrupta (ILLIGER, 1802)**Neufund**

Der Braune Feldbeifuß-Blattkäfer ist aktuell vor allem aus dem Rhein-Maingebiet sowie aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg nachgewiesen (BLEICH et al. 2020), wo sie auf sandigen Böden auftritt. Die Art lebt monophag an *Artemisia campestris* L. (BÄSE 2008). Aus Berlin waren keine Funde vor 1997 bekannt (HEINIG & SCHÖLLER, 1997). Fundorte in Berlin sind (ESSER 2020): Spandau, Südhafen, 25.V.2015, leg. J. Esser; Blankenfelde, Köppchensee 01.I.2005, leg. J. Esser; Karlshorst, Biesenhorster Sand, 23.V.2002, leg. Ch. Bayer und 1.I.2001, leg. J. Esser.

Psylliodes attenuata (KOCH, 1803)**Neufund**

In den Jahren 2016 bis 2020 trat der Hopfen-Erdflohkäfer *Psylliodes attenuata* massenhaft in Lichtenberg auf und wurde darüber hinaus 2020 in Treptow-Köpenick nachgewiesen (für Details siehe Schöller, S. 59-64 in diesem Heft).

Lilioceris merdigera (LINNÉ, 1758)**Wiederfund**

Ebenfalls beim GEO-Tag der Artenvielfalt am 25.VI.2016 in Berlin-Spandau, Eiskeller wurde auf Maiglöckchen das Maiglöckchenhähnchen *Lilioceris merdigera* gefunden. Der letzte publizierte Berliner Fund lag über 100 Jahre zurück (REINECK 1913). Aus dem Nordosten Deutschlands liegen für diese Art vergleichsweise wenige Funde vor (BLEICH et al. 2020).

Longitarsus nasturtii (FABRICIUS, 1792)**Wiederfund**

Lichtenberg, Wuhlheide, 7.V.2016, gekäschert, leg. M. Schöller. Der letzte publizierte Berliner Fund lag 65 Jahre zurück (STEINHAUSEN 1980). Fraßpflanzen des Braunen Beinwell-Erdflohs sind Raublattgewächse (Boraginaceae). Im Mai gefundene Exemplare der univoltinen Art hatten als Imago überwintert (STEINHAUSEN 2005). Aus Brandenburg sind neun Funde eingetragen, davon zwei nach 2000 (ESSER in BLEICH et al. 2020).



Abb. 1: Der Gewöhnliche Judasbaum *Cercis siliquastrum* im Bellevuepark in Berlin-Köpenick. Detail: Hülsen mit Schlupflöchern von *Bruchidius siliquastrum* (DELOBEL, 2007). Foto: Matthias Schöller




Abb. 2: *Cryptocephalus pygmaeus pygmaeus* FABRICIUS, 1792 auf Sonnenröschen, Foto: Herbert Winkelmann

Aphthona erichsoni (ZETTERSTEDT, 1838)**Korrektur**

Der Fundort des Wasserschlauch-Erdflohs *Longitarsus nigerrimus* (GYLLENHAL, 1827), in der Roten Liste Berlins mit „0“ eingestuft, und des Nördlichen Seggen-Erdflohs *A. erichsoni*, Einstufung „1“, ist derselbe. Nach einem Hinweis von Barndt (mündl. Mitteilung) müssen beide Arten in Berlin als ausgestorben angesehen werden, da das Habitat zerstört ist. Dies gilt obwohl die letzten Funde nach 1950 liegen und diese Arten formal in die Kategorie „1“ zu stellen wären. In seiner Arbeit über den Wiederfund der auch in Gesamt-Deutschland aktuell als ausgestorben eingestuften Art erwähnt BARNDT (2018) auch die Berliner Nachweise.

Gonioctena viminalis (LINNÉ, 1758)**Korrektur**

Falkenhagen b. Berlin (heute Gemeinde Falkensee), VI.1980, leg. Heinig, det. K.H. Mohr.

Die Überprüfung des Fundortes ergab, dass sich dieser nicht in Berlin, sondern bei Berlin befindet. Da kein weiterer Berliner Fund vorliegt ist der Rote Salweiden-Blattkäfer aus der Liste zu streichen.

Verzeichnis der Käfer Deutschlands online

Korrekturen

Bei einigen Einträgen das Stadtgebiet Berlins betreffend im Verzeichnis der Käfer Deutschlands online (BLEICH et al. 2020) handelt es sich um Fehler. *Coptocephala rubicunda* (LAICHARTING, 1781): gemeint ist *C. unifasciata* (SCOPOLI, 1763); *Mantura rustica* (LINNÉ, 1767): gemeint ist *M. chrysanthemi* (KOCH, 1803) (ESSER & KIELHORN 2005 und Esser, mündl. Mitt.). *Psylliodes laticollis* KUTSCHERA, 1864: Der Fund vom 20.IV.1984, leg. U. Arnold, stammt aus Strausberg, nicht aus Berlin, ein Belegexemplar steckt in Coll. Döberl in Coll. Arnold (Ulf Arnold, mündl. Mitt.).

Uns liegen keine Nachweise vor für *Aphthona lacertosa* (ROSENHAUER, 1847), die Art ist bisher in Deutschland nicht nachgewiesen; *Chrysomela collaris* LINNÉ, 1758: der Fundort „Schwanenkrug“, ein Lokal, liegt im Land Brandenburg; *Chrysomela tremula* FABRICIUS, 1787, die Meldung auch in CHRYFAUN betrifft *Chrysomela saliceti* (WEISE, 1884) (Esser, mündl. Mitt.); *Cryptocephalus anticus* SUFFRIAN, 1848, *Cryptocephalus sexpunctatus* (LINNÉ, 1758), *Longitarsus fulgens* (FOUDRAS, 1860), *Psylliodes tricolor* WEISE, 1888 und *Spermophagus sericeus* (GEOFFROY, 1785): die Belegexemplare für die Meldungen waren zur Überprüfung der Determination unauffindbar. Das Vorkommen der Arten muss bezweifelt werden.

Ergänzende faunistische Daten zur Roten Liste und Gesamtartenliste der Blattkäfer

Die Daten für die Rote Liste und Gesamtartenliste der Blattkäfer Berlins wurden im Herbst 2015 zusammengestellt, so dass eine gezielte Suche nach fraglichen Arten in diesem Jahr nicht mehr möglich war bzw. auch keine aktuellen Daten für ungefährdete Arten erhoben wurden. Daher werden alphabetisch für 79 Arten im Folgenden aktuellere Funddaten aufgeführt, in Klammern wird der letzte Nachweis laut Gesamtartenliste (RL) genannt.

Acanthoscelides obtectus (SAY, 1831)

Kreuzberg, Axel-Springer-Str., in Gebäude, 14.I.2011, leg. M. Schöller (RL: 2004)

Agelastica alni (LINNÉ, 1758)

Treptow-Köpenick, Krumme Lake, 25.VII.2020, vid. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 1.V.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 17.V.2017, Lichtenberg, Wuhlheide, 9.VI.2018 und 22.V. und 7.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2015)

Altica oleracea (LINNÉ, 1758)

Landschaftspark Johannisthal/Adlershof, 27.VIII. und 28.V.2020, leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020 und 3.VIII.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Wuhlheide, 22.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2002)

Altica quercetorum FOU DRAS, 1860 (Abb. 3)

Lichtenberg, Hegemeisterweg, auf *Quercus robur*, 13.VII.2016, leg. M. Schöller (RL: 2007)

Aphthona cyparissiae (KOCH, 1803)

Lichtenberg, Biesenhorster Sand, 01.VI.2020; Lichtenberg, Wuhlheide, 09.VII.2017 und 21.VIII.2016; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 29.VII.2017, 15.VII und 31.VII. 2016, alle leg. M. Schöller (RL: 2003)

Aphthona nonstriata (GOEZE, 1777)

Treptow-Köpenick, Krumme Lake, 25.VII.2020, leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 1.V.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Wuhlheide, Bruchwald, 07.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2005)



Abb. 3: *Altica quercetorum* FOU DRAS, 1860, der Eichen-Erdfloh hat deutschlandweit Verbreitungsschwerpunkte in Berlin und Umland sowie in der Niedersächsischen Elbtalaue, im Süden Deutschlands fehlt er weitgehend. Foto: Matthias Schöller

Bruchidius villosus (FABRICIUS, 1792)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020; Lichtenberg, Hegemeisterweg, auf *Cytisus scoparius*, 19.V.2016, alle leg. M. Schöller (RL: 2008)

Bruchus affinis FRÖLICH, 1799

Lichtenberg, Hegemeisterweg, 10.VI.2016, leg. M. Schöller (RL: 2005)

Bruchus brachialis FÄHRAEUS, 1839

Friedrichshain, Eldenaer Brücke/Eldenaer Straße, 25.VI.2020; Marzahn-Hellersdorf, Biesenhorster Sand, 01.VI.2020; Landschaftspark Johannisthal/Adlershof, 28.V.2020; Lichtenberg, Wuhlheide, 08.IV.2020; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 10.VI., 04.VI. und 19.V.2016, alle leg. M. Schöller (RL: 2015)

Bruchus luteicornis ILLIGER, 1794

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020, leg. U. Heinig und M. Schöller; Lichtenberg, Betriebsbahnhof Rummelsburg, 28.V.2020; Lichtenberg, Wuhlheide, 11.IV.2020; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 5.V.2018; alle leg. M. Schöller (RL: 2008)

Cassida denticollis SUFFRIAN, 1844

Lichtenberg, Wuhlheide, Trockenrasen, 4.VII.2020, 10.V.2018 und 9.VII.2017; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 13.VII.2016; Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016; alle leg. M. Schöller (RL: 2015)

Cassida margaritacea SCHALLER, 1783

Lichtenberg, Hegemeisterweg, 05.V.2018, 29.VII.2017 und 13.VII.2016; Lichtenberg, Wuhlheide, 10.V.2018, 7.V.2016; Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016; alle leg. M. Schöller (RL: 2006)

Cassida nebulosa LINNÉ, 1758

Lichtenberg, Wuhlheide, 28.IV.2018; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 19.IV.2018, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Cassida prasina ILLIGER, 1798

Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016, leg. M. Schöller (RL: 2006)

Cassida sanguinolenta O. F. MÜLLER, 1776

Lichtenberg, Wuhlheide, 4.VII. und 8.V.2020, 9.VI. und 10.V.2018, 22.V. und 31.VII. 2016; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 4.VI.2016; alle leg. M. Schöller (RL: 2006)

Cassida stigmatica SUFFRIAN, 1844

Lichtenberg, Biesenhorster Sand, 01.VI.2020; Lichtenberg, Wuhlheide, Bahntrasse, 10.V. und 21.V.2020; Landschaftspark Johannisthal/Adlershof, 28.V.2020, alle leg. M. Schöller; Wuhlheide, Trockenrasen, 9.VI. und 20.V.2018, 09.VII.2017; Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016; alle leg. M. Schöller (RL: 2011)

Cassida vibex LINNÉ, 1767

Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Cassida vittata VILLERS, 1789

Lichtenberg, Wuhlheide, 07.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2004)

Chaetocnema hortensis (FOURCROY, 1785)

Lichtenberg, Wuhlheide, 11.IV.2020 und 4.VII.2020, leg. M. Schöller; Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Chrysolina analis (LINNÉ, 1767)

Lichtenberg, Wuhlheide, 22.V.2016, leg. M. Schöller; Spandau, Staaken, Hahneberg, 24.IX.1993, leg. H. Winkelmann (RL: 1976)

Chrysolina geminata (PAYKULL, 1799)

Lichtenberg, Wuhlheide, 20.V.2018 und 22.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 1991)

Chrysolina hyperici (FORSTER, 1771)

Friedrichshain, Eldenaer Brücke/Eldenaer Straße, 25.VI.2020, leg. M. Schöller (RL: 2014)

Chrysomela populi LINNÉ, 1758

Lichtenberg, Wuhlheide, 05.V.2018 und 22.V.2016; Grunewald, Sandgrube, 02.V.2010, alle leg. M. Schöller (RL: 2008)

Chrysomela saliceti (WEISE, 1884)

Lichtenberg, Betriebsbahnhof Rummelsburg, 24.09.2020, auf *Populus nigra*-Hybriden; Pankow, Einsteinpark, 11.IX.2020, auf *Populus nigra*-Hybriden; Lichtenberg, Wuhlheide, bei Trabrennbahn auf *Salix purpurea*, 21.V. und 10.V.2020, leg. M. Schöller (RL: 2011)

Clytra laeviuscula RATZEBURG, 1837

Pankow, Mauerpark, auf *Salix* sp., 29.VI.2020, leg. M. Schöller; Pankow, Einsteinpark, auf *Populus nigra* 'Italica', 23.VI.2020, leg. M. Schöller; Landschaftspark Johannisthal/Adlershof, 28.V.2020, leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020, leg. U. Heinig und M. Schöller; Lichtenberg, Karlshorst, Umgeb. Trabrennbahn; 15.VII.2018 und 9.VI.2018, leg. M. Schöller, Lichtenberg, Wuhlheide, auf *Salix purpurea*, 09.VII.2017 und 15.VII.2016, leg. M. Schöller (RL: 2011)

Colaphus sophiae (SCHALLER, 1783)

Lichtenberg, Hegemeisterweg, 07.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2005)

Crepidodera aurata (MARSHAM, 1802)

Lichtenberg, Coppistr./Buchberger Str., 30.VI.2020, leg. M. Schöller; Lichtenberg, Wuhlheide, 22.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2014)

Crepidodera aurea (FOURCROIX, 1785)

Lichtenberg, Betriebsbahnhof Rummelsburg, 30.VI.2020, leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 1.V.2019, leg. U. Heinig (RL: 1984)

Crepidodera plutus (LATREILLE, 1804)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020, an *Salix alba*, leg. M. Schöller; Treptow-Köpenick, Neuenhagener Mühlenfließ, an *Salix alba*, 21.V.2020, leg. M. Schöller (RL: 1988)

Crioceris asparagi (LINNÉ, 1758)

Landschaftspark Johannisthal/Adlershof, 11.VI.2015, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Cryptocephalus bilineatus (LINNÉ, 1767)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020 und 8.VI.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Wuhlheide, 07.VII.2018, 09.VI.2018 und 9.VII.2017, leg. M. Schöller (RL: 2015)

Cryptocephalus fulvus GOEZE, 1777

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020, leg. U. Heinig und M. Schöller; Treptow-Köpenick, Wuhlheide, 04.VII.2020, leg. M. Schöller; Lichtenberg, Betriebsbahnhof Rummelsburg, 29.VI.2020, leg. M. Schöller; Berlin Marienfelde, Freizeitpark, 8.VI. und 3.VIII.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Wuhlheide, 07.VII.2018, 09.VI.2018 und 09.VII.2017; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 31.VII.2016, Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016; alle leg. M. Schöller (RL: 2015)

Cryptocephalus moraei (LINNÉ, 1758)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020; Lichtenberg, Betriebsbahnhof Rummelsburg, 29.VI.2020, alle leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 8.VI. und 3.VIII.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 28.VII.2016; Lichtenberg, Wuhlheide, 9.VI.2018, 9.VII.2017 und 21.VIII.2016; Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016, alle leg. M. Schöller (RL: 2008)

Cryptocephalus ocellatus DRAPIEZ, 1819

Schöneweide, Betriebsbahnhof Schöneweide, 28.V.2020, leg. M. Schöller; Lichtenberg, Betriebsbahnhof Rummelsburg, 22.V.2020 (RL: 2015)

Cryptocephalus rufipes GOEZE, 1777

Pankow, Einsteinpark, auf *Populus nigra* 'Italica', 23.VI.2020, leg. M. Schöller; Landschaftspark Johannisthal/Adlershof, auf *Salix* sp., 28.V.2020, leg. M. Schöller (RL: 2015)

Cryptocephalus sericeus (LINNÉ, 1758)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020, 8.VI. und 3.VIII.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Wuhlheide, 09.VII.2017, Hegemeisterweg, 15.VII.2016, leg. M. Schöller; Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Cryptocephalus vittatus FABRICIUS, 1775

Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016, leg. M. Schöller (RL: 2006)

Donacia marginata HOPPE, 1795 (Abb. 4)

Treptow-Köpenick, Wuhlheide, 03.VIII.2019, auf *Sparganium* sp., leg. M. Schöller (RL: 2014)

Epitrix pubescens (KOCH, 1803)

Treptow-Köpenick, Grünau, Krumme Lake, 25.VII.2020 und 1.V.2018, leg. M. Schöller (RL: 2005)

Galeruca tanacetii (LINNÉ, 1758)

Marzahn-Hellersdorf, Biesenhorster Sand, 01.VI.2020; Lichtenberg, Wuhlheide, 10.V.2020 und 09.VI.2018; Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016, alle leg. M. Schöller (RL: 2006)



Abb. 4: *Donacia marginata* HOPPE, 1795. Foto: Matthias Schöller

Galerucella grisescens (JOANNIS, 1866)

Grünau, Krumme Lake, 1.V.2018, leg. M. Schöller (RL: 2015)

Gastrophysa viridula (DE GEER, 1775)

Lichtenberg, bei Betriebsbahnhof Rummelsburg, Kraatz-Tränke-Graben, 18.VI.2020, leg. M. Schöller (RL: 2007)

Gonioctena quinquepunctata (LINNÉ, 1758)

Grünau, Krumme Lake, 1.V.2018, leg. M. Schöller (RL: 2014)

Hispa atra LINNÉ, 1767

Lichtenberg, Biesenhorster Sand, 01.VI.2020; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 08.V.2020, 31.VII.2016; Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016; Lichtenberg, Wuhlheide, 09.VI. und 10.V.2018, 15.VII.2016, alle leg. M. Schöller (RL: 2008)

Hypocassida subferruginea (SCHRANK, 1776)

Lichtenberg, Wuhlheide, 22.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2009)

Labidostomis longimana (LINNÉ, 1761)

Treptow-Köpenick, Krumme Lake, 25.VII.2020, vid. M. Schöller; Lichtenberg, Wuhlheide, 04.VII.2020, 9.VII.2017, leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 8.VI.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 15.VI. und 15.VII.2016; Spandau, Hakenfelde, Eiskeller, 25.VI.2016, leg. M. Schöller (RL: 2007)

Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)

Pankow, Prenzlauer Berg, 14.VII.2016, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Lochmaea crataegi (FORSTER, 1771)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VI.2019, leg. M. Schöller; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 19.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2005)

Longitarsus anchusae (PAYKULL, 1799)

Dahlem, Botanischer Garten, 23.V.1993, leg. M. Schöller (RL: 1953)

Longitarsus echii (KOCH, 1803)

Lichtenberg, Wuhlheide, 29.II.2020, leg. M. Schöller (RL: 2016)

Longitarsus melanocephalus (DE GEER, 1775)

Lichtenberg, Wuhlheide, 9.VI.2018, leg. M. Schöller (RL: 2005)

Longitarsus nigrofasciatus (GOEZE, 1777)

Lichtenberg, Wuhlheide, Bahntrasse, 21.V.2020; Wuhlheide 13.V.2018, leg. M. Schöller (RL: 2004)

Longitarsus parvulus (PANZER, 1794)

Lichtenberg, 27.IV.2001, leg. M. Schöller (RL: 2000)

Longitarsus pellucidus (FOUDRAS, 1860)

Lichtenberg, Karlshorst, Biesenhorster Sand, 1.I.2001, leg. J. Esser (RL: 1996)

Longitarsus pratensis (PANZER, 1794)

Lichtenberg, Wuhlheide, 11.IV.2020, 21.IV.2018 und 31.VII.2016, leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020 und 3.VIII.2019, leg. U. Heinig und M. Schöller (RL: 2008)

Longitarsus succineus (FOUDRAS, 1860)

Lichtenberg, Wuhlheide, 9.VI.2018, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Lythraria salicariae (PAYKULL, 1800)

Treptow-Köpenick, Grünau, Krumme Lake, 1.V.2018, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Mantura obtusata (GYLLENHAL, 1813)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VI.2019, leg. U. Heinig (RL: 1985)

Megabruchidius dorsalis FÄHRAEUS, 1839

Reinickendorf, Wittestraße, 15.01.2020, leg. Schneider; Mitte, Brunnenstraße, 18.10.2019 (RL: 2014)

Neocrepidodera ferruginea (SCOPOLI, 1763)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VI.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Hegemeisterweg, 16.VI.2016, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Neocrepidodera transversa (MARSHAM, 1802)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020, leg. M. Schöller; 8.VI.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Wuhlheide, Trockenrasen, 9.VI.2018, 9.VII.2017, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Oulema melanopus (LINNÉ, 1758)

Lichtenberg, Hegemeisterweg, 05.V.2018, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Oulema duftschmidi (REDTENBACHER, 1874)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VI.2019, leg. U. Heinig (RL: 2006)

Phaedon cochleariae (FABRICIUS, 1792)

Köpenick, Uhlenhorst, Wuhleufer, 23.VIII.2020, leg. M. Schöller (RL: 2005)

Phratora laticollis (SUFFRIAN, 1851)

Lichtenberg, Hegemeisterweg, 6.VIII.2016, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Phratora tibialis (SUFFRIAN, 1851)

Friedrichshain, Hermann-Blankenstein-Str., an *Salix purpurea*, 15.IX.2017, leg. M. Schöller (RL: 2011)

Phyllotreta armoraciae (KOCH, 1803)

Köpenick, Uhlenhorst, Wuhleufer, auf *Armoracia rusticana*, 23.VIII.2020, leg. M. Schöller; Wedding, Nordhafen, Mettmannplatz, auf *Armoracia rusticana*, 17.VI.2020, leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 1.V.2019, leg. U. Heinig (RL: 2000)

Phyllotreta vittula (REDTENBACHER, 1849)

Mitte, Luisenstraße, 02.IX.2020, leg. M. Schöller; Mitte, Chausseestraße, 29.VI.2020, leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 3.VIII.2019, leg. U. Heinig (RL: 2001)

Plagioderia versicolora (LAICHARTING, 1781)

Lichtenberg, Wuhlheide, 13.V.2018, leg. M. Schöller; Friedrichshain, Hermann-Blankenstein-Str., an *Salix purpurea*, 15.IX.2017, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Plagiosterna aenea (LINNÉ, 1758)

Treptow-Köpenick, Krumme Lake, 25.VII.2020, leg. M. Schöller (RL: 2006)

Podagrica fuscicornis (LINNÉ, 1767)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VI.2019, leg. U. Heinig; Lichtenberg, Betriebsbahnhof Rummelsburg, 6.VII.2019, 22.VI.2017, 26.VI.2016, leg. M. Schöller (RL: 2014)

Psylliodes chalcomerus (ILLIGER, 1807)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VI.2019, leg. U. Heinig (RL: 2011)

Psylliodes chrysocephalus (LINNÉ, 1758)

Lichtenberg, Prinzenviertel, Lichtfang, 15.IX.2020, leg. M. Schöller (RL: 2006)

Psylliodes dulcamarae (KOCH, 1803)

Wedding, Nordhafen, Mettmannplatz, auf *Solanum dulcamara*, 24.VI.2020; Treptow-Köpenick, Grünau, Krumme Lake, 1.V.2018, alle leg. M. Schöller (RL: 2000)

Psylliodes napi (FABRICIUS, 1792)

Lichtenberg, Wuhlheide, Erlenbruch, 11.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Pyrrhalta viburni (PAYKULL, 1799)

Friedrichshagen, Garten, VI.-VIII.2020 und Vorjahre an Schneeball-Gebüsch, vid. U. Heinig (RL: 2015)

Spermophagus calystegiae LUKJANOVITCH & TERMINASSIAN, 1957

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020, leg. M. Schöller; Treptow-Köpenick, Wuhlheide, 04.VII.2020; Lichtenberg, Wuhlheide, 10.V.2020 und 22.V.2016, leg. M. Schöller (RL: 2003)

Sphaeroderma rubidum (GRAELLS, 1858)

Lichtenberg, Umgeb. S-Bahn Storkower Str., 18.VIII.2020, leg. M. Schöller; Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020, leg. U. Heinig; Karlshorst, nahe S-Bahn Karlshorst, Lichtfang, 06.VIII.2020, leg. M. Schöller; Landschaftspark Johannisthal/Adlershof, 11.VI.2015, leg. M. Schöller (RL: 2008)

Sphaeroderma testaceum (FABRICIUS, 1775)

Marienfelde, Freizeitpark, 8.VIII.2020, leg. U. Heinig und M. Schöller; Lichtenberg, Karlshorst, Wuhlheide, 9.VI.2018, leg. M. Schöller (RL: 2006)

Aktuell wurden damit 54,5% der Arten nach dem Jahr 2000 und 29,6% der Arten nach dem Jahr 2015 nachgewiesen. An den aktuellen Nachweisen nach 2000 am stärksten vertreten waren mit jeweils über 70% der Arten die Megalopodidae, Criocerinae, Chrysomelinae und Cassidinae (Tabelle 1).

Tabelle 1: Nachweise von Blattkäfern in Berlin nach den Jahren 2000 bzw. 2015.

Taxon	Arten insgesamt	nach 2000	nach 2015	nach 2000 in %
Megalopodidae	4	4	0	100
Donaciinae	23	5	1	21,7
Criocerinae	11	8	3	72,7
Clytrini	7	4	2	57,1
Cryptocephalini	31	16	8	51,6
Lamprosomatinae	1	0	0	0
Eumolpinae	1	0	0	0
Chrysomelinae	42	31	14	73,8
Galerucini	20	13	5	65
Alticini	96	45	31	46,9
Cassidinae	19	15	10	78,9
Bruchinae	22	10	8	45,5
Total	277	151	82	54,5

Nachfolgend werden die Funddaten der Arten gelistet, für die in der Roten Liste und Gesamtartenliste lediglich CHRYFAUN vermerkt wurde. Die Abfolge der Arten entspricht der in der Roten Liste. Für alle weiteren Arten der Liste wurden in HEINIG & SCHÖLLER (2017) Sammlungen und Literaturzitate als Quelle angegeben, so dass die Fundangaben dort erfragt bzw. nachgelesen werden können.

Donacia dentata HOPPE, 1795

Berlin, 18.VII.1918, leg. ?, Coll. Michael Schmitt, Greifswald

Donacia tomentosa AHRENS, 1810

Spandau, 07.VII.1943, leg. ?, Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München

Zeugophora flavicollis (MARSHAM, 1802)

Pankow, Blankenfelde, Köppchensee, 21.VII.2009, leg. und Coll. Uwe Heinig, Berlin

Lema cyanella (LINNÉ, 1758)

Lübars, V.1977, leg. ?, Coll. Michael Schmitt, Greifswald

Oulema erichsonii (SUFFRIAN, 1841)

Spandauer Forst, 01.V.1952, leg. und Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München

Oulema duftschmidi (REDTENBACHER, 1874)

Pankow, Blankenfelde, NSG Kalktuffgelände, 21.VI.2006, leg. und Coll. Joachim Schulze, Berlin

Crioceris duodecimpunctata (LINNÉ, 1758)

Karlshorst, Bahnbrache Biesenhorster Sand, Stellwerk-Heizhaus, an *Asparagus*, 14.V.2003, leg. und Coll. Uwe Heinig, Berlin

Crioceris quatuordecimpunctata (SCOPOLI, 1763) (Abb. 5)

Karlshorst, Bahnbrache Biesenhorster Sand, Stellwerk-Heizhaus, an *Asparagus*, 14.V.2003, leg. und Coll. Uwe Heinig, Berlin



Abb. 5: *Crioceris quatuordecimpunctata* (SCOPOLI, 1763), links der Käfer, rechts die Larve auf Gemüse-Spargel *Asparagus officinalis*, das Vierzehnpunkt-Spargelhähnchen ist deutschlandweit schwerpunktmäßig in Berlin und Brandenburg verbreitet. Fotos: Matthias Schöller

Clytra laeviuscula RATZEBURG, 1837

Ahrensfelde, Eichpark, 22.V.2011, leg. und Coll. Matthias Schöller, Berlin

Smaragdina salicina (SCOPOLI, 1763)

Biesdorf, 7.V.1976, leg. und Coll. Arnfried Schwartz, Berlin

Cryptocephalus aureolus SUFFRIAN, 1847

Treptow, Flugfeld Johannisthal, 18.VI.2006, leg. Harald Fiedler, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Cryptocephalus hypochaeridis (LINNÉ, 1758)

Spandau, Schwanenkrug, 21.V.1946, leg. F. Ulrich, Coll. Arnfried Schwartz, Berlin. Der Fund von 1946 steht irrtümlich in der Roten Liste, „Schwanenkrug“, ein Lokal, liegt im Land Brandenburg. Ein älterer Fund, Buch i. Mark (gemeint ist Berlin-Pankow, Buch), 1919, leg. F. Bomke, coll. Fritz Bomke in coll. Jürgen Kurdas (Berlin) ist somit der letzte Berliner Nachweis dieser Art.

Cryptocephalus nitidus (LINNÉ, 1758)

Köpenick, FEZ Wuhlheide, 12.V.2003, leg. und Coll. Joachim Schulze, Berlin; Karlshorst, Bahnbrache Biesenhorster Sand, Stellwerk-Heizhaus, gestreift, 14.V.2003, leg. und Coll. Uwe Heinig, Berlin

Cryptocephalus decemmaculatus (LINNÉ, 1758)

Zehlendorf, Grunewald, Paulsborner Moor, 13.V.1948, leg. ?, Coll. Erdmann Griep, im Naturkundemuseum Potsdam, Potsdam

Bromius obscurus (LINNÉ, 1758)

Wilhelmshagen, 02.V.1987, vid. Uwe Heinig

Chrysolina coerulans (SCRIBA, 1791)

Pankow, Schildow, NSG Niedermoorwiesen, an Pfefferminze, 30.V.1996, leg. Moeck.

Bemerkung: Dieser Fund stellt den einzig bislang bekannten in Berlin dar, das Vorkommen von *C. coerulans* in Berlin muss überprüft werden. Auffällig ist der gleiche Fundort und -tag zur folgenden *C. herbacea*, möglicherweise liegt hier eine Fehlbestimmung vor.

Chrysolina herbacea (DUFTSCHMID, 1825)

Pankow, Schildow, NSG Niedermoorwiesen, an Pfefferminze, 30.V.1996, leg. Moeck.

Bemerkung: siehe vorherige Art, es liegt ein weiterer sicherer Nachweis mit folgenden Funddaten vor: Pankow, Blankenfelde, Köppchenseegebiet, 18.05.1993, an *Mentha aquatica*, leg. G. Jaeschke in Coll. Uwe Heinig, Berlin.

Chrysolina staphylaea (LINNÉ, 1758)

Pankow, Bucher Schloßpark, 21.I.1989, leg. Gerhard Jaeschke, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Chrysolina sturmi (BEDEL, 1892)

Köpenick, Friedrichshagen, 5.VIII.2008, vid. Uwe Heinig

Chrysolina sanguinolenta (LINNÉ, 1758)

Karlshorst, Bahnbrache Biesenhorster Sand, 17.V.2001, leg. Thomas Ziska, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Chrysolina gypsophylae (KÜSTER, 1845)

Rahnsdorf, Hessenwinkel, Trockenrasen, Sand/Kies, 2.IX.2000, leg. und Coll. David W. Wrase, Gusow-Platkow

Chrysolina carnifex (SUFFRIAN, 1851)

Karlshorst, Bahnbrache Biesenhorster Sand, 23.V.2002, leg. und Coll. Christoph Bayer, Berlin

Chrysolina analis (LINNÉ, 1767)

Köpenick, Friedrichshagen, Krummendammer Heide, 9.X.1976, leg. und Coll. Uwe Heinig, Berlin

Phaedon armoraciae (LINNÉ, 1758)

Diese Art stand mit keinem Berliner Eintrag in CHRYFAUN. Die Angabe der Quelle (CHRYFAUN 2000) ist damit nicht nachvollziehbar. Inzwischen wurden aber zwei Berliner Funde bekannt: Kreuzberg, Görlitzer Park, 20.05.2014, leg. Jens Esser (Esser schriftliche Mitteilung); Grunewald, 11.VII.1936, Coll. M. Schöller ex Coll. Lars Hendrich.

Prasocuris marginella (LINNÉ, 1758)

Neukölln, Rudow, Klarpfuhl, 2.I.1990, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Gonioctena olivacea (FORSTER, 1771)

Gatow, Heide, 17.V.1987, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Phratora atrovirens (CORNELIUS, 1857)

Frohnau, 3.VI.1978, leg. ?, Coll. Reinhard Geiter, Staßfurt

Neogalerucella calvariensis (LINNÉ, 1767)

Spandau, Tiefwerder, 16.V.1988, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Neogalerucella pusilla (DUFTSCHMID, 1825)

Großer Tiergarten, 11.V.2005, leg und Coll. Uwe Heinig, Berlin

Galeruca pomonae (SCOPOLI, 1763)

Köpenick, Wilhelmshagen, V.1985, leg. Bernd Hermann, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Galeruca laticollis SAHLBERG, 1837

Berlin, Hermsdorf, Hermsdorfer See, an *Thalictrum*, 18.VI.1977, leg. ?, Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München und Coll. Reinhard Geiter, Staßfurt; weitere Nachweise am selben Fundort: 18.V.1977, ex larva, leg. Walter Steinhausen, Coll. Reinhard Geiter, Staßfurt und Coll. Uwe Heinig, Berlin

Galeruca melanocephala PONZA, 1805

Berlin, 1928, leg. Veldkamp, Coll. Dieter Siede, Retterath

Galerucella nymphaeae (LINNÉ, 1758)

Neukölln, Teltow-Kanal, 18.V.1992, auf *Rumex*, leg. und Coll. M. Schöller, Berlin

Luperus longicornis (FABRICIUS, 1781)

Spandau, Hahneberg, Trockenwiese, 29.V.1990, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Phyllotreta armoraciae (KOCH, 1803)

Treptow, Teltowkanal, 2.V.2000, leg. und Coll. Christoph Bayer, Berlin

Phyllotreta flexuosa (ILLIGER, 1794)

Zehlendorf, Grunewald, NSG Teufelsfenn, 27.I.1993, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Phyllotreta striolata (ILLIGER, 1803)

Biesdorf, V.1976, leg. Kurt Preidel, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Phyllotreta ochripes (CURTIS, 1837)

Reinickendorf, Tegel, 9.II.2006, leg. F. Theinert, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Phyllotreta exclamationis (THUNBERG, 1784)

Berlin-Zehlendorf, Grunewald, NSG Teufelsfenn, 27.I.1993, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Phyllotreta atra (FABRICIUS, 1775)

Zehlendorf, Grunewald, NSG Teufelsfenn, 27.I.1993, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Phyllotreta scheuchi HEIKERTINGER, 1941

Biesdorf, 19.VI.1978, leg. Arnfried Schwarz; ein weiterer früherer Nachweis am selben Fundort: 4.V.1978, leg. Arnfried Schwarz, Berlin (je 1 Ex. Coll. Karl-Heinz Mohr, SDEI und Coll. Uwe Heinig)

Phyllotreta nigripes (FABRICIUS, 1775)

Tierpark, 13.V.1971, leg. Kurt Preidel, Coll. Uwe Heinig

Phyllotreta nodicornis (MARSHAM, 1802)

Frohnau, 28.V.1978, leg. ?, Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München

Aphthona cyparissiae (KOCH, 1803)

Karlshorst, Bahnbrache Biesenhorster Sand, Stellwerk-Heizhaus, gestreift, 14.V.2003, leg und Coll. Uwe Heinig; Köpenick, Wuhlheide, FEZ, Park, gestreift, 13.V.2003, leg. und Coll. Joachim Schulze, Berlin

Aphthona nonstriata (GOEZE, 1777)

Mitte, Großer Tiergarten, 11.V.2005, leg und Coll. Uwe Heinig, Berlin

Longitarsus atricillus (LINNÉ, 1761)

Neukölln, Rudower Fließ, V.1985, leg. Georg Möller, Wadern

Longitarsus jacobaeae (WATERHOUSE, 1858)

Frohnau, 10.X.1976, leg. ?, Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München

Longitarsus symphyti HEIKERTINGER, 1912

Spandau, 16.IX.1950, leg. Boljahn, Coll. Manfred Döberl in Coll. Ulf Arnold, Fredersdorf

Longitarsus rubiginosus (Foudras, 1860)

Neukölln, Rudower Fließ, VIII. und X.1985, leg. und Coll. Georg Möller, Wadern

Longitarsus ferrugineus (FOUDRAS, 1860)

Frohnau, 10.VIII.1962, leg. Walter Steinhausen, Coll. Reinhard Geiter, Staßfurt

Longitarsus exsoletus (LINNÉ, 1758)

Karlshorst, Bahnbrache Biesenhorster Sand, Stellwerk-Heizhaus, gestreift, 14.V.2003, leg und Coll. Uwe Heinig

Longitarsus ballotae (MARSHAM, 1802)

Frohnau, 8.X.1978, leg. ?, Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München

Longitarsus quadriguttatus (PONTOPPIDAN, 1765)

Mitte, Großer Tiergarten, 11.V.2005, leg und Coll. Uwe Heinig, Berlin

Longitarsus luridus (SCOPOLI, 1763)

Köpenick, Müggelsee, 4.X.1996, leg. und Coll. Jens Esser, Berlin

Longitarsus parvulus (PAYKULL, 1799)

Grünau, Krumme Lake, 1.IX. und 23.X.2000, leg. und Coll. Joachim Schulze, Berlin

Altica quercetorum FOUDRAS, 1860

Köpenick, Wuhlheide, Jg.325, 15.X.2007, leg. und Coll. Joachim Schulze, Berlin

Altica impressicollis (REICHE, 1862)

Pankow, Blankenfelde, Köppchenseegebiet, 10.V.1992, leg. Gerhard Jaeschke, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Hippuriphila modeeri (LINNÉ, 1761)

Hermsdorf, Hermsdorfer See, 25.VI.1977, leg. ?, Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München; ein weiterer Nachweis mit denselben Funddaten: leg. Walter Steinhausen, Coll. Reinhard Geiter, Staßfurt

Crepidodera aurea (FOURCROIX, 1785)

Spandau, Tiefwerder, 4.V.1984, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Crepidodera plutus (LATREILLE, 1804)

Berlin, 29.VIII.1988, leg. ?, Coll. Dieter Siede, Retterath

Mantura obtusata (GYLLENHAL, 1813)

Charlottenburg, SFB-Gelände Stallupöner Allee, V.1985, leg. und Coll. Georg Möller, Wadern

Chaetocnema concinna (MARSHAM, 1802)

Köpenick, 21.V.2009, leg. und Coll. Joachim Schulze, Berlin

Chaetocnema aridula (GYLLENHAL, 1827)

Köpenick, Wilhelmshagen, Püttberge, 24.XII.2005, leg. Christoph Bayer, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Chaetocnema arida FOUDRAS, 1860

Lübars, 25.I.1990, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Chaetocnema sahlbergi (GYLLENHAL, 1827)

Spandauer Forst, Kuhlake, 30.IX.1951, leg. ?, Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München

Dibolia occultans (KOCH, 1803)

Frohnau, an *Prunella*, 5.VIII.1978, leg. ?, Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München

Psylliodes picinus (MARSHAM, 1802)

Pankow, Buch, Hufelandkrankenhaus, 22.V.1987, leg. Gerhard Jaeschke, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Psylliodes chrysocephalus (LINNÉ, 1758)

Reinickendorf, Fließtal, Köppchensee W, 11.I.2006, leg. Christoph Bayer, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Psylliodes sophiae HEIKERTINGER, 1914

Frohnau, 13.X.1978, leg. ?, Coll. Walter Steinhausen in Zoologische Staatssammlung München

Psylliodes dulcamarae (KOCH, 1803)

Grünau, Krumme Lake, Barberfalle Gewässerrand, 18.V.2000, MTB 3547, leg. Bernd Nickel, Coll. Uwe Heinig, Berlin

Psylliodes cucullatus (ILLIGER, 1807)

Friedrichshain, 5.VII.1983, leg. Arnold. Ein weiterer früherer Fund: Köpenick Umg., 10.07.1968, leg. K. Preidel, det. M. Döberl, Coll. Uwe Heinig.

Cassida panzeri WEISE, 1907

Spandau, Hahneberg, 1.V.1993, leg. und Coll. Herbert Winkelmann, Berlin

Bruchidius marginalis (FABRICIUS, 1776)

Treptow, ehemaliger Mauerstreifen, 26.V.1999, leg. und Coll. Jens Esser, Berlin

Dank

Die Autoren danken Ulf Arnold, Jens Esser, Michael Schülke und Herbert Winkelmann (alle Berlin) für die Hilfe bei der Datenrecherche und die Möglichkeit, ihre Daten zu verwenden. Herbert Winkelmann danken wir zudem für das Foto der *Cryptocephalus pygmaeus pygmaeus*.

Literatur

- BÄSE, W. (2008). Die Käfer des Wittenberger Raumes (Insecta: Coleoptera). – Naturwissenschaftliche Beiträge aus dem Museum Dessau 20: 1-500.
- BARNDT, D. (2018): Wiederfund von *Aphthona erichsoni* (ZETTERSTEDT, 1838) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Deutschland. – Märkische Entomologische Nachrichten 20 (1): 87-96.
- BLEICH O., GÜRLICH S. & F. KÖHLER (2020): Verzeichnis und Verbreitungsatlas der Käfer Deutschlands. – World Wide Web electronic publication www.coleokat.de [28.8.2020]
- ESSER, J. (2019): Zehnter Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Brandenburgs und Berlins. – Märkische Entomologische Nachrichten 21(2): 229-236.

- ESSER, J. (2020): Teilverzeichnis Brandenburg. In: BLEICH O., GÜRLICH S. & F. KÖHLER (2019): Verzeichnis und Verbreitungsatlas der Käfer Deutschlands. – World Wide Web electronic publication www.coleokat.de [28.8.2020]
- FUCHS, H. & H. BUSSLER (2010): 27. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen (Coleoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen 59(1/2): 15–17.
- HEINIG, U. & M. SCHÖLLER (1997): Liste der Blatt- und Samenkäfer von Berlin und Brandenburg (Coleoptera; Chrysomelidae, Bruchidae). – Novius 21: 460-497.
- HEINIG, U. & M. SCHÖLLER (2017): Rote Liste und Gesamtartenliste der Blattkäfer (Coleoptera: Chrysomelidae und Megalopodidae) von Berlin. In: DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE / SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT (Hrsg.): Rote Listen der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere von Berlin, 38 S. – doi: 10.14279/depositonce-5855
- HÖRREN, TH, BODINGSBAUER, S. & G. KATSCHAK (2020): Erstnachweise des Samenkäfers *Bruchidius siliquastri* Delobel, 2007 in Nordrhein-Westfalen sowie Berlin/Brandenburg (Coleoptera: Chrysomelidae, Bruchinae). – Entomologische Zeitschrift 130/2:113-116.
- REINECK, G. (1913): Nachträge zu Schilskys „Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg (Col.) III. Chrysomelidae. – Deutsche Entomologische Zeitschrift 58: 525–528.
- RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER (2018): Die Blattkäfer Baden-Württembergs. – Karlsruhe (Kleinstauber Books), 928 S.
- SCHMITT, M., BÄASE, W., BEENEN, R., DROVENIK, B., FRITZLAR, F., GEISER, E., JÄCKEL, R., LANGER, M., MAUSER, J., RINGEL, H., SCHÖLLER, M. & D. SIEDE (2014): Das Projekt CHRYFAUN - Faunistik der mitteleuropäischen Blatt- und Samenkäfer (Chrysomelidae s. l.). – Entomologische Blätter und Coleoptera 110: 33-38.
- STEINHAUSEN, W. (1980): Blattkäfer in Westberlin, Ergebnis einer fast 30jährigen Sammeltätigkeit (Coleoptera, Chrysomelidae). – Entomologische Blätter 75: 163-171.
- STEINHAUSEN, W. (2005): Phänologie mitteleuropäischer Blattflohkäfer (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). – Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 92: 221-232.

Anschriften der Verfasser:

Uwe Heinig
Löcknitzstraße 39
12587 Berlin
E-mail: uweheinig@t-online.de

Dr. Matthias Schöller
Humboldt-Universität zu Berlin
Lebenswissenschaftliche Fakultät
Lentzeallee 55/57
14195 Berlin
E-mail: Matthias.Schoeller@hu-berlin.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Märkische Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 2020

Band/Volume: [2020_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Heinig Uwe, Schöller Matthias

Artikel/Article: [Neu- und Wiederfunde sowie Ergänzungen zur Roten Liste und Gesamtartenliste der Blattkäfer \(Chrysomelidae und Megalopodidae\) Berlins von 2017 39-58](#)