

expansiusculum, margine basali subrectilineari, incisura brevi a columella separato. — Operc. membranaceum, pale
lide carneum. — Diam. maj. $5\frac{1}{2}$, min. 5, alt. $3\frac{2}{3}$ mill.

Alcadia Gundlachi Pfr. in litt.

Habitat in insula Cuba, unde tria specimina misit Dr. Gundlach.

Neue Auriculaceen.

Vom Dr. L. Pfeiffer.

1. *Cassidula Gruneri Pfr.*

T. subperforata, ovato-oblonga, solidula, longitudina-
liter minute striata, sulcis spiralibus confertis (prope sutu-
ram profundioribus, distantioribus) decussata, nigro-fusca,
saepe erosa; spira convexo-conoidea, obtusa; sutura linea-
ris; anfr. fere 5 convexiusculi, ultimus $\frac{2}{3}$ longit. aequans,
ovatus, basi subattenuatus, obsolete tuberculatus; apertura
vix obliqua, semiovalis; plica parietalis 1 compressa, sub-
transversa; plica columellaris paulo minor, illi parallela;
perist. simplex, margine dextro antice subcontracto, vix
reflexiusculo, intus paulo supra medium unidentato, colu-
mellari dilatato, tenui, subpatente. — Long. 7, diam. $4\frac{1}{2}$
mill. Ap. 5 mill. longa, $1\frac{1}{3}$ lata.

Hab. in ins. Borneo (Gruner).

2. *Alexia obsoleta Pfr.*

T. imperforata, ovato-elliptica vel subturrita, tenuis,
levissime striatula, non nitens, purpureo-castanea vel cerea;
spira convexiusculo-conica, acuta; sutura linea impressa
marginata; anfr. 8 convexiusculi, ultimus spiram vix su-
perans, interdum varicosus, basi subattenuatus; apertura
parum obliqua, semiovalis; plica parietalis 1 valida, com-
pressa, intrans, inframediana, rarissime accidente supera
nodiformi obsoleta; plica colum. callosa, torta, obliqua;
perist. breviter expansum, intus labiatum, edentulum, mar-

gine columellari reflexo, subadnato. — Long. 10, diam. 4—4 $\frac{1}{2}$ mill. Ap. 5 mill. longa, 2 lata.

Habitat in muris portus Tergestini!

3. *Melampus Redfieldi Pfr.*

T. subrimata, ovata, solidula, striatula, nitidula, albida, fasciis variis spadiceis plerumque interruptis subtessellata; spira brevis, convexo-conoidea, acuta; sutura vix impressa; anfr. 9—10 planiusculi, ultimus $\frac{3}{4}$ longit. fere formans, superne obsolete angulatus, basi attenuatus; apertura vix obliqua, oblonga, supra basin subdilatata; plicae parietal. 2, supera major, transversa, altera approximata, dentiformis; plica columellaris acuta, arcuatim in marginem basalem continuata; perist. simplex, margine dextro superne subsinuato, tum fere stricto, intus serie profunda plicularum brevium confertissimarum munito, columellari calloso, albo, subappresso. — Long. 12, diam. max. 7 mill. Ap. 10 mill. longa, medio $2\frac{1}{3}$ lata. (Ded. Cl. Redf.)

Hab. Bermuda.

Affinis *M. coffeae*, plicis marginis dextri statim distinguendus.

Skizze einer Monographie der Gattung
Achatinella Swains.

Vom Dr. L. Pfeiffer.

Die durch ihr isolirtes geographisches Vorkommen so interessante Gattung *Achatinella* zählte im Jahre 1848 nur 28 bekannte Arten, hat sich aber seitdem auf überraschende Weise vermehrt. Schon Reeve gab in seiner trefflichen Conch. icon. (1850) Abbildungen von 45 Arten, welche freilich nach meiner Ansicht theilweise nur auf den Rang von Varietäten Anspruch machen können. Ungeachtet der Einziehung einiger Reevescher Arten konnte ich im Jahre 1853 im Supplemente meiner Monographie

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Neue Auriculaceen. 111-112](#)