

und mein *Poeyanum* als *moestum* Shuttl. var. *min.* zu bezeichnen. —

Ueber die anderen zweifelhaften Arten der D'Orbigny'schen Sammlungen von Cuba, Südamerika und den Canarischen Inseln werde ich demnächst weitere Mittheilungen zu machen im Stande sein.

Beiträge zur Molluskenfauna Westindiens.

Vom Dr. L. Pfeiffer.

Neuere Sendungen der Herren Poey und Gundlach auf Cuba, des Hrn. Riise auf St. Thomas, und andere in England erhaltene Mittheilungen setzen mich in den Stand, sowohl das bisher unbekannte specielle Vaterland einiger interessanter Arten anzugeben, als auch eine Reihe neuer Arten, vorzüglich von der bisher wenig untersuchten Insel St. Croix, zu beschreiben.

Zunächst ersah ich aus einer Sendung des Hrn. Bland an Cuming, dass *Helix cognata* Fér. von Jamaica stammt, obwohl Professor C. B. Adams diese ansehnliche Art noch nicht als Bewohnerin der genannten Insel kannte, was aber weniger befremdlich sein kann, da noch mehrere schöne Arten seitdem dort gefunden und von Hrn. Chitty beschrieben worden sind. Die Verbreitungsbezirke einzelner Schnecken scheinen, namentlich in Westindien, so beschränkt zu sein, dass jede abgelegene Quadratruthe Landes möglicherweise noch neue Arten beherbergen kann. Ein auffallendes Beispiel der Art bemerkte ich auf Cuba, wo auf der einen Seite eines zum Flusse Canimar herabführenden, mit Bambus bepflanzten Hohlweges nur *Cylin-drella crispula*, auf der anderen bei übrigens ähnlichen Verhältnissen nur *variegata* lebte.

Ferner befand sich in jener Sammlung die in den älteren englischen Sammlungen so häufige, aber in der neuesten Zeit nie von Reisenden mitgebrachte oder eingesandte schöne *Helix formosa Fér.*, von der Insel Antigua und als weitere Belehrung bemerke ich, dass die *Cylindrella Adamsiana Chitty* Contr. p. 13, nec *Pfr.* nunmehr von ihrem Autor als *Cyl. Bacquieana* bezeichnet worden ist.

Unter den letzten Mittheilungen von Cuba befanden sich ausser einigen schönen Arten aus der Gruppe der *H. auricoma*, deren Beschreibung durch Hrn. Dr. Gutierrez ich nicht vorgreifen will, mehrere neue Arten, welche ich zu publiciren aufgefordert worden bin. Es sind folgende:

1) *Helix transitoria Pfr.* — T. umbilicata, conoideo-depressa, solida, oblique leviter striata, lutea vel cinnamomea, fascia 1 lata nigra ad peripheriam ornata; spira conoideo-convexa, obtusa; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus carinatus, antice gibbosus et angulatim deflexus, basi subplanulatus; umbilicus apertus, pervius, $\frac{1}{5}$ diametri fere aequans; apertura fere horizontalis, lanceolata, intus lactea; perist. crassum, album, marginibus callo crasso junctis, supero subreflexo, basali leviter arcuato, late reflexo. — Diam. maj. 39, min. 34, alt. 16 mill. — Hab. Bayamo ins. Cubae.

Diese Art bildet gleichsam einen Uebergang von *H. Sagemon Beck* zu *H. Bornii Chemn.*, und bleibt sich, wie mir Prof. Poey schreibt, in mehr als 80 erhaltenen Exemplaren fast ganz gleich.

2) *Cylindrella planospira Pfr.* — T. breviter rimata, cylindraceo-turrita, truncata, oblique capillaceo-striata, nitida, pallide cornea; spira superne parum attenuata; anfr. superst. 13 planiusculi, ultimus antrorsum breviter solutus, confertim costulatus, basi vix compressus; apertura obliqua, subcircularis; perist. album, undique aequaliter expansum et re-

flexiusculum. — Long. $15\frac{1}{2}$, diam. 3 mill. Apert. diam. $2\frac{1}{2}$ mill. — Cuba. (Poey Nr. 156. Taf V. F. 4, 5.)

Sie ähnelt einigen Formen der *Cyl. elegans*, ist aber durch die fast platten Umgänge sogleich zu unterscheiden.

3) *Cylindrella cyclostoma* Pfr. — T. non rimata, cylindracco-subulata, costis chordaeformibus, subarcuatis, subconfertis sculpta, subopaca, pallide cornea; spira gracilis, ab anfractu penultimo sursum regulariter attenuata, apice acuta vel breviter truncata; anfr. 26–29 convexiusculi, ultimus angustior, breviter solutus, descendens, confertius costulatus; apertura diagonalis, circularis; perist. album, undique aequaliter expansum. — Long. 20, diam. max. 2 mill. Apert. diam. 2 mill. — Hab. in montibus prope Camoa insulae Cubae. (Taf. V. F. 6, 7.)

Mit *Cyl. gracillima* Poey nahe verwandt; unterscheidet sich von derselben ausser der (mehr oder weniger ausgeprägten) Sculptur constant durch die regelmässige Verjüngung des Gewindes vom vorletzten Umgange bis zur Spitze, durch convexere Windungen u. s. w.

4) *Cylindrella Camoënsis* Pfr. — T. non rimata, subfusiformi-subulata, tenuis, oblique chordato-costata, diaphana, cornea, albido subvariegata; spira gracilis, infra medium vix ventrosior, apice acuta; anfr. 20–21 parum convexi, ultimus angustior, deorsum protractus; apertura diagonalis, circularis; perist. tenue, album, undique aequaliter expansum. — Long. 12, diam. max. vix 2 mill. Apert. diam. $1\frac{2}{3}$ mill. — Hab. Camoa ins. Cubae. (Taf. V. F. 8, 9.)

Nahe verwandt mit *C. Philippiana* (aculeus Mor.), aber viel schlanker, feiner gerippt, mit zahlreicheren, weniger gewölbten Umgängen, kleinerer Mündung.

In der obenerwähnten ausgezeichneten Sendung des Hrn. Riise befanden sich:

a. von der Insel Tortola:

schöne Exemplare von *Bul. Guildingi*, *Helix nemoralina* Pet., eine ausgezeichnete Varietät des *Cycl. Newcombianum*

Ad. und interessante Formen der *Helix notabilis* Shuttl. (Malak. Bl. 1854. S. 167. — Vgl. meine Bemerkung bei den Schnecken von St. Thomas.)

b. von der Insel St. Croix.

1. *Cyclostoma rufilabrum* Beck in mehrern Grössenvarietäten, von den Pflanzungen Câne Bay und Rust op Twist im nördlichen Theile der Insel, nur an der giftigen *Hippomane Mancinella* Linn., aber dort in Menge lebend. Die Art ist völlig identisch mit *Cycl. bilabre* Menke, hinsichtlich dessen mir Geh. Hofrath Menke schreibt, dass er selbst zweifle, dass seine Exemplare wirklich in Australien gesammelt seien. Der Beck'sche, obwohl vom Autor nicht publicirte Name, muss in Folge seiner Anerkennung durch Potiez und Michaud, wie auch in Sowerby's Thesaurus, den Vorrang behalten.

2. *Chondropoma Santacruzense* Pfr. — T. perforata, oblongo-turrita, tenuiuscula, costis longitudinalibus membranaceis, undulatis, confertis sculpta, haud nitens, corneorubella, seriebus punctorum ruforum et fascia 1 basali ornata; spira subregulariter attenuata, truncata; sutura dentibus inaequalibus distantibus crenata; anfr. superst. $4\frac{1}{2}$ modice convexi, ultimus antice vix solutus; apertura verticalis, ovalis, superne subangulata; perist. duplex: internum vix expansum, externum patens, ad anfr. penultimum subexcisum, sursum et infra perforationem dilatatum. — Operc. planum, griseum. — Long. $11\frac{1}{2}$ –12, diam. 5– $5\frac{1}{2}$ mill. Ap. 4 mill. longa, 3 lata. — Hab Spring Gutt prope Christiansted insulae St. Croix.

3 *Cyclostoma basicarinatum* Pfr. — T. vix perforata, oblongo-turrita, truncata, spiraliter lirata, costulisque confertis, subinterruptis (3–4 fasciculum formantibus) sculpta, decolorata, vestigia fasciarum interruptarum fuscularum monstrans; spira subregulariter attenuata; sutura confertim denticulata; anfr. superst. 5 parum convexi, ultimus antice breviter solutus, basi carinis 2–3 validis munitus; apertura

subverticalis, angulato-ovalis; perist. duplex: internum vix expansum, externum patens, superne et latere sinistro dilatatum. Long. 18—19, diam. 7—8 mill. Ap. 5—6 mill. longa. — Legitur subfossile in La Grange prope Frederiksted insulae St. Croix. (Taf. IV. F. 2, 3.)

4. *Cyclostoma chordiferum* Pfr. — T. angustissime perforata, oblongo-turrita, truncata, spiraliter obsolete lirata et confertissime chordato-costulata, decolorata; spira subregulariter attenuata; sutura confertim denticulata; anfr. superst. $4\frac{1}{2}$, parum convexi, ultimus antice breviter solutus, basi liris 6—7 elevationibus munitus; apertura angulato-ovalis; perist. duplex: internum expansum, vix prominulum, externum undique subaequaliter patens. — Long. 19—23, diam. 8— $9\frac{1}{2}$ mill. Ap. $5\frac{2}{3}$ —7 mill longa. — Legitur subfossile in „Bülow's Minde“ insulae St. Croix. (Taf. IV. F. 1.)

5. *Cylindrella chordata* (Trachelia) Pfr. — T. vix rimata, cylindraceo-turrita, truncata, tenera, subtilissime striata et costulis chordaeformibus, subdistantibus munita, albida; sutura costis excurrentibus crenata; anfr. superst. 11—12 vix convexiusculi, ultimus antice solutus, breviter descendens, latere dextro angulatus, basi acute carinatus: carina filiformi, crenata; apertura obliqua, subtetragonorotunda; perist. album, continuum, undique breviter expansum. — Long. 10, diam. $2\frac{1}{2}$ mill. Ap. c. perist. $1\frac{2}{3}$ mill. longa et lata. — Hab. „Bülow's Minde“ prope Christiansted insulae St. Croix. (Taf. V. F. 10, 11.)

6. *Pupa fallax* Say.

7. *Pupa pellucida* Pfr. (servilis Gould.)

8. *Pupa rudis* Pfr. — T. profunde rimata, ovato-oblonga, costis obtusis, leviter arcuatis, subconfertis sculpta, cretacea; spira convexiusculo-elongata, sensim in conum obtusulum attenuata; anfr. 11 vix convexiusculi, ultimus $\frac{1}{4}$ longitudinis paulo superans, antice subascendens, juxta rimam subcompressus; apertura lunato-rotundata, dente profundo, compresso parietali et minore, profundiore columel-

lari coarctata; perist. crassum, breviter patulum, marginibus callo junctis. — Long. 30, diam. 12 mill. Ap. c. perist. 10 mill. longa, 9 lata. — Legitur subfossilis in plantationibus „Dimond“ et „Paradise“ insulae St. Croix. (Taf. V. F. 1, 2.)

9. *Pupa latilabris* Pfr. — T. profunde rimata, subperforata, obovata, costis elevatis arcuatis sculpta, cretacea; spira ovata, apice obtusula; sutura filaris; anfr. 10 plani, angusti, ultimus antice vix ascendens, medio subangulatus, basi attenuatus, subcompressus; apertura semicircularis, dente compresso, intrante parietali et minore columellari coarctata; perist. subincrassatum, late expansum, margine columellari fornicatim reflexo. — Long. 25, diam. 12 mill. Ap. c. perist. 9 mill. longa et lata. — Legitur subfossilis in plantatione „Blessing“ insulae St. Croix. (Taf. V. F. 3.)

10. *Bulimus extinctus* Pfr. — T. subperforata, ovato-pyramidata, solida, irregulariter impressa et rugata, calcarea; spira elongato-conica, acuta; sutura levis; anfr. 7 subplani, ultimus $\frac{2}{5}$ longitudinis formans, medio obsolete angulatus, basi subattenuatus; columella stricta, recedens; apertura obliqua, oblongo-semiovalis; perist. rectum, margine dextro intus subincrassato, columellari tenui, dilatato, reflexo, subadnato. — Long. 35, diam. $13\frac{1}{2}$ mill. Ap. $14\frac{1}{2}$ mill. longa, 6 lata. — Legitur subfossilis in parte orientali insulae St. Croix. (Taf. IV. F. 9, 10.)

Dieser *Bulimus*, von welchem ich nur ein einziges Exemplar gesehen habe, gehört in die Verwandtschaft des *B. elongatus* Bolt. von St. Thomas, und zeigt noch Spuren einer bräunlichen Färbung auf dem Spindelumschlag.

11. *Bulimus Swiftianus* Pfr. Von Spring Gutt bei Christiansted. Ganz identisch mit den früher von St. Thomas erhaltenen Exemplaren.

12. Verschiedene Formen des vielgestaltigen *Bul. tenuissimus* Fér. Gesellig unter Steinen und an alten Mauern auf der Pflanzung Wheel of Fortune.

13. *Bulimus Riisei* Pfr. — T. subcompressa umbili-

cata, ovato-conica, subtenuis, confertim oblique striata, calcarea; spira conica, acutiuscula; sutura profunda; anfr. $6\frac{1}{2}$ convexi, ultimus spiram subaequans; columella subrecedens; apertura obliqua, elliptico-ovalis; perist. simplex, marginibus callo tenui junctis, dextro recto, repando, columellari dilatato, fornicatim patente. — Long. 24, diam. 11 mill. Ap. $12\frac{1}{2}$ mill longa, 6 lata. — Legitur subfossilis in plantatione „La Grange“ prope Frederiksted insulae St. Croix. (Taf. IV. F. 7, 8.)

14. *Helix Santacruzensis* Pfr. — T. imperforata, subgloboso-depressa, oblique confertim striatula, albida, linea 1 spadicea saepe cingulata; spira parum elevata, vertice subtili; anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi (in junioribus carinati), ultimus subdepressus, antice subgibbus, deflexus, basi subplanulatus; apertura perobliqua, transverse auriformis; perist. sublabiatum, margine dextro breviter expanso, columellari calloso, dilatato, plano. — Diam. maj. 19, min. 16, alt $9\frac{1}{2}$ mill. — Legitur subfossilis in plantatione „La Grange“ prope Frederiksted insulae St. Croix. (Taf. IV. F. 4—6)

Diese schöne, aber nicht lebend gefundene Art scheint ihren Charakteren nach in der Mitte zwischen *H. alauda* von Cuba und *nemoralina* von St. Thomas zu stehen.

15. *Succinea approximans* Shuttl. Verbreitet überall an feuchten Stellen auf Pflanzen.

c. von der Insel St. Thomas.

Helix incerta Fér. Die typische Form, wie sie auf St. Thomas nur im subfossilen Zustande gefunden wird, mehr oder weniger glatt oder feingekörnelt, bisweilen mehr oder weniger gekielt. Eine hierher gehörige Form mit zahnförmig verbreitertem Columellarrande habe ich, da ich damals noch keine Exemplare der subfossilen St. Thomas-Schnecke gesehen hatte, in den Proc. Zool. Soc. 1854. p. 147 als *curvidens* beschrieben und unter diesem Namen ist sie auch in Reeve Conch. ic. n. 1360. t. 194 abgebildet. Diese geht also geradezu wieder ein. Aber auch an der

auf Tortola und nach Shuttleworth auf den Inseln St. Jan und Anegada lebend vorkommenden analogen Form, welche von fast allen bisherigen Autoren als *H. incerta* Fér. beschrieben worden ist (obwohl Férussac sie selbst [t. 46 A. f. 4. 5.] wahrscheinlich wegen der ähnlichen Färbung, als *H. lima* var. *notabilis* bezeichnet, worin ihm nur Reeve gefolgt ist) kann ich keine constanten Charaktere finden, welche eine spezifische Trennung derselben von der typischen *incerta*, wie sie Shuttleworth zu motiviren versucht hat, rechtfertigen. Ich besitze die var. *notabilis* in äusserst verschiedenen Formen, ungekielt, mit stumpfem und sogar mit scharfem Kiele, die Bildung der Columellarschwiele ist eben so veränderlich, als bei der ursprünglichen *incerta*, und der Grösseunterschied zwischen meiner grössten *notabilis* und meiner kleinsten *incerta* ist kaum bemerklich. Ich kann daher, nach der Untersuchung zahlreicher frischer und subfossiler Exemplare, nur bei meiner (Malak. Bl. 1854. S. 167 ausgesprochenen) Ansicht bleiben, dass *H. notabilis* Sh. auch fernerhin als Var. der *incerta* Fér. zu betrachten ist.

Die übrigen bei der Sendung befindlichen Helixarten: *euclasta*, *nemoralina*, *Gundlachi*, *vortex* und *subaquila* waren bereits als Bewohner der Insel St. Thomas bekannt.

Dasselbe gilt von *Bul. microdon* Pfr und *elongatus* Bolt., welcher sich sowohl in einfarbig weissen, als auch elegant geflammten, wie auch in subfossilen Exemplaren bei der Sendung befand.

Sehr merkwürdig ist aber die Entdeckung der *Ennea bicolor* (Pupa) Hutt., von welcher Herr Riise, wie er mir schreibt, mehr als 200 lebendige Exemplare „an den Abhängen der Pflanzung Catharineberg und in Berg's Garten“ fand, und mir ein Dutzend davon freundlich zukommen liess, welche bei der schärfsten Untersuchung sich nicht von den ostindischen unterscheiden lassen.

Unter dem Namen *Cylindrella perplicata* Fér. erhielt ich die auch auf Jamaica vorkommende *pallida* Guild.

Die übrigen auf St. Thomas gesammelten Schnecken waren noch: *Pedipes quadridens*, eine kleine Form des *Melampus coffea*, *Cyclostoma Newcombianum* und *Antillarum*, *Helicina subfusca*, *foveata* und *rubella*.

Beschreibung einiger neuer Heliceen.

1. *Helix tabida* Pfr.

T. angustissime umbilicata, turbinata, solidula, conferte rugoso-striata, sub epidermide decidua, fuscula alba; spira convexo-conica, acutiuscula; anfr. 8 lentissime accrescentes, vix convexiusculi, ultimus non descendens, periphæria subangulatus, superne convexus, basi planiusculus; apertura vix obliqua, depressa, subangulato-lunaris; perist. simplex, rectum, margine basali versus insertionem leviter incrassato. — Diam. maj. $17\frac{1}{2}$, min. 16, alt. 11 mill. (Mus. Monac.)

Habitat in montibus Nilgherries Indiae.

2. *Helix ceratomma* Pfr.


T. imperforata, depressula, solidula, oblique confertim striata et sub lente lincis spiralibus decussata, sericea, coeruleo-albida, fusculo subfasciatim nebulosa; spira parum elevata, vertice corneo, obtuso; anfr. 4 sensim accrescentes, convexiusculi, ultimus depresso-rotundatus, antice perdeflexus, basi subplanus; apertura fere horizontalis, rotundato-lunaris; perist. simplex, marginibus subconniventibus, dextro vix expansiusculo, basali plano, lato, reflexo, supra regionem umbilicalem perdilatato. — Diam. maj. 28, min. $23\frac{1}{2}$, alt. 13 mill. (Mus. Monac.)

Habitat in Caucaso. (Dr. M. Wagner.)

Malakoz. Bl. 1855.

II.





- Solaropsis 137
 Spiraxis 166.
 Stenogyra ascendens 89 contracta
 90. lucida 90. maxima 89.
 stricta 90
 Stenopus 119.
 Streptaxis 172. *prostrata* 172.
 Streptostyla 167.
 Strophia 174.
 Strophocheilus 150.
 Stylodonta 139.
 Subulina 169.
 Succinea 117. Baudonii 188. hu-
 milis 188.
 Systrophia 136.
 Tachea 142.
 Tapada 118.
 Tectula 134.
 Temesa 179.
 Testacella Sanleyi 22
 Thaumasia 177.
 Thea 137.
 Thersites 141.
 Tomigerus 148. *Venezuelensis*
 148.
 Tornatellina 170. *Hierosolyma-*
rum 39. Petitiona 3.
 Torquilla 175.
 Trachelia 179.
 Tridopsis 135.
 Trochomorpha 132.
 Turricula 131.
 Ulostoma 135.
 Unio Delesserti 57.
 Uniplicaria 173.
 Vallonia 139.
 Varicella 172.
 Vertigo 177.
 Videna 131.
 Vitrina 115. *limpida* 10.
 Vitrinella 119.
 Xerophila 130.
 Xesta 119.
 Zonites 127.

Erklärung der Tafeln.

- | | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">I.</p> <p>Fig.</p> <p>1. 2. <i>Helix prasinata</i> Roth.
 3—5. — <i>Jebusitica</i> Roth.
 6. 7. — <i>tuberculosa</i> Conr.
 8. 9. <i>Tornatellina Hierosolymarum</i>
 Roth
 10. 11. <i>Azeca Zacynthia</i> Roth
 12—14. <i>Claus. Ehrenbergi</i> Roth
 15—17. — <i>Kephissiae</i> Roth.
 18—20. — <i>Pikermiana</i> Roth.</p> <p style="text-align: center;">II.</p> <p>1—3. <i>Melania Judaica</i> Roth.
 4. 5. <i>Ancylus pileolus</i> Fér.
 6—9. <i>Planorbis cornu</i> Ehr.
 10—13. — <i>fontinalis</i> Roth.
 14. 15. <i>Isidora lamellosa</i> Roth.
 16. 17. <i>Limnaeus atticus</i> Roth.</p> | <p style="text-align: center;">III.</p> <p>Fig.</p> <p>1—3. <i>Helix Stauropolitana</i> A. Schm.
 4—11. — <i>Pampelonensis</i> A. Schm.</p> <p style="text-align: center;">IV.</p> <p>1. <i>Cyclostoma chordiferum</i> Pfr.
 2. 3. <i>Cyclostoma basicarinatum</i> Pfr.
 4—6 <i>Helix Santaeruzensis</i> Pfr.
 7. 8. <i>Bulimus Riisei</i> Pfr.
 9. 10. — <i>extinctus</i> Pfr.</p> <p style="text-align: center;">V.</p> <p>1. 2. <i>Pupa rudis</i> Pfr.
 3. — <i>latilabris</i> Pfr.
 4. 5. <i>Cylindrella planospira</i> Pfr.
 6. 7. — <i>cyclostoma</i> Pfr.
 8. 9. — <i>Camoënsis</i> Pfr.
 10. 11. — <i>chordata</i> Pfr.</p> |
|---|--|

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Beiträge znr Molluskenfauna Westindiens. 98-106](#)