Notizen deutet darauf hin, dass in Oberitalien die Verbreitungsbezirke dieser Arten mannigfach in einandergreifen; der der pomatia lehnt sich an die Alpen an, hat aber seine noch näher zu verfolgende Gränze mitten in der Ebene, der der H. adspersa lehnt sich an die Küste, beide schliessen sich aus. Der der H. cincta durchkreuzt beide, nähert sich aber mehr dem der pomatia. Hel. lucorum ersetzt pomatia im Süden und Osten, kommt gelegentlich neben cincta und adspersa vor und herrscht namentlich in der Romagna.

Eduard von Martens.

### Zwei neue Auriculaceen.

#### 1. Laimodonta Pfeifferi Dkr.

L. testa minima, ovato-conica, imperforata, transversim striata, fusca, fascia una vel duabus luteis cineta; anfractibus senis vel septenis, ultimo spira conica longiore; columella tricostata, labro acuto, intus subincrassato unicostato.

Long. 5, lat. 3 mill.

Habitat in Japonia.

Das kleine ziemlich starke regelmässig quer gereifte Gehäuse steht der L. Sandwichensis Eyd. et Soul. sehr nahe, unterscheidet sich aber durch weit geringere Grösse und kleine Furchen, welche sich zwischen der mittleren und unteren Columellarfalte befinden, jedoch nur durch die Loupe zu erkennen sind.

W. Dunker.

Nach den mir freundlich mitgetheilten Exemplaren halte auch ich die kleine Schnecke, von welcher keine grösseren vorhanden zu sein scheinen, für verschieden von den jungen Individuen des Melampus Bronni Phil., welcher wohl mit Auricula Sandwichiensis Soul. identisch sein dürfte. Da ich keinen Grund finde, die sog. Gattung für mehr als eine Gruppe von Melampus zu halten, so ordne ich die neue Art nach Melampus Bronni ein.

202

Ich ergreife die Gelegenheit, um die Beschreibung einer kürzlich von Herrn Dr. Brot in Genf nebst anderen Auriculaceen seiner Sammlung mir zur Ansicht zugesandten neuen Art hier mitzutheilen.

Melampus Brotianus Pfr.

T. imperforata, fusiformis, solida, sublaevigata, nitidula, pallide lutescens; spira convexo-conica, coerulescens, apice nigricans; sutura plana, subregularis; anfr. fere 10 planiusculi, ultimus  $^2/_3$  longitudinis formans, superne levissime subangulatus, basi attenuatus, spiraliter sulcatus; apertura subverticalis, angusta; paries aperturalis tuberculo angulato, subverticali, denticulato et plica unica subtransversa infera munitus; plica columellaris compressa, arcuatim abiens in peristoma rectum, acutum, intus callosum et plicis nonnullis majoribus et denticulis armatum. — Long.  $12^1/_4$ , diam. 7 mill. Ap. 9 mill. longa.

Habitat Ceylon?

Pfeiffer.

# Neue Landconchylien

### beschrieben von H. Dohrn.

1. Hydrocena Vescoi. T. subperforata, ovatoconica, solidiuscula, laevigata, parum nitens, carnea vel albescens; spira convexo-conica apice obtusiusculo; anfr.  $4^{1/2}$ –5 convexi, ultimus spira paullo brevior, basi rotundatus; sutura valde impressa; apertura verticalis, ovalis; peristomium simplex, expansiusculum, breviter adnatum. Operc. typicum.

Long.  $4^{1}/_{2}$ , lat. 3; Ap. diam.  $1^{3}/_{4}$  mill.

Habitat: Tahiti (Vesco). Meine Sammlung.

Neben H. albescens Pfr. zu stellen, von dieser unterschieden durch Fehlen des Winkels an der Mitte der Windungen, tief eingedrückte Naht etc.

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: Zwei neue Auriculaceen. 201-202