Bythinella bosniensis n. sp.

Tfl. 2 Fig. 9.

T. parvula, leviter rimata, subdiaphana, cylindricoconica, viridescente-alba, solidula, minute striatula; summo obtuso; anfr. 4, modice convexis, celeriter accrescentibus, quorum superiores 2 parvuli, caeteri maximi, sutura impressa separatis; ultimo magno, tertiam partem altitudinis superante, apertura rotundato-ovata. —


Lg. 1,5 mm, diam., 1,5 mm.

Gehäuse klein, fein geritzt, von weissgrünlicher Farbe, halbdurchscheinend, cylindrisch-kegelförmig, mit stumpfem Wirbel, festschalig, fein gestreift; Umgänge 4, mässig gewölbt, rasch zunehmend, die beiden ersten sehr klein, der vorletzte mehr wie doppelt so hoch, als die vorhergehenden, der letzte noch etwas breiter, gut ½ der ganzen Gehäusehöhe einnehmend, etwas nach rechts gezogen. — Mündung weit, rundlich-eiförmig; Deckel gewunden. —

In Quellen in Bosnien.

Bemerkung: Die Art ist weniger cylindrisch und hat einen Umgang weniger als Byth. austriaca, ihr Wirbel aber ist stumpfer wie bei dieser Art. — Ich verdanke dieselbe der Freundlichkeit des Herrn P. Vinc. Gredler in Bozen.

S. Clessin.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: NF_11_1891

Autor(en)/Author(s): Clessin Stephan [Stefan]

Artikel/Article: Bythinella bosniensis n. sp. 120