fluvio-lavustre de la Nouvelle-Calédonie. — II. Essais d'acclimation de certains Mollusques terrestres d'Algerie dans le S. O. de la France (Marseille 1877. Extrait du compte rendu des travaux du congrès des Orientaliste de Marseille). — March. di Monterosato, Catalogo delle Conchiglie fossili di Monte Pelegrino e Ficcarazzi presso Palermo. — Neuigkeiten p. 307—308: Enthält Mittheilungen über jene Conchyliensammlungen, welche im Jahre 1878 in der Pariser Weltausstellung aufgestellt waren.

Procedings zoolog. Society of London. 1877. 3. Heft.

G. Fr. Angas, Notes on a small Collection of Land and Freshwater-Shells from South-east. Madagaskar with descriptions of new Species pag. 527—528. Neubeschrieben und abgebildet auf Tafel 54. Bulimus Balstoni, Helix Watersi, Mongensis, Balstoni und Physa Madagascarensis.

G. Fr. Angas, Descriptions of a new Genus of Gasteropodous Mollusca from Japan, and of a new Species of Bullia from Kurrachi p. 529—530. Der Verfasser beschreibt das neue Genus Thatcheria der Subfam. Fusinae mit einer abgebildeten Art Thatc. mirabilis von Japan; ferner neu beschrieben: Bullia (Leiodomus) Kurrachensis mit Abb.

IV. Heft. — Edgar. A. Smith, On the Shells of Lake Nyassa, and on a few Marine Species from Mozambique p. 712—722 mit Tafel 74 u. 75. — Der Autor zählt 25 im Nyassa-See vorkommende Arten auf, die sich im britischen Museum befinden. Die folgenden Neubeschriebenen sind abgebildet: Melania turritispira, pupiformis, Simonsi, polymorpha, Nyassana, Lanistes solidus u. affinis, Bythinia Stanleyi, Physa Nyassana und succinoides. — Zu Unio Nyassensis Lea wird

U. Kirkii u. aferula Leu als Varietät gezogen. — G. Fr. Angas notes on the Helix sepulchralis of Ferussac and As Allies. p. 803—805 mit Tafel 80. Theilt Beobachtungen über diese Art mit, bildet H. sepulchralis und subsepulchralis ab und beschreibt H. hova u. Sakalava von Madagascar als neue Species.

Procedings Zoolog. Society of London pro 1878.

I. Heft. — G. Fr. Angas, Descriptions of seven new Species of Landshells recently collected in Costa Rica by Mr. Adolphe Boucard. p. 72—74 mit Tfl. 5. Neu beschrieben: Hel. Boucardi, adela, aesopus; Cyclotus Boucardi; Bulimus Josephus, irazuensis u. navarrensis, sämmtliche abgebildet. - G. Fr. Angas. Description of a new Species of Latiaxis. p. 74. Latiaxis elegans mit Abb. von unbekanntem Fundorte. - E. A. Smith, Description of a new Species of Helix from Japan. p. 105 - 106. Helix (Camena) congener m. Abb. im Texte S. 1. — Cheeseman. Descriptions of three new Species of Opistobranchiate Mollusca from New-Zealand. p. 275—277 mit Tfl. 15. Neu beschrieben und abgebildet. Pleurobranchus ornatus, Pleurobranchaea Novae-Zealandiae und Aclesia glauca.

II. Heft. G. Fr. Angas, Descriptions of nine new Species of Land and Marine Shells from various localities. p. 311 — mit Tfl. 18. Neubeschrieben und abgebildet. Bulimus Watersi von Madagascar, Bulimus (Otostomus) quadrifasciatus von Ecuador, Bul. (Otostomus) Napo von Ecuador; Bul. (Otostomus) Eros von Ecuador; Rostellaria luteostoma von Kurrachi, Mitra (Costellaria) Lincolnensis, von Port Lincoln, Südaustralien; Mitra Schomburgki von Südaustralien, Siphonaria albida vom Golf von St. Vincent in Südaustralien; Leda Newcombi gedredgt. in der Navy-Bay Aspinwall

in 8 Faden Tiefe. — S. Gw. Jeffreys, On de Mollusca during „the Lightning and Procubine". Expeditions 1868—70. I. Abtg. p. 393—416 mit Tafel 22 und 23. — Die englischen Schiffe „Lightning und Porcupine haben in den Jahren 1868, 69 und 70 bei den Faroër Inseln, an der West- und Ostküste von Irland, dann bei Gibraltar und im Mittelmeere unter Leitung des Autors gedredgt. Derselbe beginnt hier die Resultate seiner Arbeiten zu veröffentlichen. Nach denselben hat die „Lightning" an acht Orten bei den Faroer Inseln Tiefenuntersuchungen angestellt und — 650 Faden erreicht. — Die Procubine hat im Jahre 1869 an 90 Stationen Tiefenuntersuchungen vorgenommen und dabei im Süden von Irland eine Tiefe von 2435 Faden gefunden; im Jahre 1870 wurden die Untersuchungen bis in's Mittelmeer ausgedehnt (bis in die griechischen Gewässer) und dabei an 75 Stationen mit dem Schleppnetz gearbeitet. — Die neuen Molluskenarten, welche diese Untersuchungen ergeben haben, hat der Autor schon in einigen naturwissenschaftlichen Zeitschriften und Werken beschrieben. Hier ist es seine Absicht, die Brachiopoden, welche bis jetzt aus den europäischen Meeren bekannt sind, zusammenzustellen. Eine Tabelle zählt 22 Arten auf, gibt ihre Fundorte an und zeigt an, in welchen Tiefen sie leben. Der Liste folgen ausführlichere Beschreibungen und kritische Bemerkungen der aufgezählten Arten, von denen auch mehrere abgebildet sind. Neubeschrieben wird Terebratula trigona aus 500 Faden Tiefe von der portugiesischen Küste, und Terebr. subquadrata ebendaher von 5 - 600 Faden.

Jahrbücher der deutschen Malakozool. Gesellsch. V. Jahrg. 1878.

I. Heft. G. Schacko. Die Zungenbewaffnung der Gattung Amphibola. p. 1—9 mit 1 Tfl. — Der Verfasser beschreibt Radula und Kiefer von

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: NF_1_1879

Autor(en)/Author(s): Smith E.A., Angas G.Fr., Jeffreys John Grwyn

Artikel/Article: Procedings zoolog. Society of London. 1877. 47-49