

Proceedings of the scientific Meetings of Zoological Society of London. Jahrg. 1879.

Heft I. W. H. Dall, Ueber die Anwendung des Genus-Namen *Gouldia* in der Zoologie, p. 131—132. — Das Genus *Gouldia* ist von Bonaparte in der Classe der Vögel von C. B. Adams und andern in der Classe der Mollusken angewendet worden, wesshalb Guppy für das letztere den Namen *Crassinella* vorschlägt. — Der Autor will aber das Molluskengenus *Gouldia* aufrecht erhalten wissen, weil dasselbe die Priorität für sich hat und gibt eine Liste der Synonymie dieses Genus.

Heft II. Edgar A. Smith, Ueber eine Collection Mollusken aus Japan, p. 181—218. Mit Taf. XIX. und XX. — Nach Aufzählung der 32 Sammelstationen des Capt. H. C. St. John von H. M. S. Schiff *Sylvia*, welcher in den japanischen Meeren mit grossem Eifer gesammelt und gedredgt hat (bis zu fast 60 Faden Tiefe), gibt der Verfasser die Liste der gesammelten 89 Arten. Unter denselben sind die folgenden neu: *Terebra gotensis*, t. 19, f. 1—1a; *Terebra Jeffreysii*, t. 19, f. 2; *Terebra subtextilis*, t. 19, f. 3; *Pleurotoma Niponica*, t. 19, f. 7; *Pleurotoma difficilis*, t. 19, f. 8; *Pleurotoma triporcata*, t. 19, f. 9; *Pleurotoma consimilis*, t. 19, f. 11; *Drillia peradmirabilis*, t. 19, f. 12; *Drillia Nagasakiensis*, t. 19, f. 13; *Drillia longispira*, t. 19, f. 14; *Drillia subobliquata*, t. 19, f. 16; *Drillia candens*, t. 19, f. 17; *Drillia raricostata*, t. 19, f. 18; *Drillia intermaculata*, t. 19, f. 19; *Drillia humilis*, t. 19, f. 20; *Drillia flavo-nodulosa*, t. 19, f. 21; *Drillia fortirata*, t. 19, f. 22; *Drillia subauriformis*, t. 19, f. 23; *Defrancia gracilispira*, t. 19, f. 25; *Daphnella* (?) *fusco-balteata*, t. 19, f. 26; *Daphnella* (?) *subzonata*, t. 19, f. 27; *Mangilia robusticostata*, t. 19, f. 28; *Urosalpinx*.

innotabilis, t. 20, f. 32; *Fusus nigrostratus*, t. 20, f. 33; *Fusus Niponicus*, t. 20, f. 34; *Fusus simplex*, t. 20, f. 35; *Fusus Coreanus*, t. 20, f. 36; *Fusus Pachyrhapha*, t. 20, f. 37, 37a; *Tritonidea subrubiginosa*, t. 20, f. 40; *Columbella (Atilia) Lischkei*, t. 20, f. 41; *Columbella (Atilia) miveo marginata*, t. 20, f. 42; *Columbella (Zafra) subirtrea*, t. 20, f. 43; *Nassa (Hima) acutidentata*, t. 20, f. 46; *Nassa (Hima) luteola*, t. 20, f. 47; *lovaliophila Jeffreysii*, t. 20, f. 48; *Mitra (Costellaria) fusco-apicata*, t. 20, f. 49, *Mitra (Costellaria) Goltensis*, t. 20, f. 51; *Mitra (busia) aemula*, t. 20, f. 52; *Cancellaria japonica*, t. 20, f. 54; *Ancillaria inornata*, t. 20, f. 56.

Jahrbücher der deutsch. Malakozoolog. Gesellschaft. VI. Jahrg. 1879.

I. Heft. Dr. O. Böttger, Kaukasische Mollusken, gesammelt von Herrn Hans Leder in Paskau, p. 1—42, mit Taf. 1. Neu beschrieben: *Daudebardia Heydeni*, t. 1, f. 1; *Vitrina subconica*, t. 1, f. 3; *Lampadia Lederi*, t. 1, f. 2; *Hyalinia subeffusa* *), t. 1, f. 4; *Buliminus tuberifer*, t. 1, f. 9; *Cochlicopa Raddei*, t. 1, f. 8; *Clausilia (Euxina) aggesta*, t. 1, f. 6; *Claus. (Euxina) Lederi*, t. 1, f. 5; *Acicula Moussoni*, t. 1, f. 7; — Im Ganzen werden 52 Arten aufgeführt, eine verhältnissmässig grosse Anzahl, wenn man bedenkt, dass sie fast nur durch Sieben der Waldstreu (Herr Leder hat den Kaukasus nur in coleopterologischem Interesse besucht) gesammelt wurden.

Dr. R. Bergh, Die Doriopsen des atlantischen Meeres, p. 42—64. — Der Autor beschreibt

*) Nach einer Berichtigung im 3. Hefte, p. 290. ist der ursprüngliche Name der Art *effusa* in *subeffusa* umzuwandeln, da Pfeiffer schon eine *Hyalinia effusa* beschrieben hat.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [NF_2_1880](#)

Autor(en)/Author(s): Smith Edgar Albert, Dall W.H.

Artikel/Article: [Proceedings of the scientific Meetings of Zoological Society of London. Jahrg. 1879. 32-33](#)