wärmern Theilen Deutschlands und der Schweiz sich finden.

A. Issel e C. Tapparone-Canefri, Studio monographico supra gli Strombidae del mar rosso. (Viaggio dei Signori O. Antinori, O. Beccari ed A. Issel nel mar rosso, nel territorio dei Bogos, e regioni circostanti durante gli anni 1870—71.) Extratto dagli Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova VIII. 1876.

Die fleissige Arbeit zählt alle im rothen Meere bis jetzt aufgefundenen Arten der Familie der Strombiden auf; berücksichtigt die Subgenera, giebt vollständige Synonymie der Arten und führt neben den Fundorten des genannten Meeres auch jene ihres übrigen Verbreitungsbezirkes auf. Bei den meisten Arten sind zahlreiche, oft umfangreiche Bemerkungen über Verwandtschaften etc. angefügt.

Zum Schlusse ist eine Tabelle zur Uebersicht der Verbreitung der aufgeführten Arten beigegeben.

C. Tapparone - Canefri, Studio monografico sopra i Muricidae del mar rosso. (Viaggio dei Sign. O. Antinori, O. Beccari ed A. Issel etc.) Estratto dagli Annali del Mus. Civ. di St. nat. di Genova vol VII. (Mit 1 Tafel.)

Die mit einer hübsch ausgestatteten Tafel versehene Arbeit bildet den Vorläufer der eben besprochenen und führt alle bisher im rothen Meere constatirten Arten der Familie der Muriciden an. Vollständige

Synonymie und beigegebene Bemerkungen erhöhen den Werth des Aufsatzes.

Neu beschrieben werden: Murex Jickelii, p. 18, t. 19, f. 6; Tritonium Beccarii, p. 23, t. 19, f. 7; Latirus Forskalii, p. 32, t. 19, f. 4, 4a; Fusus leptorhynchus, p. 63, t. 19, f. 5.

Den Schluss, neben einer tabellarischen Uebersicht über die Verbreitung der im rothen Meere vorkommenden Arten, bildet ein Supplement zu der Arbeit, in welchem noch Murex Küsterianus, p. 71, t. 19, f. 1. 2 neu beschrieben wird.

C. Tapparone-Canefri, Glanures dans la Faune malacologique de l'île Maurice. Catalogue de la famille des Muricidés Woodw. Extrait des Annales de la Soiété Malacologique de Belgique. Tome XV. 1880. (Mit 2 Tafeln.)

Der Verfasser behandelt die Familie der Muriciden, welche sich an den Küsten der Insel Mauritius finden, in denselben Weise, wie er es in den beiden vorhergehend besprochenen Arbeiten thut.

Neu beschrieben werden: Murex dichrous, p. 19, t. 2, f. 5, 6; Tritonium pachycheylos, p. 30, t. 2, f. 3, 4; Ranella Bergeri Sow., p. 50, t. 2, f. 1, 2; Ranella Paulucciana, p. 51, t. 2, f. 16, 17; Fusus xantochrous, p. 57, t. 3, f. 1, 2; Trophon fossuliferus, p. 58, t. 3, f. 5, 6; Pisania luctuosa, p. 60; Tritonidea proxima, p. 64, t. 3, f. 9, 10; Tritonidea Lefevreiana, p. 65, t. 3, f. 7, 8; Tritonidea polychloros, p. 66, t. 3, f. 3, 4; Peristernia Paulucciae, p. 71, t. 2, f. 14, 15; Latirus Robillardi, p. 77, t. 2, f. 14, 15; Latirus concinnus, p. 79, t. 2, f. 10, 11. Die Abbildungen der beigegebenen Tafeln sind sehr gelungen, und bildet die

fleissige Arbeit einen sehr dankenswerthen Beitrag zur Kenntniss der Fauna des indischen Oceans.

C. Tapparone - Canefri, Contribuzioni per una Fauna malacologica delle isole Papuane.

II. Descrizione di alcune specie nuove o mal conosciute delle isole Aru, Sorong e Kei Bandan. Estratto dagli Annali del Mus. Civ. di St. nat. di Genova, vol. VII. 1875.

Auf Grund der Sammlungen, welche die italienischen Forscher Antonari, Beccari und Issel von der grossen Reise nach den papuanischen Insel mitgebracht haben, beschreibt der Autor nachstehende Neue Arten: Ranella polychloros., p. 1; Pollia papuana, p. 1; Nassa seminulum, p. 2; Marginella microscopica, p. 3; Melania recentissima, p. 3; Littorina Beccarii, p. 4; Neritina semen, p. 4; Barnea Beccarii, p. 5; Rupellaria amplectens, p. 5. — Von Latirus crenulatus Kiener ist verbesserte Diagnose gegeben.

III. Molluschi della Baia di Geelwinck inviati dai sig. O. Beccari, L. M. D'Albertis e A. A. Bruijn. Estratto dagli Ann. del Mus. Civ. di St. nat. di Genova vol. VIII. 1876.

Unter in der Bai von Geelwinck gesammelten Arten, die der Autor nach den Sammlungen der gegenannten Herrn aufzählt, finden sich folgende neu beschriebene: Fusus Brujinii, p. 1; Neverita parvula, p. 3. — Es sind im Ganzen 65 Gasteropoden (darunter 3 Helix und 1 Auricula) und 30 Muscheln (darunter 1 Batissa und 1 Cyrena unbenannt.

IV. Molluschi raccolti dal sig. L. M. D'Albertis nell Isola di Sorong (Costa Novel-Ouest della Nuova-Guinea) nell' anno 1872. Estratto dagli Annali di Mus. Civ. di St. nat. di Genova, vol. IX. 1876—77.

Die Zahl der aufgezählten Arten ist eine ziemliche Anzahl von See-, Land- und Süsswasserarten, die gemischt unter den bezüglichen Classen aufgeführt werden. Neu beschrieben werden: Sepia brachycheira, p. 1; Columbella filicincta, p. 2; Columb. doliolum, p. 3; Col. callosiuscula, p. 3; Col. Abertisii, p. 4; Cerithiopsis scabrella, p. 5; Triforis lusoris, p. 6; Triph. minutissimus, p. 6; Triph. lineolatus, p. 6; Melania singularis, p. 7; Rissoa papuana, p. 8; Ceratia variegata; p. 8; Capulus elegans, p. 9; Neritina viridissima, p. 10; Stomatia pallida, p. 11; Modiolaria corallina, p. 14; Avicula falcata, p. 14; Anomalocardia striatella, p. 15; Barbatia Paulucciana, p. 15.

V. Molluschi raccolti nelle isole Mollucche da O. Beccari (ebenda).

Die Aufzählung der Arten erstreckt sich ebenso wie bei der vorigen Arbeit auf See-, Land- und Süsswasserbewohner; es werden nur 2 Cephalopoden, 54 Gasteropoden und 10 Muscheln aufgezählt, darunter keine neue Species.

VI. Descrizione di una nuova specie di Turbo racolta da O. Beccari nella N. Guinea. Estr. Ann. Genova, vol. XII. 1878.

Neu beschrieben Turbo jobiensis, p. 1.

VII. Descrizione di alcune nuove specie di mollusche terrestri della Nuova-Guinea. Estr. Ann. Genova, vol. XV. 1880.

Neu beschrieben werden: Helix aruensis, p. 1 (59); Helix (Trophomorphoides) Bertiniana, p. 2 (60); Helix (Papuina) pelechystoma, p. 2 (60); Nanina Doriae, p. 3 (61).

W. H. Dall, Description of new forms of mollusks from Alaska contained in the collections of the National Museum; Proceed. of the Unit. States National-Museum 1878.

Es werden neu beschrieben (mit latein. Diagnose): Leptochiton Belknapi, p. 1; Trachyradsia aleutica, p. 1; Tonicella saccharina, p. 2; Genus Schizoplax (Typ. Chiton Brandtii Mid.).

W. H. Dall, Fossil mollusks from later tertiaries of California (ebenda).

Der Autor zählt 113 marine Gasteropoden aus den tertiären Ablagerungen von Sta. Barbara und San Diego in Californien auf. Die meisten finden sich noch lebend, an der Californischen und Oregonischen Koste, was durch Beisetzung verschiedener Buchstaben in der tabellarischen Uebersicht der Arten gekennzeichnet wird. Neu beschrieben werden: Axinea profunda, p. 13; Pecten expansus, p. 14; Pecten Stearnsii, p. 14; Pecten Hemphillii, p. 15; Anomia limatula, p. 15 und Scalaria Hemphillii, p. 16 (sämmtlich ohne lateinische Diagnose).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: NF_6_1883

Autor(en)/Author(s): Tapparone-Canefri C.

Artikel/Article: Studio monographico supra gli Strombidae del mar rosso. 150-154