

## Literatur-Bericht.

Journal de Conchyliologie XXI, Bd. 1881.  
Heft 1.

S. Pervier, Descript. de quelques espèces nouvelles du Cambodge appartenant aux genres *Lacunopsis*, *Jullienia* et *Pachyhydrobia*, p. 1—19. Neu beschrieben: *Lacunopsis globosa* p. 7, t. 1, fig. 1; *Lac. ventricosa* p. 8, t. 1, fig. 2; *Lac. Harmandi* p. 9, t. 1, fig. 3; *Jullienia Harmandi* p. 10, t. 1, fig. 4; *Jul. costata* p. 10, t. 1, fig. 5; *Jul. nodulosa* p. 11, t. 1, fig. 7; *Jul. acuta* p. 12, t. 1, fig. 8; *Pachyhydrobia spinosa* p. 14, t. 2, fig. 1; *Pach. Bertini* p. 15, t. 2, fig. 2; *Pach. Fischeriana* p. 15, t. 2, fig. 3; *Pach. Harmandi* p. 16, t. 2, fig. 4; *Pach. variabilis* p. 16, t. 2, fig. 5; *Pach. scalarioides* p. 17, t. 2, fig. 6 und *Pach. dubiosa* p. 18, t. 2, fig. 7. — H. Crosse, Note sur la synonymie de l'*Helix nigrilabris* Mts. d'Australie p. 20—22. Nach kurzer Erörterung über die unter verschiedenen Namen (*Edwardsi* und *Meadei*) beschriebene Art wird deren vollständige Synonymie aufgezählt. — H. Drouët, *Unionidae nouveaux ou peu connus*; p. 22—31. — Mit lateinischer Diagnose werden beschrieben: *Unio desectus* Drouët von Thessalien p. 23; *U. decipiens* Dr. vom Skutarisee p. 23; *U. Stevenianus* Kryn. von Simpfieropol, dem Araxes und Rion p. 34; *U. Gargottae* Phil. von Sicilien p. 25. *U. Avadae* Phil. von Sicilien p. 25; *U. Heldii* Küster von Passau, Podolien und aus der Saône p. 26, ist nur deforme *U. batavus* Lam. — *U. squamosus* Charp. aus der Schweiz, der Naab bei Regensburg, aus Albanien und dem Depart. Côte d'or. (Varietät von *U. batavus* Lam.). *Anodonta*

Kleciaki Drou. aus Dalmatien p. 28; An. Savensis Drou. aus Serbien p. 28. Anod. Moesica Drou. von ebendaher p. 29 und An. dorsuosa Drou. aus dem Dep. Cote d'Or. — P. Fischer, Note sur le genre *Olivella*, p. 31—33. — Erörterungen über das genannte Genus. — Henry Hemphill, Liste des Mollusques terrestres recueillis dans la partie septentrionale de la Basse Californie (Mexique), p. 35—38. — Es werden 1 *Limax*, 8 *Helix* und 1 *Succinea* aufgezählt; darunter keine neue Art. — Edgar A. Smith; Note critique sur la Monographie du genre *Velorita* de M. G. B. Sowerby, p. 38—42. — Abfällige Beurtheilung der Monographie des Genus in Sowerby. Conchol. Iconica. — Dr. A. T. de Rochebrune, Diagnoses specierum novarum familiae Chitonidarum — p. 42—46. — Neu beschrieben: Afrikanische Species: *Lophyrus Lenegalensis* p. 42; *Leptochiton Sererorum*, p. 43; *Leptoch. Cessaci* p. 43; *Tonicia Gambiensis* p. 43; *Acanthopleura Quatrefagesi* p. 44; *Acanthochites Dakariensis* p. 44; *Acanth. Adansonii* p. 44; *Ac. Bouvieri* p. 45; *Ac. Joallesi* p. 45. — L. Morelet, Diagnoses Molluscorum novorum, p. 46. Neu beschrieben: *Planorbis Rollandi* aus der Algerischen Sahara p. 46 und *Amnicola Pesmei* p. 46, von ebendaher. — Bibliographie p. 47—98; Systemat. conchyl. Cab. Sect. 92. *Neritina* II. und *Murex* V; Sect. 93. *Marginella* und *Erato*. — H. Drouët, *Unionidae de la Russie d'Europe*. — E. v. Martens, die Mollusken der Maskarenen und Seychellen, auf Grund der von Prof. Karl Möbius daselbst gesammelten Mollusken. — P. Fischer, *Manual de Conchyliologie ou Histoire naturelle des Mollusques vivants et fossils*. — Dr. Lodovico Foresti, *Dell Ostrea Cochleare di alcune sue varietà*. G. W. Tryon, *Manual of Conchology structural and systematic*. — Dr. W. Kobelt, *Synopsis novorum generum, specierum*

et varietatum Molluscorum viventium Testaceorum anno 1879 promulgatorum. — Gius. Brugnone, Le Conchiglie plioceniche delle vicenaze di Caltanissetta. — Thom. Davidson, Report on the scientific Results of the Voyage of H. M. S. Challenger during the years 1873—76. — Dr. Mario Lessena, Molluschi viventi del Piemonte. — Th. Bland, catalogue of the terrestrial Air-Breathing Mollusks of the United States and adjacent Territories of North-America. — W. H. Dall, Report on the Brachiopoda of Alaska and the adjacent shores of Northwest-America. — W. H. Dall, Descriptions of new forms of Mollusks from Alaska, contained in the Collections of the National-Museum. — Postpliocene Fossils in the Coast range of California. — Fossil Mollusks from later Tertiaries of California. — J. D. C. Schmeltz, Conchologische Miscellen. — Dr. E. v. Martens, Uebersicht der von W. Peters von 1843—1847 in Mossambique gesammelten Mollusken. — Dr. Ad. Döring, Apuntes sobre la Fauna de Moluscos de la Republica Argentina. — S. Clessin, die tertiären Binnenconchylien von Undorf. — W. M. Gabb, Descriptions of Caribbean Miocene Fossils. — Description of New Species of Fossils from the Pliocene Clay Beds between Limon and Moen, Costarica, together with Notes on previously known Species from there and elsewhere in the Caribbean Area. — Romolo Meli, Sulla natura geologica dei Terreni incontrati nelle fondazioni del nuovo ponte di ferro costruito sul Teverre a Ripetta e' sull Unio sinuatus Lam. rinvenutovi. — J. Gw. Jeffreys, Deep-Sea Exploration. — H. Hemphill, New Catalogue of the Shells of California and adjacent States. — Hemphill's Catalogue of Land and Freshwater Shells of Utah. — J. Gw. Jeffreys, Note as to the position of the Genus Seguenzia among the Gastropoda. — Rob. E. C. Stearns, Remarks on Fossils Shells from the Colorado Desert. — Comments upon Mr. Calkin's Marine

Shells of Florida. — In the matter of certain badly treated Mollusks. — Decript. of a New Species or Variety of Sand Snail of California — Marq. de Monterosato, Nota supra alcune Conchiglie Coralligene del Mediterraneo. — P. Fagot, Espèces des Pyrénées-Orientales du groupe de l'*Helix arbustorum*. — Note sur le véritable *Pupa Pyrenaica* Fér. — Matériaux pour la Faune malacol. terr. et des eaux douces de l'Aude. — P. Fagot, Moll. terr. et d'eau douce de la vallée d'Aulus. — P. Fagot, Hist. malac. des Pyrénées franç. — Haute Garonne — Hautes Pyrénées. — P. Fagot, Mollusques quaternaires des environs de Toulouse et de Villefranche. — W. W. Calkins, Description and Figure of a New Species of *Zonites* from Illinois. — Herm. v. Maltzan, zum Cap. St. Vincent, Reise durch das Königreich Algarve. — J. G. W. Jeffreys, On a new Species of *Chiton*, lately found in the British Coasts. — Jonas Collin, Faunula Molluscorum marinarum Hellebäckiana. — J. Brazier, Synonymy of and Remarks upon Port Jackson, New Caledonian and other Shells with their distribution. — List of Land Shells found on Thursday Island. — List of Brachiopoda or Lamp Shells found in Port Jackson and the Coast of New-South Wales. — Tropical Mollusca recently dredged at Port Jackson Neads. — Note on *Oniscia ponderosa*, with its locality. — Robert Boog Watson, Mollusca of H. M. S. Challenger's Expedition. Part. V. — Alf. E. Craven, Monographie du genre *Sinusiger* d'Orb. — Art. Issel, Istruzioni scientifiche per Viaggiatori raccolte — C. A. White, Contributions to Paleontology: Nr. 1. Cretaceous Fossils of the Western States and Territories. — Necrologie p. 98—104.

Heft II. H. Crosse, Faune malacologique du lac Tanganyika, p. 105—139. — vide Mal. Bl. Bd. VI, p. 127. — Dr. A. Baudon, Troisième

Supplement à la Monographie des Succinées françaises, p. 139—154. — Neu beschrieben: *S. putris* L. var. *hians* Baud. p. 141, t. 5, fig. 1. *S. Pfeiffer*, v. *punctatissima* Bd. p. 147, t. 5, fig. 3; ferner werden Bemerkungen über *S. Baudoni* Drouët und *S. acrambleia* Mab. mitgetheilt, sowie über *S. debilis* Pfr. (= *debilis* Mor.) und *S. oblonga*, von welcher Letzterer die var. *acuta* Drouët abgebildet wird (t. 5, fig. 4). — Den Schluss des Artikels bildet die Aufzählung aller in Frankreich beobachteten Arten und Varietäten. Es sind 14 Species mit 27 Varietäten. — Dr. A. Brot, Note sur quelques espèces de Coquilles fluviatiles, racoltées à Borneo et à Sumatra p. 154—160. Es werden neu beschrieben: *Melania Boeana*, p. 154, t. 6, fig. 4, *Mel. provisorio* p. 156, t. 6, fig. 2. *Mel. Bockii* p. 157, t. 6, fig. 3. — *Clea Bockii* p. 159, t. 6, fig. 5. — H. Crosse et C. Fischer, Note rectificative sur l'*Helix Farafangensis* U. Adams, p. 160—162. — Erläuterung der Synonymie der genannten Art. — H. v. Maltzan, Description de deux espèces nouvelles, — p. 162—163. Neu beschrieben: *Balea Heydeni*, p. 162, t. 6, fig. 6, v. *Cintra* in Portugal und *Argonauta Boettgeri* p. 163, t. 6, fig. 7 unbekannten Vaterlandes. — Charles de Stefani, sur la *Belgrandia thermalis* L., p. 164—167. — Der Autor stimmt mit der Anschauung der Marquise Paulucci bezüglich der Linné'schen *Turbo thermalis* überein, wonach diese Art eine ächte *Belgrandia* ist, während *Hydrobia Aponensis* Mts. eine von der ersteren verschiedene Art ist. — Zum Schlusse werden die in Italien bis jetzt beobachteten 6 Spec. *Belgrandia* aufgezählt, wobei *Belgrandia thermalis* L. als synonym mit *Bythinia Saviana* Issel genommen wird. — M. Cossmann, Description d'espèces inédites du Bassin Parisien, p. 167—173. — Es werden neu beschrieben: *Adeorbis*

lucidus, p. 167, t. 7, fig. 3; *Cerithium* Depontaillier p. 168, t. 7, fig. 4; *Mitra* Vicentiana, p. 170, t. 7, fig. 6 und *Diastoma multispiratum*, p. 172, t. 7, fig. 5. — J. Depontaillier, Description de deux nouvelles espèces fossiles, p. 175—178. — Neu beschrieben: *Euthria Rivierei*, p. 173, t. 7, fig. 1. Fundort: Die Grotte von Menton und *Scissurella Cossmanni*, p. 176, t. 7, fig. 2. — S. Depontaillier, Diagnose d'espèces nouvelles du Pliocène des Alpes-Maritimes, p. 178—180. — Neu beschrieben: *Columbella Mariae*, p. 178 und *Erato uniplicata*, p. 179. — Bibliographie, p. 180—187. — G. W. Tryon, Manual of Conchology structural and systematic Dr. P. Fischer, Manual de Conchyliologie ou Histoire naturelle des Mollusques vivants et fossiles. — Oehlert et Davoust, Sur le Devonien du depart. de la Sarthe. — Alf. de St.-Simon, Note sur l'*Helix chelonitis*. — Les Hélices carnassières et phytophages de la Nouvelle-Calédonie. — W. T. Blandford, Contributions to Indian Malacology, Nr. XII. Description of new Land und Freshwater Shells from Southern and Western India, Barmah, the Andaman Islands. — Neuigkeiten.

Heft III. H. Crosse, Contribution à la Faune malacologique de Nossi-Bé et de Nossi-Comba, p. 189—212, vide Mal. Bl. Bd. VI, p. 126. — A. Morelet, Recolte de M. Marie à l'île Mayotte p. 212—241, vide Mal. Bl. VI, p. 144. — E. Marie, Description d'espèces terrestres inédites, provenant de la Nouvelle-Calédonie, p. 241—244. — Es werden neu beschrieben: *Helix Seberti* p. 241, *Hel. caledonica* var. n. *intermedia* et *unicolor*. p. 244. — H. Drouët, Unionidae nouveaux ou peu connus, p. 244—254. — Neu beschrieben: *Unio Gaudioni* n. sp. p. 244 von Constantinopel; *U. succineus* n. sp. von Dalmatien p. 245; *U. croaticus* n. sp. p. 245

von Croatien; *Unio branchyrrhynchus* n. sp. von Norditalien, p. 246; *Unio Neocomensis* n. sp. vom Neuchâtel See p. 247; *Unio pruinus* Schmidt aus dem Veldeser See, von Albanien und Frankreich. *Anodonta Byzantina* n. sp. von Constantinopel, p. 249. *Anod. Gaudioni* n. sp. von Constantinopel. *Anod. Wimmeri* n. sp. aus Serbien, p. 251. *Anod. Dokici* n. sp. aus Serbien, *Anod. nymphigena* n. sp. aus dem Ossiacher See in Kärnthen, p. 254. *Anod. dealbata* n. sp. aus dem Faaker See in Kärnthen. — P. Fischer, Note sur la distribution géographique du *Panopaea Aldrovandi* p. 255—257. Bibliographie p. 257—275. — L. Pfeiffer, Nomenclator Heliceorum viventium. — Dr. W. Kobelt, Illustriertes Conchylienbuch. — A. de St. Simon, Anatomie de l'*Helix Cantabrica*. — G. W. Tryon, Manual of Conchology structural and systematic. — R. Meli, Sopra una nuova forma di Pecten dei depositi pliocenici di Civita Vecchia. — H. C. Küster, Syst. Conchylien - Cabinet v. Martini und Chemnitz; Sect. 95. Mactracea von Weinkauff; Sect. 97. *Helix* XI. — F. Fontannes, Etudes stratigraphiques et palaeontologiques pour servir à l'histoire de la période tertiaire dans le bassin du Rhône. VI. Le bassin du Crest (Drôme). — A. Locard, Etudes sur les variations malacologiques d'après la Faune vivante et fossile de la partie centrale du bassin du Rhône. — A. Locard, Nouvelles recherches sur les Argiles lacustres des Terrains quaternaires aux environs de Lyon. — Dr. C. Fischer, Manual de Conchyliologie 3 Fascicle. — P. Fagot, Hist. malac. des Pyrénées Franç. Ariège, Basses-Pyrénées. — M. Paulucci. Studio sulla *Helix cingulata* e forme affini. — H. v. Ihering et Dr. W. Kobelt, Zoologischer Jahresbericht 1879 von Carus, Mollusca. — Neuigkeiten. —

Heft IV. H. Crosse, Supplément à la Faune malacologique du Lac Tanganyika p. 277—706. — Nach neueren Sammlungen erhöht sich die Artenzahl der im Tanganyika vorkommenden Molluskenarten auf: Gen. Planorbis 2, Gen. Limnaea 1, Gen. Physa 1 (unbenannt), Gen. Ampullaria 1 Art. Gen. Lanistes 1, Gen. Neothauma 1 Art. Gen. Melania 7 Arten. Gen. Tiphobia 1 Art. Gen. Syrnolopsis 1 Art. Gen. Lacunopsis 1 Art. Gen. Tanganyika 2. Gen. Limnotrochus 2, Gen. Corbicula 1, Gen. Pliodon 1, Gen. Mutela 1, Gen. Spatha 1, Gen. Unio 6 Arten. Gen. Aetheria 1 Art, im Ganzen 32 Arten. — In der Umgebung des Sees wurden 12 Landmollusken gesammelt: 3 Ennea (eine nicht benannt). 4 Limicolaria, 1 Achatina, 1 Perideris, 1 Bulimus, 2 Subulina. — Betrachtungen über die geographische Vertheilung der Arten bilden den Schluss des Artikels. — L. Brevière, Tableau des Limaciens des environs de Ste.-Saulge, p. 306—316. — Der Verfasser zählt 9 Arionarten auf, darunter Ar. verrucosus n. sp. p. 310, t. 13, fig. 1, 2, und 6 Limax. — G. Wattebled, Catalogue des Mollusques Testacés terr. et fluv. observés aux environs de Moulins (Allier). Es werden 83 Arten aufgezählt, nur bekannte, meist weit verbreitete Arten. — H. Crosse et P. Fischer, Diagnoses Molluscorum novorum Reipublicae Mexicanae incolorum p. 334—335. Neu beschrieben: Aplecta bullula p. 334. Apl. Tapanensis p. 334. Physa Boucardi, p. 334. Physa Strebeli p. 335. Physa Tehuantepecensis p. 335. — J. B. Gassies, Description d'espèces terrestres provenant de la Nouvelle-Calédonie p. 336 bis 337. — Neu beschrieben: Hel. alveolus p. 336 t. 11, fig. 1, abgebildet. Bulimus Debeauxi Gass. t. 11, fig. 4. — H. Crosse, Nouvelle Note sur quelques Bulimes Neo-Calédoniens, appartenant à la

Section des Placostyles p. 338—342. Es werden beschrieben: *Bul. Rossiteri* Braz. p. 338, t. 12, Fig. 6. *Bul. fibratus* Mart. v. *sinistrosa* p. 340, t. 11, fig. 2 u. monstr. t. 11, fig. 3. — L. Morlet, Description de Coquilles nouvelles p. 342—347. — Neu beschrieben: *Eulima Caledonica* n. sp. p. 342, t. 12, fig. 1 u. 1a von Neu - Caledonien; *Helix Lacosteana* Morl. p. 343, t. 12, fig. 5. *Planorbis Rollandi* Morl. p. 344, t. 12, fig. 4. *Anmicola Pesmei* Morl. p. 345, t. 12, fig. 2. *Melanopsis Tunetana* Morl. p. 346, t. 12, fig. 3. Die 3 letzteren von Nordafrika. Bibliographie p. 347—365. — G. W. Tryon, Manual of Conchology structural and systematic, Partie XII. — Andr. Garrett, The Terrestrial Mollusca, inhabiting the Cooks or Harvey Islands. — W. Kobelt, Fauna Molluscorum extramarinorum Japoniae. — R. B. Watson, Mollusca of H. M. S. Challenger's Expedition Part IV.—X. — W. H. Dall, Reports on the Results of Dredging, under the Supervision of Al. Agassiz in the Gulf of Mexico and in the Caribbean Sea 1877—79. — Appendice al Catalogo delle Conchiglie componenti la Collezione Rigacci. — M. Paulucci, contrib. alla Fauna Malacol. italiana, Specie raccolte dal Dott. G. Cavanna negli anni 1878—80. — Edg. A. Smith, on the Gen. *Myodora* of Gray. — M. Paulucci Molluschi fluviatili italiani inviati come saggio alla Esposizione internazionale della Pesca in Berlino. — Ph. Dautzenberg, Liste des Coquilles rec. à Cannes. — M. Paulucci, Fauna italiana. — Comunicazioni malacologiche Art. I et II. — Nap. Pini, Appunti malac. sopra alcune forme di Conchiglie italiane, pubblicate come nuove specie. — M. Paulucci, Replica alle Osservazioni critiche dei Signori Pini, De Stefani et Tiberi sopra alcune viventi pubblicazioni malacologiche. —

Band XXII, Heft 1. H. Crosse, *Les Pleurotomaires de l'époque actuelle* p. 5—22. — Es werden die 4 recenten Arten des Genus mit vollständiger Synonymie und Beschreibung aufgezählt. *Pleuro. Adansoniana* Cr. F. ist abgebildet t. 1, fig. 1, 2. — C. Tapparone Canefri, *Museum Pauluccianum, Etudes malacologiques*. — Neu beschrieben: *Bullia Crosseana* n. sp. p. 23, t. 2, fig. 1, 2. *Volutharpa Paulucciana* n. sp. von Japan p. 24, t. 2, fig. 3, 4. — Das Genus *Volutharpa* wird beschrieben und die Arten desselben aufgezählt. — *Cypraea tabescens* var. *alveolus* n. var p. 30, t. 2, fig. 5. *Latirus Fischerianus* n. sp. p. 33, t. 2, fig. 8—9, v. Neu Caledonien. *Latir. funiculatus* n. sp. p. 34, t. 2, fig. 10—11. *Lat. melanorhynchus* n. sp. p. 35, t. 2, fig. 6—7. *Latir. scabrosus* Rv. v. *nigritellus* n. var. p. 36, t. 2, fig. 12 bis 13. — A. Mousson, *Note sur quelques coquilles de Madagascar*. p. 37—48. — Unter der Aufzählung von 12 von G. Schneider in Basel bezogenen Arten werden neu beschrieben: *Helicophanta Audeberti* p. 38, t. 3, fig. 1, *Ampelita Casizona* p. 41, t. 3, fig. 2. *Cyclostomus scalatus* p. 43, t. 3, fig. 4. *Cycl. obsoletus* Lam. v. *minor* p. 44; *Cyclost. brevimargo* p. 45, t. 3, fig. 5; *Ampullaria subscutata* p. 46, t. 3, fig. 6; *Doryssa (Melania) Audeberti* p. 47, t. 3, fig. 7. — P. Fischer, *Diagnoses d'espèces nouvelles de Mollusques recueillis dans le cours des expéditions scientifique de l'avisole Travailleur* p. 49—54. — Werden neu beschrieben: *Embolus triacanthus* p. 49—53. *Murex Richardi* p. 49. *Fusus Bocagei* p. 49. *Nassa Edwardsi*, p. 50; *Trochus Vaillanti*, p. 50, *Ziziphinus Folini* p. 50. *Machaeroplax Hidalgoi* p. 51. *Rimula Asturiana* p. 51. *Trochus lusitanicus* p. 51. — *Lima Marioni* p. 52. *Lima Jeffreysi* p. 52. *Modiola lutea* p. 52, und *Cochlodesma tenerum* p.

53. Sämmtlich vom Atlantischen Ocean an der Küste von Portugal bis Frankreich. — H. Crosse et P. Fischer, Description d'une espèce nouvelle de *Cyclostoma* provenant de Madagascar p. 54—55. Neu beschrieben: *Cyclostoma Paulucciae* p. 54. — P. Fischer, Sur la classification des Cephalopodes p. 55—57. Enthält Bemerkungen über die Eintheilung der Cephalopoden. — R. Tournouër, Description d'un nouveau Genre de *Cardidae* fossiles des „Couches à Congeries“ de l'Europe Orientale p. 58—59. — Neu aufgestellt: Genus *Prosodacna* mit 3 Arten: *Cardium macrodon* Desh., *Neumayri* Fuchs u. *Stephanescoi* Tourn. — R. Tournouër, Description d'un nouveau genre de *Melanopsidae* fossiles des terrains tertiaires superieurs de l'Algerie p. 59. — Neu aufgestellt Gen. *Smendovia* mit Species *Melanopsis Thomasi* Tourn. — P. Fischer, *Diagnosis generis novi Pteropodium fossilium* p. 59—60. — Neu aufgestellt: Gen. *Euchilothea* p. 59. Typus *Cleopatra Parisiensis* Desh. — Bibliographie p. 60—79. — G. W. Tryon Manual of conchology. Partie XIII. — C. Tapparone-Canefri, Glanures dans la Faune malacol. de l'île Maurice, Catalogue de la Famille des Muricidés. — M. l'abbé Bardin, Etudes palaeontologiques sur les terrains tertiaires miocènes du depart. de Maine-et-Loire. — D. Pohlert, Etudes sur les terrains paléozoïques de l'Ouest de la France. Description d'un nouveau Genre de Lamellibranche du terrain devonien inferieur. — L. de Folin, Considerations sur le genre *Acme* et les Operculés terrestres. — Japetus Steenstrup, De Ommatostrephagtige Blaëksprutters ind byrdes Forhold, en Orientirung. — Jap. Steenstrup. *Sepiella* Gray. — Jap. Steenstrup *Sepiadarum* og *Idiosepius* to nye Slaegter of *Sepiernes*

Familie med Bemaerkninger om de to belaegete Former Sepioloidea, D'Orb. og Spirula Lam. — Art. Issel, Istruzioni pratiche per l'ostricoltura e la mitilicoltura. — E. Bucquoy et Th. Dautzenberg. Les Mollusques marins du Roussillon. — A. de Lapparent, Traité de géologie. — H. Drouët, Unionidae de la Serbie. — Ar. Locard. Contribution à la forme malacologique franç. — Monogr. des genres Bulimus et Chondrula. 2. Cat. des Moll. terr. aquat. des environs de Lagny. — G. F. Angas, Notes on the Hel. sepulchralis and its Allies; with Descriptions of two Species. Descriptions of nine new Species of Land and Marine Shells from various Localities. — Descr. of a new Genus of Land Shells belonging to the Family Cyclophoridae. — Descr. of two new Species of Helix from. S. E. Betsileo Madagascar. — Necrologe. —

Heft II. A. Morelet, Observations critiques sur le Memoire de M. G. v. Martens intitulé: Mollusques des Mascareignes et des Sechelles, p. 85—106. Der Autor ergänzt die Aufzählung der Arten im genannten Werke, durch weitere Arten seiner Sammlung und beschreibt folgende neue: Cyclostoma verticillatum p. 90, t. 4, fig. 1. Cycl. dissotropis p. 91, t. 4, fig. 2. Cycl. trissotropis p. 92, t. 4, fig. 3. Cycl. Vacoense p. 93, t. 4, fig. 4. — Auricula Nevillei p. 104, t. 4, fig. 5. Assiminea granum p. 103, t. 4, fig. 8. Melampus carneus p. 101, t. 4, fig. 6. Hel. avellana p. 102, t. 4, fig. 7. Ausserdem ist das Vorkommen von Hel. pulchella zu erwähnen. — Th. Davison, Description d'une espèce nouvelle de Terebratulina, provenant de Japan p. 106—108. Neu beschrieben: Terebrat. Crossei p. 106, t. 7, fig. 1. — P. Fischer, Description d'une espèce inédite du genre Modiolus provenant de la Nouvelle-Calédonie p. 109—110. Neu beschrieben: Modiolus Moreleti.

p. 109, t. 7, fig. 2. — H. Crosse et P. Fischer, Description d'un *Cyclostoma* nouveau de Madagascar p. 110—112. Neu beschrieben: *Cyclost. Paulucciae* p. 110, t. 7, fig. 3. — M. Crosse et P. Fischer Description d'une espèce nouvelle de *Melania* provenant du Cambodge p. 112—113. Neu beschrieben: *Mel. Forestieri* p. 112, t. 7, fig. 4. — P. Cossmann, Description d'espèces nouvelles du Bassin Parisien p. 114—136. — Neu beschrieben: *Poromya tumida* p. 114, t. 5, fig. 1. *Sportella Bezanconi* p. 115, t. 5, fig. 2. *Lucina Bourdoti* p. 115, t. 2, fig. 3. *Trigonocoelia curvirostris* p. 117, t. 5, fig. 4. *Navicella Baylei* p. 118, t. 5, fig. 5. *Lacuna anomala* p. 119, t. 6, fig. 1. *Diastoma acuminiense* p. 120, t. 6, fig. 2. *Eulima Lamberti* p. 121, t. 6, fig. 5. *Bifrontia conoidea* p. 22, t. 6, fig. 4. *Stolidoma Morleti* p. 123, t. 6, fig. 5. *Delphinula infundibulata* p. 124, t. 6, fig. 6. *Typhis Rototi* p. 125, t. 6, fig. 7. *Marginella elevata* p. 147, t. 6, fig. 8; *Cardita Terquemi* p. 128. *Lima Buvignieri* p. 129, *Corbula Buvignieri* p. 129 und *Trochus subspiratus* p. 129. — Bibliographie p. 130—176. P. Fischer Manual de Conchyliologie Fasc. 4. — G. W. Tryon Manual of Conchology Partie XIV. — Memoires concernant l'histoire naturelle de l'Empire Chinois par des Pères de la Compagnie de Jésus. — Second cahier; Notes sur les Mollusques terrestres de la Vallée du fleuve bleu. — Bulletin de la Société d'étude des sciences natur. de Beziers. 4. année. — M. H. Filhol, Note sur une espèce nouvelle d'*Helix* (*H. Campbellica*). — Alf. de Craven, Descriptions of three new Species of Land and Freshwater Shells from Nossi-Bé Island. — On a Collection of Land and Freshwater Shells made during a short Expedition to the Usambara Country in Eastern Africa, with description of seven new species. — L. G. Jeffreys. The Deep-sea Mollusca of the Bay of

Biscay. — J. Brazier Notes on recent Mollusca found in Port Jackson and in the Coast of New South Wales and other localities with their synonyms. — List of Species of Porcellana or Cypraea found in Moreton Bay, Queensland. — Remarks on same recently redescribed Australian Shells. — Notes on a new variety of *Bulimus caledonicus*. — Ed. Dufour, Etudes des Fossiles des Sables éocènes de la Loire-Inferieure, Coq. bivalves. — M. Lessona, Sugli Arion del Piemonte. — W. Kobelt, Catalog der im europäischen Faunengebiet lebenden Binnenconchylien. 2. Aufl. — G. B. Sowerby, Description of eight new Species of Shells. — W. D. Hartmann, Observations on the Species of the Genus *Partula*, with a bibliographic Catalogue. — Description of a *Partula* supposed to be new, from the Island of Moorea. — A. Catalogue of the genus *Partula* Fér. — N. Pini, Contribuzione alla Fauna fossile postpliocenica della Lombardia. — Nouve Specie o forme poco note di Molluschi. — Contribuzione alla fauna malacologica d'Italia del Socio. — Delesse et de Lapparent, Revue de Géologie pour les années 1875 et 1876. — Mario Lessona. Solla *Helix hispida* L. in Piemonte. — Th. Bland, Description of a new Species of *Triodopsis* from New-Mexico. — On the relations of the Flora and Fauna of Santa Cruz West Indies. — Notes on *Macroceramus Kieneri* Pfr. and *M. pontificus* Gld. — Robert E. C. Stearns. On *Helix aspersa* in California and the geographical distribution of certain West American Land Shells. — *Mya arenaria* in San Francisco Bay. — Observations on *Planorbis*. — Edgar A. Smith. Account of the Zoological Collections made during the Survey of H. M. S. „Alert“ in the Straits of Magellan and on the Coast of Patagonia; Mollusca and Molluscoida. — On the genus *Gouldia* of C. A. Adams, and on a new Species of *Crassatella*.

— Note on *Cypraea decipiens*. — Lodovico Foresti, Contribuzione alla Conchiliologica Terziaria italiana. — C. F. Ancey, Sur la Faune Conchyliologique terrestre du pays des Somalis. — F. Hilgendorf. Noch einmal Planorbis multiformis. — Neue Forschungen in Steinheim. — Neue Untersuchungen über Plan. multiformis. — P. Fagot, Description de deux espèces de Pomatias des environs de Bagnères-de-Bigorre. — W. H. Dall, Nomenclature in Zoology and Botany. — F. Fontannes, Etude sur les Faunes malacologiques miocènes des environs de Tersanne et de Hauterives. — A. Benoist, L'étage Tortonien dans la Gironde. — L. de Folin et L. Perier, Notice sur les Fonds de la Mer. — F. Fischer, Notice sur la vie et les travaux d'Alcide d'Orbigny. — G. Nevill, Description of a new Species of *Acme* and varieties from the Conglomerat Beds at Menton. — W. G. Binney, On the Land Shells of the Mexican Island of Guadeloupe, collected by Dr. E. Palmer. — On the Jaw and Lingual Dentition of certain Costa Rica Land Shells collected by Dr. W. M. Gabb. — An certain North American Species of *Zonites*. — G. Brusina, *Orygoceras*, eine neue Gasteropodengattung des Melanopsiden-Mergel Dalmatiens. — C. A. White. Note on the occurrence of *Productus giganteus* in California. — Note on *Acrotele*. — Description of a new Cretaceous Pinna from New-Mexico. — Note on the occurrence of *Stricklandinia Salteri* and *S. Davidsoni* in Georgia. — L. de Folin. Dernieres observations sur les anomalies malacol. de l'étang d'Osségor. — C. A. White, Contributions to Paleontology Nr. 2—8. — H. Douvillé. Sur quelques genres de Brachiopodes. — Terebratulidae et Waldheimiidae. — R. C. Rossiter. A. List of the Cypraeidae found on the Coast of New Caledonia and Localty Islands. — J. G. Jeffreys, on the Mollusca procured during the „Lightning“ and

„Porcupine“ Expeditions 1868—70. Part. III. — E. A. Smith, Notes on the Gen. *Chilina*, with a List of the Known species. — On the Freshwater Shells of Australia. — R. E. C. Stearns, Description of a new Species or Variety of Land Snail of California.

Heft III. H. Crosse et P. Fischer, Note complémentaire sur la resorption des parois internes du test, chez les *Auriculidae*, p. 177—181. — Zur Ergänzung einer schon früher publicirten Arbeit über dasselbe Thema wird das verschiedene Verhalten der einzelnen Genera beschrieben und durch auf t. 8, fig. 1—15 dargestellte Figuren erläutert. — Zum Schlusse werden die Genera der Familie in 3 Gruppen getheilt. 1. Gruppe mit vollständiger Resorption der Innenwände: *Melampus*, *Auricula*, *Blauneria*, *Marinula*, *Tralia*, *Alexia*, *Monica* und *Plecotrema*. 2. Gruppe mit theilweiser Resorption: *Cassidula* und *Scarabus*. 3. Gruppe ohne jede Resorption: *Pedipes*. — H. Crosse et P. Fischer, Note complémentaire sur la resorption des parois internes du test chez les *Olivella*, p. 181—183. Bei den Arten des Gen. *Olivella* findet ebenfalls eine Aufsaugung der Innenwände der Schale durch das Thier statt. — Alb. Mousson Note rectificative, p. 183. — Der Verfasser berichtigt seine als *Doryssa Audeberti* von Madagascar beschriebene Art als *Melanatria Audeberti*. — H. Crosse, Note additionnelle sur le *Pleurotomaria Rumphii* Schepm., p. 183—184. Der Autor erkennt die Artberechtigung der genannten Species gegen seine *P. Adansoniana* an. — A. Morelet, Malacologie de Comores.-Récolte de M. Marie, à l'île Mayotte, p. 185—200. — (Vide laufender Band). — L. Morlet, Deuxième Supplément à la Monographie du genre *Ringicula* Desh., p. 200—215. — Der Verfasser zählt weitere Arten auf. Neu beschrieben werden: *A. Cabrai*,

p. 201, t. 9, fig. 1; *R. Senegalensis*, p. 202, t. 9, fig. 2; *R. admirabilis* p. 203, t. 9, fig. 3. *Ring. Schlumbergeri* p. 204, t. 9, fig. 4. — Die recenten Arten vermehren sich dadurch auf 37. — Durch Aufzählung weiterer fossiler Arten vermehrt diese Abtheilung auf 73. Species, von letzteren werden neu beschrieben; *R. Langlassei* p. 206, t. 9, fig. 6; *R. Leognanensis* p. 207, t. 9, fig. 7; *R. semidecorata* p. 208, t. 9, fig. 8. — Bibliographie p. 216—260. — Herm. Strebel et Dr. G. Pfeffer, Beitrag zur Kenntniss der Fauna Mexicinischer Land- und Süßwasserconchylien, Theil V. — G. W. Tryon, Manual of Conchology, Partie XV. — E. Bucquoy, Ch. Dautzenberg et G. Dollfuss, Les Mollusques marins du Roussillon. — M. Schepman Conchyliologische Bydragen. — A. Locard, Prodrome de Malacologie française. Catalogue général des Mollusques vivants de France. — B. Boog Watson, Mollusca of H. M. S. Challenger Expedition, Part. XI—XIV. — M. Neumayer et C. M. Paul, die Congerien- und Paludinen-schichten Slavoniens und deren Faunen. — R. Hörnes et M. Auinger, die Gasteropoden der Meeres-Ab-lagerungen der ersten und zweiten Miocänen Mediterran-stufe in der Oestr. Ung. Monarchie. — Marq. de Mon-terosato, Nota sull Articolo delle Conchiglie Pompeiane dell Dott. Tiberi. — P. Fagot, Notes sur le Catalogue des Mollusques de la region de Toulouse. — F. W. Hut-ton, Contributions to New Zealand Malacology. — Thomas Bland, Alfred R. Wallace, On the colors of animals. — Sitzungsberichte der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin, 1879—1880. — F. W. Nutton, On the New Zealand Hydrobinae. — On a new genus of Rissoinae. — On the Freshwater Lamellibranchs of New Zealand. — Notes on the Ana-tomy af the Bitentaculate Shigs of New Zealand. — Note on some Branchiate Mollusca. — Marq. de

Monterosato, Conchiglie del Mediterraneo, Art. second.  
 — S. Brusina, Le Pyrgulinae de l'Europa Orientale. —  
 L. Bardin, Note sur quelques Pectinidées du Miocène  
 de l'Anjou. — E. A. Smith, Observations on the Gen.  
 Astarte, with a List of the known recent species. —  
 M. Fischer, Sur la Faune malacol. abyssale de la  
 Méditerranée. — J. Gw. Jeffreys, Notes on the  
 Mollusca procured by the Italian Exploration of the  
 Mediterranean in 1881. — A. F. de Rochebrune,  
 Sur un type nouveau de la famille de Cyclostomaceae.  
 — E. A. Smith, A. Contribution to the Molluscan  
 Fauna of Madagascar. — A. Locard, Études mala-  
 cologiques sur les dépôts préhistorique de la vallée  
 de la Saône. — Dr. W. Kobelt, Iconographie der  
 Land- und Süßwasser-Mollusken mit europäischen noch  
 nicht abgebildeten Arten v. E. A. Rossmäessler. Neue  
 Folge, I. Bd., 1. u. 2. Lief. — Attilio Zuccari,  
 Collezione Rigacci. — Catalogo dei Fossili dei Dintorni  
 di Roma compilato. — J. W. Taylor, Life histories  
 of British Helices. Nr. 1. Hel. arbustorum. — S. B. Gas-  
 sies, Des causes de disparition de certaines espèces de  
 Mollusques terrestres dans la Guyenne et de l'acclima-  
 tisation de certaines autres. — W. H. Dall, On certain  
 Limpets and Chitons from the deep waters of the Eastern  
 Coast of the United States. — Deep-Sea Exploration.  
 — Neuigkeiten p. 260.

Heft IV. P. Fischer, Sur les Urocyclus  
 de Mayotte et de Nossi-Comba p. 261—271.  
 Der Verfasser beschreibt nach den Sammlungen M. E.,  
 Marie 3 Species des Gen. Urocyclus und zwar: U. Como-  
 rensis p. 262, t. 11, fig. 1. U. vittatus p. 262, t. 12,  
 fig. 1 und U. longicauda p. 263, t. 12, fig. 3. Von der  
 ersteren und zweiten Art wird die Anatomie (Radula  
 und Geschlechtsapparat) beschrieben und abgebildet t. 11,  
 fig. 2—7 und t. 12, fig. 2—9; nachdem die Literatur

über das Genus kritisch durchgegangen wurde. Am Schlusse werden die sämtlichen bekannten 7 Arten aufgezählt. — A. Vayssière, Note sur l'existence d'une coquille chez le *Notarchus punctatus* p. 271—273. Die genannte Art besitzt eine kleine Schale die t. 11, fig. 8 abgebildet wird. — P. Fischer, Diagnoses d'espèces nouvelles de Mollusques recueillis dans le cours des Expéditions scientifiques de l'avis le Travailleur, p. 273—277. — Es werden neu beschrieben: *Mitra cryptodon* p. 273 aus 1900 m Tiefe; *Fusus pupula* p. 274 aus 608 m; *Pseudomurex perfectus* p. 274, aus 400 m; *Belomitra paradoxa* p. 275 aus 627 m; *Dentalium ergasticum* p. 275 aus 1900 m Tiefe; sämtliche aus dem atlantischen Ozean. — R. Boog Watson, Note sur le *Rimula Asturiana* Fischer, p. 277. — Die genannte Art wird für identisch mit *Puncturella* (*Cranopsis*) *crabicia* Wats. erklärt. — P. Fischer, Note additionnelle sur le *Rimula Asturiana* p. 278. Der Autor widerspricht dieser Auffassung nicht und führt die Charaktere der 4 in Betracht kommenden Genera auf. — M. Cossmann, Description d'espèces nouvelles du Bassin Parisien (Fortsetz.) p. 279—293. — Werden neu beschrieben: *Sphenia radiatula* p. 279, t. 13, fig. 1; *Tellina Bouryi* p. 280, t. 14, fig. 1. — *Psammobia inaequilateralis* p. 281, t. 14, fig. 2; *Cytherea nuculoides* p. 282, t. 14, fig. 3; *Cyth. Vincentiana* p. 283, t. 14, fig. 4; *Isodoma ovalina* p. 285, t. 13, fig. 2. *Cardium Bourdoti* p. 286, t. 13, fig. 4; *Cardita cuneata* p. 287, t. 13, fig. 3; *Parmophorus pyramidalis* p. 288, t. 13, fig. 5; *Litiopa Klipsteini* p. 290, t. 14, fig. 5; *Cerithium Petitclerci* p. 291, t. 14, fig. 6, und *Marginella ventricosa* p. 292, t. 13, fig. 6. — M. Cossmann, citation d'espèces déjà décrites, dans de nouveaux gisements du

Bassin Parisien p. 293—294. Enthält Mittheilungen über die erweiterte Verbreitung in anderen als ursprünglich angegebenen Schichten. — Bibliographie p. 295—324. — M. Paulucci, Note Malacolog. sulla Fauna terr. e fluv., dell'isola di Sardegna. — J. V. Carus, Zoolog. Jahresbericht für 1881. Herausgegeben von der Zoolog. Station zu Neapel, III. Abth., Tunicata, Mollusca. — G. W. Tryon, Structural and systematic Conchology, vol. I. — J. G. Hidalgo, Moluscos Marinos de España, Portugal y las Baleares. — Mar. Lessona et C. Pollonera, Monographie dei Limacidi Italiani. — Herm. Friele, Den Norske Nordhavs-Expedition 1876—78, VIII., Zoology.-Mollusca. — Th. Studer, Beiträge zur Meeresfauna West-Africas. — Proceedings of the scientific Association of Trinidad, Part. XII. — W. H. Dall, Deep-Sea Exploration. — J. G. Jeffreys, Black-Sea Molluska. — Ant. de Gregorio, Fossili dei dintorni di Pachino. — Alph. Milne-Edwards, Rapport sur les travaux de la Commission chargée par M. le Ministre de l'Instruction publique d'étudier la Faune sous-marine dans les profondeurs de la Méditerranée et de l'Océan Atlantique. — Edg. A. Smith, Description of a species of *Fusus*. — P. Pelseneer, Etudes sur la Faune littorale de la Belgique, Mollusques et autres animaux inférieurs rec. sur la côte Belge en 1881. — W. H. Dall, Note on *Gadinia excentrica* Tib. — C. Tapparone-Canefri, Catalogo della Collezione di Conchiglie marine, terrestri e fluviatili del Signor Cav. F. Della Chiesa di Cervignasco. — J. D. Butterell, A List of the Land and Freshwater Moll., observed in the neighbourhood of Beverley. — M. Murlon, Monographie du Tamennien comprenant les Psammites du Condroz et les Schistes de la Famenne proprement dits. — P. Cogels, Contribution à l'étude géologique et paléontologique de la

Campine. — W. H. Dall, List of Papers 1866—1882. — A. Locard, Monographie du genre *Lartetia*. — A. Locard, Sur la présence d'un certain nombre d'espèces meridionales dans la Faune malacol. des environs de Lyon. — A. Locard, Notes sur les Hel. franc. du groupe de l'*Helix nemoralis*. — A. Locard, Catalogue des Moll. viv. terr. et aquat. du depart. de l'Aisne. — Neuigkeiten p. 324—26. — Nach Mittheilung M. A. Grandidiers werden 2 neue Arten von Madagascar beschrieben: *Helix* (*Ampelita*) *eurychila* p. 324 und *Acroptychia manicata* p. 328.

---

The Journal of Conchology Vol. III., 1880.

A. Garret, Catalogue of the Polynesian Mitridae with remarks on their geographical Range, Station, and descriptions of supposed new species p. 1—73. — Nach kurzen Bemerkungen über die Familie Mitridae folgt die tabellarische Liste der sämtlichen Arten der Familie Mitridae mit Angabe ihres Vorkommens von den Inseln von West- und Ost-Polynesien. Daran reiht sich die Aufzählung der Arten der einzelnen Genera mit Bemerkungen über ihre Verbreitung. Es sind 71 Species des Gen. *Mitra* (darunter — *M. eburnostoma* n. sp. p. 15; *M. eburnea* n. sp. p. 15; *M. humeralis* n. sp. p. 18; *M. propinqua* n. sp. p. 22; *M. subtexturata* n. sp. p. 26; *M. spiripuncta* n. sp. p. 27; *M. Tallitensis* n. sp. p. 30. — 9. Sp. *Strigatella* Sw. (mit *Strig. Zebra* n. sp. p. 35.) —; Gen. *Turricula* Klein mit 76 Arten (darunter *T. bicolor* n. sp. p. 38; *T. castanea* n. sp. p. 42; *T. flexicostata* n. sp. p. 46; *T. festiva* n. sp. p. 46; *T. fusco-nigra* n. sp. p. 47; *T. Hoyti* n. sp. p. 47; *T. instricta* n. sp. p. 48; *T. laevicostata* n. sp. p. 50; *T. modicella* n. sp. p. 53; *T. pulchra* n. sp. p. 56; *T. Peasei* n. sp. p. 57; *T. propinqua* n. sp. p. 58; *T. uniliniata* n. sp. p. 60 nebst 8 nicht benannten Species). Gen. *Cylindra* Schum.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [NF\\_7\\_1885](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur-Bericht Journal de Conchyliologie XXI Bd. 1881 104-124](#)