

Kleine conchyliologische Mittheilungen, p. 183 bis 188. Enthält Bemerkungen über das Vorkommen von *Venericardia planicosta* Lam., von *Helix intersecta* Poir. (= *caperata* Mont.), von *Lithoglyphus naticoides* Fer., von *Claus. plicatula* Drp., ferner die Aufzählung von Binnenmollusken, die in der Umgegend von Miasteczko an der Netze (Nord Posen) gesammelt wurden, sowie einiger Wassermollusken aus der Warthe bei der Festung Posen. — *Necrologie* p. 188. — Kleinere Mittheilungen p. 188 bis 189. *Literaturbericht* p. 189—191.

Jahrbücher der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. Jahrgang VIII. 1881. — C. A. Westerlund, *Kritische Bemerkungen*, p. 1—9. — Bemerkungen über *Hel. eremia* und *anonyma* West., *Planorb. vorticulus* Tr., *Limnaea lagotis* var. *margaritacea* West., *Claus. cruciata*, über *Pomatias*arten; *Valvata minuta* Drap. über *Hel. Thiesseae* Montf; *Helix Mathildae* Klec.; *Helix etnea* Ben.; und *Hyal. Kutschigi* Pons. — V. Gredler, zur *Conchylienfauna von China*, II. p. 10—33. — Fortsetzung des Berichtes über die von dem Missionär Kaspar Fuchs in China gesammelten Arten. Es werden neu beschrieben: *Hyalina (Conulus) franciscana* p. 13; *Hel. miliaria* p. 14; *Streptaxis Fuchsianus* p. 16, t. 1, fig. 2; *Strept. cavicola* p. 19; *Stenogyra turgida* p. 21, 1, fig. 3; *Pupa Xunana* p. 23, t. 1, fig. 5. *Claus. principalis* p. 24, t. 1, fig. 6; *Claus. genuina* p. 26; *Pupina ephippium* p. 28; *Moussonia Paxillus* p. 29, t. 1, fig. 7. — O. F. von Möllendorf, zur *Binnenmolluskenfauna von Nordchina*, p. 33—43. Aufzählung von 33 Arten, darunter neu *Helix mongolica* p. 39, t. 1, fig. 10; — Fr. Rolle, über einige Landschnecken aus einer römischen Aufgrabung bei Homburg v. d. Höhe, p. 44. — Aufzählung von 10 Arten vom Homburger Schlossberg und von 6 Species aus dem Gonzenheimer Feld. — W. Kobelt,

Excursionen in Süditalien, p. 50—67. Die sicilianischen Iberus mit Tafel 2. — Enthält interessante Bemerkungen über das allmähliche Uebergehen einzelner Arten in einander. — O. Schmidt; zur Molluskenfauna von Weimar, mit Berücksichtigung der in den pleistocänen Ablagerungen vorkommenden Arten, p. 68—82. Nach Beschreibung des Sammelterrains folgt Aufzählung der Arten mit specieller Fundortangabe bis incl. der Auriculiden. — T. A. Verkrutzen, Bericht über meinen Besuch der grossen Bank von Neufundland im Sommer 1880, p. 81—100. Aufzählung der gesammelten Arten. — H. Tschapeck, einige Süsswasser-Mollusken des Sanngebietes, p. 101—109. Aufzählung der Melanien und Neritina-Arten. Abgebildet werden *Melania Hollandri* typ. t. 1, f. 1, a. b. c. d. e. var. *elegans* f., var. *semiplicata* fig. g. var. *laevigata* fig. h., *Mel. parvula* t. 1, fig. 1, i. k., *Melanopsis acicularis* fig. l. m., *Mel. Esperii* fig. n., und *Neritina stragulata* fig. o. — V. Gredler, zur Conchylien-Fauna von China, III. p. 110—132. — Weitere Aufzählung von P. Kasp. Fuchs gesammelten Arten: Neu beschrieben: *Hydrocaena Bachmanni* p. 114, t. 6, fig. 2. — *Stenogyra gracilior* p. 117, t. 6, fig. 3; *Pupa strophoides* p. 118, t. 6, fig. 4; *Oncomelania* n. gen. p. 120; *Oncomelania Hupensis* p. 120, t. 6, fig. 5; *Unio Leai* var. *cinnamomeus* n. p. 122, t. 6, fig. 6; *Hel. Kuangtanensis* p. 124; *Lithoglyphus liliputanus* p. 131. — Von *Hydrocaena Bachmanni* ist die Zungenbewaffnung beschrieben und abgebildet t. 6, fig. 2. — H. C. Weinkauff, Catalog der Gattung *Cypraea* Leach., p. 133—57. Aufzählung der 185 Arten mit Fundortangaben. — D. F. Weinland, Nachtrag zur Molluskenfauna von Haiti, p. 158—159. Neu beschrieben: *Macroceramus lineatus* Brug. var. *glabrata*, p. 158 und *Cylindrella sericea*

Pfr. var. *Kisslingiana*, p. 159. — S. Hazay, die Succinien Englands, p. 160—165. Aufzählung der Arten: *Succ. putris* mit 8; *Succ. elegans* mit 1, *Succ. Pfeifferi* mit 6, *Succ. suecica* und *Succ. oblonga* mit 1 Var. Neu beschrieben: *Succ. putris* var. *Fitz-Geraldiana* p. 164. — O. Boettger, Sechstes Verzeichniss transcaucasischer, armenischer und nordpersischer Mollusken, p. 167—261. Es werden neu beschrieben: *Glandina algira* Schum. var. *mingrelica*, p. 170, t. 7, fig. 1; *Daudeb. Lederi* p. 172, t. 7, Fig. 2, a, b; *Pseudomilax* n. gen. p. 173. *Pseudom. Lederi* p. 174, t. 7, fig. 3a—c; *Pseudom. bicolor* p. 175, t. 7, fig. 4a—c; *Trigonochlamys* n. g. p. 176. *Trig. imitatrix* p. 177, t. 7, fig. 5a—c; *Limax monticola* p. 180, t. 7, fig. 6a—c; *Limax carinatus* p. 186, t. 7, fig. 7a—c; *Hyalinia suturalis* p. 190, t. 8, fig. 9a—d; *Hyal. Komarowi* p. 192, t. 7, fig. a—d; *Hyal. subeffusa* var. *depressa* p. 193, t. 8, fig. 10a—b; *Hyalinia pontica* p. 195, t. 8, fig. 13a—c; *Hyal. elegans* p. 197, t. 8, fig. 12a—c; *Helix Ravergii* Kryn. var. *persica* t. 8, fig. 14a—c; *Helix (Xerophila) parableta* p. 212, t. 8, fig. 15a—c; *Helix (Helicogena) Christophi* p. 217; *Retowskia* nov. sect. gen. *Bulimini* p. 219 (für *Bul. Schlaeflii* Mouss.); *Clausilia litotes* Schum. var. *litoderma*, p. 231, t. 8, fig. 16a—b; *Claus. pumiliformis* p. 234, t. 9, fig. 17; *Claus. dipolauchen* p. 235, t. 9, fig. 18; *Claus. Lederi* var. *triadis* p. 238, t. 9, fig. 19; *Pomatias Lederi* p. 244, t. 9, fig. 23; *Hydrobia Sieversi* p. 246, t. 9, fig. 23; *Ancylus fluviatilis* var. *armenia* p. 255, t. 9, fig. 21. — Jul. Hazay, Ausflug nach Oberungarn. Excursionsbericht. Neu beschrieben werden: *Bythinella Heynemanniana* p. 271. *Byth. Tornensis* p. 273 und *Lymnophysa palustris* var. *gracilis* p. 274, Figuren im Text. — O. Böttger, Neues über die Gattung *Daudebardia* p. 276—277. — Beobachtung

Hans Leders über elektrische Explosionen der *D. Lederi*. — W. Kobelt, die ehemalige Landverbindung zwischen Mauritanien und Spanien p. 278. Malacologische Funde zum Beweise für die einstige Verbindung. — T. A. Verkrüzen, *Buccinum* L., p. 279—301. Aufzählung der Arten des Genus, welche auf der nördlichen Hemisphäre beobachtet werden, mit Bemerkungen über einige Arten. Dann folgen nachträgliche Notizen über *Bucc. Totteni* Stimps. — O. F. Möllendorf, Beiträge zur Molluskenfauna von Südchina, p. 302—312. Neu beschrieben werden: *Cyclophorus elegans* p. 307; *Cycloph. Clouthianus* p. 308; *Cycloph. Hungerfordianus* p. 308, *Cycloph. trichophorus* p. 309; *Pupina pulchella* p. 309; *Vaginulus chinensis* p. 310; *Claus. Gerlachi* p. 310; *Claus. Elisabethae* p. 311; *Pupa microstoma* p. 311; *Streptaxis erythroceras* p. 311; *Strept. costulatus* p. 312. — W. Kobelt, Catalog der Gattung *Neptunea* Bolten, p. 313—322; Aufzählung der Arten mit Fundortangaben. — W. Kobelt, Catalog der Gattung *Monoceras* Lam., p. 323—325. — W. Kobelt, Catalog der Gattung *Myodora* Gray, p. 325—327. — W. Kobelt, die mauritanischen *Iberus*, p. 327—336. — Neu beschrieben werden: *Hel. sicanoides* Kob., p. 330, t. 10, fig. 1—3; *Hel. platycheloides* p. 332, t. 10, fig. 4—6; *Hel. tetuanensis* p. 313, t. 10, fig. 7—9; *Hel. Boettgeri* p. 334, t. 10, fig. 10—12; *Hel. Scherzeri* Zelebor., abgebildet t. 10, fig. 13—15. — C. F. Jickeli; Land- und Süßwasser-Conchylien Nordost-Africas gesammelt durch J. Piroth, p. 336. Aufzählung von 18 Arten, darunter neu beschrieben: *Cleopatra Pirothi* p. 338 und *Pisidium Pirothi* p. 340. — O. Boettger, *Sectiones speciesque novae Clausiliarum Caucasiarum* p. 341—346. — Neu auf-

gestellt und beschrieben: *Acrotoma* sect. nov. p. 341; Typus *A. Komarowi* p. 341. *Claus. laccata* p. 342; *Claus. semicincta* p. 343. — *Micropontica* nov. sect. p. 345. Typus *Claus. closta*, p. 345. — P. Hesse, *Miscellen*, p. 346–350. — Die systematische Stellung von *Hel. arbustorum*; 2. *Hel. carascalensis* Fer., eine Xerophile, 3. *Hel. pisana* Müll. — Literatur p. 350 bis 354. —

IX. Jahrgang. 1882. — Th. Loebbecke u. W. Kobelt; *Museum Löbbeckeanum* III, p. 1–7. Beschreibung neuer Arten: *Latirus Troscheli* Löbb., n. sp., t. 1, fig. 1, von den Philippinen. *Apollon leucostoma* var., p. 2, t. 1, fig. 2; *Streptaxis regius* Löbb., n. sp., p. 3, t. 1, fig. 3. *Strept. Dunkeri* var. *clausa* Löbb., p. 4, t. 1, fig. 4–5; *Bulimus Doeringii* Kob., n. sp., p. 5, t. 1, fig. 6 von Cordoba in Südamerika; *Bul. Philippi Döring.*, n. sp., p. 6, t. 1, fig. 7 von ebendaher. — W. Kobelt. *Cataloge lebender Mollusken*; p. 8–29. — *Catalog von Gen. Fusus* Lam. mit 34 Arten; *Gen. Pisania Bivona* mit 31 Arten; *Gen. Pollia* Gray mit 52 Arten; *Gen. Metula* H. u. A. Adams mit 4; *Gen. Buccinopsis* Jeff. mit 3; *Gen. Neobuccinum* Smith. mit 1; *Gen. Chlanidita* Mts. mit 1; *Gen. Clavella* Sws. mit 3, *Gen. Desmoulea* Gray mit 9 Arten. — P. Hesse, *Miscellen. Fortsetzung*, p. 29–37. — 4. *Trigonochlamys imitatrix*. Zunge und Kiefer beschrieben und abgebildet, t. 2, Fig. 1, + a–c; 5. *Hel. Ammonis* Schm. und Verwandte. Geschlechtsapparat von *H. candicans*, t. 2, fig. 2; *Hel. ericetorum*, t. 2, fig. 3 und *Hel. ammonis*, t. 2, fig. 4 abgebildet. — V. Gredler, *Zur Conchylienfauna von China* IV; p. 38–50. — Neu beschrieben werden: *Hyal. spiriplana*, p. 39; *Hyal. Loana*, p. 40; *Pterocyclus Lienensis*. p. 43; *Claus. ridicula*, p. 45; *Hel. Zenonis*, p. 48; und *Stenogyra striatissima*, p. 49. — W. Kobelt,

Tryon's Manual of Conchology, p. 51—67, Recensionen. — W. Kobelt, Diagnosen neuer Arten, p. 68—72. — Neu beschrieben werden: *Helix Florentiae* Ponsonby von Tanger, p. 68; *Hel. Ponsonbyi* von Oran, p. 69; *Hel. Sigensis* von Nemours in Algier, p. 69; *Hel. Lemoinei* Deb. vom südlichen Oran, p. 69; *Hel. andalusica* Kob. von Spanien, p. 70; *Stenog. decollata* var. *claviformis* von Nemours, p. 71; *Pupa tingitana* von Tetuan, p. 71; *Pupa Algesirae* und *Pupa vasconica*, p. 72 von Spanien. — W. Kobelt, Excursionen in Spanien, p. 73—90. — Th. Loebbecke, Diagnosen neuer Arten, p. 90—91. — *Conus Weinkauffi* Löb. von Neu-Caledonien, *Ostrea Liskei* Lob., p. 91 von Ceylon. — Literatur, p. 91 bis 96. — H. Dohrn, Beitrag zur Kenntniss süd-amerikanischer Landconchylien, p. 97—115. Neu beschrieben: *Ammonoceras nitidulus*, p. 97. *Ammon. amazonicus*, p. 97; *Helix gyroplatys*, p. 99. *Hel. suborbicula* (= *orbicula* J. Pfr. nec Orbigny), p. 100; *Solaropsis rugifera*, p. 101; *Solaropsis diplogonia*, p. 101; *Solaropsis elaps.*, p. 102. *Bulimus callistoma*, p. 103, t. 3, fig. 1—2; *Bul. Semperi*, p. 103, t. 3, fig. 5—6; *Odonostomus Ciaranus* p. 104, t. 3, fig. 9. *Otostomus nigrogularis*, p. 107, t. 3, fig. 10—13; *Otost. melanoscolops*, p. 108, t. 3, fig. 6—8. Ausserdem Bemerkungen über eine Reihe anderer Arten. — H. Dohrn, Ueber einige centralasiatische Landschnecken, p. 115—120. Neu beschrieben werden: *Zonites latissimus*, p. 117, nebst Bemerkungen über eine Reihe bekannter Arten, die sämmtlich aus dem Hasrat-Gebirge, südöstlich von Samarkand stammen. — W. Kobelt. Catalog der Familie Melanidae, p. 121. — Die Aufzählung der Arten erfolgt nach A. Brot's Monogr. in Mart.-Chemnitz Conchylien-Cab. — Gen. *Paludomus* mit 44 Arten; Gen. *Hemisinus* Sws. mit 36; Gen. *Melanopsis* Fer. mit 42; Gen. *Claviger* Haldem. mit 7; Gen. *Pirena* mit 9;

Gen. *Doryssa* Ad. mit 16 Arten. — W. Kobelt, *Excursionen in Spanien*, p. 143—170. — H. C. Weinkauff, *Catalog der Gattung Ovula* Ring., p. 171—179. — 66 Arten. — O. F. v. Möllendorf, *Diagnoses specierum novarum Chinae meridionalis*, p. 179—188. Es werden neu beschrieben: *Cyclotus tubaeformis*, p. 179, *Pterocyclus Gerlachi*, p. 180; *Cyclophorus cuticosta*, p. 180; *Leptopoma polygonatum*, p. 181; *Diplommatina rufa*, p. 181; *Alycaeus latecostatus*, p. 182; *Helicina Hungerfordiana*, p. 182; *Helicina Hainanensis*, p. 182; *Ennea splendens*, p. 183; *Macrochlamys cincta*, p. 183. *Microcystis Schmackeriana* Möll., p. 184. *Plectopylis cutisculpta*, p. 184; *Helix trochulus*, p. 184; *Helix xanthoderma*, p. 185; *Claus. porphyrea*, p. 186. *Claus. mucronata*, p. 187. *Claus. Eastlakeana*, p. 187; *Claus. thaleroptyx*, p. 188. — F. Loebbecke und W. Kobelt, *Museum Löbbeckeanum*, p. 188—191. Neue Arten: *Conus Weinkauffi* Löbb., p. 188, von Neucaledonien (?). *Conus Kobelti* Löbb., p. 189; *Ostrea Lischkei* Löbb., p. 190, von der Westküste Ceylons. — Literatur, p. 191—202. — T. A. Verkrüzen. *Buccinum* L., p. 203 bis 221, Fortsetzung. — Nachträglich etwas über *Buccinum undatum* L., seine Abänderungen und nächsten Verwandten, p. 221—229. — W. Kobelt, *Die Buccinen des Peterburgers Museums*. (Bemerkungen zu vorstehendem Ausfatze), p. 229—235. Neu beschrieben: *Buccinum Verkrüzeni*, p. 230. Dann werden verbesserte Diagnosen mehrerer nordischer Arten gegeben. — M. M. Schepman, *Die Zungen der Hyalinen*, p. 236—243. Beschreibung und Abbildung der Zungenzähne von *Hyal. fulva*, t. 6, fig. 1. *Hyal. nitida*, t. 6, fig. 2; *Hyal. excavata*, t. 6, fig. 3; *Hyal. olivetorum*, t. 6, fig. 4; *Hyal. hiulca*, t. 6, fig. 5; *H. nitens*, t. 6, fig. 6; *Hyal. nitidula*, t. 6, fig. 7; *Hyal. pura*, t. 6,

fig. 8; Hyal. filicum, t. 7, fig. 9; Hyal. koutaisiana, t. 7, fig. 11; Hyal. Darparnaldi, t. 7, fig. 11; Hyal. Villae, t. 8, fig. 12; Hyal. Alhambrae, t. 8, fig. 13; Hyal. cellaria, t. 8, fig. 14; Hyal. alliaria, t. 8, fig. 15. Hyal. helvetica, t. 8, fig. 16; Hyal. glabra, t. 8, fig. 17; Hyal. Hammonis, t. 8, fig. 18; Hyal. petronella, t. 8, fig. 19; Hyal. crystallina, t. 8, fig. 20. — E. v. Martens. Binnenconchylien aus Angola und Loango, p. 243 bis 250. Aufzählung einer Reihe von Arten, die v. Mechow und Dr. Buchner in den genannten Gegenden gesammelt haben. Neu beschrieben: Achatina Buchneri, p. 245; Limicolaria subconica, p. 246; Ennea Dohrni, p. 247. Melania recticosta, p. 248. Trochonanina peliostoma, p. 250. — O. F. v. Möllendorf, Materialien zur Fauna von China, p. 251—278. I. Die Deckelschnecken: Es werden unter Aufzählung aller bisher bekannten Arten aus China neu beschrieben oder abgebildet: Cyclotus tubaeformis Moll., p. 252, t. 9, fig. 1; Cyclotus chinensis Pfr., p. 254, t. 9, fig. 2; Cyclotus stenomphalus Heude, p. 256. Cyclophorus exaltatus Pfr. p. 266, t. 9, fig. 3; Cycloph. punctatus Pfr., p. 268, t. 9, fig. 4; Cyclophorus subcarinatus Mlldf., p. 270, t. 9, fig. 5; Cycloph. pyrostoma Mlldf., p. 271, t. 9, fig. 6; Cycloph. elegans Mlldf., p. 272, t. 9, fig. 7; Cycloph. Clouthianus Mlldf., p. 274, t. 10, fig. 1. — Literatur, p. 278—282. — P. Hesse. Eine Reise nach Griechenland, p. 283—336. Reiseerlebnisse, dann Aufzählung der Literatur über griechische Binnen-Conchylien und der gesammelten Arten. Neu beschrieben werden: Hyalinia Clessini, p. 318, t. 12, fig. 2; Hyal. Zakynthia, p. 319, t. 12, fig. 3; Hyal. Blanci, p. 319, t. 12, fig. 4; Hel. interpres West., p. 323, t. 12, fig. 5; Hel. Chalcidea Mouss. var. didyma West., p. 325, t. 12, fig. 6; Buliminus pseudogastrium, p. 328; Cionella acicula var. Böttgeri, p. 332, t. 12, fig. 8; Pomatias

tessellatus var. densestriata, p. 335. — O. F. Möllendorf, Materialien zur Fauna von China, p. 337—356, Fortsetzung. Neu beschrieben werden: Cycloph. trichophorus Mlldf., p. 338, t. 10, fig. 3; Cycloph. pellicosta Mlldf., p. 340, t. 10, fig. 2; Cycloph. Hungerfordianus Mölldf., p. 344, t. 10, fig. 4; Leptopoma polyzonatum Mlldf., p. 343, t. 10, fig. 5; Alycaeus Hungerfordianus Nev., p. 345, t. 10, fig. 6; Alycaeus latecostatus Möll., p. 346, t. 10, fig. 7. Diplommatina subcylindrica Mlldf., p. 349. Dipl. rufa Mlldf., p. 350, t. 10, fig. 8; Pupina pulchella Mlldf., p. 352, t. 10, fig. 9. Helicina Hungerfordiana Mölldf., p. 354. — T. A. Verkrüzen, Buccinum L., Fortsetzung, p. 356 bis 365. — C. F. Jickely, Diagnosen neuer Conchylien, p. 366—370. Neu beschrieben: Ancyclus Clessinianus, p. 366 von Alexandrien. Vitrina conquisita, p. 366 von Habab; Vit. Riepiana, p. 366 von Abyssinien; Recluzia erythraea, p. 367; Elusa Rüppelli, p. 367; Syrnodea solidula Dkr. var. fasciata, p. 367; Rissoina assimilis, p. 368; Riss. dimidiata, p. 368; Riss. angulata, p. 369; Scapharca Jickelii Dkr., p. 369; Donax Dohrnianus, p. 369; Tyleria Vesti, p. 370; sämtlich aus dem rothen Meere. — H. Dohrn, Aufzählung der Naninaarten von Madagascar, p. 370—377. Unter den bis jetzt bekannten 10 Arten des Genus werden neu beschrieben: Nan. Hildebrandti, p. 371; Nan. anobrachys p. 373; N. Eos., p. 373; N. Thalia, p. 374; N. Xestia, p. 375; N. basalis, p. 375. — Guilielmus Dunker, de Molluscis nonnullis terrestribus Americae australis, p. 377—388. Neu beschrieben oder abgebildet werden: Helix. Neogranadensis Pfr. var., p. 377, t. 11, fig. 5, 6; Bulimus lugubris, p. 378, t. 11, fig. 1, 2; Bul. albopalteatus, p. 378, t. 11, fig. 7—8; Bul. Powisianus Petit, p. 379, t. 11, fig. 3, 4. — Literatur, p. 380—386.

X. Jahrgang, 1883. H. Simroth, Anatomie der *Parmacella Olivieri* Cuv., p. 1—47. — Ausführliche und vollständige Beschreibung der anatomischen Verhältnisse der genannten Art mit Abbildungen T. 1, Fig. 1—18. — D. F. Heynemann, Neue Nacktschneckengattung von Madagascar, p. 47—50. Neu beschrieben Genus *Elisa*, p. 48 mit *Elisa bella*, p. 48, T. 2. Abbildung der Art Fig. 1—3, des Schälchens Fig. 5, des Kiefers Fig. 5 und der Radula Fig. 6—7. — C. A. Westerlund, Malakologische Miscellen, p. 51—64. I. Descriptiones. Es werden neu beschrieben: *Hyal. Westerlundi* Cafici, p. 51; *Helix bidinensis* Caf., p. 52; *Hel. Benoiti* Caf., p. 52; *Hel. moesta* Parr. v. *luctuosa*, p. 53., sämtlich v. Sicilien; *Hel. praeclara* Caf., p. 53, v. Sicilien; *Vitrina kotulae*, p. 54, von Galizien; *Hyal. alliardia* var. *cantabrica*, p. v. Spanien; *Hyal. glabra* var. *hungarica*, p. 55, v. Ungarn; *Hyal. perspectiva* var. *parma* v. Italien, p. 56; *Hyal. icterica* Tib. var. *parthenopaea* v. Italien, p. 56; *Hyal. incerta* Drap. var. *vafra* v. Bayonne, p. 56; *Leucochroa cariosula* Mich. var. *vetula* v. Algerie, p. 57; *Helix phthiota* v. Griechenland, p. 58; *Hel. pastorella* von Griechenland, p. 58; *Hel. liburnica* Stoss, v. Italien, p. 59; *Hel. samnitum* v. Italien, p. 59; *Hel. graja* v. Griechenland, p. 60; Pupa *avenacea* Prug. var. *clienta* v. Galizien, p. 61; Pupa *odontostoma* West. v. Norwegen, p. 61; *Claus. gastrolepta* Ross. subsp. *Eugenia* v. Dalmatien, p. 61; *Claus. intusstructa* Blanc v. Süditalien, p. 62; *Claus. euchroa* v. Euboea, p. 63; *Pomatias auritus* var. *chelys* v. Dalmatien, p. 63; *Pomat. laburdensis* Fag. var. *labrosa* v. Spanien, p. 63 und *Pomat. Blancianus* v. Sicilien, p. 64. — II. Conspectus formarum in regione Palaeoaretica viventium generis *Pomatias* Stud., p. 64—72. Die Arten der paläoaretischen Region werden in 5 Sectionen gruppiert, die sich auf Merkmale

der Schale gründen. Ob diese Eintheilung eine glücklich gewählte ist, möchte ich entschieden bezweifeln, da zum Beispiele die Sect. V. *turritus* nur Arten enthält, die von ihren unverkennbaren Stammarten abgerissen sind. — Pom. *Henricae* Strob. wird als in Bayern vorkommend angegeben, was ich als unrichtig bezeichnen muss. — P. Hesse, Beiträge zur Molluskenfauna Griechenlands, p. 73—81. Enthält ältere Literaturangaben über die Binnenconchylien Griechenlands. — E. v. Martens. Diagnosen neuer Arten, p. 81—84. — Neu beschrieben werden: *Nanina Egbertae* von Südost-Neuguinea, p. 81; *Hel. excoriata* v. Madagascar, p. 82; *Helix naso* von Südost-Neuguinea p. 82; *Helix Rehsei* von ebenda, p. 83; *Planorbis Hildebrandti* v. Madagascar, p. 83 und *Cistula consepta* v. Portorico. — W. Kobelt, Diagnosen neuer Arten, p. 84 bis 86. — Neu beschrieben: *Hel. Maltzani* v. Smyrna, p. 84; *Hel. aimophila* var. *Tchihatcheffi* v. Biredschik (Euphrat). — Literatur, p. 86—96. — W. Kobelt, Molluskengeographisches vom Mittelmeer, p. 97—114. Der interessante Aufsatz ist kaum eines Auszuges fähig. — Herm. Frh. v. Maltzan, Beiträge zur Kenntniss der senegambischen Pleurotomiden, p. 125—135. Aufzählung der 36 Arten der Familie mit kritischen Bemerkungen. Neu beschrieben werden: *Crassispira laevisulcata*, p. 122, T. 3, Fig. 6; *Mangilia goreënsis*, p. 131, T. 3, Fig. 11; *Mang. subclathrata*, p. 133, T. 3, Fig. 13; *Mang. Strucki*, p. 133, T. 3, Fig. 14; *Mong. senegalensis*, p. 134, T. 3, Fig. 15. — O. Boettger, VII. Verzeichniss von Mollusken der Kaukasusländer, p. 135—198. — Aufzählung von 91 von Hans Leder gesammelten Arten; darunter neu beschrieben: *Selenochlamys* n. gen. *Testacell.*, p. 141, unt. *Selen. pallida*, p. 142, T. 5, Fig. 1; *Amalia Lederi*, p. 143, T. 4, Fig. 1; *Limax intermittens*, p. 145, T. 4,

Fig. 7; *Hyalinia Suanetica*, p. 148, T. 5, Fig. 3; *Hyal. sucinacia*, p. 150, T. 5, Fig. 2; *Hyal. Kutaisiana*, Mss. v. *transitans*, p. 151, T. 5, Fig. 5, *Hyal. reticulata*, p. 152, T. 5, Fig. 4; *Helix Prometheus*, p. 159, T. 4, Fig. 6; *Helix euages*, p. 161, T. 4, Fig. 2 und T. 6, Fig. 1; *Helix flavolimbata*, p. 162, T. 5, Fig. 6; *Hel. Narzanensis* Kryn. var. *Suanetica*, p. 164, T. 6, Fig. 4; var. *macromphala*, p. 165, T. 6, Fig. 3; var. *cyclothyra* p. 167, T. 6, Fig. 2; var. *Appeliusi* Mouss. f. *depressa* p. 167, T. 6, Fig. 5; *Hel. Pontica* p. 170, T. 4, Fig. 3—5 und T. 6, Fig. 6; *Medea* nov. sect. gen. *Bulimini* p. 175, (für. *Bul. Raddei* Kob. *Bulim. Boettgeri* Cless.), p. 176, T. 6, Fig. 7, 8; *Bul. Lederi*, p. 177, T. 7, Fig. 1. Pupa *superstructa* Mouss. var. *Lederi*, p. 180, T. 7, Fig. 3; var. *zonata*, p. 182, T. 7, Fig. 2; *Claus. litotes* Schm. var. *Suanetica*, p. 186, T. 7, Fig. 9; var. *ganeo.*, p. 187, T. 7, Fig. 10; *Claus. derasa* Mouss. var. *Suanetica*, p. 189, T. 7, Fig. 8. — Literatur, p. 198—200. — W. Kobelt; *Excursionen im Baskenlande*, p. 201—212; *Reisebericht.* — H. C. Wein-kauff, *Catalog der Gttg. Litorina*, Fér., p. 213 bis 227. Aufzählung der 105 Arten. — O. F. v. Möllendorf, *Materialien zur Fauna von China*, p. 228—269. — Behandelt das Genus *Clausilia* und zählt 37 bis jetzt beobachtete Arten auf. Neu beschrieben werden: *Claus. tau* Bttg. var. *cyclostoma*, p. 230; abgebildet sind: *Claus. Lorraini* Mke., p. 344, T. 8, Fig. 1; *Cl. porphyrea* Möll., T. 8, Fig. 2; *Cl. Elisabethae* Möll. T. 8, Fig. 3; *Cl. Gerlachi*, T. 8, Fig. 4; *Cl. Möllendorffiana* Heude, T. 8, Fig. 5; *Claus. thaleroptyx*, T. 8, Fig. 6; *Cl. Eastlakeana* Möll., T. 8, Fig. 7. — Angehängt ist eine Tafel über die geographische Vertheilung der Arten.

O. Böttger, *Zwei neue ostasiatische Clausilien*, p. 270—272; *Cl. clarocincta*, p. 270, t. 8,

fig. 8; Cl. Ponsonbyi, p. 271, t. 8, fig. 9. — C. F. v. Möllendorf, Materialien zur Fauna von China, p. 272—288. — II. Die Agnathen, Aufzählung von 4 Arten Streptaxis, darunter neu beschrieben: Streptaxis bidens, p. 276, t. 10, fig. 9; Ausserdem abgebildet Str. sinensis, p. 272, t. 10, fig. 7; Str. costulatus Möll., p. 275, t. 10, fig. 8. — Ferner von 5 Ennea-Arten (abgebildet sind: Ennea microstoma Möll. p. 277, t. 10, fig. 10; Ennea splendens, p. 279, t. 10, fig. 11) und 1 Art. Streptoste. — III. Nachträge zu den Pneumonopomen. — Neu beschrieben: Cyclotus Schomburgianus, p. 284; Cyclophorus Frieseanus, p. 286; Cycloph. taivanum, p. 287, und Pupina Jüdeliana, p. 288, t. 10, fig. 5. — H. Simroth, Anatomie von Elisa bella Heyn., p. 289—312. Enthält ausführliche Beschreibung der anatomischen Verhältnisse der genannten Art mit Abbildungen (t. 11.). — O. Boettger, Aufzählung der von den Herren E. Reiter und E. Brenske 1882 in Griechenland und auf den Jonischen Inseln gesammelten Binnenmollusken, p. 313. — Aufzählung von 92. Arten. — Darunter neu beschrieben: Zon. verticillus var. coreyrensis, p. 315; Pupa claustralis var. coreyrensis, p. 318; Acme lineata var. Coreyrensis, p. 319; Pomatias tessellatus var. Moussoni, p. 320, sämtliche von Corfu; Acme Reiteri n. Cephalonia, p. 326, Hel. lens var. Elia, p. 330 von Elis; Hel. Brenskei, p. 335 von Messenien; Claus. Messenica Mts. var. Brenskei, p. 337 von Messenien; Hel. profuga Schm. var. attica, p. 342; Valvata depressa Pfr. var. soluta, p. 343 von Athen. — H. Dohrn, Eine neue Nanina von Süd-Celebes, p. 344—345. Neu beschrieben: Nanina Ribbei, p. 345, t. 11, fig. 1—3. — H. Dohrn, Beiträge zur Conchylienfauna des östlichen Brasiliens, p. 346 Aufzählung von 17 von Lieutenant Will gesammelten

Landschnecken. Abgebildet *Bul. melanostomus scalaris*, t. 11, fig. 4; *Bulimus Willei* n. sp., p. 350, t. 11, fig. 5—6; *Bul. albofilosus*, p. 351, t. 11, fig. 7; *Bulim. obliquus* Rve. t. 11, fig. 8—15, u. 6 Süßwasserschnecken. — O. F. v. Möllendorf, Materialien zur Fauna von China, p. 356—383; IV. Die Zonitiden. Aufzählung der Arten: 3. *Macrochlomys*; abgebildet: *Macr. cincta* Möll., p. 361, t. 12, fig. 1; neu beschrieben: *Macrochl. nitidissima*, p. 363. 4. *Microcistis*, neu beschrieben: *Micr. Schmackeriana*, p. 364; *Micr. sculpta*, p. 364, t. 12, fig. 8; *Micr. glaberrima*, p. 365, t. 12, fig. 7; 3. *Kaliella*, neu beschrieben: *Kal. rupicola*, p. 368, t. 12, fig. 5; *Kaliella depressa*, p. 368, t. 12, fig. 6; 2. *Sitala*, neu beschrieben: *Sit. trochulus*, p. 370, t. 12, fig. 4; *Sit. turrita*, p. 371, t. 12, fig. 3; 1 *Nanina*, abgebildet. *Nan. Eastlakeana*, Möll., p. 371, t. 12, fig. 2. V. Die Heliciden; 1. *Vitrina*; 3. *Hyalina*; 1 *Plectopylis*; abgebildet: *Plectopylis pulvinaris* Gould., p. 377, t. 12, fig. 9; Neu: *Plectop. multispira*, p. 378, t. 12, fig. 10. — V. Gredler, Reisebericht aus Oberitalien, p. 383—388. — Literatur, p. 388—392.

Dr. R. Bergh, Ueber die Gattung *Rhodope*, „Zoolog. Anzeiger“ 1882, No. 123.

Der Verfasser bespricht die Anschauungen Kölliker's, Graff's und v. Ihering's über die Anatomie der Gattung. Er weist die irrige Deutung des Central-Nervensystems von Tethys, wie es von Ihering aufgefasst wurde, nach, kann aber auch Graff, der behauptet, dass *Rhodope* „keineswegs eine Turbellarie, sondern eine Nacktschnecke darstelle“, beipflichten. — Nach dem Autor der vorliegenden kurzen Studie ist *Rhodope* nur eine in gewissen Beziehungen modificirte Turbellarie, welche sich in der Anordnung des Nervensystems den Nemertinen etwas nähert.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [NF_7_1885](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Jahrbücher der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. Jahrgang VIII. 1881. 141-154](#)