

Inhalt.

Original-Aufsätze.

- V. Gredler, Zur Conchylienfauna von China. p. 1—20.
Simroth, Dr. H. Neuer Fundort für *Daudebardia brevipes*. p. 21.
O. Retowski, Am Strande der Krim gefundene angeschwemmte
Binnenconchylien. p. 22—42, mit Tafel 1.
S. Clessin, Beitrag zur Fauna der Binnen-Mollusken Dalmatiens.
p. 44—65.
S. Clessin, Binnenconchylien von Pola in Istrien. p. 66.
S. Clessin, Neue Arten des Genus *Corbicula* Mühlf. aus Vorder-
und Hinterindien, Borneo und Sumatra. p. 67—80 mit
Tafel 2 und 3.
V. Gredler, Zur Conchylien-Fauna von China X. Stück.
p. 120—163.
S. Clessin, Binnenmollusken aus Kleinasien p. 164—166.
-

Literaturbericht.

- Journal de Conchyliologie. Bd. XXIII, XXIV u. XXV, p. 82—94.
Bulletino della società Malacologica italiana vol. X und XI.
p. 94—97.
Journal of Conchology vol. IV, p. 97—107.
Jahrbücher der deutschen Malakozool. Gesellschaft. XI. u. XII.
Jahrg. 107—114.
Nachrichtenblatt der deutschen Malakozool. Gesellsch. XVI. u. XVII.
Jahrg. p. 114—120.
Martini-Chemnitz, Syst. Conch.-Cab. II. Aufl. Lfg. 117, p. 167.
Fagot, Moluscos de Panticosa y valle del Cinca. p. 167.
Dybowski, W. Studien über die Mundwerkzeuge der Limnaen.
p. 167.
Reinhardt, O. Einige Landschnecken von der Insel Lampedusa.
p. 167.
— Land- und Wassermollusken von Neuguinea. p. 167.

- Simroth, O. Ueber einige Nacktschnecken. — Ueber eine Nacktschnecke von Samarkand. — Der Liebespfeil von Vitrinen. p. 168.
- Dybowski, W. Studien über die Zahnplatten einiger der Abtheilung Stylommatophora angehörigen Schnecken. p. 168.
- Fagot, P. M. Études sur les espèces du groupe de *Helicarascalensis*. p. 168.
- Lomniki, A. M. Mieczaki znane dotychczas y Pleistocenu Galicyjskiego. p. 160.
- Flach, E. Molluskenfauna von Aschaffenburg. p. 169.
- Sandberger, F. Molluskenfauna von Unterfranken diesseits des Spessarts. p. 169.
- Die Verbreitung der Mollusken in den einzelnen Bezirken Unterfrankens etc. p. 169.
- Krimmel, O. Ueber die Clausilien Württembergs. p. 170.
- Diemar, F. H. Die Molluskenfauna von Niederhessen. p. 170.
- Brömme, Chr. Die Conchylienfauna des Mosbacher Diluvialsand. p. 171.
- Locard, Arnould. Catalogue general des Mollusques vivants de France. p. 171.
- Kobelt, W. Reiseerinnerungen aus Algerien. p. 173.
- Schlichter, Dr. H. Einiges über *Anodonta mutabilis* im Federsee. p. 174.
- Binney, W. G. Notes on the jaw and Lingual Dentition of Pulmonate. p. 174.
- Dybowski, W. Beschreibung einer neuen sibirischen *Ancylus*-Art. p. 175.
- Studien über die Zahnplatten der Gattung *Limnaea*. p. 175.
- Morlet, S. Diagnoses de moll. terr. et fluv. du Tonkin. p. 175.
- Reibisch, Th. Ueber das Aufstellen von Conchylien-Sammlungen. p. 175.
- Morelet, A. Malakologie des Comores. IV. Art., p. 176.
- Reinhardt, O. Verzeichniss der Weichthiere der Prov. Brandenburg. p. 176.
- Kobelt, W. Erster Nachtrag zur Fauna der Nassauischen Mollusken. p. 176.
- Branczik, Karl. Reise an der Küste Dalmatiens im Jahre 1885.
- Kobelt, W. Prodrömus Faunae Mollusc. Testaceorum maria europaea inhabitantium. p. 177.
- Böttger, O. Die Binnenmollusken des Talysch-Gebietes. p. 178.
- Martens, E. v. Conchologische Mittheilungen. p. 179.
-

Literatur-Bericht.

Journal de Conchyliologie. Tome XXIII. 1883.

Heft I. H. Mazé, Catalogue révisé des Mollusq. terr. e. fluv. de la Guadeloupe et de ses dépendances. p. 5—54. Unter der Aufzählung der bis jetzt beschriebenen Arten finden sich folgende neu beschriebene: *Geostilbia Mazei* Crosse p. 7. t. 1. F. 2; *Bulimus Houelmontensis* Crosse p. 19. t. 1. fig. 6. — P. Fischer, Sur les *Urocyclus* et les *Vaginula* de Nossi-Bé, Nossi-Comba et Mayotte p. 54—56. Neu beschrieben werden: *Vag. subaspera* p. 55, und *Vag. Comorensis* p. 55. t. 2. F. 3. — S. G. Hidalgo, Description de deux espèces nouvelles d'*Helix* p. 56—58. Neue Arten: *Hel. Cisternasi* p. 56. t. 2. f. 4; *Hel. Molinae* p. 57. t. 2. f. 5. — P. Tournouer, Description d'un nouveau sous-genre de *Melaniidae* fossile, des terrains tertiaires supérieurs de l'Algerie p. 58—60. — Aufstellung des Unter-genus, *Sمندovia* Tourn. — P. Fischer, Observations sur la Note précédente p. 60—62. Neu beschrieben: *Melanopsis decipiens* Tourn. p. 60. t. 3. F. 3; eine Art des oben angeführten Subgenus. — E. de Bourg, Diagnoses *Scalidarum novarum* et *Acirsae novae* in stratis Eocenici regionis „Bassin de Paris“, vulgo dictae repertis p. 62—67. Neu beschrieben: *Scalaria Bourdoti* p. 62; *Scal. Raincourti* p. 63; *Scal. Godini* p. 63; *Scal. Chalmasi* p. 64; *Scal. Acumiensis* p. 64; *Scal. Baudoni* p. 65; *Scal. Morleti* p. 66; *Scal. Cossmanni* p. 66; *Scal. Lemoinei* p. 66 und *Acirsa Bezançoni* p. 67. — Bibliographie p. 68—89. — Necrologie p. 89—96.

Heft II. H. Crosse. Note complementaire sur l'habitat de l'*Helix Maresi* p. 97—98. — Die Art findet sich in Oglat-el-Beida, im Süden von Chott-El-Gharbi, in Algerien. — P. Fischer, Sur le genre *Coelaxis* p. 98—102. Beschreibung des Genus mit Aufzählung der 3 Arten. Die *Radula* von *Coel. australis* wird beschrieben und abgebildet t. 3. Fig. 5—6. — H. Crosse et P. Fischer, Diagnoses Molluscorum novorum, reipublicae Mexicanae et Guatemalae incolarum p. 102 bis 110. Neu beschrieben werden: *Amphicyclotus Maleri* p. 102; *Cistula Sargi* p. 103. — L. Morlet, Description d'espèces nouvelles de coquilles recueillies par M. Pavie au Cambodge p. 104—110. — Neu beschrieben werden: *Streptaxis Lemyrei* p. 104. t. 4. F. 1; *Helix Norodomiana* p. 106. t. 4. F. 3; *Pupina Paviei* p. 107. t. 4. F. 4; *Pupina Crosseana* p. 108. t. 4. F. 5. *Unio Fischerianus* p. 109. t. 4. F. 6. — E. de Boury, Description d'espèces nouvelles de *Mathilda* du Bassin de Paris, et revision du genre p. 110—153. — Nach allgemeinen Bemerkungen über das Genus folgt die Aufzählung von 37 fossilen Arten unter Angabe ihrer Fundorte. Das 3. Capitel bringt die neu aufgestellten Arten: *Mathilda Baylei* p. 126. t. 5. F. 1 a—b; *Math. Bourdoti* p. 128. t. 5. F. 2. 2a; *Math. Cossmanni* p. 130. t. 5. F. 3. 3a; *Math. Crossei* p. 132. t. 5. F. 4. 4a; *Math. Morgani* p. 134. t. 5. F. 5. 5a; *Math. impar* Desh. p. 137. t. 5. F. 6; *Math. costellata* Desh. p. 138. t. 5. F. 7. 7a; *Math. Raincourti* p. 141. t. 5. F. 8. 8a; *Math. Morleti* p. 143. t. 5. F. 9. 9a; *Math. turritellata* Lam. p. 146. t. 5. F. 10. 10a; *Math. Bezançoni* p. 149. t. 5. F. 11. 11a; *Math. Baudoni* p. 151. t. 5. F. 12. 12a. — M. Cossmann, Description d'espèces du terrain tertiaire des environs de Paris. p. 153—174. I. Neue Arten: *Psammobia cuisensis* p. 153. t. 6. F. 1. 1a; *Psam. crassatellaeformis* p. 155. t. b. F. 2a—6; *Donax Bezançoni*

p. 156. t. 6. F. 3a—c; *Diplodonta transversaria* p. 158. t. 6. F. 4. 4a; *Erycina catalaunensis* p. 159. t. 6. F. 5. 5a; *Leda cochlearella* p. 160. t. 6. F. 6a—c; *Fissurella scobinellata* p. 161. t. 7. F. 7a—b; *Hipponyx articulatus* p. 162. t. 7. F. 6. 6a; *Crepidula Parisiensis* p. 163. t. 6. F. 8. 8a; *Nematura microscopica* p. 165. t. 7. F. 2; *Planorbis praecursor* p. 166. t. 7. F. 4a—b; *Aphanitoma quadricincta* p. 167. t. 7. F. 1. 1a. — II. Neue Arten für das Bassin von Paris. — *Anisocardia pectinifera* Sow. p. 168. t. 6. F. 7. 7a. — III. Beobachtungen über einige schon aus dem Eocaen von Paris beschriebene Arten. — *Fusus asperulus* Lam. p. 170. t. 7. F. 3a—b; *Pileopsis pennata* Lam. p. 172. t. 7. F. 5a—b; *Schismope Deshayesi* Mun. Chal. p. 173. t. 7. F. 8. — Bibliographie p. 174—188.

Heft III. A. Morelet. Malacologie des Comores, Recolte de M. E. Marie à l'île Mayotte p. 190—216. Schon besprochen. — A. Mousson, Trois nouvelles espèces du Nord-Ouest du Mexique p. 216—219. Neu beschrieben: *Helix* (*Polygera*) *unguifera* p. 216. t. 9. F. 1; *Bulimulus Forreri* p. 217. t. 9. F. 2; *Helicina Durangoana* p. 218. t. 9. F. 3. — H. Crosse et P. Fischer, Description d'une variété nouvelle d'*Anodonta* recu. par M. d. Forrer dans l'Etat de Sinaloa (Mexico) p. 219—221. — Neu beschrieben: *Anod. glauca* Valenc. var. *sinaloensis* p. 219. — H. Crosse, Note Complementary sur l'*Anodonta Guillani* Recluz. p. 221 bis 222. Die Art wird abgebildet p. 9. F. 4. — F. Daniel, Faune malacologique terr. fluv. et marine des environs de Brest p. 223—264. Aufzählung der marinen Arten (72 Genera mit 160 Arten), darunter Gen. *Unio* mit 2 *Anodonta* mit 1 Art. — Bibliographie p. 265—287. — Nouvelles p. 288.

Heft IV. Ph. Dautzenberg, Liste de Coquilles du Golfe de Gabes p. 289—330. An 12 Stationen im

genannten Golfe wurden 282 Species marine Cochyliden gesammelt — F. Daniel, Faune malac. terr. fluv. et marine des environs de Brest. Fortsetzung. p. 331 bis 391. — Fortsetzung der Aufzählung der Arten, und zwar umfasst die ganze Fauna 439 Arten in 180 Gener. — P. Fischer. Diagnoses d'espèces nouvelles de Mollusques recueillis dans le cours de l'Expedition scientifique du Talisman p. 391—394. — Es werden neu beschrieben: *Fusus abyssorum* p. 391, *Marginella impudica* p. 392. Gen. n. *Oocorys* p. 392. *O. sulcata* p. 392 und *Gibbula Gorgonarum* p. 398. — R. P. Heude. Note sur un Limacien nouveau de Chine p. 394—395. Neu beschrieben: *Rathousia* n. gen. p. 394, gegründet auf *Vaginulus Sinensis* Heude. — A. Morelet. Mollusques nouveaux de la cote occidentale d'Afrique p. 395—401. — Werden neu beschrieben: Gen. nov. *Aspidelus* p. 395 mit *Asp. Chaperi* p. 395. t. 10. f. 1 (Schälchen jenem einer *Parmacella* ähnlich); *Vitrina amoena* p. 397. t. 10. f. 2; *Bulimus terrulentus* p. 398. t. 10. f. 5; *Stenogyra lugubris* p. 399. t. 10. f. 4; *Stenogyra nebulosa* p. 400. t. 10. f. 5; *Ennea sulcifera* p. 401. t. w. f. 6. — H. Crosse. Note sur une deformation de l'*Helix pomatia*, L. récemment observée. — p. 401—402. Beschreibung und Abbildung einer deformen *Hel. pomatia* t. 10. f. 7. — P. Fischer. Note preliminaire sur une nouvelle espèce du genre *Cirro-teuthis* p. 402—404. — *Cirro-teuthis umbellata*. — P. Fischer. Note sur le *Mathilda Magellanica* p. 404—405. — Neu beschrieben: *Math. Magellanica* p. 405. — Bibliographie p. 405—407.

Tome XXIV. 1884.

P. Fischer. Observations sur le genre *Pyrrula* de Lamarck. p. 5—11. Bemerkungen über das Gen. *Pyrrula* Lam. mit Abbildung des Deckels von *Rapapapyracea*. — H. Crosse. Catalogue des espèces du

genre *Rapa* Klein p. 11—15. — Aufzählung der bis jetzt bekannten 5 Arten des Genus mit Synonymie und Fundortangabe und Bemerkungen. — H. Crosse. Catalogue des espèces du genre *Couthouya* A. Adams. p. 15—18. — Aufzählung der 4 Arten des Genus. — R. P. M. Heude. Rectifications de nomenclature p. 18 bis 20. — Berichtigung der Namen mehrerer Arten aus China, die im Werke des Berichtigers, *Conchyliologie fluv. de la Chine centrale*, und in *Memoires sur l'hist. nat. de l'Empire chinois* aufgeführt werden. — P. Fischer. Description d'un nouveau genre de Mollusques fossile p. 20—22. Neu beschrieben: Gen. *Raincourtia* p. 20. mit *Raincourtia incilis* n. sp. p. 20. t. 2. f. 3. — M. J. Depontailier. Fragments d'un Catalogue descriptif des fossiles du pliocène des environs de Cannes. p. 22—86. — Aufzählung von 31 marinen Schnecken, mit lateinischer Diagnose, Synonymie und Beobachtungen verschiedener Verhältnisse. Neu beschrieben werden: *Murex spinicosta* p. 28, *Nassa Bisotensis* p. 76. t. 1. f. 4. mit var. *costata* p. 76; *Nassa Cosmanni* p. 78. t. 1. f. 5. mit var. *submutica* p. 79; *Columbella Mariae* p. 84. t. 1. fig. 7. — Bibliographie p. 87—101. Necrologie p. 101—103. M. Joachim Barrande † 5. Oct. 1883. — J. B. Gassies † 14. Ap. 1883. — H. A. Prévost † 25. Sept. 1883. — M. J. Jaubert † 1883. — Anna Zoé Vimont † 29. Aug. 1883. — J. Th. Reinhardt † 1882. — F. Summichrast † 26. Sept. 1882.

Heft II.

H. Crosse. Faune malacologique terrestre de Gibraltar p. 105—112. Aufzählung von 24 meist von Kobelt, dann von Morelet, Ponsonby u. Dautez gesammelten Arten. Angeführt werden 10 von J. G. Hidalgo aufgeführten Arten, die jedoch von den Obengenannten nicht gefunden wurden. — P. Fischer. Une nouvelle classification des Bivalves p. 113—122. — Uebersichtliche Zusam-

menstellung der Resultate, zu welchen M. Neumayr in seiner Publikation „zur Morphologie des Bivalvenschlosses gekommen ist. Dieser Autor gruppirt die Muscheln nach der Beschaffenheit des Schlosses in 5 Abtheilungen: Cryptodontes, Desmodontes, Taxodontes, Heterodontes und Dysodontes. — Mit Recht meint Fischer, dass die Eintheilung ohne Berücksichtigung der Anatomie der Thiere keine natürliche ist, da z. B. die Unionen und Anodonten nach einseitiger Berücksichtigung des Schlosses in verschiedene Gruppen zu stehen kommen. — A. Morelet. Deux Najades inédites du Tabasco p. 122 bis 125. Neu beschrieben: Anodonta Grijalvae p. 123 und Anod. Tabascensis p. 124. — G. Watterbled. Description de Mollusques inédits, recueillis par. M. le capitaine Dorr en Cochinchine, p. 125—131. — Es werden neu beschrieben: Stenogyra carinata p. 125. t. 6. fig. 1; Planorbis Dorrianus p. 126 t. 6. f. 2; Melania Grangeri p. 127. t. 6. f. 3; Bythinia Crosseana p. 127. t. 6. f. 4; Stenothyra Dorriana p. 129. t. 6. f. 5; Stenothyra decollata p. 129. t. 6. f. 6; Hydrobia Yvonneana p. 130. t. 6. fig. 7 und Valvata minutissima p. 131. t. 6. f. 8. — G. Watterbled. Description d'une nouvelle espèce d'Unio provenant du Soudan occidental p. 132—133. Neu beschrieben: Unio Decampsianus p. 132. t. 7. fig. 1. — Dr. Sowerby. Corrigenda p. 133. Pleurotoma Chuestieri Sow. — E. de Boury. Descriptions de Scalaridae nouveaux p. 134—164. — Nachstehende Arten, die schon früher beschrieben wurden, werden ausführlicher behandelt und abgebildet: Scalaria Bourdoti p. 134. t. 4. f. 2; Scal. Godini p. 137. t. 3. f. 1; Scal. brevicula Desh. p. 139. t. 3. f. 2; Scal. Chalmasi p. 142. t. 3. f. 3; Scal. Acumiensis p. 145. t. 4. f. 4; Scal. Baudoni p. 147. t. 5. f. 1; Scal. Cossmanni p. 151. t. 4. f. 4; Scal. Lemoinei p. 153. t. 4. f. 1; Scalaria cretacea p. 155. t. 5. f. 2; Acirsa Besançonni p. 157.

t. 5. f. 3; *Acirsa Auversiensis* Desh. p. 158. t. 5. f. 4;
— Bibliographie p. 164—191. — Nouvelles p. 191—192.
Heft 3.

Dr. A. Bandon, troisième Catalogue des Mollusques vivants du département de l'Oise p. 193—325. — Der Verfasser zählt 139 Arten und zahlreiche Varietäten auf, unter denen mehrere der letzteren neu beschrieben werden. Derselbe hat die Principien des Herrn Bourgnignat nicht angenommen, wie aus der geringen Artenzahl der Najaden hervorgeht. Die Nacktschnecken sind mit einer verhältnissmässig grossen Artenzahl (*Arion* 7, *Limax* 8 Species) aufgezählt, von denen mehrere wohl nur Farben-Varietäten sein werden. Am ausführlichsten ist das Gen. *Succinea* behandelt, mit 6 Arten und elf Varietäten. — Neu beschrieben werden: *Succinea putris* var. *angusta* p. 214. t. 9. f. 1; var. *extensa* p. 214; *Zonites crystallinus* var. *nitidissima* p. 230; *N. aspersa* var. *lutea* p. 239. t. 8. f. 2; *Hel. pomatia* var. *costellifera* p. 241. t. 8. f. 5; *Ferussacia subcylindria* v. *densata* p. 256. p. 257; *Clausilia nigricans* var. *linearis* p. 266. t. 9. f. 12; *Limnaea stagnalis* var. *marginalis* p. 277; *Lim. palustris* var. *elata* p. 279. t. 9. f. 14; var. *Vuillefroyi* p. 280. t. 9. f. 15. — *Lim. ovata* var. *ventricosa* p. 283; var. *reflexa* p. 284; *Lim. intermedia* var. *pyramidalis* p. 285. var. *amygdalina* p. 285; *Valvata piscinalis* var. *cancellata* p. 294. t. 10. f. 5. — *Pisidium obtusale* var. *tumefacta* p. 308; *Pis. nitidum* var. *striatissima* p. 309; *Pis. roseum* var. *gibbosa* p. 312; *Pis. pulchellum* p. planulata p. 315. — Der Name *Pisidium roseum* Scholtz für *Pis. milium* Held. = *Gassiesianum* Baud. ist falsch gewählt. Ich besitze *Pis. roseum* vom Originalfundorte und kann daher aufs Bestimmteste versichern, dass diese Scholtz'sche Art nicht identisch ist mit der von Bandon beschriebenen. — Ferner sind noch eine Anzahl sehr interessanter Monstruositäten beschrieben

und abgebildet. — H. Crosse. Note sur les caractères et le véritable habitat de l'*Helix aimophila* p. 325 bis 327. Bemerkungen über diese Art und ihre Varietät *Tchihatcheffi* mit Abbildungen. — H. Crosse, Note sur quelques formes monstrueuses de *Bulimus Ouveanus* Dotz. des îles Loyalty p. 328—330. — Ein links-gewundenes Exemplar der genannten Art und ein scalares abgebildet t. 7. f. 4 und 3 beschrieben. — L. Morlet. Description d'une espèce nouvelle de *Melania*; p. 330—331. *Melania Savinieri* Brot p. 330. t. 7. f. 2. neu beschrieben. — Eusèbe Vassel. Description d'une nouvelle espèce de *Pecten* fossile du Canal de Suez p. 331. Neu beschrieben: *Pecten Fischeri* p. 331. — Dante Pantanelli, sur le *Murex Hörnesi* d'Ancona p. 332—334. Bemerkungen über die genannte Art. — Bibliographie p. 335—340. Nouvelles 340.

Heft IV.

H. Crosse. Faune malacologique terr. et fluv. des côtes de Socotera et d'Abel-et-Goury p. 341—375. — Aufzählung von 48 Arten der Insel Socotera und 6 Arten der Insel Abd-el-Goury. — Auf der ersteren zählt das Gen. *Buliminus* 20, das Gen. *Stenogyra* 7, das Gen. *Ennea* 1 Art. Das Gen. *Planorbis* ist mit 3, *Hydrobia* mit 1, *Melania* mit 4 Arten vertreten; die Familie der *Cyclostomacea* hat 7 Arten. — Die Letztere besitzt 2 *Buliminus*, 1 *Tropidophora*, 1 *Otopoma*, 1 *Lithidion*, 1 *Guillania*. Den Schluss bilden Betrachtungen über den Charakter der Fauna. — P. Fischer, Note sur la Faune malacologique des îles Berlingues-Portugal p. 375. — Von der Insel sind nur wenige Arten bekannt, nämlich 6 marine Species und 6 Landschnecken (nur Gen. *Helix*); Bemerkungen über die Verbreitung der Arten. — P. Fischer. Sur les Mollusques terrestres de l'îlot Branco (archipel du Cap. Vert.) — Es kommen nur 2 Arten auf derselben vor.

— P. Fischer. Note sur le *Potamides fluviatilis* Pot. et Mich. p. 381—383. — Beobachtungen über die Lebensweise der Asterien, nachdem im Magen von *Astropecten* todte Exemplare von *Potamides fluviatilis* gefunden worden. — Prof. Bavay. Note sur le reproduction des *Helix Cooperi* et *H. st. haemostoma* p. 383—384. — P. Fischer. Addition à la note précédente. Theilen Beobachtungen über das Lebendiggebären dieser Art mit. — L. Morelet. Description d'espèces nouvelles de Coquilles recueillies par M. Pavie, au Cambodge. — p. 386—405. Werden neubeschrieben: *Hel. Paviei* p. 386. t. 11. f. 1, *Bulimus semitessellatus* p. 387. t. 11. f. 2; *Cyclophorus Cambodgensis* p. 388 t. 11. f. 3; *Cyclophorus Paviei* p. 389. t. 11. f. 4; *Cyclophorus Klobukowskii* p. 391. t. 12. f. 1; *Cycl. Landesi* p. 392. t. 11. f. 5; *Pterocyclus Fischerianus* p. 393. t. 12. f. 2; *Paludina Tiranti* p. 394, t. 12. f. 3; *Paludina Thomsoni* p. 395. t. 12. f. 4; *Melania Paviei* p. 397. t. 12. f. 5; *Melania Lemeyrei* p. 398. t. 12. f. 6; *Mel. Dautzenbergiana* p. 399. t. 13. f. 1; *Pseudodon Thomsoni* p. 401. t. 13. f. 2; *Dreissensia Crosseana* p. 402. t. 13. f. 4. — Correspondence p. 403—404. — Bibliographie p. 404—415.

Band XXV, Heft 1.

H. Crosse. Catalogue des espèces du genre *Leucoptychia* p. 5—20. — Nach Bemerkungen über die Gruppierung der Arten folgt die Aufzählung derselben. 4 Arten. — Der Autor theilt in Gruppe „*Leptopomiformes*“ mit 2 Arten und in Gr. *Cyclophoriformes* mit 3 Arten und zwar *Leucopt. foliacea* Chem. p. 12. t. 1. f. 1. mit Diagnose, Beschreibung und Beobachtungen und *Leucopt. Leai* Tryon. p. 16. t. 1. f. 2. — A. Morelet. Coquilles terr. et fluviatiles de l'Afrique équinoxiale p. 20—33. Aufzählung von 15 Arten. Neu beschrieben: *Limicolaria Droueti* p. 21. t. 2. f. 14;

Lim. Aethiops Mor. p. 23. t. 2. f. 15; Stenogyra invalida p. 23. t. 2. f. 15; Stenog. normalis p. 24. t. 2. f. 7; Sten. gracilentia p. 25. t. 2. f. 8; Sten. acmella p. 26. t. 2. f. 4; Sten. saxatilis p. 27. t. 2. f. 1; Sten. plebeja p. 27. t. 2. f. 2; Sten. recisa p. 28. t. 2. f. 5; Ennea circumcisa p. 29. t. 2. f. 3; Hydrobia Gabonensis p. 30. t. 2. f. 12; Unio aequatorius p. 31. t. 2. f. 9; Dreissensia lacustris p. 32. t. 2. f. 11; Dreissensia ornata p. 32. t. 2. f. 10. — P. Fischer. Note sur deux espèces de Bithynella des nappes d'eaux souterraines de la France p. 33. — Genus Paulia Bourg. mit P. Berenguieri und Locardiana beschrieben. Die Thiere sind mit Augen versehen, die Gehäuse sind cylindrisch und die Deckel sind nicht gewunden. Der Autor beschreibt die Thiere, die Radula und den Deckel von P. Berenguieri, welche aus einem Brunnen zu Coubutnot stammen. — Neben diesem Genus hat M. Nicolas 1881 ein Genus Avenionia mit 3 unterirdisch lebenden Arten beschrieben; Fischer hält dieses Genus für identisch mit Gen. Paulia. — Nach diesen Darlegungen sind die Arten des Gen. Bythiospeum Brgt. = Vitrella Cles. schon nach der Organisation des Thieres und der Deckel der Gehäuse nicht mit dem Gen. Paulia zu vereinigen. — R. P. M. Heude. Rectifications de nomenclature p. 42—43. Berichtigung der Namen von 5 Arten, welche im 3. Hefte der Naturgeschichte des chinesischen Reiches beschrieben werden. H. Crosse. Description du nouveau genre Heudeia p. 43—45. — Beschreibung des Gen. Heudeia p. 44 mit Heudeia (Helicina) Setchuanensis p. 44 aus China. E. Vassel. Description d'une nouvelle espèce de Pecten fossile du Canal de Suez p. 46—47. — Neu beschrieben: Pecten Fischeri p. 46 t. 3. f. 1. — L. Morlet. Description de Coquilles fossiles du Bassin Parisien p. 48—52. Es werden neu beschrieben: Pha-

sianella Bezançon p. 48. t. 3. f. 5; Cancellaria Bezançon p. 49. t. 3. f. 3; Canc. semiclathrata p. 50. t. 3. f. 4 und Canc. Domeli p. 51. t. 3. f. 2. Bibliographie p. 53—79. Necrologie p. 79—80. G. Br. Sowerby, † 25. Juli 1884 und A. G. Fischer de Waldheim † Juli 1884.

Heft 2.

Dr. F. Daniel. De la récolte des Mollusques dans la region Celtique (particulièrement dans la rade de Brest) et des saisons les plus favorables pour leur recherche p. 81—92. — Enthält Beobachtungen über die zum Sammeln günstigsten Zeiten für marine Mollusken. — J. G. Hidalgo. Note sur la Parmacelle trouvée près de Malaga (Espagne) p. 93—94. Der Autor hält die bei Malaga vorkommende Parmacella für Parm. Valenciennesi Webb et Berth. — H. Crosse. Note additionnelle sur le Parmacella Valenciennesi W. et B. p. 94—96. — Der Autor stimmt der Ansicht Hidalgo's bei. — E. de Bury. Nouvelles observations sur l'Acirsa subdecussata Cantr. p. 96—99. — Neue Beobachtungen über die genannte Art. — P. Fischer. Description d'une nouvelle espèce de Dendropupa du terrain permien de Saône et Loire p. 99—105. — Neu beschrieben: Dendropupa Walchiarum p. 100. (Fig. im Text.) Angereiht ist die Aufzählung von 7 Landschnecken aus devonischen Schichten Nordamerikas. — M. Cossmann. Description d'espèces du Terrain tertiaire des environs de Paris p. 106—137. — Aus den tertiären Schichten der Umgebung von Paris werden nachstehende Arten neu beschrieben: Corbula areolifera p. 106. t. 4. f. 5; Capsa mediumbonata p. 107. t. 4. f. 4; Donax ovalina p. 109. t. 4. f. 3; Cardium diasticum p. 110. t. 5. f. 8; Hemicardium mite p. 112. t. 4. f. 6; Gen. n. Goosensia p. 113; Goos. plicatuloides p. 113. t. 5. f. 7; Sportella irradiata p. 115. t. 4.

f. 2; *Lutetia deficiens* p. 117. t. 5. f. 6; *Emmarginula macra* p. 119. t. 5. f. 1; *Fissurella tapeina* p. 120. t. 6. f. 7; *Lacuna terebralis* p. 122. t. 6. f. 1; *Littorina trochiformis* p. 123. t. 6. f. 5; *Umbrella Raincourtii* p. 125. t. 5. f. 4; *Planorbis cuisensis* p. 126. t. 6. f. 6; *Ancillaria excavata* p. 127. t. 6. f. 3; *Mitra tetrapticta* p. 128. t. 6. f. 8. Angereicht sind Beobachtungen über schon bekannte Arten. — Bibliographie p. 137—160.

H e f t 3.

H. Crosse. De la nécessité de la suppression des genres *Sinusigera* et *Cheletropis* p. 161—166. — Die beiden Genera sind auf unvollendete Gehäuse von *Purpura*-Arten gegründet und haben daher keine Berechtigung. — P. Fischer. Note sur l'animal de l'*Adeorbis subcarinatus* Mont. p. 166. — Enthält Beschreibung des Thieres der genannten Art, welches mit seiner *Radula* abgebildet ist t. 9. f. 1—4. — P. Fischer. Note sur l'animal de l'*Hybocystis elephas* Morg. p. 174 bis 179. — Beschreibung des Thieres der genannten Art mit Abbildungen t. 10. f. 1—5. (Fig. 4. die *Radula*.) — H. Crosse. Etudes monographiques sur les espèces du genre *Hybocystis* Bens. p. 180—193. Nach Beschreibung des Genus und Bemerkungen über die geographische Verbreitung desselben folgt die Aufzählung der 4 Arten: *Hypocystis elephas* Morgan p. 183. t. 11 f. 1; *H. grvida* Bens. p. 187. t. 11. f. 2; *H. Mouchoti* Pfr. p. 190. t. 11. f. 3. und *H. Myersi* Haines p. 191. t. 11. f. 4; 3 Arten leben in Vorderindien, die letzte in Siam. — J. G. Hidalgo. Description d'une nouvelle espèce d'*Helix* d'Espagne p. 193—194. Neu beschrieben: *Hel. Quadrasi* p. 193. t. 9. f. 6. — J. G. Hidalgo. Description d'une espèce nouvelle de *Circe* des Philippines p. 195—196. Neu beschrieben: *Circe Barundae* p. 195. t. 9. f. 7. — L. Morlet. Note rectificative p. 196. Der Autor tauft

seine *Cancellaria Bezançoni* Journ. Conch. Bd. 23 p. 49 in Canc. Multienensis um. — M. Cossmann. Description d'espèces du Terrain tertiaire des environs de Paris. Fortsetzung p. 197—206. Es werden neu beschrieben: *Crucibulum Bernayi* p. 197. t. 8. f. 1; *Capulus parmorphoroides* p. 198. t. 8. f. 2; *Emarginula compressa* p. 199. t. 8. f. 7; *Rissoina Raincourti* p. 201. t. 8. f. 6; *Buccinofusus hemigymnus* p. 202. t. 8. f. 3; *Triton cuneatum* p. 203. t. 8. f. 5; *Metula Vasseuri* p. 205. t. 8. f. 4. — Bibliographie p. 206—252. — Nouvelles p. 252.

Heft 4.

A. Vayssière. Etude sur l'organisation de la *Truncatella truncatula* Drap. p. 253—288. Ausführliche Beschreibung der Anatomie des Thieres der genannten Art mit zahlreichen Abbildungen t. 12. f. 1—11 und t. 13. f. 12—20. Auch ein Parasit des Thieres *Scyphidia Fischeri* p. 285. t. 13. f. 19 u. 20 ist beschrieben und abgebildet. — A. Morelet. Malacologie des Comores. 4. art. Recolte de M. Humblot à la grande Comore p. 288—301. — Besprechung folgt später. — P. Fischer. Contribution à la faune malacologique du Puy-de-Dôme-Mollusques des environs de Châtel-Guyon p. 302—309. Nach kurzen Bemerkungen über die Vertheilung der Arten folgt die Liste von 37 Arten, welche bei Châtel-Guyon beobachtet wurden; es sind nur 3 Wasserschnecken aber keine Bivalven darunter. — H. Crosse. Diagnoses Molluscorum novorum, in regione Usagara dicta, Africae orientalis, collectorum p. 310—312. Neu beschrieben werden: *Ennea Usagarica* p. 310; *En. galactochila* p. 311; *En. ringens* p. 311. — L. Morlet. Diagnosis Conchyliorum fossilium novorum instratis eocenicis repertorum p. 312 bis 316. Neu beschrieben: *Lima Barreti* 312; *Rissoina Barreti* p. 312; *Rissoina Cloezi* p. 313; *Rissoa Barreti*

p. 313; *Melania Raincourti* p. 314; *Odostomia Barreti* p. 314; *Bulla Bezançoni* p. 314; *Solarium Langlassei* p. 315; *Bifrontia Crenensis* p. 315; *Conus Crenensis* p. 305. — Bibliographie p. 316—341.

Bulletino della societa Malacologica italiana. Vol. X. 1884.

D. Pantanelli, Note di Malacologia pliocenica. Aggiunte e correzioni al catalogue del molluschi pliocenici del dintorni di Siena pubblicato Da de Stefani e Pantanelli nel Bull. vol. IV. 1878—1880. — Zu den Arten erwähnter Abhandlung werden 51 weitere hinzugefügt; darunter neu beschrieben: *Pholadidia Brochii* p. 12. *Pollia janioides* p. 66. *Turbonilla similans* p. 29. — March. Ant. de Gregorio, intorno ad alcuni nomi de conchiglie Linneanes p. 33—34. — Bemerkungen über einige Namen Linné'scher Arten. — Ant. de Gregorio, intorno al Triton tritonis L. sp. — Der Verfasser schlägt vor, an Stelle des Namens von Triton variegatum Lam. jenen von Triton tritonis L. zu setzen. — A. de Gregorio Studi su talune conchiglie Mediterranee viventi e fossili con una rivista del Gen. Vulsella p. 36. — Studien über lebende und fossile Austern. Im Mittelmeere leben 8 Arten und Varietäten; 16 Arten und Varietäten wurden fossil in tertiären Ablagerungen gefunden. Neu beschrieben *Ostrea Bonfornellenis* p. 48, für welche Art das Subgenus *Sdikia* vorgeschlagen wird. — Dann folgen Betrachtungen über die Vulsella-Arten der Tiefseezone des Mittelmeeres, sowie die Diagnosen einer Reihe von Arten, die auf 2 beigegebenen Tafeln abgebildet sind. Neu beschrieben: *Vulsella navicula* p. 58. t. 1. f. 1; *Vuls. claripta* p. 59. t. 1. f. 2a, b; *Vuls. valida* p. 59. t. 1. f. 3; *Vuls. tigrina* p. 60. t. 1. f. 4; *Vuls. pulchella* p. 60. t. 2. f. 5; *Vuls. ringella* p. 61. t. 2. f. 1a, b. u. 2; *Vuls. cimbula* p. 61. t. 2. f. 4; *Vuls. scrobula* p. 62. t. 2. f. 5; *Vuls. umbotropa*

p. 62. t. 2. f. 6; Vuls. cochlearina p. 62. t. 2. f. 3; Vuls. virginis p. 62. t. 3. f. 1; Vuls. cilestrina p. 63. t. 3. f. 3; Vuls. mirula p. 63. t. 3. f. 3; Vuls. umboversa p. 63. t. 3. f. 4; Vuls. mitis p. 64. t. 4. f. 1; Vuls. blanda p. 64. t. 4. f. 2; Vuls. spongiarum p. 64. t. 4. f. 3; Vuls. peregrina p. 66. t. 4. f. 4. — Die Vulsella-Arten des rothen Meeres: 7 Arten, darunter neu: Vulsella indipa p. 68. t. 5. f. 4a, b; Vuls. ililima p. 69. t. 5. f. 5 und Vuls. vuma p. 70. t. 5. f. 3. — Neue Conchylien aus der Tiefseezone des Mittelmeeres. Neu beschrieben: Gen. nov. Fundella p. 72. Fundella Lioyi p. 73. t. 4. f. 6 u. t. 5. f. 6. — Neue Pecten-Arten aus dem oberen Tertiär. Neu beschrieben: Pecten Tiberii p. 74; Pecten polymorphopsis p. 75; Pecten praesulcatus p. 75; Pecten Guiscardi p. 76. — Ueber einige lebende und fossile Pinna-Arten. — Neue Arca-Arten aus den unteren Schichten des Postpliocäen von Palermo. — Neu beschrieben: Arca pectinata Brocc. var. arquatoensis p. 82; Arca merilla p. 82; Arca Partannensis p. 83. — Eine neue Tapes aus den Pliocäen. — Neu beschrieben: Tapes Altavillensis p. 86. — Eine neue Venus aus dem Postpliocäen von Palermo. Neu aufgestellt: Venus imbricatopsis p. 87. — Eine neue Form von Cytherea multilamella Lam. — Forma depressobliqua p. 88 neu beschrieben. — Bemerkungen über Venus impressa Serr. — Eine neue Thracia und eine neue postpliocäne Lyonsia — Neu beschrieben: Thracia mitela p. 92 und Lyonsia Jeffreysi p. 93. — Lebende und fossile Varietäten und Formen von Triton Parthenopum Sal. und von Triton corrugatum Lam. Neu beschrieben von ersterer Art var. peribrantum und corruforme p. 96, von letzterer Forma intermidens p. 97; vivopse, propetuberculiferum und Pantanellii p. 98. — Verschiedene lebende und fossile Formen von Triton gyroides Brocc. Neu beschrieben: Forma inflectilabrum und labroplitum p. 99,

imperans, Ficarazzense und singillum p. 100. — Bemerkungen über *Ranella reticularis* Born. — Derselbe Autor schreibt noch über eine grosse Menge der verschiedensten Arten, deren Aufzählung fast einer Copie seiner Arbeit, die den ganzen Band füllt, gleich käme. Wir beschränken uns daher, nur die neu beschriebenen Arten und Varietäten anzuführen: *Cassis undulata* Gmel. var. n. *levilabiata* p. 113; *Dolium galea* L. var. n. *spirintrorsum*, *tardina* p. 114 und *epidermata* p. 115. — *Turritella terebra* L. var. n. *imbricosoluta* p. 118; *Patella Lampedusensis* n. sp. p. 121; *Petricola mirulla* n. sp. p. 127; *Semele fazisa* n. sp. p. 137. — *Pecten pirillus* n. sp. p. 186; *Pecten gallimus* n. sp. 191; *Pecten storius* n. sp. p. 191; *Anatina Bonfornellensis* n. sp. p. 195; *Ostrea cucullata* Born. var. n. *Coppiana* p. 197; *Chama incernata* n. sp. p. 207; *Chama Carolae* p. 208; *Lucina lia* p. 215; *Lucina belma* p. 217; *Fissurella Vitoensis* p. 220; *Fiss. miriga* p. 221; *Fiss. tapina* Gray. (= *Fiss. clypeata* Hörnes) p. 224. — Es folgen eine Reihe von kleineren Beobachtungen über einzelne Genera und Arten, z. B. über die Formen und Varietäten von *Murex brandaris* L. und die nahestehenden Arten, die sämtlich aufzuführen zu viel Raum einnehmen würden. — *Necrolog* J. Gw. Jeffreys p. 289—290. Verzeichniss der Mitglieder der italienischen Malakozoologischen Gesellschaft p. 291—292.

Volume XI. 1885.

S. Brusina Sull. *Helix homoleuca* del Littorale Croato p. 5—10 (schon im Bd. VIII besprochen). — L. Foresti. Decrizione de una forma nuova di *Marginella*, ed alcune osservazioni sull' uso dei vocaboli mutazione e varieta p. 11—15. — Neu beschrieben: *Marginella Fornasini* p. 11 mit Abbildung im Text. — S. Brusina, Note d'Aggiunta all' articolo sull' *Helix homoleuca* p. 16—26. Schon besprochen Bd. VIII. —

March. A. de Gregorio, Continuazione degli Studi su talune conchiglie mediterranee viventi e fossili p. 27—204. Die sehr umfangreiche Arbeit behandelt so verschiedene Themata, dass sie nicht gut eines auf eng bemessenem Raume gedrängten Auszuges fähig ist.

G. B. Adami, Novità malacologiche recenti p. 204. — Neu beschrieben werden: *Hyalina* De Bettana p. 205. t. 1. f. 1—3 (eine der *Hyal. lucida* Drap. verwandte Art von Valdagno); *Helix planospira* Lam. var. *italica* Stab. mut. *Illasyacia* Adami p. 208. *Hel. cingulata* var. *Pinii* p. 209; var. *incerta* p. 209; *Helix colubrina* San. var. *Medoacensis* p. 212; *Hel. Nicolisiana* n. sp. p. 214 t. 1 f. 4—6; *Hel. Bonaldai* n. sp. p. 216 t. 7—9; *Pupa avenacea* Brug. var. *plicatula* p. 221, *Pupa granum* var. n. *meridionalis* n. p. 222; *Clausilia Laurae* n. sp. p. 223 f. 10—12; *Claus. Paroliniana* de Betta var. n. *intermedia* p. 225. *Cl. plicatula* var. n. *latecostata* p. 226; *Limnaea stagnalis* var. n. *violacea* p. 231; *Pisidium Piattii* n. sp. p. 231 f. 15. *Unio Bourguignatianus* n. sp. p. 234 f. 13—14, *Unio athesinus* n. sp. p. 236, f. 16—17. *Unio Piccinellii* n. sp. f. 18—19. *Unio Tommassii* n. sp. p. 241 t. 20, 21; *Unio Cristophori* n. sp. p. 242; *Unio Gredleri* n. sp. p. 245 f. 22; *Unio Ruffoni* n. sp. p. 248 f. 26 27, *Anodonta Ambrosiana* n. sp. p. 250 f. 30. *An. Colelliana* p. 252 f. 31, var. n. *Toblinica* p. 254; *An. Strobiliana* n. sp. p. 255 var. n. *medoacensis* p. 257. *An. Jenii* n. sp. p. 258 f. 28. — Dante Pantanelli, Supra alcune Scalarie terziarie p. 262—272. Besprechung der Gruppe *Cirsotrema* und Aufzählung der Arten derselben.

Journal of Conchology. Vol. IV. 1883 bis 1885.

Heft 1. W. Kobelt, The Land shells of Gibraltar p. 1 9. Aufzählung von 20 um Gibraltar gesammelten Arten. — Neu beschrieben werden: *Hyalina calpica* p. 3;

Hyal. Dauthezi p. 4; *Helix* Coquandi var. *Ellioti* p. 5 und *Helix* (*Turricula*) *simiarum* p. 8. — J. T. Marshall. On a Parasite of *Limnaea truncatula* p. 10—12. — Der Parasit ist die längst bekannte *Fasciola hepatica*, eine Cercarie. — Den. Roebuck. Pupa secale v. alba p. 12—13. Diese von Mr. Rimmer von Pateley Bridge Yorkshire angegebene Art ist *P. umbilicata* var. alba. — New Yorkshire Locality for *Planorbis lineatus*. — C. Ashford, *Ancylus lacustris* var. albida at Christchurch p. 13. — Pulsations of *Helix rufescens* p. 13. (Beobachtungen über den Herzschlag der genannten Art). — J. W. Taylor. Pupa *umbilicata*. Nach dem Autor ist die als Pupa *umbilicata* Drap. mit 2 Zähnen von R. Tate angegebene Art nicht diese Art, sondern gehört zu Pupa *marginata* Drap. (*P. muscorum* L.). — Proceedings of the Conchological Society p. 14—23. Bibliographie p. 23—24. — W. Taylor, Pupa ringens in Sutherlandshire p. 24. — W. Nelson, Descriptions of new British varieties of Freshwater Shells p. 25—26. Aufzählung einer Reihe für England neuer Varietäten von Wasserschnecken. — J. Darker Butterell, Description of a new variety of *Limax agrestis* p. 27. — Neu beschrieben: *L. agrestis* var. *nigra*. — F. M. Hele; *Helix lapicida*, var. *albina* near Bristol p. 26. — J. W. Taylor, Description of some new Varieties of British Land and Freshwater Shells p. 28—37. Aufzählung einer Reihe für England neuer Varietäten von Binnenschnecken, meist nur auf Grössendifferenzen und Farbenabänderungen gegründet. J. W. Taylor. Septa of *Planorbis lineatus* p. 37. — Nach dem Autor kommen entgegen der Angabe Jeffreys auch bei unvollendeten Gehäusen die Abtheilung in Kammern vor. — W. Denison Roebuck, The British Slug List p. 38—43. Aufzählung der in England vorkommenden Nacktschnecken mit ihren Varietäten. Die englische *Amalia Sowerbyi* ist als *Amalia gagates*

var. plumbea Moq. aufgeführt. — James Cosmo Melvill, Description of a new species of Cassis p. 43—44. Neu beschrieben Cassis kalosmodix p. 43. t. 1. f. 1. Fundort unbekannt. — W. Taylor, Pupa marginata v. albina p. 44. Deren Vorkommen in Worcestershire. — The Conchological Societys List of British Land of Freshwater Mollusca. Aufzählung von 132 Arten mit zahlreichen Varietäten. — J. W. Taylor, Descriptions of new varieties of British Land Shells p. 53—54. — Aufzählung und Beschreibung von 8 für England neuen Varietäten von Landschnecken. — Proceedings of the Conchological Society p. 54—55. — Tr. M. Christy, Notes on the Mollusca collected in Switzerland in 1885. — Excursionsbericht über im Engadin gesammelte Conchylien. — W. H. Dall, Circe versus Gouldia p. 60—63. Bibliography p. 63—64. — Proceeding of the Concholog. Soc. p. 65—68. — J. W. Taylor, Pupa secale var. edentula Taylor p. 68. Die Varietät kommt bei Ingleton, Yorks vor. — Charl. Asford The darts of british Helicidae p. 69—79. Bemerkungen und Beobachtungen über den Pfeilsack und die Pfeile englischer Helixarten. — W. Nelson, Note on some malformed specimens of Limnaea peregra p. 80. Bemerkungen über monstruöse Formen von L. peregra. — J. W. Taylor, Vitrina pellucida var. depressiuscula Jeffr. p. 80. Vorkommen derselben bei Celtenham. — J. W. Taylor, On Zonites glaber Studer as a member of the British Fauna p. 81. Die Art soll in Marple Wood, Cheshire vorkommen. Ich werde nicht fehlgehen, wenn ich dafür halte, dass damit Hyal. subglabra Bourg. gemeint sein wird. — J. W. Taylor, Limnaea peregra var. stagnaliformis n. p. 82. Die genannte Varietät beschrieben p. 82. t. 1. f. 2—3. — J. W. Taylor, Hel. lapicida v. nigrescens p. 83. Die Varietät (Farbenabänderung) beschrieben. — Hel. arbustorum v. pallida

p. 83. Für den Namen *pallida* wird *cineta* in Vorschlag gebracht. — *Bulimus obscurus* var. *albinos* p. 83—84. Vorkommen dieser Varietät an mehreren Orten. — *Physa fontinalis* var. *albina* p. 84. Deren Vorkommen. — *Limnaea palustris* var. *globosa* n. Die Varietät neu beschrieben p. 84. t. 1. f. 3—4. Bibliographie p. 85—89. — J. W. Taylor, Life histories of British Helices p. 89—105. Ausführliche Beschreibung der *Hel. aspersa* mit Angabe der Synonymie und Varietäten und Beschreibung der Anatomie des Thieres. — Proceedings of the Concholog. Soc. p. 106—108. — Charles Asford, The darts of British Helicidae Part. II. p. 108—112. Beschrieben und abgebildet: Pfeil von *Hyal. nitida* p. 108. t. 3. f. 1—4; *Zon. excavatus* p. 109. t. 3. f. 5—10 und von *Hel. virgata* p. 111. t. 3. f. 11—17. — J. W. Taylor, *Neritina fluviatilis* var. *cerina* Colb. in Hampshire p. 112. — W. Dennison Roebuck, Carnarvonshire Notes. July 1883. — Aufzählung der am genannten Orte gefundenen Arten. — T. S. Hillman, *Testacella haliotidea* v. *scutulum* in Sussex p. 115. — J. W. Taylor, Notes on the Range of *Paludina vivipara* L. p. 116. Bemerkungen über die Synonymie der Art. — W. Nelson, Alterations in the Molluscan Fauna of a small pond p. 117. Bemerkungen über Veränderungen in der Schneckenfauna in einem Sumpfe bei Black Hills, Leeds. — W. Dennison Roebuck, *Bulimus obscurus* var. *albinos* Mg. p. 117. Kommt bei Fitschin bei Eastbourne vor. — H. Glanville Barnace, Musical Sounds Couased by *Achatinellae* p. 118. — Die Achatinellen der Sandwichsinseln geben Töne von sich, welche wie Aeolsharfen klingen. — J. W. Taylor, *Hel. virgata* v. *mayor* at Eastbourne p. 118. — Bibliography p. 119—124. — J. Hele, *Limnaea peregra* v. *Burnetti* Alder p. 124—125. Beobachtungen über diese Art, die bei Loch Skene in Dumfriesshire vorkommt. — Den.

Roebuck, *Limax maximus* var. *cellaria* Argenv. p. 125. Deren Vorkommen an einigen Orten. Es ist diese Varietät wohl identisch mit unserem *Limax cinereus* List. — J. W. Taylor, *Hel. rotundata* var. *alba* in Scotland p. 125. — Den. Roebuck, Flinshire Notes July 1883. p. 126. Excursionsbericht. — J. W. Taylor, *Ancylus lacustris* a Thread spinner p. 127. Mittheilung einer Beobachtung über das Fadenspinnen der genannten Schnecke. — J. W. Taylor, *Paludina vivipara* v. *unicolor* Jeff. p. 127—128. Bemerkungen über das Vorkommen der genannten Varietät. — W. Nelson, Variation in the coloration of *Planorbis contortus* L. — Beobachtung über abnormale Färbung der genannten Art. — J. W. Taylor, *Planorbis complanatus* monst. *terebrium* Turton p. 128. Vorkommen dieser Abnormität in England. — Charl. Ashford, The darts of British *Helicidae* III. p. 129—133. Die Pfeile von *Hel. ericetorum* p. 129. t. 2. f. 1—5; *Hel. caperata* p. 131. t. 5. f. 6—8 und *Hel. pisana* p. 131. t. 5. f. 9—16 beschrieben und abgebildet. — W. F. Petterd, p. 133; *Hel. aspersa* in Tasmania p. 133. — Den. Roebuck, *Limax agrestis* var. *reticulata* Müll. in Britain p. 134. Fundorte der Varietät. — J. W. Taylor, *Limnaea palustris* var. *obesa* n. p. 135. t. 1. f. 5. — W. F. Petterd, Description of new Tasmanian shells p. 135 bis 145. Neu beschrieben: *Liotia compacta* p. 135; *Liotia Lodderae* p. 135; *Turritella Higginsi* p. 143; *Aclis micra* p. 136; *Eulima vitrea* p. 136; *Chemnitzia Beddomei* p. 136; *Trophon laminata* p. 136; *Rissoa lineata* p. 137; *R. dulcis* p. 137; *R. bicolor* p. 137; *R. approxima* p. 138; *R. badia* p. 138; *R. Diemenensis* p. 138; *R. pulchella* p. 138; *R. Layardi* p. 138; *Schismope Beddomei* p. 139; *Sch. pulchra* p. 139; *Crossea minuta* p. 139; *Cyclostrema micra* p. 139; *Obeliscus Tasmanica* p. 140; *Aclis turrata* p. 140; *Stylifer robusta* p. 140; *St. Lodderae* p. 140;

Cyclostrema Hariettae p. 141; *Rissoina approxima* p. 141; *Trophon tumida* p. 141; *Tr. eburnea* p. 142; *Terebra Beddomei* p. 142; *Cerithiopsis Johnstoni* p. 142; *Volvaria lubrica* p. 143; *Marginella mixta* p. 143; *M. Beddomei* p. 143; *M. Johnstoni* p. 143; *M. minima* p. 143; *Eulima aurantia* p. 144; *Clementia Tasmanica* p. 145; *Myochama Woodsii* p. 145. — J. W. Taylor, *Valvata piscinalis* monst. sinistrorsum in Derbyshire p. 145. — W. D. Roebuck, New variety of *Arion ater* p. 146. Neu beschrieben: *Arion ater* v. *plumbea* von Otley to Pool. — J. W. Taylor, *Limnaea palustris* monst. *carinatum* n. p. 146. Beschrieben und abgebildet t. 1. f. 6. — J. W. Cundall, Marine Mollusca collected at Ilfracombe p. 147—149. Liste der Namen der an der genannten Stelle gesammelten marinen Schnecken. — Den. Roebuck, *Limnaea stagnalis* var. *fragilis-variegata* at Malham Tarn. p. 149. — W. T. Petterd, *Gundlachia* in Tasmania. Das Vorkommen einer Art dieses Genus in Neuseeland. — Den. Roebuck, *Limax maximus* var. *maculata* Picard in Britain p. 150. — Proceedings of the Conch. Soc. p. 151—158. — J. W. Taylor, Occurrence of *Cyclostoma elegans* var. *fasciata* Pic. in England p. 158. Die Varietät kommt bei Tintern, Monmouthshire vor. — Den. Roebuck, *Limax maximus* var. *Johnstoni* Moq. in East-Gloucestershire p. 158. — W. F. Petterd, New species of Freshwater shells from Australia p. 159—160. Neu beschrieben werden: *Bithynia Richmondiana* p. 159; *Amnicola positera* p. 159; *Ancylus assimilis* p. 159. — Ferner Aufzählung der Arten, welche im Richmond-River vorkommen. — W. Baillie, Colonizing Land shells in East-Southerlandshire p. 160. Aufzählung einiger Arten, die sich in dem angegebenen Landstrich acclimatisirt haben. — C. T. Musson, Subfossil Shell deposits in Nottinghamshire p. 161—163. Aufzählung

mehrerer Arten aus Ablagerungen (quaternär?) von Bingham, Gotham und Scarthingmoor etc. — Es sind nur mit recenten Species übereinstimmende. — Ch. Ashford, The darts of british Helicidae IV. p. 164 bis 170. Es werden die Pfeile von *Hel. nemoralis* p. 164. t. 7. f. 1—6; *Hel. hortensis* p. 166. t. 7. f. 7—11; *Hel. fusca* p. 169. t. 7. f. 12—15 beschrieben. — Proceedings etc. p. 171—173. — The present state of Knowledge of the Distribution of Land and Freshwater Mollusca in Britain p. 174—184. Numerische Zusammenstellung der bis jetzt in den Grafschaften und Inseln beobachteten Land- und Süßwasser-Mollusken. — Die höchste Zahl ist 96 Arten (Yorkshire Mid-West) bei 132 in ganz England vorkommenden Species. — Bibliography p. 184—185. — A. W. Nicholls, List of Land and Freshwater Mollusca collected at Peterborough p. 185—188 Verzeichniss der um Peterborough beobachteten Binnen-Mollusken. — Authenticated Materials for a Land- and Freshwater Mollusca of Mid-West Yorkshire p. 188—194. — Aufzählung der beobachteten Arten. — J. W. Cundall, Occurrence of *Acme lineata* in North-Somerset p. 194. Vorkommen der genannten Art in England. — Ch. Ashford, The darts of british Helicidae V. p. 195—202. Beschrieben werden: Die Pfeile von *Hel. arbustorum* p. 195. t. 8. f. 1—4; von *Hel. lapicida* p. 197. t. 8. f. 5—7; *Hel. pulchella* p. 199. t. 8. f. 8—9; *Hel. aspersa* p. 199. t. 8. f. 10 bis 18. — H. P. Fitzgerald, List of Mollusca of Preston Condovery, North Hants p. 203—205. Aufzählung der am genanntem Orte beobachteten Binnen-Mollusken. — J. W. Taylor, *Pupa secale* var. *minor* Mq. Td. Britain p. 205. — Den. Roebuck, Llandudno and Derbyshire Mollusca p. 206—214. Aufzählung der beobachteten Arten. — E. Collier, *Helix villosa* Drap. as a British Species 214. *Hel. villosa* soll bei Cardiff

vorkommen. — W. Nelson, *Paludina contecta*, in Yorkshire, p. 214. — Proceedings Conch. soc., p. 215—216. — J. W. Taylor *Bulimus acutus* var. *elongata* Cr. et Jan in England. — E. Collier, *Planorbis dilatatus* Gld. p. 217. Das Vorkommen in England. — W. D. Roebuck. *Arion ater* var. *bicolor* in West-Gloucestershire p. 217. — Bibliography p. 218—222. — W. D. Roebuck, *Limax maximus* v. *Ferrussaci* in County Antrim p. 222. — W. Nelson, *Zonites radiatulus* var. *viridescens-alba* p. 223. — Das Vorkommen dieser Varietät in England. — W. D. Roebuck, New variety of *Limax flavus* p. 223. — Die var. n. *grisea* des *Limax flavus* neu beschrieben. — J. W. Taylor, Unusually large *Unio pictorum* p. 224. Erwähnung einer ungewöhnlich grossen *Unio pictorum* aus dem Ossington Lake Notts. — *Arion ater* var. *albolateralis* in Sussex p. 224. — *Planorbis contortus* var. *albida* at York p. 224. — *Claus. rugosa* var. *albinos* in South Hants. p. 224. — C. W. Peach, Land and Freshwater Shells of Caithness p. 225—228; Aufzählung von 30 beobachteten Arten. — J. W. Taylor, *Planorbis corneus* v. *albinos* in Warwickshire p. 228. — Capt. E. F. Becher, The Land an Freshwater Mollusca of the Maltese Islands p. 229—239. Aufzählung der auf der Insel Malta und den zur Gruppe derselben gehörigen Inseln vorkommenden Arten. — T. D. A. Cockerell, Colonization of Land shells at Chislehurst p. 238. — Beobachtungen über die Einschleppung von Landschnecken bei Chislehurst. — Ch. Ashford, The darts of Brit. Helicidae VI. p. 239. Beschrieben werden: die Pfeile von *Hel. pomatia* p. 239. t. 9, f. 1—8. *Hel. rufescens* p. 241. t. 9. f. 9—12. *Hel. hispida* p. 243, t. 9, f. 13—17. *Hel. concinna* Jeff. p. 244. t. 9. f. 18—20. J. Ponsonby, List of shells found in the Neighbourhood of Yeovill, N. Somersetshire p. 245—247. Namentliche

Aufzählung der gesammelten Arten (53). Authenticated List of the Mollusca of Northamptonshire p. 247—258. Aufzählung der vorkommenden Arten mit Varietäten. — Charl. Ashford, Note on the anatomy of *Helix sericea* Müll. p. 259. — Bemerkungen über die Anatomie von *H. sericea*. — Proceedings etc p. 260—265. — J. W. Taylor, *Clausilia rugosa* monst. dextrorsum in Stirlingshire p. 265. — J. Ponsonby, Additions to the Land shells of Gibraltar p. 266. Aufzählung von weiteren 7 Arten, in Summa 27 Species. — Ch. Ashford, the darts of British Helicidae VII. p. 267—270. Beschrieben werden die Geschlechtsapparate von *Hel. revelata* Mich. p. 268. t. 10, f. 1. *Hel. obvoluta* p. 268. t. 10, f. 2; *Hel. carthusiana* p. 269. t. 10. f. 3. *Hel. cantiana* p. 269. t. 10. f. 4. — R. D. Darbishire, *Astarte borealis* p. 270. Das Vorkommen dieser Art bei Warkworth, Northumberland. — J. W. Taylor, Notes on a collection of Guernsey and Sark Mollusca made by J. R. Brockton Tomlin in August 1884 p. 271—275. Aufzählung der auf den Inseln Guernsey und Sark gesammelten 20 Arten. — W. Denn. Roebuck, Variation in *Lehmannia arborum* p. 276—280. Aufzählung der 6 durch lateinische Diagnose beschriebenen Varietäten von *Lehm. arborum*. Mit Angabe der englischen Grafschaften, in welchen die Art beobachtet wurde. — J. Ponsonby, Remarks on the Land op Freshwater Mollusca of the Maltese Islands p. 280—282. Bemerkungen über mehrere Arten der Inselgruppe von Malta. — E. A. Smith, Note on *Eulima candida* of Marrat p. 282—283. Bemerkungen über die genannte Art — Obituary. — J. Gw. Jeffreys p. 283—285, Necrolog. — R. W. S. Smart and A. H. Cooke, The Marine shells of Scilly p. 285—303. Aufzählung der an den Scilly-Inseln gesammelten marinen Mollusken. — W. Jeffery, Note on the preparation of the smalles Bivalves for the Cabinet p. 303. Angabe,

wie kleine Muscheln für die Sammlungen zu präpariren sind. — B. Sturgess Dodet, Probable causes of abnormal variation in *Limnaea* p. 304. Angabe einiger muthmasslicher Ursachen über die abnormalen Variationen bei den *Limnaen*. — R. Scharff, on the organs of sense in the British Land and Freshwater Mollusca p. 305—312. Kurze Beschreibung des Gesichts-, Gehör- und Geruch-Organen bei den in England vorkommenden Arten. — J. H. Ashford, *Pupa umbilicata* var. *albina* at Christchurch. S. Hants p. 312. Proceedings etc. p. 313—316. — J. C. Melvill, Description of two new species of shells p. 316. Neu beschrieben: *Scalaria inclyta*, p. 316. t. 11. f. 1. (China) und *Bullia pura* p. 316. t. 11. f. 2. (Port Elizabeth). — A. D. Darlishire, Land shells at Doys Bay, Connemara p. 317—318. Aufzählung von 20 Arten. J. W. Taylor a. W. D. Roebuck, Census of the authenticated distribution of British Land and Freshwater Mollusca p. 319—336. Namentliche Aufzählung der 128 Arten englischer Binnenmollusken mit Angabe ihrer Verbreitung in England durch Einsetzung der Nummern der Grafschaften, in denen sie gefunden wurden, sowie unter Angabe der Länder, in welchen sie ausserhalb Britannien vorkommen. Die letztere Aufzählung ist mangelhaft und unvollständig; eine beigegegebene Karte Britanniens enthielt die Nummern der englischen Grafschaften. — H. P. Fitzgerald, Additions Captures from Preston Candover N. Hants p. 337. Aufzählung weiterer 10 Arten, wodurch sich die Liste der Arten auf 71 Species erhöht. — R. D. Darbshire, *Anodon herculeus* Gerstf. p. 337—338. — Bemerkungen über diese Art. — R. Miller Christy, Notes on the Land a. Freshwater Mollusca of Manitoba p. 339—349. Aufzählung der in Manitoba in Nordamerika vorkommenden Arten. — W. Bendall, The Locality for *Limnaea involuta* Thomp. p. 349. Berich-

tigung über den Fundort dieser Art. — R. D. Darbishire, Marine Mollusca at Oban p. 350. — Aufzählung von 22 Arten. — J. W. Taylor, Description of a new species of Planorbis from Manitoba p. 351. Neu beschrieben Plan. umbilicatus p. 351, Figur im Text. — J. W. D. Roebuck, A new variety of the Cellar-slug-Limax flavus var. suffusa p. 352. Neu beschrieben die genannte Varietät von Ealing, Middlesey. — J. W. Taylor, Zonites nitidulus var. Helmii in S. Tipperary p. 352. — Backer Hudson, Notes of the oswestery District of Salop with reference to Land and Freshwater Mollusca collected there in June 1885 p. 353—355. Excursionsbericht. — W. Hill Evan's, The locality for Limnaea involuta Thomp. p. 355. Bemerkungen über den Fundort der Art. — Proceedings p. 356—365. — E. A. Smith, Note on Anodon herculeus Gerst. p. 366. — Bemerkungen über die genannte Art. — T. D. A. Cockerell, Planorbis subangulatus at Malta p. 366. — Nicht Plan. glaber, sondern die Plan. subangulatus findet sich auf Malta. — E. Collier, Shells collected at Llandulas, North Wales during a brief visit in August last p. 367—368. Aufzählung von 29 bei einem kurzen Besuch gesammelten Arten. — C. Cockerell, Helix pisana var. alba at Rush. W. Dublin p. 368. — J. H. Thompson, The Land Mollusca of Bristol county, Massachusetts p. 369—373. Aufzählung der Arten. — T. D. A. Cockerell, Hel. ericetorum at Llandudno. p. 373. — Sydney C. Cockerell, Abnormal spiral banding in our Land and Freshwater Mollusca p. 374—375. Aufzählung der in England mit abnormalen Spiralbändern beobachteten Arten. — W. D. Roebuck, New Varieties of Limax arborum and Arion ater p. 375—376. Neu beschrieben: Lim. arborum var. maculata und Arion ater var. reticulata. — T. D. A. Cockerell, Ancyclus fluviatilis var. costata Fér. — Diese Varietät wurde

bei Folkestone beobachtet. — J. W. Taylor, *Pupa marginata* var. *brevis* Baud. in Britain p. 376. Vorkommen dieser Varietät bei Runswick Bay bei Whitby.

Jahrbücher der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. XI. Jahrg. 1884.

D. F. Heynemann, Studien über einige wenig gekannte Gattungen p. 1—17. Gen. *Aspidoporus* Fitz. ist zu streichen, da die Gattung auf eine Species *Amalia* (vom Hermannskogel im Wiener Wald) gegründet ist. — Gen. *Urocyclus* Gray. wird anerkannt. Von 7 Arten derselben sind die Thiere, Kiefer und Radula oder Theile abgebildet t. 1. f. 1—5 u. 7. Dann folgen einige Bemerkungen über Gen. *Dendrolimax* Dohrn, von welchem *Dend. Heynemanni* Dohrn abgebildet ist. — Spirid. Brusina, Die Neritodonta Dalmatiens und Slavoniens nebst allerlei malakozoologischen Bemerkungen p. 17—121. Die umfangreiche Arbeit haben wir schon besprochen. Literatur p. 121—128. — Vinc. Gredler. Zur Conchylien-Fauna von China p. 129—161. Nach Bemerkungen über mehrere in neuerer Zeit über China erschienenen Werke werden neue Fundorte und Funde aufgezählt: I. aus der Provinz Hupé, II. aus der Provinz Hunan und III. aus der Provinz Kuang-si. Dann folgt die Beschreibung der Novitäten: *Sitala bilirata* p. 141. t. 3. f. 1, *Nanina infantilis* p. 143. t. 3. f. 2, *Buliminus Anceyi* p. 144. *Stenogyra mira* p. 146. t. 3. f. 3, *Sten. pellita* p. 147. *Clausilia Fuchsi* p. 147. t. 3. f. 4, *Claus. paradoxa* p. 150. t. 3. f. 5, *Claus. simiola* p. 151, *Planorbis membranaceus* p. 153, *Claus. paracelsa* p. 155, Figur im Text. Ferner wird die Radula von *Pupina ephippium* t. 3. f. 6 und *Nanina infantilis* t. 3. f. 7—10 beschrieben und abgebildet. — O. F. v. Möllendorf, Materialien zur Fauna von China p. 162—181. — Aufzählung der Arten der Genera *Amphidromus*, *Buliminus*

und Pupa mit Synonymie, lateinischer Diagnose nebst Bemerkungen meist über die Fundorte. Neu beschrieben werden: *Buliminus albescens* p. 170, Pupa *Heudeana* = *P. cryptodon* Heude p. 176. — Leop. Tausch, Die von Prof. Dr. C. Doelter auf den Capverden gesammelten Conchylien p. 181—189. — Aufzählung von 22 Arten Schnecken und 10 Muscheln. — C. F. Jickeli, Studien über die Conchylien des rothen Meeres p. 189—217. III. Die Gattungen *Ancillaria* Lam., *Cypraea* L. und *Pleurotoma* Lam. — Aufzählung der Arten mit vollständiger Synonymie und Angabe deren Verbreitung. Das Gen. *Ancillaria* zählt 14, das Gen. *Cypraea* 30, das Gen. *Pleurotoma* 13 Arten. Literatur p. 217—224. — P. Hesse, Beiträge zur Molluskenfauna Griechenlands III. p. 225—245. Enthält Bemerkungen und anatomische Untersuchungen einer Reihe griechischer Arten. Von *Hyalinia aegopinoides* Maltz. ist Kiefer und *Radula* abgebildet und beschrieben t. 4. f. 1; von *Hyal. aequata* Mss. die *Radula* t. 4. f. 2; von *Zonites graecus* Kob. Kiefer und *Radula* t. 4. f. 3 u. 6 und Genitalapparat t. 5. f. 1; von *Hel.* der Kiefer und Genitalapparat beschrieben; von *Hel. cantiana* der Genitalapparat t. 5. f. 8; von *Helix Martensiana* Genitalapparat; von *Hel. Oliveri* Fér. der Genitalapparat t. 5 f. 10; von *Helix lecta* t. 5. f. 11. 11a, *Hel. noverca* t. 5. f. 12. 12a, *Hel. Westerlundi* t. 5. f. 13. 13a der Genitalapparat und Kiefer; von *Hel. pellita* der Kiefer; von *Hel. cyclolabris* der Genitalapparat. Für diese griechischen *Campylaea* wird ein neues zu *Fruticicola* gehöriges Subgenus *Pseudocampylaea* aufgestellt p. 27. — C. F. Jickeli, Studien über die Conchylien des rothen Meeres p. 245 bis 263. IV. Die Gattungen *Pyramidella* mit 3, *Obeliscus* mit 7, *Elusa* mit 3, *Syrnola* mit 7, *Rissoina* mit 20 Arten. Abgebildet werden: *Riss. assimilis* Jick.

t. 6. f. 1—3; Riss. dimidia Jick. t. 6. f. 4—6 und Riss. angulata Jick. t. 6. f. 7—9. — E. Merkel, Zur Kenntniss der Molluskenfauna Schlesiens p. 263 bis 289. Schon besprochen. — O. Böttger, Neuer fossiler Archaeozonites aus dem Tertiär der Rhön p. 289—291. Neu beschrieben: Archaeoz. Strubelli p. 289. Literatur p. 291—306. — O. F. v. Möllendorf, Materialien zur Fauna von China p. 307—391. Patula Held. 2 Arten; Helix L. Gr. Gonostoma Held. 2 Arten; Gr. Polygyra Say. 2 Arten; Gr. Triodopsis Raf. 2 Arten; Gr. Vallonia Riss. 2 Arten; Gr. Plectotropis Mts. 6 Arten. Neu beschrieben Hel. applanata p. 319; Gr. Fruticicola Held. 6 Arten; Unter-Gr. Fructicotrochus Kob. 19 Arten; Gruppe Cathaica Moll. p. 339 30 Arten; Gr. Aegista Alb. 7 Arten; Gr. Armandia Ancey. 10 Arten; Gr. Abba Beck. 1 Art; Gr. Hadia Alb. 18 Arten; neu beschrieben Helix Caspari p. 389. t. 9. f. 1 u. 2; Hel. Frieseana p. 385. t. 7. f. 3 u. 4; Helix stenozone p. 385. t. 7. f. 5 u. 6; Helices incertae sedis 11 Arten. Ausserdem sind abgebildet: Helix xanthoderma Möll. p. 375. t. 7. f. 1 u. 2; Hel. hainanensis Ad. p. 374. t. 7. f. 3; Hel. trisinuata var. sculptilis Moll. p. 310. t. 7. f. 4; Hel. Fortunei v. meridionalis Moll. t. 7. f. 5; Hel. subrugosa Desh. t. 7. f. 6; Hel. Hungerfordiana Nev. p. 336. t. 7. f. 7; Hel. subchinensis Nev. t. 7. f. 8; Hel. xanthoderma v. polyzona t. 8. f. 1 u. 2; Hel. platyodon Pfr. p. 372. t. 8. f. 3—8; Hel. succincta Ad. p. 383. t. 9. f. 7 u. 8. Bei allen Arten ist die vollständige Synonymie, die Verbreitung, bei den weniger bekannten die Diagnose beigegeben. — Literatur p. 391—398.

Jahrgang XII. 1885.

D. F. Heynemann, Ueber Vaginula-Arten im British Museum p. 1—17. Aufzählung von 8 Arten. Neu beschrieben: Vaginula fusca p. 6. t. 1. f. 1—3

von Rio Janeiro; Vag. nigra p. 7. t. 1. f. 4—5 von Chili; Vaginula maura p. 7. t. 1. f. 6 u. 7 von Delagoa-Bay, Südost-Afrika; Vag. picta p. 8. t. 1. f. 8 u. 9 von der Insel Anjouan, Komoren; Vag. grossa p. 9. t. 2. f. 1. von ebendaher; Vaginula bicolor p. 9. t. 2. f. 2 von den Seychellen; Vag. flava p. 10 t. 2. f. 3 von Borneo; Vag. tuberculosa Mts. p. 11. t. 2. f. 4 von Südbrasilien. — D. F. Heynemann, Ueber Chlamydephorus Binn. p. 17—20. Die einzige Art des Genus Chl. Gibbonsi Binn. abgebildet t. 2. f. 5—7 und beschrieben. — Jul. Hazay, Die Molluskenfauna der hohen Tatra und über einige Vorkommnisse der nördlichen Karpathen p. 20—45. Schon besprochen. — P. Hesse, Die systematische Stellung von Helix Quimperiana Fér. p. 45—47. t. 3. f. 1a—e. Nach Beschreibung der Anatomie der Art kommt der Verfasser zu dem Schlusse, dass selbe keine Campylaea ist, sondern dass sie als Repräsentantin einer eigenen Gruppe Elona Ad. gelten muss. — P. Hesse, Ueber einige Arten des Gen. Buliminus Ehr. p. 48—52. Beschreibt die Genitalien von Bul. detritus p. 49. t. 3. f. 2; Bul. Hohenackeri p. 50. t. 3. f. 3; Bul. tauricus p. 51. t. 3. f. 4; Bul. bidens var. Retowskiana p. 51. t. 3. f. 5 und Bul. pupa v. grandis p. 51. t. 3. f. 6. — O. Böttger, Beitrag zur Kenntniss der Schneckenfauna von Central-Bosnien, sowie des südlichsten Dalmatiens und Westmontenegros p. 53—72. Schon besprochen Bd. VIII. — O. v. Möllendorf, Gruppeneintheilung von Cochlostyla p. 72—82. Die geringe Uebereinstimmung der Gruppeneintheilung der Cochlostylaarten in Pfeiffer's Nomenclator und Semper's Landschnecken der Philippinen veranlasst den Verfasser, eine tabellarische Nebeneinanderstellung der Gruppierung nach beiden Autoren zu geben, ohne jedoch die Fehler derselben zu verbessern. — D. F. Heynemann, Ueber die Vagi-

nula-Arten Afrikas p. 83—128. Nach allgemeinen Bemerkungen folgt die Aufzählung der Arten: Afrika, Westküste: a. Continent 2 Arten, b. Inseln 1 Art, *V. myrmecophila* n. sp. p. 101; Afrika, Ostküste: a. Continent 4 Arten, b. Inseln: 1. Madagascar 5 Arten, Neu *V. verrucosa* p. 110, *V. margaritifera* p. 112, *V. sulfurea* p. 113; 2. Komoren 3 Arten, Neu *V. picta* p. 116, *V. grossa* p. 117; 3. Seychellen 5 Arten, Neu *V. elegans* p. 119, *V. tristis* p. 121, *V. parva* p. 122; 4. Mascarenen 2 Arten; 5. Rodriguez 1 Art. Die sämtlichen Arten sind mit Beschreibungen und jene, welche der Autor selbst gesehen, mit genauen Ausmaassen versehen. — O. Böttger, Malakologische Ergebnisse auf Streifzügen in Thessalien p. 128—200. Schon besprochen Bd. VIII. — H. v. Ihering, Zur Kenntniss der amerikanischen *Limax*-Arten p. 201 bis 219. Die anatomischen Ergebnisse der amerikanischen *Limax*arten werden gegenüber den europäischen gestellt und als Beispiel die Anatomie der südamerikanischen *Limax brasiliensis* t. 5. f. 1—4 beschrieben, welcher sich mit *L. campestris* Gay an den europäischen *L. laevis* anschliesst. Der Verfasser kommt zu dem Schlusse, dass „*L. laevis* eine sehr weitverbreitete Art ist, deren amerikanische Glieder in der Rückbildung des Innenzackens der Lateralzähne sich von dem europäischen unterscheiden.“ — Vinc. Gredler, Zur Conchylienfauna von China p. 219—235. VII. Stück. Neu beschrieben werden: *Zonites scrobiculatus* p. 220. t. 6. f. 2; *Helix Hupensis* p. 221. t. 6. f. 1; *Hel. piligera* p. 222. t. 6. f. 3; *Ennea Fuchsi* p. 223; *Claus. pacifica* var. *Siantanensis* p. 225; *Planorbis filaris* p. 225; *Pterocyclus cyclopterus* p. 228. t. 6. f. 6; *Moussonina apicina* p. 229; *Paludomus rusiostoma* p. 231. t. 6. f. 7; *Paludomus minutiusculus* p. 232. t. 6. f. 8; *Melania tumida* Gredl. v. *cinnamomea* p. 233; *Melania praenotata* Gr. var. *inter-*

media u. minor p. 234. Im Anhange werden neue Fundorte bekannter Arten mitgetheilt. — H. v. Maltzan, Diagnosen neuer Arten p. 235. — Neu beschrieben: *Helix* (*Zenobia*) *Saxivaga* p. 235 und *Hel. Cynetarum* p. 235; beide von Algarve. — D. F. Heynemann, Die nackten Landpulmonaten des Erdbodens p. 236 bis 313. Enthält die Aufzählung der sämtlichen bisher beschriebenen Arten Nacktschnecken von allen Theilen der Erde. Am Schlusse ist eine alphabetische Zusammenstellung der nackten Landpulmonaten nebst Angabe der geographischen Verbreitung der Gattungen angehängt. — W. Dybowski, Zur Anatomie des Kauapparates der Schnecken p. 331—348. Die Arbeit behandelt *Paludina vivipara* Lam. und *Limnaea stagnalis* mit ausführlicher Beschreibung der anatomischen Verhältnisse der Kauapparate. — O. F. v. Möllendorf, Materialien zur Fauna von China p. 349—398. Behandelt werden die Auriculaceen. Neu beschrieben: *Pythia fimbriosa* p. 349. t. 9. f. A. a. b; *Plecotrema minuta* p. 351. t. 9. f. B. a. c; *Cassidula plecotrematoides* p. 352. t. 9. f. C. a—c; *Cassidula Schmackeriana* p. 354. Folgen Nachträge und Berichtigungen. Abgebildet wird: *Opistophorus hainanensis* H. Adams p. 357. t. 9. f. 1; *Cyclophorus hirsutus* Möll. p. 360. t. 9. f. 2; *Lagochelilus pilosus* Möll. p. 365 t. 9. f. 3; *L. longipilus* Möll. p. 367. t. 9. f. 4. Neu beschrieben: *Diplommatina sculptilis* n. sp. p. 368. t. 9. f. 5; *Pupina flava* Möll. p. 370. t. 9. f. 6; *Georissa sulcata* n. sp. p. 372. t. 9. f. 7; *Geor. Hungerfordiana* n. sp. p. 373. t. 9. f. 8a; *Macrochlamys discus* n. sp. p. 379. t. 9. f. 8b; *Microcystis stenomphala* n. sp. p. 381. t. 10. f. 9; *Kaliella monticola* Möll. p. 384. t. 10. f. 12b; *Kal. Hongkongensis* n. sp. p. 385. t. 10. f. 13; *Kal. polygyra* Möll. t. 10. f. 14; *Microcystina sinica* n. sp. p. 386; *Nanina filicostata* n. sp. p. 387;

Ariophanta taivovica Möll. p. 387. t. 10. f. 16; *Plectopylis diptychia* n. sp. t. 10. f. 17; *Helix Eastlakeana* Möll. p. 391. t. 10. f. 19; *Helix cicatricosa* Möll. var. *inflata* Möll. p. 393. t. 11. f. 20; *Hel. subgibbera* n. sp. p. 394. t. 11. f. 21; *Buliminus granulatus* Möll. p. 395. t. 11. f. 22; *Pupa strophostoma* n. sp. p. 395. t. 11. f. 23; *Clausilia gastroptychia* n. sp. p. 397. t. 11. f. 24.

Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. XVI. Jahrg. 1884.

J. Stussiner u. O. Böttger, Beitrag zur Molluskenfauna des Canalthales (Oberkärnthen) und des Quellgebietes der Wurzenener Save (Oberkrain) p. 1—16. Aufzählung von 63 Arten. — O. Böttger, Neue *Helix* aus Calabrien p. 16. Neu beschrieben: *Hel. Stussineri* p. 16. — H. Tschapeck, Aus dem Sommer 1883 in Steiermark p. 17—21. I. Vom Semmering: *Clausilia dubia* Drp. var. *Schlechtii* Zel. u. mut. *albina*. II. Ruine Wolkenstein am oberen Ennsthal; *Pomatias septemspirale* mut. *alpina*. III. Von den Höhen der Kaiserau bei Admont: *Limnophysa* var. *Admontensis* var. n. p. 19. — Ernst Friedel, Beitrag zur diluvialen Nordseefauna Hinter-Pommerns p. 22—25. Aufzählung von 15 Muscheln, 6 Schnecken und 1 Rankenfüsser. — W. Kobelt, Diagnosen neuer Arten: *Limnaea bivonica* n. sp. p. 26 vom Busen von Riga; *Hel. Arichensis* Deb. p. 26; *Hel. Duriezi* Deb. 27 von Algier; *Hel. semirugosa* p. 27. von Marocco. — O. v. Möllendorf, Diagnosen neuer chinesischer Arten p. 28—29. Neu beschrieben: *Buliminus albescens* p. 28 und *Pupa meridionalis* p. 29. — Kleinere Mittheilungen: Perlenfischerei auf den Aru-Inseln p. 29. Literatur p. 30 bis 32. — Hans, Simon u. O. Böttger. Naturwissenschaftliche Streifzüge in den cottischen Alpen p. 33 bis 49. Excursionsbericht mit Aufzählung von 29 gesammelten Arten. — W. Kobelt, Neue Philippiner Deckel-

schnecken p. 49—52. Neu beschrieben: *Cyclotus auriculatus* p. 49; *Cyclotus Caroli* p. 50; *Cyclotus latecostatus* p. 50; *Cyclophorus Semperi* p. 51; *Cyclophorus trochiformis* p. 51; *Truncatella Semperi* p. 52. — H. Simroth, Ueber die deutschen und einige ausserdeutsche europäische Nacktschnecken p. 52—61. Kurze Mittheilungen, theils anatomischen, theils beschreibenden Inhalts. — W. Kobelt, Neue Pulmonaten aus der Kohlenformation p. 61—62. Mittheilungen über den Fund dreier Arten aus der Kohlenformation nach Ch. D. Walcott. — Literatur p. 62—64. — H. Freih. v. Maltzan, Diagnosen neuer senegambischer Gastropoden p. 65—73. Neu beschrieben: *Persona Smithi* p. 65; *Tritonium Kobelti* p. 66; *Fusus Böttgeri* p. 67; *Cantharus turricula* p. 67; *Canth. subsinuatus* p. 67; *Canth. multigranulosus* p. 68; *Mesalia Freytagi* p. 68; *Nassa pachychylus* p. 68; *Nassa Mülleri* p. 69; *Nassa Crossei* p. 69; *Nassa Goréënsis* p. 70; *Nassa argentea* Marr. var. *multicostata* p. 70; *Nassa incrassata* Müll. v. *senegalensis* p. 70; *Nassa Heynemanni* p. 70; *Marginella liliputana* p. 71; *Marg. Böttgeri* p. 71; *Columbella Broderipi* Sow. v. *lutea* p. 71; *Columb. triangulifera* p. 71; *Columb. Freytagi* p. 72; *Mitra exigua* p. 72; *Mitra separanda* p. 72; *Mitra strictecostata* p. 73. — H. Frh. v. Maltzan, Beitrag zur Kenntniss einiger osteuropäischer Heliceen p. 73—75. Enthält Bemerkungen über *Helix spiriplana*, *Naxiana* und *lecta*; *Clausilia rudis* und *extensa*. — Der Tiefsee-Fauna-Auszug nach Norman, Vortrag in den Transact. of the Nat. Hist. Soc. of Northumberland. — Literatur p. 81—87. — C. A. Westerlund, En garde p. 89—92. — Der Verfasser wendet sich gegen v. Kimakowicz, wegen seiner Aeusserung über *Claus. stabilis* und giebt zum Schlusse die Beschreibung der *Forma typica*, der var. *haesitans* aus Galizien und der var. *aberrans* aus Sieben-

bürgen. — H. v. Heimbürg, Diagnosen neuer Arten p. 92—95. Neu beschrieben: *Bulimus lacrimosus* p. 92; *Unio Omiensis* u. *Melania Dunkeri* p. 94; letztere beide von China. — O. v. Möllendorf, Diagnosen neuer chinesischer Arten p. 95—97. Neu beschrieben: *Hel. applanata* p. 95; *Hel. Caspari* p. 96; *Hel. Frieseana* p. 96; *Hel. stenoazona* p. 96. — Br. Strubell. *Clausilia orthostoma* Mke. in Thüringen, nördlich der Rhön p. 97. — T. A. Verkrüzen. *Buccinum* p. 98—103. Fortsetzung. Bemerkungen über einzelne Arten, sowie über die Gruppen des Genus. — O. F. v. Möllendorf. *Sinensia*, Bemerkungen zu Herrn V. Gredler's V. Stück zur Conchylienfauna von China p. 103—107. J. Ponsonby, Landschnecken von Gibraltar p. 107 bis 108. — Kleinere Mittheilungen 109—110. Ueber Einwirkung schwerer Stürme auf die Strandfauna; Einfluss des Futters auf die Färbung. Austernefeinde. — *Annales de Malacologie* — *Panopaea Androandi*. — Mollusken im Bernstein. — Literatur p. 110—119, Necrologie p. 419. Mittheilungen und Anfragen p. 119 bis 120. — W. Kobelt. Excursionen in Nordafrika p. 121—168. Algier und Umgebung. Excursionsberichte. — O. F. v. Möllendorf. Diagnosen neuer chinesischer Arten p. 169—174. Neu beschrieben: *Cylophorus hirsutus* p. 168; *Lagocheilus pilosus* p. 169; *Lag. longipilus* p. 170; *Pupina flava* p. 170; *Streptaxis pachychilus* p. 171; *Macrochlamys discus* p. 171, *Microcystis stenomphala* p. 172; *Kaliella polygyra* p. 172; *Kaliella monticola* 172; *Ariophanta taivanica* p. 173; *Buliminus granulatus* p. 173; *Claus. hainanensis* p. 174. — E. Merkel. Zur Molluskenfauna Schlesiens p. 174 bis 178. Bemerkungen über das Vorkommen einiger Arten. — D. F. Heynemann. *Arion* — *Letourneuxia* — *Geomalacus* p. 178—180. Die Gattung *Letourneuxia* ist nicht haltbar. Die Unterschiede zwischen

Arion und Geomalacus angegeben. — J. Blum, Die Schneckenfauna von Schaumburg in Nassau p. 180—182. Aufzählung von 40 Arten. — W. Kobelt, Neue tunesische Unionen p. 182—183. Neu beschrieben: *Unio Micelii* p. 182; *Unio Medjerdae* p. 183—183. — O. Böttger, Diagnoses specierum novarum carniolae p. 184. — Neu beschrieben: *Vitrina truncata* p. 184; *Vitrina carniolica* p. 184. *Acme Stussineri* p. 185. — S. Clessin, Mollusken aus der Rhön p. 186 bis 188. Aufzählung von 5 Arten vom Bade Brückenau, 20 vom Kreuzberg, 7 von Waldaschach 12 von Bad Kissingen und 5 von der Ruine Trimberg. — Kleinere Mittheilungen p. 188—189. *Panopaea Aldrovandi*. — Perlen-Fischerei in Californien. Insel Guadeloupe an der Küste von Unter-californien.

Literatur p. 189—195. Gesellschaftsangelegenheiten p. 195—196.

XVII. Jahrgang 1885.

H. v. Ihering. Zur Verständigung über Beschreibung und Abbildung von Radula-Zähnen p. 1—7. Vorschläge zur gleichmässigen Behandlung und Benennung der Theile der Radula-Zähne. — H. Tschapeck. Von den Tanneben bei Peggau in Steiermark p. 7—22. Excursionsbericht. — C. Reuleaux, Ueber einige interessante Funde auf deutschem Gebiete p. 22—25. — Mittheilungen über 7 Arten oder Varietäten, die der Verfasser gesammelt hat. — H. Frh. v. Maltzan. Neue Gastropoden vom Senegal p. 25—30. Neu beschrieben: *Scalaria trochiformis* p. 25; *Scal. senegalensis* p. 26; *Scal. Böttgeri* p. 25; *Obeliscus suturalis* p. 26; *Turbonilla Mülleri* p. 27; *Turb. senegalensis* p. 27; *Turb. rosea* p. 28; *Alaba senegalensis* p. 28; *Actaeon senegalensis* p. 29; *Cardium Kobelti* p. 29; *Crassatella Paeteli* p. 30. — Literatur p. 30—32. V. Gredler, Kritische Fragmente p. 33—41. VII. Ueber einige Pupa-Arten.

VIII. Ueber einige neuere Pomatiasarten. — W. Kobelt, Excursionen in Nordafrika p. 41—53. Fortsetzung des Excursionsberichtes. — O. Böttger, Fundortlisten mitteleuropäischer Nacktschnecken p. 54—58. 1. von Carlsbad in Nordböhmen; 2. von Bad Teinach im bad. Schwarzwalde; 3. von Stuttgart; 4. von den Berner und Walliser Alpen. — H. Simroth, Ueber *Limax montenegrinus* Böttgeri p. 58—59. Die Art gehört zu *Limax coeruleus*. — Dr. Brockmeier, Ueber das Vorkommen von *Hydrobia* im obersten Flussgebiete der Sieg bei Burgholdinghausen und im mittleren der Lenne bei Plettenberg in Westfalen p. 59—61. Literatur p. 62 bis 63. — Gesellschaftsangelegenheiten p. 64. — W. Kobelt. Excursionen in Nordafrika. Fortsetzung p. 65—79. — Fr. Kinkel. Alter von *Hel. pomatia* p. 79—80. Kann 5 Jahre alt werden. — O. Böttger, Ostdeutsche Arten im Mosbacher Sande p. 80—82. Es werden 7 solche Arten angegeben. — H. Tschapeck, Ein *Melania*-Nachtrag aus Steiermark p. 82—84. *Melania Hollandi* v. *afra* Zgl. — T. A. Verkrüzen, *Buccinum* p. 85—88. Fortsetzung. — Fr. Erjavec, Ein Molluskenfeind p. 88—89. *Glandina Pireti* durchbohrt die Gehäuse von *Cyclost. elegans*, um das Thier zu verzehren. — Literatur p. 89—95. Anzeigen p. 96. W. Kobelt, Excursionen in Nord-Afrika p. 97—113. Fortsetzung. W. Neumayr, *Perisphinctes Kobelti* n. Forma p. 113—114. Neu beschrieben: Die genannte Form — W. Kobelt, Ein neuer *Buliminus* p. 115. Neu beschrieben: *Bulim. Micelii* p. 115. — O. Böttger, Notiz über 2 *Clausiliinae* des Mainzer Beckens p. 116—117. Neu beschrieben: *Trychtychia reticulata* p. 116 und *Eualopia Kinkelini* p. 117. — O. Böttger. Zur Fauna von Elis und Achaia p. 117—127. Aufzählung der vom Consul Conéménos gesammelten Arten. Neu beschrieben: *Hel. Argintellei* Kob. var. *peritricha* p. 119; *Hel. Cone-*

menosi p. 120; *Bulim. Cefalonicus* Mons. var. n. *Conemenosi* p. 121; *Cochlicopa cyclothyra* p. 121; *Claus. Conemenosi* Bttg. var. n. *macrodera* p. 122; *Claus. achaica* p. 122; *Pomatias tessellatus* var. n. *Achaica* p. 123. — Kleinere Mittheilungen p. 123. — Behandlung von Muscheln. — Literatur p. 123—127. Gesellschaftsangelegenheiten p. 127—128. — W. Kobelt, Excursionen in Nordafrika p. 129—136. Fortsetzung. — E. Merkel, Ein Ausflug ins Tatragebirge p. 136 bis 145. Excursionsbericht mit Aufzählung der 46 gesammelten Arten. — O. Böttger, Neue *Stenomphalus*-Form aus dem Mainzer Becken p. 145—147. Neu beschrieben: *Stenomph. Heusleri* p. 145. — S. Clessin, Bemerkungen über *Bulim. detritus* Müll. p. 147—151. Aufzählung der Varietäten der genannten Art und deren Verbreitung. — S. Clessin, Mollusken aus der Doline der Reka (nicht Preká) bei S. Canzian auf dem Karst p. 151 bis 152. Liste von 12 in derselben gesammelten Arten. — H. Simroth, Ueber einige *Parmacellen* p. 153 bis 158. Anatomische Beschreibung der aus westlichen Gegenden des Mittelmeeres stammenden Arten. — Literatur p. 158—160. Gesellschaftsangelegenheiten p. 160. O. Frh. v. Möllendorf, *Diagnoses specierum novarum sinensium* p. 161—170. Neu beschrieben: *Opisthophorus borealis* p. 161; *Cylophorus fimbriosus* p. 162; *Alycaeus globulus* p. 162; *Alyc. anthostoma* p. 162; *Diplommatina Laurentiana* p. 163; *Dipl. conica* p. 163; *Pseudopomatias* n. gen. p. 164; *Pseudop. amoenus* p. 164; *Plectopylis laminifera* p. 164; *Plectop. stenochila* p. 165; *Helix diplomphala* p. 165; *Hel. binodata* p. 166; *Hel. hemipleuris* p. 166; *Clausilia Laurentiana* p. 167; *Claus. franciscana* p. 167; *Claus. gigas* p. 168; *Claus. purpurascens* p. 168; *Claus. trachelostropha* p. 169; *Lithoglyphus Fuschsianus* p. 169. — J. Blum, Schnecken von Wildhaus in Ober-Toggenberg. Cant.

St. Gallen p. 170—174. Excursionsbericht mit Aufzählung von 32 gesammelten Arten. — S. Clessin, Bemerkungen über *Buliminus montanus* Drap. p. 174 bis 177. Aufzählung von 5 Varietäten. Darunter neu beschrieben: var. *carpaticus* p. 176. — S. Clessin. Die Binnenmollusken Montenegro's p. 177—182. Aufzählung der bis jetzt aus Montenegro bekannten Arten (32). — Neu beschrieben: *Helix Nikitai* p. 180. — V. Gredler, Kleiner Sammelbericht p. 183—185. — Mittheilungen über Conchylien von Bergen in Bayern, dann von Kufstein, Walchsee und von Val. Vestino. — W. Kobelt, Zwei neue *Crassatellen* p. 185—186. Neu beschrieben: *Crassatella acuminata* p. 185 und *Crass. sublamellata* p. 186. — O. Böttger, Zur Süßwasserfauna der Umgebung von Darmstadt p. 187. — Aufzählung einiger Arten, die sich in den Torfstichen zwischen Eberstadt und Bickenbach finden. — Nekrologie p. 188. Thom. Bland und Th. Davidson. — Gesellschaftsangelegenheiten p. 188. Literatur p. 188—192.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [NF_9_1887](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 81-120](#)