

## Avifaunistischer Jahresbericht für 1986 aus dem Pleiße — Wyhra-Gebiet

FRED ROST, RAINER STEINBACH und BERND VOGEL

Der avifaunistische Jahresbericht wurde erstellt aus der Gemeinschaftsarbeit des Ornithologischen Arbeitskreises Pleiße—Wyhra der Kreise Altenburg, Borna, Geithain und Schmölln. Der 1987 erschienene 1. Bericht (Mauritiana, Altenburg, 12: 197—201) soll sich nicht nur auf die Besonderheiten, sondern auch auf verschiedene regionale Untersuchungen und Bestandserfassungen konzentrieren. Erwünscht sind auch lokale Mitteilungen über Bestandsschwankungen und Trends, vor allem bei seltenen Brutvogelarten.

Der Jahresbericht enthält einige oft zu nennende Wasservogelgebiete, für die folgende Abkürzungen verwendet werden: B = Speicherbecken Borna, E = Eschefelder Teiche; GW = Grubensee Witznitz, H = Haselbacher Teiche; I = Imnitzer Lachen; R = Stausee Rötha; W = Speicherbecken Windischleuba und Teiche; S = Stausee Schömbach. Die Namen der Beobachter werden in Klammern beigefügt, mit folgenden Abkürzungen: Ar = P. Arnold; Fö = D. Förster; Ha = J. Hagemann; Hö = N. Höser; Kä = St. Kämpfer; Ki = J. Kipping; Kr = H. Krug; Ro = F. Rost; St = R. Steinbach und Vo = B. Vogel. Wir bedanken uns bei allen Beobachtern, ob genannt oder ungenannt, für ihre Unterstützung!

Einige weitere Abkürzungen: BK = Brutkleid, RK = Ruhekleid, dj. = diesjährig, vorj. = Vorjährig; mehrj. = Mehrjährig, schl. = schlicht, ÜK = Übergangskleid, ad. = Adult, WK = Winterkleid (Schlichtkleid).

**Prachtaucher** — *Gavia arctica*: B: 19. 5. 1 (Reim); 24. 5. 1 RK (Fö); 31. 5. 1 RK und 1 BK (Fö); 15. und 28. 10. 1 (Ro).

**Eistaucher** — *Gavia immer*: B: 28. 10.—8. 11. 1 ad. ÜK (Ki, Burger, Fö, Stengel, Ro, Kä, St).

**Haubentaucher** — *Podiceps cristatus*: W: max. 19. 9. 135 (St) u. 24. 10. 179 (Hö); S: 31. 10. 55 (Vo); B: 19. 10. 71 (Ro). Bruten: W: 8; E: 6; Nauenhainer Teich 1; Teich bei Beucha 1; H: 5; B: 2; Grube Pahna: 2.

**Ohrentaucher** — *Podiceps auritus*: Klärteiche Böhlen 3. 3.—17. 3. 1 RK (Angermann, Thiene-mann); B: 31. 12. 1 (Ro).

**Schwarzhalstaucher** — *Podiceps nigricollis*: W: max. 11. 7. u. 12. 7. 72 (St, Kä); B: bis 14. 12. 1 (Ki); Bruten: E: 17, davon 7 ohne Erfolg, 2—4 Spätbruten; W: 5, ohne Erfolg.

**Zwergtaucher** — *Podiceps ruficollis*: W: max. 30. 9. 179 (St), im Winter max. 12. 1. 7 Pleiße/Fockendorf; Bruten: W: 1; E: 2; Seebischteich 1; Nauenhainer Gr. Teich 1; H: 2; B: 1.

**Kormoran** — *Phalacrocorax carbo*: Heimzug: W: max. 22. 3. 52 (St); E: max. 7. 4. 40 (Frieling); Wegzug: W: max. 6. 10. 88 (St). Nachweise Mai—August: E: 19./20. 5. 1 (Kä, Scholz); GW: 22. 6. 1 juv. (Fö); R: 24. 8. 1 (Hertel).

**Graureiher** — *Ardea cinerea*: W: max. im Winter 2. 1. 84 (St), noch im Mai große Ansammlungen, so 19. 5. 72 (St), 25. 5. 92 (Kä, St), Wegzug max. 16. 8. 200 (St).

**Silberreiher** — *Casmerodius albus*: S: 7. 11. 1 (Frieling), 23. 11. 1 (Wolf, Bahndorf).

**Nachtreiher** — *Nycticorax nycticorax*: I: 18. 6. 1 ad. (Fö).

**Rohrdommel** — *Botaurus stellaris*: I: 5. 1.—16. 2. 1 (FG Groitzsch)

**Weißstorch** — *Ciconia ciconia*: W: keine Brut; Kr. Geithain 1 Brutpaar. (Hö) sah am 18. 5. 6 bei Garbisdorf.

**Schwarzstorch** — *Ciconia nigra*: W: 12. 4. 1 (St); Feldflur Gatzten: 3. 5. 1 (Kr); NSG Pfarrholz Groitzsch: 21. 6. 1 (Kr); bei Mockern: 29. 8. 2 (St); S: 28. 9. 1 (Kä, St).

**Höckerschwan** — *Cygnus olor*: Brutpaare: E: 1; Fürstenteich 1; Nauenhainer Großteich und Hegeteich Narsdorf je 1, aber beide ohne Erfolg; W: 1; H: 3; B: 1.

**Singschwan** — *Cygnus cygnus*: B: 3. 1. 1 (Kä, St); W: 18.—22. 1. 2 ad. (Kä, St), 25. 1. 4 (St); 26. 1. 4 ad. (Hö, St).

- Saatgans** — *Anser fabilis*: Spülfläche Deutzen: max. 18. 10. 2800 (Ro), 18. 1. 2000 (Hö); bei Bocka am 26. 10. 3200 durchziehend (St).
- Bleßgans** — *Anser albifrons*: Spülfläche Deutzen: max. 26. 10. 56 ad. und 1 juv. (St); sonst nur einzelne bis 11 Stück in verschiedenen Gebieten.
- Graugans** — *Anser anser*: 13. 3. 8 bei Bocka (Vo); 16. 3. 4 bei Groitzsch (Kr); S: 22. 3. 1 (Vo); E: 6., 20. u. 22. 4. 1 (Ar, Kä); 27. 4. und 1. 5. 1, 1 Restloch Paradies (Hö, Ro); W: 23. 5. 5 (Kä, St), 25. 5.—14. 6. 1—2 (Fö, Kä, St); bei Bad Lausick: 7. 10. 6 (Scholz); S: 15. 11. 1 (Vo).
- Brandgans** — *Tadorna tadorna*: W: 5. 5. 1,0 (Kä, St); R: 2. 4. u. 30. 4. 1 (Fö); S: 27. 11.—24. 12. 1 (Vo).
- Pfeifente** — *Anas penelope*: E: noch am 4./5. 5. 2,1 (Kä, St, Wolf).
- Schnatterente** — *Anas strepera*: W: Winterdaten: 25. 1. u. 1. 2. je 1,0 (St). Brut: W: mind. 1 (Hö, St).
- Krickente** — *Anas crecca*: W: hoch am 1. 5. 215 (St), max. im Winter 25. 1. 715 (St). Bruten: W: 4—5.
- Stockente** — *Anas platyrhynchos*: Bruten W: ca. 40; E: 12—14; weiteres Kreisgebiet Geithain 24—26 [1]; H: 19; B: 3; Breiter Teich Borna: 4.
- Spießente** — *Anas acuta*: Brutversuch: W: hier bis Juni regelmäßig 2,1 mit Balz und anderen Verhaltensweisen, die auf Brut oder Brutversuch hindeuten (Kä, St).
- Löffelente** — *Anas clypeata*: W: max. Wegzug: 31. 10. 171 (St), 2. 11. 214 (Hö); E: 13. 8. 147 u. 26. 9. 168 [1]. Brut: W: 1?
- Kolbenente** — *Netta rufina*: H: 8.—11. 5. 1,0 (Ki); W: 30. 8. 1 (Fö), 30. 9.—11. 10. 0,1 (Kä, St); B: 28. 9. 0,2 (Ha), 7.—11. 10. 0,1 (Ha, Ro); R: 6. 8. 1,0 juv. (Fö), 17. 8. 5 (Fö), 21. 8. bis 14. 9. 1—2 (Fö, Hertel).
- Tafelente** — *Aythya ferina*: Winterkonzentrationen: B: 3.1. 1080 (Kä, St); W: 26. 1. 1589 (Hö, St); B: 8. 2. 1019 in Richtung Süd (Ro). Bruten: E: 17; Tagebau Bubendorf 1; H: 26; B: 2; Breiter Teich Borna: 2; W: 30—40.
- Reiherente** — *Aythya fuligula*: Bruten: W: ca. 80—90; H: 18; E: 31; Speicher Frauendorf: 1.
- Moorente** — *Aythya nyroca*: W: 12. 4. 1, 28. 4. 1, 22. 5. 1,0 (St), 25. 5. 1,0 (St), 11. 10. 1 (Fö), 22. 11. 1 (St), 5. 12. 6 (Hö); B: 20. 9. 1 (Ki); H: 26. 5. 1 (Ro); Prößdorf 8. 10. 2 (Scheffler); Seebischteich 11. 5. 1 (Vo).
- Schellente** — *Bucephala clangula*: W: 1,1 bis Mai, 0,1 bis Mitte Juni; E: 20. 7. 1 (Fö). Wegzug W u. R ab 12. 8.; W: max. 5. 12. 28 (Hö).
- Eisente** — *Clangula hyemalis*: W: 25. 1. 0,2 (St), 5.—14. 6. 1,1 (Kä, Fö, St)!
- Samtente** — *Melanitta fusca*: B: 24. 3., 7. 4. und 20. 4. 1 (Fö, Ki, Ro); W: 2. 5. 1,0 (Fö, Kä).
- Trauerente** — *Melanitta nigra*: B: 29. 10. 0,4 (Ki); W: 24. 11. 0,1 (St).
- Eiderente** — *Somateria mollissima*: W: 5. 6. 1,0 subad. (St).
- Zwergsäger** — *Mergus albellus*: B: 13. 11. 0,1 (Ki); Klärteiche Böhlen: 25. 2.—11. 3. 1—5, max. 11. 3. 1,4 (Angermann, Thienemann); I: 16. 3. 0,1 (Kr); GW: 7. 12. 0,1 (Ha, Ro); W: max. 18. 3. 1,2 (St), 24. 10. 0,3 (Hö).
- Mittelsäger** — *Mergus serrator*: B: 8. 11. 4 (Fö); 7. 12. 1 (Ha); E: 12. 11. 4, 21.—23. 11. 3, 7. 12. 4 (Bahndorf, Ar, u. a.); S: 15. 11. 1 (Vo), 16. 11. 6 (Vo); W: 15. 3. 1,0 (Hö), 26.—31. 10. 3 schl. (Kä, St), 23./24. 11. 1 (St), 29./30. 11. 1 (St), bis 7. 12. 0,1 (Hö, Kä).
- Gänsesäger** — *Mergus merganser*: 11. 3. 1,0 tot am Frankenhainer Teich (Geutel); S: 28. 9. 0,1 (Kä, St), 24. 12. 0,1 (Vo); W: 20. 1. 0,2 u. 4. 2. 1,1 (Kä), 16. 3. 0,1 (Kä), 2. 12. 1,0 (Kä), 7. 12. 0,5 (Kä). B: 23. 11. 2,1 (Fö), 7. 12. 5 (Ha, Ro); Tageausee Lobstädt: 7. 12. 2,0 (Ha, Ro); GW: 7. 12. 2,0 diesj. (Ha, Ro); Klärteiche Böhlen: 26. 2.—11. 3. 2—18, max. 3. 3. 7,11 (Angermann, Thienemann); R: 8. 3. 1,1 (Hertel).
- Mäusebussard** — *Buteo buteo*: Konzentrationen: Felder östlich Pähnitz: 2. 1. 24 (St); W: 16. 3. 39 durchziehend (St); B: 7. 3. 48 (Ro).
- Raufußbussard** — *Buteo lagopus*: W: Nachweise bis 29. 3. und ab 24. 10. (Hö); in der Regel einzelne Stücke, besonders im Raum Borna.
- Sperber** — *Accipiter nisus*: Bruten: 1 im Kr. Borna, sonst Sommerdaten bei Bad Lausick, im Kr. Altenburg an 3 Stellen (St).
- Roter Milan** — *Milvus milvus*: Brutpaare: Kr. Geithain 12, Kr. Altenburg mind. 5; Kr. Borna und Schmölln?
- Schwarzer Milan** — *Milvus migrans*: Brutpaare: Kr. Geithain mind. 2, Kr. Altenburg mind. 2 (St), Kr. Borna u. Schmölln? Durchzug: W: Zonenzentration 31. 8. 16 (St).
- Seeadler** — *Haliaeetus albicilla*: R: 7. 3. 1 immat. (Hertel); B: 7. 3. 1 immat. (Ro); W: 12. 4. 1 immat. (Kä, St); im Gebiet E, W, B, Meuselwitz 7. 11.—14. 12. 1 subad. (Kä, u. a.).

- Wespenbussard** — *Pernis apivorus*: Durchzug: Bad Lausick: 4. 9. über 100 (Scholz); Pegau 4. 9. 43 (Thienemann). Bitte alle Bruten melden.
- Rohrweihe** — *Circus aeruginosus*: Brutpaare Kr. Altenburg, Borna u. Geithain mind. 28—29 (Ro); es fehlen Angaben aus dem Kr. Schmölln und dem nördlichen Teil des Kr. Borna.
- Kornweihe** — *Circus cyaneus*: W: max. 1. 2. 1,4 (St), 25. 10. 1,3 (Fö, St).
- Wiesenweihe** — *Circus pygargus*: E: 2. 5. 1,0 (Fö).
- Fischadler** — *Pandion haliaetus*: W: schon am 16. 3. 2 (St); Konzentration im Feldgebiet Eschefeld/Bocka: 10. 8. 8 u. 15. 9. 9 (St).
- Baumfalke** — *Falco subbuteo*: Gemeldet wurde nur ein Brutpaar aus den Kr. Geithain [1].
- Merlin** — *Falco columbarius*: Nur ein Nachweis: B: 25. 10. 1,0 (Fö).
- Rotfußfalke** — *Falco vespertinus*: W: 28. 4. 1,0 (St); Feldgebiet zwischen Eschefeld und Bocka: 4.—17. 8. 1 juv. (Kä, St, Vo).
- Wachtel** — *Coturnix coturnix*: Rufende Vögel: 14. 6. 1 Schnauderhainichen (Scheffler), 15. 6. 1 Feldflur Heinichen (Scheffler), 19. 6. 1 zw. Walditz u. Niederpickenhain (Rößner), 26. 6. 2 Rückhaltebecken Serbitz (Scheffler), 12.—27. 7. 1 bei Buchheim (Scholz).
- Kranich** — *Grus grus*: E: 17. 3. 1 (Ar); 17. 3. 6 bei Prießnitz (Vo) 18. 3. 3 Frankenhain (Frank), die selben bei Niedergräfenhain (Heinrich); S: 22. 3. 15 (Vo, Sittel); 17. 11. 10 bei Windischleuba (Hö); 22. 12. 82 Frohburg (Feilotter); B: 24. 12. 97 (Fö); 24. 12. 70 bei Knautnaundorf (Lehmann).
- Wasserralle** — *Rallus aquaticus*: Bruten: E: 3—4; W: 3; B: 13—14; Feldlache südlich Borna 1 (Ro, St, u. a.).
- Tüpfelralle** — *Porzana porzana*: Restloch Paradies: 27. 4. 1,0 (Hö). Bitte alle Daten aus der Brutzeit melden!
- Wachtelkönig** — *Crex crex*: 9. 6.—16. 6. 1,0 Großprießligk (Kr.)
- Teichralle** — *Gallinula chloropus*: Brutpaare: W: 6; E: 5; Restsee Wilhelmschacht Kesselshain 1 (Ro). Bitte alle Brutplätze melden.
- Blefralle** — *Fulica atra*: Brutpaare: H: 50; B: 13; Breiter Teich Borna: 1; W: 30—40; Wilchwitzer Teiche: 10; E: 38; weitere 44—47 in den anderen Teilen des Kr. Geithain [1]. Konzentrationen: B: 23. 11. 4960 (Fö), 3. 1. 2160 (Kä, St).
- Austernfischer** — *Haematopus ostralegus*: W: 29. 3. 1 (St), 21. 6. 1 (St).
- Kiebitz** — *Vanellus vanellus*: Brutpaare: E: 2; sonst im Kr. Geithain 4 bei Ballendorf, 1 Köllersdorf [1]; W: 2; sonst Kreis Altenburg ca. 20—30 an mind. 8 Plätzen (St).
- Sandregenpfeifer** — *Charadrius hiaticula*: W: schon am 16. 3. 1 (Kä, St).
- Fußregenpfeifer** — *Charadrius dubius*: Brutpaare: 2 Tagebau Borna/Ost bei Schönau/Nenkersdorf; 1 Tongrube Sommerhof/Geithain; 2 Sandgrube bei Windischleuba; 5 Tagebau Haselbach; W: 2 (St); Sandgrube F 175 bei Oberhain: 2 (Sittel); B: 2 (Ro, St).
- Goldregenpfeifer** — *Pluvialis apricaria*: E und Feldgebiete südlich davon: 27. 10.—19. 12., max. 30 am 27. 10. (Hö u. a.); H: 12. 10. 1 (Ki).
- Waldschnepfe** — *Scolopax rusticola*: Es wurde ein Gelegefund aus dem Kr. Geithain gemeldet (Ar).
- Großer Brachvogel** — *Numenius arquata*: Spüflfläche Deutzen: max. am 7. 10. 23 (Ro, Ha, St).
- Regenbrachvogel** — *Numenius phaeopus*: W: 4. 4. 1, 7. 4. 15, 27. 4. 3, 3. 5. 6, 5. 7. 1, 20. 7. 1, 28. 7. 1 (St); I: 11. 9. 1 (Kr).
- Pfuhlschnepfe** — *Limosa lapponica*: W: 19. 4. 10 ÜK (St); B: 20.—28. 9. 1 (Ki, Fö, Ha, Ro); W: 17.—24. 9. 1 (Fö, Kä, St).
- Waldwasserläufer** — *Tringa ochropus*: W: Winterdaten: 1. 1. und 25. 1. je 1 (St), 11. 1. 1 (Hö).
- Teichwasserläufer** — *Tringa stagnatilis*: W: 23.—31. 7. 1 ÜK (Kä, St).
- Knutt** — *Calidris canutus*: Teiche bei Kömmlitz: 8. 9. 1 (Kr); S: 21. 9. 2 (Vo).
- Zwergstrandläufer** — *Calidris minuta*: W: Heimzugdaten: 27. 5. 5 (Kä, St), 7. 6. 2 (St), 10. 6. 21 (St), 12. 6. 3 (St), 13. 6. 2 (St); Tagebau Borna Ost: 14. 6. 1 (St), 24. 6. 3 (Ro, Ar).
- Sanderling** — *Calidris alba*: W: 23. 7. 1 (Hö).
- Sumpfläufer** — *Limicola falcinellus*: B: 18. 5. 1 (Fö).
- Odinshühchen** — *Phalaropus lobatus*: W: 7. 7. 0,1 (Kä, St), 28. 8. 1 schl. (St).
- Heringsmöwe** — *Larus fuscus*: W: 18. 3. 1 ad. u. 2 vorj. (Kä); S: 13. 9. 3 diesj. (St); W: 15. 9. 2 diesj. (Kä, St), 17. 9. 2 ad. (Kä, St), 19. 9. 5 ad. und 3 diesj. (St).
- Silbermöwe** — *Larus argentatus*: Nachweise besonders B und W, im Frühjahr bis 26. 5., in der Regel 1—4 Vögel; B: 27. 7. 1 diesj. (Fö); sonst Wegzug ab 29. 9. 1—4 Vögel (Fö, Kä, Ro, St u. a.).
- Sturmmöwe** — *Larus canus*: Brutpaare: Tagebau Borna Ost 18, davon viele verloren gegangen (Ar); Tagebau Haselbach 4 (St). Konzentrationen: Mülldeponie Altenburg/Nord: 9. 1. 1600 (St), 11. 1. 2150 (St); W: am 6. 5. 1 Teilalbin

- Schwarzkopfmöwe** — *Larus melanocephalus*: W: 21. 5. 2 ad. (Kä, St), 25. 5. 2 ad. (Kä, St), 12. 6. 2 ad. (St), 18. 9. 1 diesj. (Kä, St).
- Lachmöwe** — *Larus ridibundus*: Bruten: E: 450 + 400? im Schilf [1]; Tagebau Borna Ost: 50 (Ar), auch hier große Verluste; W: 250, erfolgreich nur etwa 30–40 (St.) Konzentrationen: Mülldeponie Altenburg Nord: 11. 1. 2250 (St); Schlafplatz B: 15. 10. 6000 (Ro); R: max. 21. 8. 8600 (Fö).
- Zwergmöwe** — *Larus minutus*: viele Extremdaten: W: 26. 1. 1 ad. (Hö, St), 1. 2. 1 ad. (St), 14. 12. 1 diesj. (St), 20. 12. 3 diesj. (St), 21. 12. 2 ad. + 2 diesj. (St); Kauerndorfer Wiesen 27. 12. 1 diesj. (St); B: 23. 12. 2 immat (Ki, Bürger)!
- Dreizehenmöwe** — *Rissa tridactyla*: W: 6. 11. 1 immat. (Hö); Elsteraue Groitzsch: 15. 2. 1 ad. (Kr).
- Weißflügelseeschwalbe** — *Chlidonias leucopterus*: E: 26. 5. 1 (Ar, Ro).
- Raubseeschwalbe** — *Hydroprogne tschegrava*: W: 28. 7. 3 ad. (St), 17. 9. 1 ad. + 1 diesj. (St).
- Flußseeschwalbe** — *Sterna hirundo*: W: 24. 4. 2 (Kä), 19. 5., 26. 5., 31. 5.–2. 6., 7. u. 23. 6. (je 1) (Kä, St), 10., 18., 19. u. 27. 7. 1–2 (Kä, St), 17.–25. 9. 1–13, max. 18. 9. 13 (Kä, St).
- Hohltaube** — *Columba oenas*: Bruten: Forst Pahna 6, Kammerforst 6. Bitte in Zukunft alle Brutplätze melden!
- Türkentaube** — *Streptopelia decaocto*: Schlafplatz Getreidewirtschaft Altenbug/Poschwitz: max. 230 am 9. 1. (Hö).
- Steinkauz** — *Athene noctua*: Kr. Borna 1 Brut (Kr), Kr. Schmölln 10 Bruten (Bachmann), Kr. Geithain 2 Brutpaare [1].
- Sumpfohreule** — *Asio flammeus*: I: 6. 1. 1 (Lehmann).
- Grauspecht** — *Picus canus*: Brutplätze: Pahnauer Forst 2, Deutsches Holz 2, Forst Leina 2 (St). Auch hier alle Bruten melden!
- Schwarzspecht** — *Dryocopus martius*: Brutplätze: Forst Leina mind 1. (St), Forst Pahna 1 (St), Kammerforst 1 (St). Auch hier alle Bruten melden.
- Mittelspecht** — *Dendrocopos medius*: Brutplätze: Kammerforst 2, Pahnauer Forst 4–6, Stöckigt 3, Streitwald mind. 4, Forst Leina 6–8 (St).
- Wendehals** — *Jynx torquilla*: Nur zwei Brutplätze im Kammerforst gemeldet (St). Bitte in der Zukunft alle Brutzeitbeobachtungen melden!
- Ohrenlerche** — *Eremophila alpestris*: Talwiesen südlich Eschefeld: 16. 11. 1985–12. 2. 1986 bis 36 (Vo); W: 4. 1. 1 (Kä, St), 5. 1. 61 Silo zwischen Windischleuba und Pöppschen (St); 11. 1. 1 Mülldeponie Altenburg (St); 17. 1. 26 zwischen Ballendorf und Bad Lausick (Ar); 23. 2. 21 bei Trebshain, Flößberg und Ballendorf (Ar) sowie 26 Sandgrube F 96 Lgl.-Oberhain (Grunert); 1. 3. 1 ebenda (Grunert).
- Heidelerche** — *Lullula arborea*: Das einzige bekannte Brutgebiet ist der Kammerforst: mind. 3 Brutpaare (St). W: später Durchzug, am 20. 4. nach Ost 24 (St).
- Haubenerleche** — *Galerida cristata*: Im Kr. Altenburg sind noch folgende Brutplätze bekannt: Altenburg-Nord und Altenburg-Südost sowie der Lerchenberg. Bitte in Zukunft alle Brutplätze melden!
- Uferschwalbe** — *Riparia riparia*: Brutplätze: Kr. Altenburg: mind. 2 Sandgrube Altenburg (St); Kr. Geithain: 4 Sandgrube Frauendorf (Frank), 3–4 Sandgrube Frankenhain (Ar, Frank, Scholz), 1 Sandgrube Trebshain (Frank). Bitte auch aus den Kreis Borna alle Brutplätze melden!
- Brachpieper** — *Anthus campestris*: Tagebau Haselbach: 1 (St); B: 2 (St, Ro); je 1,0 am 1. 6. Kippenrand östlich Brösen (Kr), 1. 5. bei Werben (Kr), 10. 6. und 15. 6. Tagebaukante bei Großstolpen (Kr) sowie 20. 5. und 13. 6. Tagebau Borna Ost (Ar, St).
- Wasserpieper** — *Anthus pratensis*: Brutplätze: 1 Nauenhainer Gr. Teich (Ar, Delling), 6 Lgl. Oberhain (Sittel), 2–3 Sumpfwiesen Ballendorf (Ar), 2–3 Köllersdorf (Ar, Scholz), 1 zwischen Wintersdorf und den Kammerforst (St). Dies sind sicher nicht alle Brutplätze; bitte auch hier zukünftig alle melden!
- Rotkehlpieper** — *Anthus cervinus*: W: 10. 5. 1 (St), 17. 9. 1 (St).
- Wiesenpieper** — *Anthus spinoletta*: W: max. 18. 1. 32 (St), 25. 1. 36 (St), 11. 4. 50 (St), B: am Schlafplatz 7. 3. 35 (Ro).
- Raubwürger** — *Lanius excubitor*: Brutpaare: Kr. Altenburg 2 (St) und Kr. Borna südlicher Teil 1 (St); im Kr. Geithain Bruten noch möglich [1].

- Rohrschwirl** — *Locustella luscinioides*: B: 19.—22. 5. 1,0 (Ro, Reim); Restloch Paradies: 1. 5. 1 (Kr).
- Schlagschwirl** — *Locustella fluviatilis*: 22. 5. 1 Wilchwitzer Teiche (St), 5.—7. 5. 1 Park Windischleuba (Hö), 18. 5. 1 Bastholz Lgl. Oberhain (Sittel).
- Schilfrohrsänger** — *Acrocephalus schoenobaenus*: W: schon am 12. 4. 1 (St). Aus allen Gebieten keine Brut gemeldet!
- Sumpfrohrsänger** — *Acrocephalus palustris*: W: 40 Sänger (St).
- Teichrohrsänger** — *Acrocephalus scirpaceus*: W: 32 Sänger (St); E: 35—37 [1].
- Drosselrohrsänger** — *Acrocephalus arundinaceus*: Brutpaare: H: 4 (Ki); E: 1—2 [1]; Frankenhainer Teich 1 Sänger (Frank). W: keine Brut, am 18. 8. 4 Durchzügler (St).
- Sperbergrasmücke** — *Sylvia nisoria*: W: 26. 4. 1,0 (St), Kippenfläche bei Rositz: 5—8 (St); Tagebau Haselbach: 2—3 (St); B: 1—2 (Ro); I: 18. 6. 1 (Fö); bei Kitzscher: 16. 5. 2, später dort noch 1 (Ro).
- Schwarzkehlchen** — *Saxicola torquata*: W: 12. 4.—14. 4. 0,1 (Kä, St).
- Braunkehlchen** — *Saxicola rubetra*: Wiesenaue bei Tegkowitz auf 5 ha 3 Brutpaare (Hö); bei Langenleuba Oberhain an 6 Stellen (Sittel), sonst nur einzelne Brutpaare. Angaben aus dem Kr. Borna fehlen.
- Nachtigall** — *Luscinia megarhynchos*: Sänger: W: 2 (St); Knau: 1 (St); Park Windischleuba: 2 (Kä, St); Remsa: 1 (St); Paditzer Schanzen: 1 (St). Sonst regelmäßig Brutvogel etwa nördlich der Linie Meuselwitz — Fockendorf — Frohburg.
- Sprosser** — *Luscinia luscinia*: W: am 6. u. 7. 5. 1,0 (Kä, St).
- Blaukehlchen** — *Luscinia svecica*: W: 4. 4. 0,1 (Hö), 1. 5. 1,0 (Kä, St).
- Steinschmätzer** — *Oenanthe oenanthe*: Als Brutvogel vor allem in den südlichen Teilen fehlend! Besiedelt nur noch einige Sandgruben, so bei Windischleuba, Altenburg und Oberhain, Regelmäßiger Brutvogel nur noch in der Bergbaufolgelandschaft! Konzentration: 29. 9. 20 bei Fürstenholz Flößberg (Ro).
- Hausrotschwanz** — *Phoenicurus ochruros*: Spätdateen wurden gemeldet: 11. 11. 1 Gorma/Rositz (St); S: 24. 12. 1 (Vo); Kraftwerk Regis bis 5. 1. 0,1 (Sykora); W: 4. 1. 1 (Kä).
- Singdrossel** — *Turdus philomelos*: W: Winternachweise 25. 1. u. 26. 12. 1 (St).
- Beutelmeise** — *Remiz pendulinus*: Etwa 65 Brutnester im Gebiet (Ro). Max. beim Wegzug: W: 20. 9. 210 (St).
- Haubenmeise** — *Parus cristatus*: Als Brutvogel nur aus den Forst Leina gemeldet (St); bitte alle Brutvorkommen melden.
- Weidenmeise** — *Parus montanus*: Die Art hat weiter leicht zugenommen; Forst Leina 2,5 Paare pro 10 ha (St).
- Tannenmeise** — *Parus ater*: W: 6. 10. 63 durchziehende (Kä).
- GrauParammer** — *Emberiza calandra*: Sänger: mind. 5 Rückhaltebecken Stöhna (Ro, Reim) 5 zwischen Werben und Domsen und 1 Restloch Domsen (FG Grotzsch). Bitte auch hier alle Nachweise melden, auch Daten außerhalb der Brutzeit!
- Ortolan** — *Emberiza hortulana*: 1. 5. 1,0 und 25. 5. 2,0 bei Werben (Angermann).
- Schneeammer** — *Plectrophenax nivalis*: B: 7. 12. 1 (Ro); bei W: 25. 12. 32 (Kä, St), 26. 12. 3 (St); bei Werben: 12. 1. 2 (Angermann); Talwiesen südlich von Eschefeld 9. 3. 1 (Vo).
- Birkenzeisig** — *Carduelis flammea*: W: max. 23. 11. 300 (Kä u. a.); 11. 11.—5. 12. 200 Silikatwald bei Bad Lausick (Scholz); am 6. 12. 400 Park Windischleuba (Hö); sonst in allen Gebieten einzelne.
- Berghänfling** — *Carduelis flavirostris*: max. 11. 1. 150 Feld bei Bad Lausick; 22. 11.—13. 12. ca. 100 Bad Lausick-Köllersdorf (Scholz); E: 7. 12. 70—80 (Ar).
- Fichtenkreuzschnabel** — *Loxia curvirostra*: 1. 5. 15 Förstersee (Kr); Fürstenholz Flößberg: 10. 5. 2, 12. 5. 3, 14. 5. 1 und 18. 6. 12 (Ro); 27. 5. 8,2 bei Ballendorf (Scholz); 18. 6. 2 Restloch Paradies (Kr).
- Eichelhäher** — *Garrulus glandarius*: S: 29. 4. 92 durchziehend (Vo).
- Saatkrähe** — *Corvus frugilegus*: Brutpaare: Breiter Teich 140 (Ro); Regis 16 (Hö).
- Kolkrahe** — *Corvus corax*: Neben vielen Brutzeitbeobachtungen wohl nur sichere Plätze im Kammerforst und Fürstenholz Flößberg (Ro, St u. a.).

## Literatur

- [1] FEILOTTER, J.; FRIELING, F. (1986): Ornithologischer Beobachtungsbericht aus dem Frohburg—Eschefelder Teichgebiet (NSG) und übrigen Teilen des Kreises Geithain 1986. 10 Seiten
- [2] ROST, F.; STEINBACH, R.; HÖSER, N. (1987): Avifaunistische Besonderheiten im Pleiße—Wyhra-Gebiet 1985. *Mauritiana*, **12**, 197—201

Eingegangen am 29. 6. 1988

FRED ROST, Heckenweg 3, Postfach 12/68, Meuselbach, DDR - 6429

RAINER STEINBACH, Luckaer Str. 7, Windischleuba, DDR - 7401

BERND VOGEL, Nr. 55, Bocka, DDR - 7401

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mauritiana](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [12\\_1987\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Rost Fred, Steinbach Rainer, Vogel Bernd

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht für 1986 aus dem Pleiße  
—Wyhra-Gebiet 381-386](#)