

### Faunistische Kurzmitteilungen

**Nachweise von Schaben, Ohrwürmern und Fangschrecken aus Rumänien (Blattodea, (Dermaptera, Mantodea).** – In der Sammlung des Mauritianums befinden sich einige wenige Belege rumänischer Schaben, Ohrwürmer und Fangschrecken, die auf Rumänien-Expeditionen 1988 bis 1997 gesammelt wurden. Die Fundortorte lagen in Siebenbürgen (Tîrnava Mare-Aue: Dumbrăveni, Copșa Mică; Mureș-Aue: Brîncovenesti, Seitental des Mureș bei Săcămaș, Talhänge bei Sibiu und Mîndra; Munții Trăscăului: Intregalde), im Banat (Mureș-Aue: Tela, Bata), in der Crișana (Mureș-Aue: Șoimoș bei Lipova; Munții Zarandului: Lacul Tauț) und in der Dobrudscha (Istria).

#### Mantodea

*Mantis religiosa* (LINNÉ, 1758)

6 km westlich Copșa Mică (10/1993), Dumbrăveni (10/1995), Bata (9/1996), bei Tela (10/1997)

#### Blattodea

*Hololampra punctata* (CHARPENTIER, 1825)

Mîndra-nördlich Sibiu (6/1994), Lacul Tauț (6/1995),

*Ectobius lapponicus* (LINNÉ, 1758)

Lacul Tauț (6/1995), Brîncovenesti (6/1996), Șoimoș (6/1996), Bata (6/1997), Seitental des Mureș bei Săcămaș (6/1996), Intregalde (6/1995)

#### Dermaptera

*Forficula auricularia* (LINNÉ, 1758)

Intregalde (10/1995, 6/1996), Sibiu (8/1988), Bata (10/1997)

*Labidura riparia* (PALLAS, 1773)

Istria (8/1992)

Eingegangen am 12. 6. 1998

Dipl.-Biol. KATHRIN WORSCHER, Naturkundliches Museum Mauritianum, Parkstraße 1, 04600 Altenburg

**Zweiter Nachweis von *Anthrax varia* Fab. (Diptera, Bombyliidae) für die rumänische Fauna.** – Die holarktisch verbreitete Wollschweberart *Anthrax varia* wurde erst 1982 von MEDEEA WEINBERG für die rumänische Fauna publiziert. Sie fand in der Sammlung von Dr. Xenia Scobiola-Palade ein männliches Exemplar mit den Daten: 3. 6. 1968, Eselnita Valley.

Bei Aufsammlungen von Dipteren in einem Seitental des Mureș bei Săcămaș konnte am 19. 6. 1996 ein Exemplar der Art gefangen werden. Das Tier nutzte, gemeinsam mit der Bombyliide *Anthrax binotata* und der xerophilen Syrphiden-Art *Paragus majoranae*, eine ca. 3 m<sup>2</sup> große sonnenbeschienene Kiesbank mit angrenzender kleiner Abbruchkante am Bachufer. Im selben Tal wurden weiterhin folgende Bombyliiden festgestellt: *Bombylius ater*, *Bombylius fulvescens* und *Hemipenthes morio*.

### Literatur

WEINBERG, M. (1982): Contribution to the knowledge of the Asilidae and Bombyliidae (Diptera) of Romania. – Trav. Mus. Hist. nat. „Grigore Antipa“ 24: 135–146.

Eingegangen am 12. 6. 1998

Dipl. Museol. (FH) MIKE JESSAT, Naturkundliches Museum Mauritianum, PSF 1644, D-04590 Altenburg/Thür.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mauritiana](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [16\\_1996](#)

Autor(en)/Author(s): Worschech Kathrin

Artikel/Article: [Faunistische Kurzmitteilungen 580](#)