

Faunistische Notizen

78.) Weitere Funde von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) und *Erathophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) am Niederrhein (Lep., Tortricidae et Oecophoridae)

von ARMIN HEMMERSBACH

Further findings of *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) and *Erathophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) in the Lower Rhine area

Am Niederrhein wurde 2001 die Bodenständigkeit der von WITTLAND (2001) als neu für Deutschland vorgestellten Tortricide *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) eindrucksvoll bestätigt. Neben den bereits von LEIDERITZ (2001) publizierten Funden, zählte ich alleine in meinem Garten in Mönchengladbach-Rheydt (Stadtmitte) über 40 Tiere am Licht, fünf weitere Falter kamen in einem Kiefernwald-Heidegebiet im Depot Brüggen-Bracht ans Licht.

Insbesondere bei meinen Gartenfunden fiel mir auf, daß die Art meist sehr spät ans Licht kommt. Ich kontrollierte den Turm (2 x 160 W Mischlicht) vor dem Schlafengehen zwischen 24⁰⁰ Uhr und 1⁰⁰ Uhr und kurz vor der Morgendämmerung (im Hochsommer ca. 4⁰⁰ Uhr bis 4³⁰ Uhr). Nur ausnahmsweise waren schon Falter bei der ersten Kontrolle angefliegen. Von den fünf bei Brüggen gefangenen Faltern kamen vier innerhalb von 10 Minuten kurz vor 2⁰⁰ Uhr, ein weiterer um ca. 2³⁰ Uhr.

Die genauen Daten sind:

Mönchengladbach-Hermges	27.06.2001	2 F.	SELIGER
Brüggen (Depot)	29.06.2001	5 F.	HEMMEBSBACH
Mönchengladbach-Rheydt	20.06.2001	4 F.	"
"	26.06.2001	2 F.	"
"	27.06.2001	5 F.	"
"	28.06.2001	2 F.	"
"	29.06.2001	3 F.	"
"	02.07.2001	1 F.	"
"	04.07.2001	3 F.	"
"	06.07.2001	1 F.	"
"	07.07.2001	1 F.	"
"	09.07.2001	2 F.	"
"	10.07.2001	1 F.	"
"	11.07.2001	1 F.	"
"	13.07.2001	3 F.	"
"	15.07.2001	4 F.	"
"	16.07.2001	1 F.	"

Mönchengladbach-Rheydt	17.07.2001	3 F.	HEMMERSBACH
"	20.07.2001	1 F.	"
"	21.07.2001	2 F.	"
"	23.07.2001	2 F.	"
"	24.07.2001	1 F.	"

Ein weiteres typisches niederrheinisches Kleinschmetterlings-Kleinod ist die Totholzmotte *Erathophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854), die ebenfalls erst seit kurzer Zeit aus Deutschland bekannt ist (BIESENBAUM 1989; SCHULZE 1991).

Bei dieser Art dürften die zahlreichen neuen Fundorte das wachsende Interesse der Lepidopterologen an den sogenannten Kleinschmetterlingen widerspiegeln. Die Art kommt zum Licht, ist allerdings ansonsten auch tagaktiv und läßt sich leicht aus Holzhaufen aufscheuchen. Die Raupe lebt an Totholz und der Falter erschien auch aus mehreren Totholzproben im Entomologischen Verein Krefeld, gesammelt im Hülser Bruch und Hülser Berg. Bisher waren nur Laubhölzer bekannt (hauptsächlich Birke und Erle) an denen die Raupe lebt, doch WITTLAND fand im Oktober 1999 eine Raupe in einem Kiefernstubben, aus der er den Falter im Frühjahr 2000 erhielt. Im Krefelder Zoo beobachtete ich mehrere Falter (von denen ich mangels anderer Möglichkeiten einen Beleg mit der Hand fing) über Holzmulch fliegen. Da diese Art der Bodenabdeckung in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, beständen hierüber zwangsläufig enorme potentielle Vermehrungsmöglichkeiten und durch Ausbringung und Verteilung auch passive Verbreitungsmöglichkeiten. In städtischen Schredder- und Mulchhaufen fanden Coleopterologen massenhaft Nashornkäfer und ihre Jugendstadien. Es ist zwar nur spekulativ, doch was für Nashornkäfer gilt – warum sollte es nicht auch für einen Kleinschmetterling gelten?

Mönchengladbach-Pongs	26.05.2001	1 F.	WITTLAND
Mönchengladbach-Windberg	02.06.1999	1 F.	SELIGER
Hagen (bei. Niederkrüchten)	06.05.1999	1 F.	SELIGER
"	31.05.2000	1 F.	SELIGER
"	02.06.2000	2 F.	SELIGER
Hahnepützheide bei Zons	23.06.2001	1 F.	LEIDERITZ
Bergener Heide/NL	06.07.2001	2 F.	LEIDERITZ
Krefeld (Zoogelände)	20.05.2001	1 F.	HEMMERSBACH
Krefeld-Hülser Berg	06.1999	1 F.	LEIDERITZ
Schermbeck (Jägerheidemoor)	10.06.1997	1 F.	BIESENBAUM
Brüggen-Bracht (Depot)	29.05.1999	2 F.	HEMMERSBACH
Brüggen-Bracht (Depot)	05.06.2001	je 1 F.	HEMMERSBACH & SELIGER
"	29.06.2001	1 F.	HEMMERSBACH
"	10.1999	1 R.	WITTLAND (e.l. 05.05.2000)
Mönchengladbach-Rheydt	12.06.1999	1 F.	HEMMERSBACH
Prummern	1999 mehrfach gesichtet, ohne Beleg		STEEGERS

Bereits bekannt ist der Fundort Poelveenensee (HEMMERSBACH 1995). In den grenznahen niederländischen Gebieten (Maasniederung) fand COX die Art bei Mook, Elden, Assel, Cuyk und Groesbeek.

Literatur:

- BIESENBAUM, W. (1989): *Erathophyea amasiella* HERRICH-SCHÄFFER 1855 (= *E. aleatrix* DIAKONOFF 1975) neu für Deutschland (Lep., Oecophoridae). — *Melanargia*, 1: 33-34, Leverkusen
- HEMMERSBACH, A. (1995): Bemerkenswerte Funde im Schwalm-Nette-Gebiet im Jahre 1994 (Lep., Oecophoridae, Thaumetopoeidae, Geometridae et Noctuidae). — *Melanargia*, 7: 16-17, Leverkusen
- LEIDERITZ, P. (2001): Faunistische Notizen 77.) Weitere Funde von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) (Lep., Tortricidae). — *Melanargia*, 13: 50, Leverkusen
- SCHULZE, W. (1991): *Erathophyea amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER 1855) – eine neue Art für die deutsche Fauna (Lep., Oecophoridae). — *Mitt.Arbeitsgem.ostwestf.-lipp. Ent.*, 7: 29-30, Bielefeld
- WITTLAND, W. (2001): Zur Verbreitung von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) in Deutschland. — *Melanargia*, 13: 14-16, Leverkusen

Anschrift des Verfassers:

Armin Hemmersbach

Mühlenstr. 237

D-41236 Mönchengladbach

79.) *Coenobia rufa* (HAWORTH, 1809) neu für die Lepidopteren-fauna des Bergischen Landes (Lep., Noctuidae)

VON HEINZ SCHUMACHER

Coenobia rufa (HAWORTH, 1809) new for the lepidoptera fauna of the "Bergisches Land"

Vor etwa 30 Jahren wurde in der Wahner Heide (Stadt Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis) das wohl schönste und wichtigste verbliebene Moorgebiet, der Hirzenbachweiher, durch Verkipfung mit Bauschutt vernichtet. Unter anderem waren von hier die Weichorchis (*Hammarbya paludosa*), das Torfmoos-Knabenkraut (*Dactylorhiza sphagnicola*), die Moosbeere (*Vaccinium oxycoccos*), Sonnentau-Arten (*Drosera intermedia* und *D. rotundifolia*) und große Bestände von Schmalblättrigem Wollgras (*Eriophorum angustifolium*) bekannt.

Nachdem 1995/1996 bei Bohrungen zumindest teilweise noch intakte Torfschichten nachgewiesen werden konnten, wurden im Winterhalbjahr 1999/2000 die Ablagerungen mit erheblichem Aufwand wieder entfernt. Ermög-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Hemmersbach Armin

Artikel/Article: [Weitere Funde von *Lozotaenoides formosana* \(Geyer, 1830\) und *Erathophyes amasiella* \(Herrich-Schäffer, 1854\) am Niederrhein \(Lep., Tortricidae et Oecophoridae\) 88-90](#)