

## Faunistische Notizen

### 89.) *Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799) im südlichen Ruhrgebiet (Lep., Tortricidae)

von PETER H. ROOS

#### *Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799) in the southern Part of the Ruhr area

*Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799) ist eine mediterrane Wicklerart, der es sicherlich auch aufgrund ihrer Polyphagie gelungen ist, kühlere nördliche Gebiete zu besiedeln. Das Interesse an dieser Art, insbesondere die Dokumentation von Vorkommen und Ausbreitung, hat ökonomische Gründe, kann sie doch als hochpotenter Schädling von Nutz- und Gartenpflanzen speziell in Gewächshäusern auftreten. Nach Mitteleuropa und Nordamerika ist sie eingeschleppt worden (RAZOWSKI 2001), wobei importierte Zierpflanzen offenbar als Verbreitungsvehikel dienen (KARNKOWSKI 1999; PFLANZENSCHUTZAMT BERLIN 2003). Die Ausbreitung in England ist gut dokumentiert (BRADLEY et al. 1973).

*C. pronubana* ist aus den Niederlanden, Hessen (BATHON 2001) und schließlich im Jahre 2002 auch aus dem westlichen Nordrhein-Westfalen gemeldet worden (SELIGER & WITTLAND 2002). Jetzt kann ein Exemplar aus dem südlichen Ruhrgebiet mit den folgenden Funddaten verzeichnet werden: Sprockhövel (Niedersprockhövel), 19.11.2004, P. Roos. Das beobachtete Tier war „in frischem Zustand“. Aufgrund der Vielzahl möglicher Futterpflanzen kann über die Herkunft des Tieres nicht spekuliert werden. In der näheren Umgebung des Fundortes befinden sich keine Gewächshäuser. Als potenzielle in größeren Beständen vorhandene Futterpflanzen sind *Thuja* und *Lonicera* zu nennen.

#### Literatur:

- BATHON, H. (2001): Der Mittelmeernelkenwickler *Cacoecimorpha pronubana* auch in Hessen (Insecta, Lepidoptera, Tortricidae). — Hess.Faun.Briefe **20**(4), 66-68, Darmstadt.
- BRADLEY, J.D., TREMEWAN, W.G. & SMITH, A. (1973): British Tortricoid Moths. Cochyliidae and Tortricidae: Tortricinae. — The Ray Society, **147**, London
- KARNKOWSKI, W. (1999): Quarantine pests intercepted in consignments of ornamental plants imported into Poland in 1993/1998. — Bull.OEPP, **29**, 45-49
- PFLANZENSCHUTZAMT BERLIN (2003): Pflanzenschutz-Info. Merkblatt – Nelkenwickler.
- RAZOWSKI, J. (2001): Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. — Verlag F. Slamka, Bratislava

SELIGER, R. & WITTLAND, W. (2002): *Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Tortricidae). — *Melanargia*, **14**, 47-49, Leverkusen

Anschrift des Verfassers:

Peter Roos

Goethesr. 1a

D-45549 Sprockhövel

**90.) *Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767) bei Stolberg/NRW – Wiederfund einer in Nordrhein-Westfalen als verschollen angesehenen Art (Lep., Arctiidae)**

VON FRANZ CARDAUN und DETLEV HENNINGS

***Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767) near Stolberg – Rediscovery of a species, which was presumed missing in Northrhine-Westphalia**

Am 29.06.2005 beobachtete Herr FRANZ CARDAUN an seinem Gartenhaus in Mausbach bei Stolberg ein Exemplar der Art *Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767) am Licht.

Dieser kleine Bärenspinner, dessen Raupe sich von Flechten und Moosen ernährt (s.a. KOCH 1984), gilt in Nordrhein-Westfalen als „ausgestorben oder verschollen“ (DUDLER et al. 1999). Letzte Nachweise datieren aus dem Jahre 1891. *D. ancilla* gilt als thermophile Art, die auf Steppen- und Felsenheiden anzutreffen ist. Die dem Fundort nächstgelegenen Vorkommen befinden sich an der Ahr, der Mosel und am Mittelrhein (STAMM 1981), vereinzelte Meldungen auch aus der Provinz Limburg/NL und den Ardennen/B (DONK & OTTENHEIJM 1974). Um so erstaunlicher ist das Auftreten dieser Art in einem relativ schattigen Hausgarten in der Voreifel, der sich am Rande eines Tannenwaldes befindet. Mögliche Erklärung für diesen ungewöhnlichen Fund ist die Nähe eines aufgelassenen Steinbruchs (Dolomit), aus dem die Art eingeflogen sein könnte und die extrem heiße Witterung mit Temperaturen über 30° C, die am Fundtag in Stolberg herrschte.

**Literatur:**

DONK, M. VAN DEN & OTTENHEIJM, C. (1974): Nachtblindervangsten in midden Lmburg. — *Entom. Ber.*, **34**: 169-171, Amsterdam

DUDLER, H., KINKLER, H., LECHNER, R., RETZLAFF, H. SCHMITZ, W. & SCHUMACHER, H. (1999): Die Rote Liste der gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung mit Artenverzeichnis. — in: LÖBF (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. — LÖBF-Schr.R., **17**: 575-626, Recklinghausen

KOCH, M. (1984): Wir bestimmen Schmetterlinge. (Ausg. in e. Bd.) — Neumann Verlag, Leipzig, Radebeul

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Roos Peter H.

Artikel/Article: [Cacoecimorpha pronubana \(Hübner, 1799\) im südlichen Ruhrgebiet \(Lep., Tortricidae\) 86-87](#)