

FAUNISTISCHE NOTIZEN

31.¹⁾ Über die bisherige Verbreitung von *Eupithecia inturbata* HÜBNER 1817 im Rheinland (mit Karte)


Seit der Veröffentlichung von STAMM (1981) sind weitere Fundorte dieser lokalen, an warme Standorte mit Feldahorn (*Acer campestre*) gebundenen Art, bekannt geworden. Die Angabe vom 5.7.1968 aus Bergisch Gladbach - zitiert bei STAMM, S. 193 - ist zu streichen. Ergänzend ist bei "Godendorf 1.8.1970" hinzuzufügen: 2 F. KINKLER.

Aus Ostwestfalen lagen bisher nur alte Angaben von UFFELN (1908) aus der Warburger Gegend vor. Am 8. und 23.7.1977 wurden von SCHAEFER und WEIGT insgesamt 8 Falter bei Marsberg gefunden (WEIGT 1978). Nach mündlicher Mitteilung von WEIGT wurde *Eupithecia inturbata* HÜBNER 1817 außerdem im Bereich der Diemelplatten bei Willebadessen und im Almetal bei Wewelsburg ab Mitte Juli bis August mehrfach als Falter und Raupe beobachtet.

Nach KINKLER, SCHMITZ, NIPPEL & SWOBODA (1987) wurde die Art von PELZ und SCHUMACHER in Merten-Bülgenauel/Sieg gefunden. Bei Durchsicht einiger Sammlungen konnte ich in letzter Zeit weitere Belegstücke aus unserem Gebiet nachweisen. Da die Art, insbesondere im abgeflogenen Zustand, leicht mit *E. tenuiata* HÜBNER 1813 verwechselt werden kann, wurden die Falter genitaliter überprüft. Nachfolgend eine Auflistung der von mir determinierten Stücke:

Stolberg-Hammerberg	25.7.1980	1 ♂	leg. NIPPEL
Bad Münstereifel-Iversheim	5.8.1981	1 ♀	leg. GIERLING
Aachen (Freyenter Wald)	6.9.1986	1 ♀	leg. VORBRÜGGEN
Niederbachem (Dächelsberg)	3.8.1986	4 ♂	leg. NIPPEL
Daleiden (Irsental)	18.8.1986	1 ♀ 1 ♂	leg. NIPPEL
Altenahr (Rotweinwanderweg)	15.8.1987	1 ♀ 1 ♂	leg. W.SCHMITZ
Altenahr (NSG Ahrschleife)	12.8.1988	1 ♂	leg. WOIZILINZKI

1) Faunistische Notizen Nr. 1-30 s. Mitt.Arbeitsgem. rhein.-westf.LepidopteroI., 3, Düsseldorf



BRD / NORDRHEIN - WESTFALEN / HESSEN / RHEINLAND - PFALZ / SAARLAND

Literatur:

KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. u. SWOBODA, G. (1987): Die Schmetterlinge des Bergischen Landes VI. Teil: Die Spanner (II) - Jber.naturwiss.Ver.Wuppertal, **40**, Wuppertal

STAMM, K. (1981): Prodrömus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens. Solingen

UFFELN, K. (1908): Die Großschmetterlinge Westfalens mit besonderer Berücksichtigung der Gegenden von Warburg, Rietberg und Hagen. Münster

WEIGT, H.-J. (1978): Entomologische Notizen aus Westfalen - Dortmunder Beitr.Landesk., Naturwiss.Mitt., **12**, Dortmund

Willibald Schmitz, Mutzer Heide 29, 5060 Bergisch Gladbach

32.) *Coenotephria* (= *Cidaria*) *berberata* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 neu für die Fauna des Bergischen Landes

In der Zeit vom 1. bis 14.8.1986 konnte BONESS einen Falter von *Coenotephria berberata* in Leverkusen-Bergisch Neukirchen nachweisen. Die Art wurde im Bergischen Land bisher noch nicht gefunden. Möglicherweise ist auch hier ein Zusammenhang mit dem Anpflanzen der Roten Berberitze (*Berberis thunbergii* DC.) als Zierstrauch und Grundstückseinfassung vorhanden (VORBRÜGGEN 1981). Die Art ist bei KINKLER, SCHMITZ, NIPPEL & SWOBODA (1985) auf S. 66 als Nr. 108 a einzufügen.

Da das Auftreten dieser Art in unserem Arbeitsgebiet von besonderem Interesse ist, soll hier noch auf weitere Funde in Mönchengladbach-Rheydt hingewiesen werden. Unser verstorbener Mitglied, Herr BETTMANN, fing am 30. u. 31.7.1987 dort je einen Falter.

Literatur:

KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1985): Die Schmetterlinge des Bergischen Landes V. Teil: Die Spanner (I) - Jber.naturwiss.Ver.Wuppertal, **38**, Wuppertal

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Schmitz Willibald

Artikel/Article: [Über die bisherige Verbreitung von Eupithecia inturbata HÜBNER 1817 im Rheinland 1-2](#)