

Ein weiterer Fundort von *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758) für Rheinland-Pfalz (Lep., Lasiocampidae)

von DANIEL MÜLLER

Zusammenfassung:

Am 15.05.2018 wurden Raupen von *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758) bei Mayen festgestellt. Damit konnte für Rheinland-Pfalz ein weiterer Fundort dieser deutschlandweit vom Aussterben bedrohten Art belegt werden. Bei einer Lichtfang-Kontrolle am 10.10.2018 ließen sich dort auch die Imagines beobachten.

Abstract:

A new locality for *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758) in Rhineland-Palatinate

Eriogaster catax (LINNAEUS, 1758) caterpillars were discovered on 15.05.2018 in Mayen. Thus a further habitat for this nationwide endangered species in Germany could be established in the Rhineland-Palatinate. Also, during a light-catching control on 10.10.2018, adult specimens could be observed.

Im Großraum Mayen konnte der Verfasser bei Kartierungsarbeiten, die Teil eines Auftrags des LBM Cochem-Koblenz waren und zur qualitativen Bestandsaufnahme der dort vorkommenden Tagfalter durchgeführt wurden, völlig überraschend den Wollfalter *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758) nachweisen. Auf drei mehr oder weniger zusammenhängenden Flächen wurden am 15.05.2018 insgesamt 30 erwachsene Raupen (Abb. 1) dieser deutschlandweit vom Aussterben bedrohten und in den Anhängen II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geführten Art registriert. Alle entdeckten Raupen saßen auf eineinhalb bis zweieinhalb Meter hohen, gut besonnten Sträuchern von Schlehe (*Prunus spinosa*), die sich in räumlicher Nähe zu einem Bach befanden. Zudem konnten an den Wirtsgehölzen drei verlassene Raupengespinste gefunden werden (Abb. 2). Der gesamte Lebensraum von *E. catax* bei Mayen, welcher praktisch komplett von Ackerland umgeben ist, lässt sich als Biotopkomplex aus verschiedenen Gehölzgesellschaften mit teils üppigen Saumstrukturen, Hochstaudenfluren und unterschiedlich stark genutztem Grünland charakterisieren.

Gänzlich unbekannt ist die Art aus der näheren Umgebung des Fundortes nicht. So berichtet BUSCH (1939) Folgendes: „Am Rande der Eifel, auf den Höhen des Elztales, findet man im Juni Kolonien von *Eriogaster catax*, einer Art, die mir im Rheinland recht selten vorzukommen scheint.“ Interessanterweise gibt es jedoch keine neueren Quellen, die ein Vorkommen von *E. catax* in dieser Region belegen, obwohl ein zwischenzeitliches Verschwinden des Falters als unwahrscheinlich anzusehen ist. Schließlich finden sich die nächstgelegensten und zuvor einzigen aktuell bekannten rheinland-pfälzischen Populationen im Bereich des Nahetals. Eine mögliche Wiederbesiedlung, die sich von dort aus ergeben haben könnte, steht allein aufgrund der räumlichen Entfernung außer

Betracht. Entsprechend muss nach derzeitigem Wissensstand davon ausgegangen werden, dass die Art jahrzehntelang übersehen wurde.



Abb. 1: Erwachsene Raupe von *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758) an Schlehe, Rheinland-Pfalz, Großraum Mayen, 15.05.2018 Foto: D. MÜLLER



Abb. 2: Verlassenes Gespinst mit Raupenhäuten von *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758), Rheinland-Pfalz, Großraum Mayen, 15.05.2018 Foto: D. MÜLLER

Bei einer Lichtfang-Kontrolle am 10.10.2018, durchgeführt von Dr. A. SCHMIDT (SGD Nord), konnten 11♂♂ (s. Umschlagbild) und 1♀ festgestellt werden.

Dank:

An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn GÜNTER SWOBODA für die Literaturrecherche sowie den ein oder anderen Hinweis zum Erstellen dieser Notiz bedanken.

Literatur:

- BROSZKUS, W. (1996): Verzeichnis der in den Jahren 1992-1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet. Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebietes (BRD, Rheinland-Pfalz). II. Teil: Spinner, Schwärmer etc. — *Melanargia*, **8**: 32, Leverkusen
- BUSCH, T. (1939): Gäste an Schlehe (*Prunus spinosa*) und Weißdorn (*Crataegus oxyacantha*) — *Entom.Rundsch.*, **56**: 211-215, Stuttgart
- FÖHST, P. (1989): *Eriogaster catax* LINNAEUS 1758, eine bisher im Rheinland als ausgestorben angesehene Art wiedergefunden (Lep., Lasiocampidae). — *Melanargia*, **1**: 21-22, Leverkusen
- KINKLER, H. (1994): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 8. Zusammenstellung. — *Melanargia*, **6**: 81, Leverkusen
- KINKLER, H. (1998): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 11. Zusammenstellung. — *Melanargia*, **10**: 152, Leverkusen
- SCHMIDT, A. (2010): Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera s.l.) des Landes Rheinland-Pfalz. Standard-Faunenliste mit integriertem Rote-Liste-Vorschlag. — *Melanargia*, **22**: 161, Leverkusen
- SCHUMACHER, H. (2006): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 18. Zusammenstellung. — *Melanargia*, **18**: 25, Leverkusen
- SCHUMACHER, H. (2018): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 30. Zusammenstellung. — *Melanargia*, **30**: 12, Leverkusen
- STAMM, K. (1981): Prodomus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens. — S. 68, Selbstverlag, Solingen

Anschrift des Verfassers:

Daniel Müller
Erlenweg 30
D-56332 Lehmen
D.mueller1996@web.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Daniel

Artikel/Article: [Ein weiterer Fundort von Eriogaster catax \(LINNAEUS, 1758\) für Rheinland-Pfalz \(Lep., Lasiocampidae\) 149-151](#)