Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771)

26.5.	Burbach-Oberdresselndorf (Winterbachtal)	1 F.	DÜSSEL
31.5.	Lützel	21 F.	FR
3.6.	Altenteich	1 F.	FIE, FUHRMANN
13.6.	Lützeln (Hainswinkel)	2 F.	FR

Beobachter:
AN = CHRISTIAN ANTON
FIE = VIKTOR FIEBER
FR = ARTUR FRANZ
TW = ROLF TWARDELLA

Frau DÜSSEL, Frau RADKE, Herr BLANA-MÜLLER, Herr EICHERT, Herr FASEL, Herr FUHRMANN, Herr GEHRMANN, Herr GIROD, Herr LERCHSTEIN, Herr SASSMANNSHAUSEN, Herr SAUER, Herr WEBER, Herr WINCHENBACH

Faunistische Notizen

58.) Bemerkenswerte Funde im Schwalm-Nette-Gebiet im Jahre 1993 (Macrolepidoptera)

von Armin Hemmersbach, Mühlenstr. 237, D-41236 Mönchengladbach-Rheydt

1993 wurden im Schwalm-Nette-Gebiet wieder zahlreiche für das Niederrheinische Tiefland interessante Arten beobachtet, von denen hier einige genannt werden sollen. Den Herren DERRA, STEEGERS und LEIDERITZ danke ich für ihre Mitarbeit im Gelände und für die Weitergabe ihrer Daten und Beobachtungen, den zuständigen Damen und Herren der Kreisverwaltungen Heinsberg und Viersen für die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen.

Bei der in HEMMERSBACH (1993) unter Vorbehalt gemeldeten *Eupithecia pulchellata* (STEPHENS, 1831) handelt es sich tatsächlich um diese Art. Zwischen dem 12. und 15.5.1994 schlüpften sechs Falter. Die Raupen dieser Zucht wurden im Juni 1993 bei Dalheim eingetragen; zwei weitere Raupen wurden bei Meerbusch gefunden, die jedoch beide parasitiert waren. Sicherlich dürften bei gezielter Absuche von Fingerhut-Beständen weitere Fundstellen am Niederrhein zu erwarten sein.

Im NSG Lüsekamp wurde ein Falter von *Drymonia velitaris* (HUFNAGEL, 1766) am 4.7.1993 gefangen (Wiederfund für den Naturraum Niederrheinisches Tiefland - deutsche Seite[1]) An weiteren interessanten Arten konnten dort u.a. *Phragma-*

taecia castaneae (HÜBNER, 1790), *Orthosia miniosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Coenobia rufa* (HAWORTH, 1809) und *Spilosoma urticae* (ESPER, 1798) gefunden werden.

Der Elmpter Bruch ist - trotz der guten Bearbeitung - immer wieder für Überraschungen gut: Ein Falter von *Lithophane socia* (HUFNAGEL, 1766) (Wiederfund für den Naturraum Niederrheinisches Tiefland - deutsche Seite[1]) erschien am 15.9.1993 am Köder. Ebenfalls am Köder wurde *Eurois occulta* (LINNAEUS, 1758) (2. Wiederfund für den Naturraum Niederrheinisches Tiefland) am 3.9.1993 beobachtet. Weiterhin sind von hier Einzelbeobachtungen von *Celaena haworthii* (CURTIS, 1829), *Apamea aquila funerea* (HEINEMANN, 1859), *Mythimna straminea* (TREITSCHKE, 1825) (alle drei Arten am 16.7.1993), ebenfalls am 16.7.1993 15 Falter von *Hypenodes torfusalis* (WOCKE, 1850) und *Gnophos obscuratus* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (ein Falter am 12.8.1993) erwähnenswert. Häufig waren wieder *Eugraphe subrosea* (STEPHENS, 1829) sowie *Schrankia costaestrigalis* (STEPHENS, 1834) am Köder im August 1993 anzutreffen.

Im Sekretis, einem Bruchgebiet zwischen Hinsbeck und Leuth wurden zahlreich *Senta flammea* (CURTIS, 1828) und *Macrochilo cribrumalis* (HÜBNER, 1793) beobachtet.

Literatur:

HEMMERSBACH, A. (1992): Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Niederrheinischen Tiefland und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht (Zeitraum: April 1991 - Mai 1992) — Melanargia, **4**: 22-34, Leverkusen

HEMMERSBACH, A. (1993): Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Niederrheinischen Tiefland und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht (Macrolepidoptera) — Melanargia, **5**: 65-86, Leverkusen

---

[1]) Von beiden Arten sind bereits aktuelle Funde aus dem niederländischen Teil des Naturraums Niederrheinisches Tiefland - im Grenzgebiet - in dieser Zeitschrift veröffentlicht (s. HEMMERSBACH, 1992, Seite 28 und 1993, Seite 72)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Hemmersbach Armin

Artikel/Article: Bemerkenswerte Funde im Schwalm-Nette-Gebiet im Jahre 1993 (Macrolepidoptera) 45-46