

**Nachträge und Ergänzungen zu:**  
**Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens**  
 Band 3, Familie: **MOMPHIDAE** und  
 Band 4, Familie: **ELACHISTIDAE** BRUAND, 1850 — Unterfamilie:  
**ELACHISTINAE** SWINHOE & COTES, 1889 —

von Willy Biesenbaum, Feldstr. 69, D-42555 Velbert-Langenberg

---

**Zusammenfassung:** Es werden Nachträge und Ergänzungen zu den Bänden 3 und 4 aus der Reihe **Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens** gebracht. Von den MOMPHIDAE wird eine, von den ELACHISTINAE werden sieben Arten behandelt.

**Summary:** There follows a supplement to Volumes 3 and 4 of the series **Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens**. Of the MOMPHIDAE one, of the ELACHISTINAE seven species will be discussed.

---

Zu den beiden letzten Faunenheften aus unserem Arbeitsgebiet, die die Familie MOMPHIDAE bzw. die Unterfamilie ELACHISTINAE aus der Familie ELACHISTIDAE behandeln, liegen nun schon einige wertvolle und erwähnenswerte Ergänzungen vor.

**MOMPHIDAE SPULER, 1910**

***Mompha miscella*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) — Band 3: Seite 34

Die an Sonnenröschen (*Heliathemum*) gebundene Art war bisher in unserem Arbeitsgebiet nur vom Mittelrhein und aus der Nordeifel bekannt. Nun konnte ich *M. miscella* am 11.8.1995 bei Tringenstein (NSG Hohe Straße) (UTM MB 55 20), Gladenbacher Bergland, nachweisen. Sie ist somit neu für den hessischen Teil unseres Arbeitsgebietes und für den Naturraum 32 –Westerwald. Die Tabellen 1 und 2 auf Seite 14 und 15 müssen dahingehend ergänzt werden.

**ELACHISTINAE SWINHOE & COTES, 1889**

***Elachista berndtiella*** TRAUOGOTT-OLSEN, 1985 — Band 4: Seite 73

*E. berndtiella* fand ich zweimal in diesem Jahr, und zwar vier Exemplare am 29.4.1995 beim Dämmerungsfang in Dörscheid/Mittelrhein (UTM MA 10 50) und ein Exemplar am 17.7.1995 beim Lichtfang, ebenfalls in Dörscheid, allerdings an anderer Stelle. Der früheste Fund dieser Art in unserem Arbeitsgebiet datiert somit vom 12.4., der späteste vom 17.7. Das weist auf zwei Generationen hin.

***Elachista gregori*** TRAUGOTT-OLSEN, 1988 — Band 4: Seite 74

Von dieser, in der ELACHISTINAE-Fauna mit einigen Vorbehalt als *E. gregori* aufgeführten seltenen Art fand ich ein weiteres Stück am 21.6.1995 bei Bornich/Mittelrhein (UTM MA 10 50). Neu für den Naturraum 29 – Mittelrheingebiet. In der Tabelle 1 auf Seite 27 zu ergänzen.

***Elachista rudectella*** STAINTON, 1851 — Band 4: Seite 77

Am 13.6.1995 fing ich im NSG Dortejbachtal bei Klotten/Moseltal (UTM LA 70 55) ein frisches ♂ von *E. rudectella*. Bisher war diese Art nur von drei Stellen am Mittelrhein bekannt. Diesen für unser Arbeitsgebiet wertvollen faunistischen Nachweis verdanken wir dem Entgegenkommen der Bezirksregierung in Koblenz, die auf Anregung des Vorstandes unserer Arbeitsgemeinschaft einigen aktiven Mitgliedern die Genehmigung erteilte, faunistische Untersuchungen in Naturschutzgebieten des Regierungsbezirkes Koblenz durchzuführen. Neu für den Naturraum 25 – Moseltal. In Tabelle 1 auf Seite 27 zu ergänzen.

***Elachista unifasciella*** (HAWORTH, 1828) — Band 4: Seite 86

Von dieser Art lagen bisher nur Nachweise von zwei Stellen unseres Arbeitsgebietes vor. Jeweils einen Falter konnte ich am 22.6.1995 in Dörscheid/ Mittelrhein und am 29.6.1995 im NSG Gillesbachtal (UTM LA 25 90) bei Marmagen nachweisen. Neu für den Naturraum 28 – Westeifel und für Nordrhein-Westfalen. In Tabelle 1 auf Seite 27 und Tabelle 2 auf Seite 30 zu ergänzen.

***Elachista bisulcella*** (DUPONCHEL, 1843) — Band 4: Seite 91

Von *E. bisulcella* lagen nur alte Nachweise aus vier Gebieten unseres Arbeitsgebietes vor, der letzte Fund datiert aus dem Jahre 1951. Am 6.8.1995 fing ich am Rande eines Naturschutzgebietes bei Bottenhorn (500 m NN) (UTM MB 60 25) im Gladenbacher Bergland ein ♂ am Licht. Neu für den Naturraum 32 – Westerwald und für den hessischen Teil unseres Arbeitsgebietes. In Tabelle 1 auf Seite 28 und Tabelle 2 auf Seite 30 zu ergänzen.

***Elachista monosemiella*** (RÖSSLER, 1881) — Band 4: Seite 64

Ebenfalls bei Bottenhorn im Gladenbacher Bergland fing ich am 9.8.1995 einige Tiere von *E. monosemiella* in der Dämmerung. Neu für den Naturraum 32 – Westerwald. In Tabelle 1 auf Seite 27 zu ergänzen.

***Biselachista utonella*** (FREY, 1856) — Band 4: Seite 93

Beim Lichtfang an meiner Wohnung in Langenberg (UTM LB 70 85) fand ich am 9.7.1995 ein ♂ von *B. utonella*. Neu für den Naturraum 33 – Süderbergland. In der Tabelle 1 auf Seite 28 zu ergänzen.

#### Literatur:

BIESENBAUM, W. (1995): Familie: ELACHISTIDAE BRUAND, 1850 – Unterfamilie: ELACHISTINAE SWINHOE & COTES, 1889 — in: Arbeitsgem.rhein.-westf.Lepidopterol. (Hrsg.): Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Bd. 4, Leverkusen

KOSTER, S. & BIESENBAUM, W. (1994): Familie: MOMPHIDAE — in: Arbeitsgem.rhein.-westf. Lepidopterol. (Hrsg.): Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Bd. 3, Leverkusen



**Abb. 45.01:**

***Coleophora ballotella*** (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1839)

Deutschland, Rheinland-Pfalz  
Schloßböckelheim (Nahe), 03.07.2000  
leg. BIESENBAUM, coll. BIESENBAUM

Foto: BIESENBAUM

<sup>1)</sup> Zur Einlage in: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7  
W. BIESENBAUM & H. VAN DER WOLF (1999): Familie: Coleophoridae (HÜBNER, [1825])

**45.01 *Coleophora ballotella*** (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1839)

*Karsholt & Razowski: 2591*

*Leraut-Nr.: 832*

**Falter:** Flügelspannweite 13 - 16 mm  
Vorderflügel bräunlichgelb mit einer feinen weißen Linie am Vorderrand, in der Flügelmitte und in der Falte  
Tafel XXX, Abb. 45.01

**Verbreitung:** a) Europa  
Ost-, Südost-, Mittel- und Südeuropa  
  
b) Arbeitsgebiet  
Bisher nur im Nahetal nachgewiesen

**Flugzeit:** Juni bis August

**Futterpflanze/**

**Biologie:** Die Raupen leben in einem Lappensack an den Blättern von Schwarznessel (*Ballota*), Ziest (*Stachys*), Taubnessel (*Lamium*), Andorn (*Marrubium*), Gamander (*Teucrium*)

**Biotopanspruch:** Ruderal- und Unkrautflure, Wald- und Gebüschränder, Magerrasen

<sup>1)</sup> Zur Einlage in: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7  
BIESENBAUM & VAN DER WOLF (1999): Familie: Coleophoridae HÜBNER [1825]

**45.01 *Coleophora ballotella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1839)**  
 (Lepidoptera, Coleophoridae)



Fundort (Bundesland)	UTM-Koord.	Datum	Anzahl	leg./coll./Literatur
Schloßböckelheim (RP)	MA 05 15	03.07.2000	1	Biesenbaum

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Biesenbaum Willy

Artikel/Article: [Nachträge und Ergänzungen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens 68-69](#)