

eingestuft. Nach diesem neuen Fund muß diese Einstufung revidiert und die Art in die Kategorie 1 „Vom Aussterben bedroht“ gestellt werden. Weitere Nachforschungen in ähnlichen Biotopen in der Gegend um Winterberg könnten vielleicht Aufschluß darüber geben, ob *E. dilucidarius* noch an anderen Plätzen anzutreffen ist.

Literatur:

KINKLER, H., SCHULZE, W. & WEIGT, H.-J. (1988): Korrektur zur „Roten Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Großschmetterlinge (Lepidoptera)“ (Stand: Oktober 1986). – Schriftenr.LÖLF, 9: 37-40, Recklinghausen

ROTE LISTE NRW (1986): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) (Stand: 1986) – in: Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere, 2. Fassung – Schriftenr.LÖLF, 4: 170-190, Recklinghausen

UFFELN, K. (1908): Die Grossschmetterlinge Westfalens mit besonderer Berücksichtigung der Gegenden von Warburg, Rietberg und Hagen. – Jahresber.Westf. Prov.Ver.Wiss.Kunst, 1907/1908, Beih. 36: 138, Münster

3. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4

Familie: ELACHISTIDAE BRUAND, 1850

– Unterfamilie: ELACHISTINAE SWINHOE & COTES, 1889 –

von Willy Biesenbaum, Feldstr. 69, D-42555 Velbert-Langenberg

Zusammenfassung:

Dieser Nachtrag zu Band 4 aus der Reihe **Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens** behandelt neun Elachistinae-Arten. Es werden neue Fundorte gemeldet, wodurch die Tabelle über das Vorkommen in den einzelnen Naturräumen ergänzt wird, einige ältere Funde werden bestätigt.

Summary:

This supplement to Volume 4 of **Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens** deals with nine Elachistinae species. New finding places are reported. The Table showing occurrence in the individual nature areas is supplemented herewith; some older findings are confirmed.

Perittia obscurepunctella (STAINTON, 1848)

Am 22.4.1996 erschienen 15 Falter bei einem Leuchtabend im Jägerheimdemoor, Dämmerwald im Kreis Wesel. Bisher lagen von dieser Art erst zwei Fundorte aus unserem Arbeitsgebiet vor. Neu für den Naturraum 57 (Niederrheinisches Tiefland).

Stephensia brunnichella (LINNAEUS, 1767)

WERNO, Nunkirchen, fing am 11.6.1996 einen Falter bei Perl. Dieser Nachweis ist neu für den partiellen Teil unseres Arbeitsgebietes im Naturraum 19 (Saar-Nahe-Bergland).

Elachista gleichenella (FABRICIUS, 1781)

Ebenfalls bei Perl fing WERNO am 30.5.1996 einen und am 11.6.1996 vier Falter von *Elachista gleichenella*. Neu für den partiellen Teil unseres Arbeitsgebietes im Naturraum 19 (Saar-Nahe-Bergland).

Elachista pollutella (DUPONCHEL, 1843)

Bei Schloßböckelheim (NSG Nahegau) fing ich am 16.4. und am 18.4.1996 jeweils einen Falter. Neu für den partiellen Teil unseres Arbeitsgebietes im Naturraum 19 (Saar-Nahe-Bergland).

Elachista nitidulella (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

Am 28.6.1996 konnte WERNO diese Art in einem Exemplar als neu für den partiellen Teil unseres Arbeitsgebietes im Naturraum 19 (Saar-Nahe-Bergland) nachweisen.

Elachista berndtiella TRAUOGOTT-OLSEN, 1985

Diese Art wurde schon von GROSS 1967 bei Bad Münster am Stein und bei Schloßböckelheim nachgewiesen. Nun gelang mir am 17.4.1996 ein erneuter Nachweis mit einem Falter bei Bad Münster am Stein (NSG Rotenfels).

Elachista differens PARENTI, 1978

Einen Falter dieser in Deutschland seltenen Art fing ich am 11.7.1996 bei Bad Münstereifel (NSG Hirnberg). Dies ist somit der dritte Fundort in der Nordeifel.

Cosmiotes freyerella (HÜBNER, [1825])

WERNO fing am 7.5.1996 fünf Falter bei Nohn. Neu für den partiellen Teil unseres Arbeitsgebietes im Naturraum 19 (Saar-Nahe-Bergland).

Cosmiotes exactella (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

Bis auf einen Fund aus dem Jahre 1988 bei Dörscheid/Mittelrhein lagen von dieser Art bisher nur alte Nachweise vor. Am 6.5.1996 fing ich einen Falter bei Kaub am Mittelrhein.



Abb. 1: Männchen von *Acalyptris pyrenaica* LAŠTŮVKA & LAŠTŮVKA, 1993
Bad Münstereifel-Iversheim (NRW), NSG Kuttenberg, 13.6.1994
leg. et coll. BIESENBAUM Foto: VAN NIEUKERKEN

fig. 1: Male of *Acalyptris pyrenaica* LAŠTŮVKA & LAŠTŮVKA, 1993



Abb. 2: ♂ (links) und ♀ (rechts) von *Elophos dilucidarius* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
1775) Wissinghauser Hochheide bei Winterberg (NRW) 8.8.1996, leg. et
coll. RADTKE

Foto: RADTKE

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Biesenbaum Willy

Artikel/Article: [3. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4 Familie: Elachistidae Bruand, 1850 - Unterfamilie: Elachistinae Swinhoe & Cotes, 1889 - 11-12](#)