

4. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4

Familie: ELACHISTIDAE BRUAND, 1850

– Unterfamilie: ELACHISTINAE SWINHOE & COTES, 1889 –

von Willy Biesenbaum, Feldstr. 69, D- 42555 Velbert-Langenberg

Zusammenfassung:

Dieser Nachtrag zu Band 4 aus der Reihe Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens behandelt sieben ELACHISTINAE-Arten. Es werden neue Fundorte gemeldet, wodurch die Tabelle über das Vorkommen in den einzelnen Naturräumen ergänzt wird, einige ältere Funde werden bestätigt..

Summary:

This supplement to Volume 4 of The Lepidopteren Fauna of the Rhineland and Westphalia concerns seven ELACHISTINAE species. New findings are reported which supplement the table on the occurrence in the individual nature areas. Some older findings are confirmed.

Elachista anserinella ZELLER, 1839

Am 26.5.1997 konnte ich drei Falter am Heimberg bei Schloßböckelheim als Neufund für den partiellen Teil unseres Arbeitsgebietes im Naturraum 19 (Saar-Nahe-Bergland) nachweisen.

Elachista rudectella STAINTON, 1851

Von dieser in unserem Arbeitsgebiet seltenen Art lagen bisher nur Funde vom Mittelrhein und aus dem Moseltal vor. In der Zeit vom 25.5. bis zum 28.5.1997 flog die Art in Anzahl bei Schloßböckelheim (Nahe). Neu für den partiellen Teil unseres Arbeitsgebietes im Naturraum 19 (Saar-Nahe-Bergland).

Elachista coeneni TRAUOGOTT-OLSEN, 1985

Diese Art war bisher nur von den Halbtrockenrasen der Nordeifel und von den Trockenrasen des Mittelrheins bekannt. Am 27.5.1997 fing ich einen Falter bei Schloßböckelheim (NSG „Nahegau“) und am 28.5.1997 drei Falter am Grieserkopf bei Schloßböckelheim. Neu für den partiellen Teil unseres Arbeitsgebietes im Naturraum 19 (Saar-Nahe-Bergland).

Elachista littoricola LE MARCHAND, 1938

Bisher lag von dieser Art nur ein Falter aus unserem Arbeitsgebiet vor, den GROSS am 12.6.1965 am Rotenfels bei Bad Münster am Stein fing. In die-



Abb. 1: *Nycteola asiatica* (KRULIKOVSKY, 1904), 27.7.1994, Köln-Dellbrücker Heide, leg. W. SCHMITZ

Foto: KINKLER



Abb. 2: *Perizoma bifaciatum* (HAWORTH, 1809), 27.8.1993, Wuppertal-Dornap, leg. W. SCHMITZ

Foto: KINKLER

sem Jahr konnte ich bei Schloßböckelheim drei Falter nachweisen, und zwar am 26.5. zwei Exemplare am Heimberg und am 27.5.1997 ein Exemplar im NSG „Nahegau“. Eine schöne Bestätigung des Vorkommens dieser Art im Nahegebiet nach 34 Jahren.

Elachista adscitella STANTON, 1851

Im NSG „Nahegau“ bei Schloßböckelheim zwei Falter am 25.5.1997. Neu für den partiellen Teil unseres Arbeitsgebietes in Rheinland-Pfalz und im Naturraum 19 (Saar-Nahe-Bergland).

Elachista (Biselachista) cineropunctella (HAWORTH, 1828)


Von dieser Art lag bisher nur ein Falter aus dem NSG „Gillesbachtal“ bei Marmagen (Nordrhein-Westfalen) vor. Als zweiter Fundort in unserem Arbeitsgebiet ist nun das NSG „Kuttenberg“ bei Bad Münstereifel zu nennen, wo ich am 15.5.1997 einen Falter fand.

Cosmiotes freyerella (HÜBNER, [1825])

Bei Alken (Moseltal) vier Falter am 23.5.1997. Neu für den Naturraum 25 (Moseltal).

Veranstaltungshinweise

10. Westdeutscher Entomologentag
22. und 23. November 1997
Düsseldorf



Veranstalter: LÖBBECKE-Museum und Aquazoo Düsseldorf
Entomologische Gesellschaft Düsseldorf

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Biesenbaum Willy

Artikel/Article: [4. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4 Familie: Elachistidae Bruand, 1850 - Unterfamilie: Elachistinae Swinhoe & Cotes, 1889 70-71](#)