Skorodit von der Kampriesenalm

Eine Ergänzung von Elisabeth KIRCHNER zum Beitrag des gleichen Themas von H. PUTZ in F. 11, S. 235 des MAS.

In dem mir vorliegenden Probenmaterial von Herrn Wolfgang RAUSCH konnte auch Arsenkies und Pyrit festgestellt werden.
Zu den Formen konnten neben den spitzpyramidalen Kristallen (Abb. 1) eine interessante radiale Anordnung derselben mit einem Radius von 2 mm festgehalten werden (Abb. 2).
Die Aufnahmen wurden von Prof. Dr. P. SIMONSBERGER am Elektronenmikroskop der Fa. Cambridge am ehem. Institut für Zoologie, Universität Salzb., durchgeführt.



Abb. 1: Spitzpyramidale Skorodit-xx



Abb. 2: Radial angeordnete Skorodit-xx

Anschrift der Verfasserin: Univ.Prof. Dr. Elisabeth Ch. KIRCHNER, ehem. Inst. für Mineralogie Univ. Salzburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mineralogisches Archiv Salzburg

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: 12_2007

Autor(en)/Author(s): Kirchner Elisabeth Charlotte

Artikel/Article: Skorodit von der Kampriesenalm 250