

Neu- und Wiederfunde von Käferarten (Coleoptera) in den westdeutschen Regionen Nordrhein, Rheinland, Rheinhessen-Pfalz und Hessen

KLAUS RENNER

Kurzfassung: Bei der Aktualisierung des „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ ergaben sich durch Literaturstudien, Überprüfung von Belegen und Abgleich mit meiner Käfer-Datenbank für die Regionen Nordrhein, Rheinland, Pfalz und Hessen insgesamt zwölf Neufunde und acht Wiederfunde seltener Käferarten.

Abstract: Due studies on a new version of „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ in published references, revision of collection material and my database on Coleoptera, for the four German regions Northrhine, Rhineland, Palatinate and Hesse altogether twelve new records and eight re-records of rare beetle species could be found.

Im Rahmen der Erstellung des Verzeichnisses der Käfer Deutschlands (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) wurde auch die rheinische Literatur eingehend analysiert und Belege kritisch geprüft, so dass die Fauna der westdeutschen Regionen als besonders gut dokumentiert gelten kann. Das Verzeichnis wurde 2000 und zuletzt 2011 aktualisiert und soll nun auch online zur Verfügung stehen (KÖHLER 2000, 2011, <http://colkat.de>). Ein Abgleich der Datenbanken des Verzeichnis mit meiner Fund-Datenbank hat für viele Regionen neue Funde aufgezeigt, die einen Statuswechsel im Verzeichnis der Käfer Deutschlands zur Folge haben. Darunter finden sich auch ein Dutzend Neufunde (*) und acht Wiederfunde für westdeutsche Regionen, die hier vorgestellt werden sollen. Für den Datenbank-Abgleich gilt mein besonderer Dank FRANK KÖHLER (Bornheim).

Nordrhein (No)

*42-.002-.005-. *Dryops similaris* BOLLOW, 1936 (Dryopidae): Niederrheinisches Tiefland, Kalkar-Wissel, Wisseler Dünen, Kiesgruben, 19.VII.2003, 1 Ex.

93-.040-.006-. *Strophosoma nebulosum* Stephens, 1831 (Curculionidae): Eifel, Kreuzau, Drover Heide, 6.V.2011, 2 Ex. Dass einige von W. MEYER in der Drover Heide gefundene Exemplare zu dieser Art gehö-

ren, wurde von mir bestätigt (MEYER & MEYER 2011). Der zuvor letzte nordrheinische Nachweis des Rüsselkäfers stammt von C. KOCH aus Mönchengladbach dem Jahr 1942, weitere ältere Funde aus Kleve, Süchteln, Bornheim-Rösberg und dem Bonner Kottenforst (KOCH 1968).

Rheinland (Rh)

- 23-.113-.004-. *Sepedophilus pedicularius* (GRAVENHORST, 1802) (Staphylinidae): Ahrtal, Altenahr-Kreuzberg, 28.II.1969, 1 Ex. Nach einer Revision der kleinen, dunklen *Sepedophilus*-Arten (KÖHLER 1994) wurden fast alle Belege dieser Art *S. obtusus* (LUZE, 1902) zugeschlagen. Es verblieben lediglich drei Belege aus Rheinnähe in Köln, Bonn und Koblenz. Der Fund von ROETTGEN in Koblenz-Moselweiß erfolgte im April 1904, so dass der Nachweis an der Ahr als Wiederfund einzustufen ist.
- *23-.188-.184-. *Atheta procera* (KRAATZ, 1856) (Staphylinidae): Saar-Nahe-Bergland, Kirn, Kellenbach-Tal, Simmerbach-Ufer, 17.V.1986, 1 Ex.
- 42-.002-.007-. *Dryops anglicanus* EDWARDS, 1909 (Dryopidae): Eifel, Wallendorf, Our-Ufer, 3.VI.1990, 1 Ex. (HEBAUER det.). Der bisher einzige Nachweis dieses Hakenkäfers stammt aus Sinzig, wo HORION ein Exemplar im August 1935 am Ahrufer fand (KOCH 1968).
- *79-.011-.019-. *Mordellistena horioni* ERMISCH, 1956 (Mordellidae): Moseltal, Klotten, Dortebachtal, 5.VII.1968, 1 Ex.
- *89-.004-.009-. *Bruchidius dispar* (GYLLENHAL, 1833) Bruchidae: Saar-Nahe-Bergland, Schloßböckelheim, Heimberg, 7.VI.1999, 1 Ex. an einem Trockenhang gekeschert (ANTON det. 2003).

Rheinhessen-Pfalz (Pf)

- 23-.048-.006-. *Oxytelus fulvipes* ERICHSON, 1839 (Staphylinidae): Saar-Nahe-Bergland, Staudernheim, Nahe-Aue, 20.V.1991, 1 Ex. Der bisher einzige pfälzische Nachweis des Kurzflüglers stammt von G. SCHAAF vom Hardtrand bei Neustadt (HORION 1963).
- *23-.083-.003-. *Neobisnius lathrobioides* (BAUDI, 1848) (Staphylinidae): Pfälzer Wald, Eppenbrunn 10.V.2008, 1 Ex. im Autokescher.
- *23-.089-.001-. *Gabronthus thermarum* (AUBÉ, 1850) (Staphylinidae): Pfälzer Wald, Eppenbrunn, 12.V.2008, 1 Ex. im Autokescher.
- *23-.090-.025-. *Gabrius toxotes* JOY, 1913 (Staphylinidae): Pfälzer Wald, Ludwigswinkel, Rösselsweiher, 11.V.2008, 1 Ex.

- 23-188-048-. *Atheta nigrifula* (GRAVENHORST, 1802) (Staphylinidae): Saar-Nahe-Bergland, Oberhausen (Nahe), Lemberg, 30.VII.1999, 1 Ex. im Autokescher. Der bislang einzige Pfälzer Beleg dieser Aleocharine findet sich im Frankfurter Senckenberg-Museum (SCHAAF leg., BRENNER vid., KÖHLER i. l.).
- 23-188-169-. *Atheta xanthopus* (THOMSON, 1856) (Staphylinidae): Pfälzer Wald, Eppenbrunn, 12.V.2008, 1 Ex. im Autokescher. Auch hier stammt der bislang einzige Pfälzer Beleg von G. SCHAAF, der Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem im Pfälzer Wald aktiv war (SMF, BRENNER vid., KÖHLER i. l.).
- *23-188-173-. *Atheta heymesii* HUBENTHAL, 1913) (Staphylinidae): Pfälzer Wald, Eppenbrunn, 10.V.2008, 1 Ex. im Autokescher.
- 23-188-217-. *Atheta episcopalis* BERNHAUER, 1910 (Staphylinidae): Pfälzer Wald, Eppenbrunn, 12.V.2008, 1 Ex. im Autokescher. Auch diese Art wurde früher von G. SCHAAF im Pfälzer Wald dokumentiert (SMF, BRENNER vid., KÖHLER i. l.).
- *91-020-0011. *Crypturgus subcribrosus* REITTER, 1894 (Scolytidae): Saar-Nahe-Bergland, Oberhausen (Nahe), Lemberg 10.IX.1999, 1 Ex. im Autokescher PFEFFER (1995) hat diese Art noch als Unterart von *Crypturgus cinereus* bezeichnet, sie gilt aber inzwischen als eigenständig (JORDAL & KNÍZEK 2007).

Hessen (Hs)

- 23-188-190-. *Atheta boletophila* (THOMSON, 1856) (Staphylinidae): Nordhessen, Zierenberg, 3.X.1987, 1 Ex. Die Aleocharinae wird zuletzt von HEYDEN (1904) für Hessen erwähnt.
- *23-237-0381. *Aleochara major* FAIRMAIRE, 1858 (Staphylinidae): Nordhessen, Lamerden, Diemeltal, 1.XI.1981, 1 Ex. in Bodenfallen. Die westfälischen Funde des Verfassers wurden ursprünglich von Benick als *Aleochara melichari* (REITTER, 1889) bestimmt und so auch publiziert (RENNER & GRUNDMANN 1984). Nach Materialrevisionen wurden sie aber wie auch andere norddeutsche Funde der *Aleochara major* zugeordnet (VOGEL 1998, ASSING 2009).
- *50-008-0101. *Meligethes matronalis* AUDISIO & SPORNRAFT, 1990 (Nitidulidae): Meinhard-Hitzelrode, Hohestein 500 m, 9.IV.2009, 1 Ex.
- *50-008-054-. *Meligethes erichsoni* BRISOUT, 1863 (Nitidulidae): Nordhessen, Liebenau-Zwergen, Diemeltal, 25.VI.1994, 3 Ex. an einem Trockenhang.

Literatur

- ASSING, V. (2009): A revision of *Ceranota* STEPHENS, subgenus of *Aleochara* GRAVENHORST Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). – Beiträge zur Entomologie **59**: 355–422.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (1999): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter **95**: 1–31.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (2007): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). III. – Entomologische Blätter **102**: 1–78.
- JORDAL, B. H. & M. KNÍZEK (2007): Resurrection of *Crypurus subcribrosus* EGGERS 1933 stat. n., and its close phylogenetic relationship to Nearctic *Crypurus* (Coleoptera, Scolytinae). – Zootaxa **1606**: 41–50.
- HEYDEN, L. v. (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Frankfurt/M.
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd.IX: Staphylinidae, 1. Teil Micropeplinae bis Euaesthetinae. Überlingen/Bodensee.
- KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. – Decheniana-Beihefte **13**: I–VIII, 1–382.
- KÖHLER, F. (1994): Revision rheinischer Käfernachweise nach dem ersten Supplementband zu den Käfern Mitteleuropas. Teil II: Staphylinidae, Pselaphidae (Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen **4**: 69–107.
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte **44**: 60–84.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **55**: 109–174, 247–254.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **4**: 1–185.
- MEYER, M. & W. MEYER (2011): Untersuchungen zur Käferfauna der Drover Heide bei Kreuzau (Kreis Düren, Rheinland). – Coleo **12**: 17–66.
- PFEFFER, A. (1995): Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae). Basel (Pro Entomologia, Naturhistorisches Museum Basel)
- RENNER, K. & B. GRUNDMANN (1984): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna III. – Entomologische Blätter **80**: 71–84.
- SABELLA, G., C. BÜCKLE, V. BRACHAT & C. BESUCHET (2004): Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Brachygluta* THOMSON, 1859 (Coleoptera, Staphylinidae) (1. Teil). – Instrumenta Biodiversitatis **6**: 1–283.
- VOGEL, J. (1998): Gattung *Aleochara* GRAVENHORST. U.G. *Ceranota*. Bestimmungstabelle der mitteleuropäischen Arten, in: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) Die Käfer Mitteleuropas. 4. Supplementband, 195–197. Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm.

Dr. KLAUS RENNER, Wickenkamp 9a, D-33615 Bielefeld
E-Mail: <kaefer.renner@t-online.de>

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Renner Klaus

Artikel/Article: [Neu- und Wiederfunde von Käferarten \(Coleoptera\) in den westdeutschen Regionen Nordrhein, Rheinland, Rheinhessen-Pfalz und Hessen 11-14](#)