

Faunistische Notizen

von Günter Swoboda

12. Weitere Funde von Synvaleria oleagina SCHIFFERMÜLLER 1775 in der Eifel (Noctuidae).

Die bisher nur vom Mittelrhein, Nahe und Mosel nachgewiesene wärmeliebende Art, konnte in den letzten Jahren auch an wärmebegünstigten Plätzen der Ahr und an der Nette festgestellt werden.

Altenahr	11. IV.75	1 Falter	leg. Beckers
	4. IV.81	1	leg. Kinkler
Mayschoß	29. III.76	5 "	leg. Forst
	17. IV.76	2 "	
Rech	8. III.77	2	
	12. III.77	25 "	
	15. III.77	10 "	
Plaidt Ruine Wernerseck	27. III.82	1	leg. W. Schmitz

M. Forst, Köln

13. Erstfund von Cupido minimus FUESSLY 1775 in der Wahner Heide (Lycaenidae).

Am 29.V.82 gelang mir im Nordteil der Wahner Heide der Nachweis eines Falters von C. minimus. WEYMER (1878): Macrolepidopteren der Umgebung von Elberfeld, S. 56, schreibt über die Verbreitung von C. minimus: "Sehr local. Von Müser bei Schwelm gefunden, nach Kirby auch wahrscheinlich bei Hilden. (s.a. KINKLER, SCHMITZ: Die Tagfalter des Bergischen Landes in "Jahresber. Nat. wiss. V. Wuppertal, 1971). Seit 1878 sind keine weiteren Meldungen über ein Vorkommen dieser Art im Bergischen Land, zu dem auch die Wahner Heide gehört, bekannt geworden.

An gleicher Stelle und am gleichen Tag konnte die sonst selten gewordene Heodes tityrus PODA 1761 ziemlich häufig beobachtet werden.

0. Schmitz, Bergisch Gladbach

14. Miana literosa HAWORTH 1809 in Ausbreitung begriffen? (Noctuidae).

Die früher nur selten gemeldete Noctuidae M. literosa ist wahrscheinlich in Ausbreitung begriffen. Hier die neueren Funde:

Neuß (NRW)	6.VIII.72	1 Falter	leg. Siepe
Niederkrüchten (NRW)	30. VII.78	1	leg. Kinkler
Mönchengladbach (NRW)	5.VIII.79	1	leg. Neuwald
Etzweiler (NRW)	18.VIII.79	2 "	leg. Gierling und Kinkler
Altenahr (Rh.-Pf.)	2.VIII.80	1	leg. W. Schmitz
Mechernich-Berg (NRW)	31. VII.81	2 "	leg. Kinkler
Bergisch Neukirchen (NRW)	30. VII.82	1	leg. Boness

Die meisten Falter wurden genitaliter untersucht, da sie sehr leicht mit der ähnlichen Art Miana furuncula SCHIFFERMÜLLER 1775 verwechselt werden können.

Beim Präparieren der Tiere sollte man, wie auch bei vielen anderen schwer unterscheidbaren Arten, die Genitalien herausziehen. Zumindest bei den Männchen sollten die Valven durch zwei Nadeln auseinandergedrückt werden. Mit dem Binokular oder meist auch schon mit der Lupe, lassen sich die Arten später an Hand typischer Unterscheidungsmerkmale eindeutig determinieren. Man erspart sich dadurch das aufwendige Genitalpräparat.


H. Kinkler, Leverkusen

15. Ein weiterer Fundort von Luffia ferchaultella STEPHENS 1850 in der Bundesrepublik (Psychidae).

Am 27.III.82 wurde erneut ein stark besetzter Biotop mit L. ferchaultella entdeckt. Es handelt sich um einen Felsen in einer Flußschleife der Nette in der Nähe der Ruine Wernerseck bei Plaidt/Eifel. Hier konnten in großer Anzahl die Säckchen der Art aufgefunden werden. Die ökologischen Verhältnisse sind ähnlich wie an dem Fundort bei Altenahr. (s. Karte S. 130)

H. Kinkler, Leverkusen

W. Schmitz, Bergisch Gladbach



BRD / NORDRHEIN - WESTFALEN / HESSEN / RHEINLAND - PFALZ / SAARLAND

16. Thera stragulata HÜBNER 1809 neu für das Arbeitsgebiet (Geometridae).

Bei der Durchsicht der Sammlung SCHMAUS im Museum König, Bonn, konnte die Geometride T. stragulata als neu für unser Arbeitsgebiet registriert werden. Es steckten neun Falter in dieser wertvollen Lokalsammlung, die fast nur aus Belegstücken von Kastellaun und Umgebung (Hunsrück) besteht.

Kastellaun (Rh.-Pf.)	8.VIII.45	leg. Schmaus
	17. IX.58	
	27. IX.68	
	22. IX.69	
	2. IX.73	
	31. V.74	
	13. VI.74	
	16. VI.74	
	5. X.75	

H. Kinkler, Leverkusen

17. Der zweite Fund von Peribatodes manuelaria HERRICH-SCHÄFFER 1852 im Arbeitsgebiet (Geometridae).

Der zweite Fund im Arbeitsgebiet nach Entdeckung der Art durch Rodenkirchen im VIII.73 in Holsthum/Südeifel. Wahrscheinlich wird die Art übersehen, da nur wenig von der sehr ähnlichen Peribatodes secundaria SCHIFFERMÜLLER 1775 verschieden.

Trimbs/Nettebachtal (Rh.-Pf.) 24.VII.82 1 ♀ leg. Kinkler

H. Kinkler, Leverkusen

18. Mesotype virgata HUFNAGEL 1767 in der Eifel (Geometridae).

Diese unscheinbare, offensichtlich nicht zum Licht kommende Geometride, wurde bisher nur auf wenigen Kalk- und Vulkantrockenrasen der Eifel gefunden. Der Falter kann im Flug leicht mit einem Micro verwechselt werden.

Ettringen (Hochstein) (Rh.-Pf.) 15.V.80 leg. Kinkler u. W. Schmitz
Wiesbaum (Baumberg) (Rh.-Pf.) 15.V.82 leg. Kinkler

H. Kinkler, Leverkusen

19. Scotia puta HÜBNER 1800-1803 in der Schnee-Eifel (Noctuidae).

Am 21.VIII.82 gelang mir der Fang eines Falters von S. puta bei Brandscheid (Rh.-Pf.). In den letzten Jahren wurde diese Art mehrfach im Arbeitsgebiet gefunden, eine Ausbreitung kann angenommen werden.

F. Nippel, Wermelskirchen

20. Tagfalterbeobachtungen im Nahetal (Diurna).

In der Zeit vom 26.V.-17.VI.82 konnte ich in Kirschroth/Nahe eine ganze Reihe Tagfalter beobachten.

Papilio machaon LINNAEUS 1758
Aporia crataegi LINNAEUS 1758
Pieris brassicae LINNAEUS 1758
Pieris rapae LINNAEUS 1758
Pieris napi LINNAEUS 1758
Anthocharis cardamines LINNAEUS 1758
Colias hyale LINNAEUS 1758
Gonepteryx rhamni LINNAEUS 1758
Apatura iris LINNAEUS 1758
Inachis io LINNAEUS 1758
Vanessa atalanta LINNAEUS 1758
Aglais urticae LINNAEUS 1758
Araschnia levana LINNAEUS 1758
Mesoacidalia aglaja LINNAEUS 1758
Issoria lathonia LINNAEUS 1758
Maniola jurtina LINNAEUS 1758
Coenonympha pamphilus LINNAEUS 1758

Coenonympha arcania LINNAEUS 1761
Pararge aegeria LINNAEUS 1758
Lasiommata megera LINNAEUS 1767
Callophrys rubi LINNAEUS 1758
Heodes tityrus PODA 1761
Polyomatus icarus ROTTENBURG 1775
Ochlodes venatus BREMER et GREY 1857

H. Bettmann, Mönchengladbach-Rheydt

21. Nachweis von Coenotephria sagittata FABRICIUS 1787 in Düsseldorf
(Geometridae).

Anfang IX.78 beobachtete ich in den Urdenbacher Kämpen (Düsseldorf-Urdenbach), dem Gebiet um den alten Rheinarm, an Gelber Wiesenraute (Thalictrum flavum) ca. 50 Raupen von C. sagittata. Die aus den mitgenommenen Raupen erzielten Falter schlüpfen in VI. und VII.79.

U. Puschmann, Düsseldorf

Anschrift des Verfassers:

Günter Swoboda
Felderstr. 62

5090 Leverkusen 1

Literaturhinweise

von Günter Swoboda

WEIGT, H.-J.: Entomologische Notizen aus Westfalen 3

Interessante Neufunde und Beobachtungen 1980 und 1981 (Lepidoptera). - Natur und Heimat, 42. Jahrg., H. 1, Münster 1982, S. 1-4, 10 Abb.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Swoboda Günther [Günter]

Artikel/Article: [Faunistische Notizen 128-133](#)