

123. *Hypnum fuitans* Hedw. zu Bötzt. auf der Wolfert, Ob. im Schachen in Wassergraben und ebenso gegen Gottenheim st.
 124. — *flicinam* L. am Bretterwerk der Mühlen zu Bötzt. und Ob. in feuchten Graben. F. c. fr.
 125. — *rugosum* Ehrh. in den Waldungen und anderen Ränder st.
 126. — *incurvatum* Schrd. Bötzingen auf Dächern F. c. fr.
 127. — *cupressiforme* L. in verschiedenen Formen (*tectorum*, *brevisetum*, *filiforme*) F. c. fr.
 128. — *molluscum* Hedw. Ob. am Fussweg gegen die Neunlinden, am Jmenbuck S. c. fr.
 129. — *cuspidatum* L. an feuchten Plätzen, in Graben der Wiesen, Gärten. S. c. fr.
 130. — *purum* L. im Wald und an Rainen, F. nicht selten. c. fr.
 131. — *Schreberi* Willd, Wald, H. c. fr.
 132. *Hylocomium splendens* Br. u. Schpr. F. c. fr. in den Waldungen.
 133. — *brevirostrum* Schpr. st. unter der Eichelspitze am Fussweg nach Eich.
 134. — *squarrosum* st. ebenda und an andern feuchten Orten
 135. — *triquetrum* Schpr. Im Walde nicht selten F. c. fr.

Zum Schlusse der Vorführung der Moose des Kaiserstuhles erübrigt mir noch zu berühren, warum nur so wenige Localitäten als Standorte angegeben sind. Die westliche Abdachung des Kaiserstuhles, mit Ausnahme eines kleinen Gebietes bei Vogtsburg, wo metamorphosirter Kalk auftritt, ist äusserst moosarm und beherbergt blos gewöhnliche Moosarten, nur noch ein ganz kleiner District bietet den seltneren die Möglichkeit ihres Fortkommens und lässt sich daraus erschliessen, welche Einbussen derselbe durch die früher beregten Eingriffe erlitten hat.

Neue Standorte

wurden uns von nachstehenden Herren mitgeteilt

- Bäumgartner, Reallehrer in Freiburg. (B.)
 Dr. Christ in Basel. (Ch.)
 Döll jun., Apotheker in Karlsruhe. (D.)
 Engesser, Thierarzt in Hüfingen. (E.)
 Frey, Oekonom in St. Jigen. (F.)
 Götz, Hauptlehrer in Hofgrund. (G.)
 Klotz, Gymnasiast in Freiburg. (Kl.)
 Kneucker, Unterlehrer in Kürnbach. (Kn.)
 Kübler, Apotheker in Munzingen. (Kü.)
 Lang, Gymnasiast in Freiburg. (La.)
 Liehl, Reallehrer in Freiburg. (Li.)
 Mez, Gymnasiast in Freiburg. (Me.)
 Müller, Unterlehrer in Opfingen. (Mü.)
 Dr. Schill, pract. Arzt in Müllheim. (Schi.)
 Schneider, Apotheker in Basel. (Schn.)
 Schneyder, Professor in Freiburg. (Schy.)
 Schönberger, Lehrer in Karlsruhe. (Schö.)
 Stehle, Hauptlehrer in Freiburg. (St.)
 Sterk, Hauptlehrer in Rheinweiler. (Stk.)

- Ceterach officinarum* Willd. An Mauern bei Bamlach. (Stk.)
Asplenium viride Hds. An Mauern in Hofsgrund. (G.) Am Hirschsprung. (La.) Bei Wolterdingen. (Schy.)
Asplenium germanicum Weiss. An Mauern in Britzingen (G.)
Asplenium Adiantum nigrum L. Am Wartturmberg b. Wertheim. (Kn.)
Phegopteris Robertiana A Br. In einem Wäldchen bei Wenkheim. Bei Steinmauern. (Kn.)
Aspidium aculeatum, v. vulgare D. Zwischen Hofsgrund und dem Schmelzplatz. Auf dem Hirschkopf bei St. Wilhelm. (G.)
Cystopteris fragilis Bernh. In Hofsgrund und Oberweier, häufig (G.) An einer Mauer in Merzhausen. (La.)
Botrychium Lunaria Kef. Auf Wiesen um Hofsgrund. (G.)
Botrychium matricariaefolium AB. Am Gesprengstollen in Hofsgrund (G.)
Equisetum variegatum Schleich. Am Rheine und auf den Höhen von Jstein und Rheinweiler. (Stk.)
Lycopodium annotinum L. Oberhalb und unterhalb des Schmelzplatzes (An der Strasse Freiburg-Todtnau). (G.) Bei Neustadt. (St.)
Lycopodium clavatum L. Im Stohren. Zwischen Feldberg u. Nothschrei (G.) Bei Neustadt. (St.)
Lycopodium alpinum L. Zwischen der Halde und dem Hofsgrunder Schulhaus. Am Schweinebühl bei Hofsgrund. (G.)
Setaria verticillata P. d. B. In Eschbach bei Staufen. In Thunsel. (G.)
Melica ciliata L. Am Gänseberg hinter Wenkheim. (Kn.)
Sesleria coerulea Ard. Wäldchen bei Werbachhausen. (Kn.)
Eragrostis poaeoides P. d. B. Auf der Bahnstrecke der Renchthalbahn. (Me.) Am Mühlburgertor in Karlsruhe. (Kn.)
Lolium arvense Schrd. Unterm Flachs bei Kürnbach. (Kn.)
Nardus stricta L. Auf dem Hirzberg bei Freiburg. (B.)
Scirpus pauciflorus Lighth. Zwischen Ottenheim u. dem Rheine. (G.)
Scirpus maritimus L. Am Neckar bei Ladenburg (M.)
Carex Davalliana Sm. Bei Brennet im Torfmoor von Jungholz. (Schi.) Im Mooswald bei Thiengen. Zwischen dem Sternen im Höllenthal und Alpersbach. (Me.)
Carex dioica L. Im Torfmoor von Jungholz. (Schi.)
Carex pulicaris L. Im Torfmoor von Jungholz. (Schi.) Am Steinwasen und an der Sommerhalde von Hofsgrund. Im Stohren. (G.)
Carex alba Scop. Zwischen dem Weinstetter Hof und dem Rhein. (G.)
Carex strigosa Huds. An waldigen Abhängen auf der rechten Seite vom Neunmagen. (G.) Im Wald bei Mühlburg. (Kn.)
Carex pilulifera L. Bei Hofsgrund häufig. (G.)
Carex filiformis. Im Jungholzer Torfmoor. (Schi.)
Carex humilis Leyss. An bewaldeten Kalkhügeln zwischen Wenkheim und Werbachhausen. (Kn.)
Muscari neglectum Duss. In Weinbergen zwischen Weil und Haltingen. (Ch.)
Allium Scorodoprasum L. Auf Aeckern bei Dertingen. (Kn.)

- Allium rotundum* L. In Weinbergen bei Wertheim. (Kn.)
Scilla bifolia L. Im Sickinger Wald. (Kn.)
Gagea stenopetala Rehb. Auf Wiesen zwischen Wenkheim und Werbachhausen. (Kn.)
Narcissus poeticus L. Bei Emmendingen. (La.) Auf Wiesen in Hofgrund. (G.)
Crocus vernus All. Auf einer feuchten Wiese beim sog. Klösterle unweit Rippoldsau. (D.)
Orchis pallens L. Am Wartenberg bei Geisingen. (Schy.)
Orchis sambucina. Auf Wiesen unterhalb Schollbrunn. Im Vorpessart (Bayern). (Kn.)
Orchis incarnata W. Im Erlenthal bei Eendingen. (La.)
Listera cordata R. Br. An feuchten moosigen Stellen im Kohlwalde zwischen Hofgrund und dem Schmelzplatz. (G.)
Epipactis microphylla Sw. Auf dem Schönberg zwischen der Schneeburg und Ebringen im Walde. (Me.)
Goodyera repens. R. Br. Bei Schliengen. (Stk.)
Corallorrhiza innata R. Br. Beim „Adler“ im Bärenthal. (La.)
Cypripedium Calceolus L. Im Werbacher Walde, linkes Welzufer. (Kn.)
Zanichellia palustris L. Im Welzbach häufig. (Kn.)
Potamogeton rufescens Schrad. Im Bache des Jungholzer Torfmoors. (Schi.)
Elodea canadensis Rich. Im Dorfbach von Eimeldingen. (Schi.) Bei Kleinkems. (Schö.) In der Breg und Donau, auch in einem Teiche zwischen Hüfingen und Allmendshofen. (E.)
Salix pentandra L. Auf dem Michelsberg bei Untergrombach. (Kn.)
Salix repens L. und *Salix repens-aurita* D. Im Torfmoor bei Jungholz. (Schi.)
Betula pubescens Ehrh. Im Mooswald bei Lehen. (Me.)
Alnus glabra — *incana*. Bei Eimeldingen u. Märkt. (Schi.)
Parietaria erecta M. u. K. In einer Seitenstrasse von Heitersheim (G.) Im Schlossgarten bei Karlsruhe. (Kn.)
Euphorbia chamaesyce v. *canescens*. L. Auf d. Station Rheinweiler. (Stk.)
Empetrum nigrum L. Hohlohsee bei Gernsbach. (Kn.)
Chenopodium ficifolium Sm. Bei Eschbach, Griessheim, Bremgarten. (G.)
Polycnemum majus A. Br. Bei Rheinfeldern u. Warmbach. (Schi.) Auf einem Brachacker im Hänig. (Kn.)
Amarantus sylvestris Desf. Auf Kartoffeläckern bei Grenzach und Richen. (Schi.)
Rumex scutatus L. An Weinbergsmauern auf dem Schlossberg bei Freiburg. (Kl.)
Salvia verticillata L. Am Eisenbahndamm zwischen Thunsel u. Krotzingen. (G.) Auf dem Kalmut und bei Dertingen. (Kn.)
Brunnella alba Pall. Bei Jstein. (Stk.)
Teucrium montanum L. Bei Blumberg. (Schy.) Auf dem Apfelsberg bei Gamburg und auf dem Kalmut bei Hontburg. (Kn.)

- Teucrium Botrys* L. Auf Strassenrändern und wüsten Stellen bei Wenkheim. (Kn.)
Melampyrum cristatum L. Bei Kleinkems. (Stk.) Im Wald auf dem linken Welzufer bei Werbachhausen. (Kn.)
Lathraea Squamaria L. Im Rheinwald bei Hartheim. (Kü.)
Orobanche Hederae Dub. Im Ufergebüsch am Rhein zwischen Wyhlen und Warmbach, gegenüber der grossen Insel. (Schi.)
Gratiola officinalis L. Im Mattweggraben zwischen Eschbach (Staufen) u. dem Rothlaub. (G.)
Mimulus luteus L. An der Kinzig bei Gengenbach. (Li.)
Scrophularia Ehrharti v. *Nessii* W. An beiden Welzufern. (Kn.)
Pulmonaria angustifolia L. Im Wald bei Werbachhausen, linken Welzufer. (Kn.)
Anchusa officinalis L. Bei Wertheim u. Kreuzwerth. (Kn.)
Physalis Alkekengi L. In Weinbergen an der Ruine Windeck. Bei Weinheim. (Me.)
Cuscuta racemosa Mart. Auf Kleeäckern bei Wyhlen. (Schi.)
Chlora serotina L. Bei Rheinweiler. (Stk.)
Chlora perfoliata L. Bei Rheinweiler. (Stk.)
Callomia grandiflora Douglas. Bei Neustadt. (St.)
Armeria vulgaris Willd. Am Remberg bei Wertheim. (Kn.)
Anagallis tenella L. Im Torfstich von Jungholz am Rand von Wassergräben. (Schi.)
Pyrola uniflora L. Bei der Hofgründer Säge. (G.)
Prismatocarpus hybridus L'Herit. Untern Getreide bei Wenkheim. (Kn.)
Crepis setosa Hall. Bei Neuenburg in der Nähe der Bahn. Bei Griesheim. (G.)
Hieracium prenanthoides Vill. An der Zastlerwand. (G.)
Hieracium rigidum Hartm. In Wäldern bei Triberg. (Me.)
Lactuca virosa L. In Elmendingen bei Pforzheim. (Me.)
Lactuca saligna L. Auf Schutt beim Winterhafen von Wertheim. (Kn.)
Erigeron Droebachiensis Mill. Zwischen Griessheim u. dem Rhein. (G.)
Rudbeckia hirta L. Wiederholt gefunden am Kinzigdamm b. Gengenbach. (Li.)
Inula hirta L. In einem Wäldchen bei Wenkheim u. im Wald bei Werbachhausen. (K.)
Inula Vaillantii Vill. Zwischen dem Weinstetter Hof u. dem Rhein. (G.)
Doronicum Pardalianches L. In einem Wäldchen bei Werbachhausen. (Kn.)
Cineraria spatulifolia Gm. In einem Wäldchen b. Werbachhausen. (Kn.)
Cirsium eriophorum Scop. Bei Neustadt. (St.) Am Klettenberg bei Wenkheim. (Kn.)
Centaurea solstitialis L. Bei Huttingen. (Stk.) Am Eisenbahndamm hinter der Güterhalle von Heitersheim. (G.)

- Galium rotundifolium* L. Bei Neustadt. (St.) Bei Triberg. (Me.)
Seseli coloratum Ehrh. Bei Kleinkems. (Stk.)
Libanotis montana All. Bei Blumberg. (Schy.)
Orlaya grandiflora Hoffm. Auf Brachäckern bei Höffeld. (Kn.)
Turgenia latifolia Hoffm. Auf Aeckern bei Wenkheim, Werbach-
 hausen u. Tauberbischofsheim. (Kn.)
Torilis helvetica Gmel. Am Waldrand bei Sickingen. (Kn.)
Saxifraga aizoon. Jacq. An der steilen Nordhalde des Feldsees. (G.)
Crassula rubens L. Am Damm bei der Leopoldshöhe (Schn.)
Sedum villosum L. In Hofgrund. (G.)
Callitriche auctumnalis L. Im Strassengraben zwischen Hugstetten
 und Hochdorf. (Schi.)
Sorbus domestica L. Im Mühlwald bei Wenkheim. (Kn.)
Rosa pimpinellifolia DC. Auf dem Kalmut bei Dertingen. (Kn.)
Potentilla recta L. Auf einer Mauer in Gallenweiler. (G.)
Trifolium spadiceum L. Bei Alpirsbach. (Me.)
Coronilla montana Scop. Auf dem Kalmut an der bad. Grenze bei
 Homburg am Main. (Kn.)
Vicia pisiformis L. An Waldwegrändern im Hännig bei Wenkheim
 häufig. (Kn.)
Vicia sylvatica L. In Wäldern bei Werbachhausen. (Kn.)
Lathyrus Nissolia D. Zwischen Denzlingen u. Glotterthal im Getreide.
 (Kl.) Bei Bollschweil. (G.)
Lathyrus palustris L. Bei Rheinweiler. (Stk.)
Geranium pratense L. Auf fast allen Wiesen bei Wenkheim und
 Tauberbischofsheim. (Kn.)
Drosera intermedia Heyne. Im Torfmoor bei Jungholz. (Schi.)
Arabis brassiciformis Wallr. In einem Wäldchen b. Werbachhausen. (Kn.)
Arabis arenosa Scop. Bei Kleinkems. (Schö.)
Erysimum orientale L. Auf Aeckern bei Werbachhausen häufig. (Kn.)
Thlaspi montanum L. In einem Wäldchen bei Werbachhausen. (Kn.)
Lepidium Draba L. Bei Istein. (F.) Zwischen Riegel u. Endingen. (Me.)
Lepidium graminifolium L. In der Kiesgrube bei der Stadt Wien
 in Freiburg. (Kl.)
Lunaria rediviva L. Am Wege vom Kypfelsen nach dem Schauins-
 land. (Me.)
Calepina Corvini Dezv. Am Eisenbahndamm b. Leopoldshöhe. (Schn.)
Fumaria parviflora Lam. Auf einem Acker bei Wenkheim. (Kn.)
Thalictrum aquilegifolium L. Bei Rheinweiler. (Stk.)
Myosurus minimus L. Am Oelberg bei Ehrenstetten. (G.)
Helleborus viridis L. In Grasgärten bei Wenkheim. (Kn.)
Aconitum Lycoctonum L. In einem Wäldchen b. Werbachhausen. (Kn.)

Baumgartner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1882-1888

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Neue Standorte. \(1882\) 12-16](#)