

# MITTEILUNGEN

des

## Botanischen Vereins

für den

### Kreis Freiburg und das Land Baden.

---

№ 16.      Erscheinen in **zwanglosen Heften**, welche allen Mitgliedern **1884.**  
                 unentgeltlich durch die Post zugeschiekt werden.

---

#### Charakteristische Formen der Flora von Achern.

(Schluss.)

- Galeopsis ochroleuca* Lam. (6—8; Rastatt).  
*Stachys annua* L. (7—9; Membrechtshofen).  
*Leonurus Cardiaca* L. (7, 8; Renchen, Achern, Oberachern, Windeck).  
*Scutellaria minor* L. (7, 8; Sasbachwalden, Obersasbach).  
*Ajuga genevensis* L. (5, 6; Achern etc. vorherrschend).  
*Teucrium Scordium* L. (7, 8; Müllen).  
*Melampyrum silvaticum* L. (7, 8; Hornisgrinden).  
*Pedicularis silvatica* L. (5, 7; Lauf, Sasbachwalden).  
— *palustris* L. (5—7; Abtmoorwiesen).  
*Euphrasia Odontites* L. (5, 6; Neusatzreck); form.  $\beta$ . *brevibracteata*  
Bogenhard (8—10; Schweinsweiden bei Kork, Weitenung,  
Altenheim).  
*Orobancha Rapum* Thuill. (6, 7; sehr verbreitet auf *Sarothamnus* im  
Vorgebirge).  
— *minor* Sutt. (6, 7; Kleeäcker bei Achern, Fautenbach, Oens-  
bach, Ganshurst).  
— *ramosa* L. (7, 8; ebendasselbst auf Tabak).  
*Gratiola officinalis* L. (6, 8; Membrechtshofen).  
*Digitalis purpurea* L. (6, 8; Wälder des Vorgebirges häufig).  
*Antirrhinum Orontium* L. (7—10; Waldulm, Oberachern, Achern).  
*Linaria Cymbalaria* L. (6—8; Sasbachwalden, Renchen).  
— *Elatine* Mill. (7—10; Oberachern, Sasbachwalden).  
*Veronica scutellata* L. (6—9; Oberachern, Abtmoor).  
— *longifolia* L. (7, 8; Membrechtshofen).  
— *acinifolia* L. (4, 5; Getreide bei Achern etc. häufig).  
— *Tournefortii* Gmel. (3—10; Fautenbach, Rastatt).

- Lindernia pyxidaria* All. (7, 8; Oberachern, Renchen, Altenheim;  
 (Hanflöcher).  
*Limosella aquatica* L. (7—9; ebendasselbst).  
*Scrophularia canina* L. (6, 7; Helmlingen).  
*Verbascum Blattaria* L. (6, 8; Wagshurst, Niederschopfheim, Schut-  
 terwald).  
*Utricularia vulgaris* L. (6—8; Abtsmoorwiesen).  
 — *minor* L. (6—8; ebendasselbst).  
*Myosotis caespitosa* L. (5—7; Gamshurst).  
*Physalis Alkekengii* L. (6; Ottersdorfer Wald).  
*Nicotiana rustica* L. (7, 8; Wagshurst, cult.).  
*Erythraea ramosissima* Pers. (7, 8; Oberachern).  
*Menyanthes trifoliata* L. (4, 5 Abtsmoorwiesen, Neusatzack).  
*Limnanthemum nymphaeoides* Lk. (7, 8; Memprechtshofen).  
*Cynanchum Vincetoxicum* R. Br. (6, 7; Geishöhle, Glashütte, Edel-  
 frauengrab).  
*Lysimachia nemorum* L. (6, 7; Achern, Sasbachwalden).  
*Centunculus minimus* L. (6, 8; Renchen, Fautenbach).  
*Hottonia palustris* L. (5, 6; Sasbachried, Abtsmoor, Wagshurst).  
*Samolus Valerandi* L. (6—8; Ichenheim, Altenheim).  
*Andromeda polifolia* L. (6, 7; Hornisgrinde).  
*Pirola uniflora* L. (6, 7; Iffezheimer Wald).  
 — *umbellata* L. (6, 7; ebendasselbst).  
 — *secunda* L. (6, 7; ebendasselbst).  
 — *chlorantha* Sw. (6; ebendasselbst).  
 — *minor* L. (6; ebendasselbst und Achern, Oberachern).  
*Vaccinium uliginosum* L. (5—7; Hornisgrinde).  
 — *Vitis Idaea* L. (5—8; Sasbachwalden, Windeck).  
 — *Oxycoccus* L. (6, 7; Hornisgrinde).  
*Campanula Cervicaria* L. (7, 8; Ichenheim; leg. Baur).  
 — *persicifolia* L. (6, 7; Waldulm).  
*Jasione perennis* L. (7, 8; Vorgebirge).  
*Arnoseris pusilla* Gärtn. (6, 7; Sasbachwalden, Waldulm).  
*Crepis paludosa* Mnch. (6, 7; Oberachern, Sasbachwalden).  
*Hieracium bifurcum* L. (7, 8; Fautenbach, Achern).  
*Mulgedium alpinum* Cass. (7, 8; Hornisgrinde).  
*Adenostyles albifrons* Rchb. (7, 8; ebendasselbst).  
*Petasites albus* Gärtn. (4, 5; Allerheiligen).

- Aster parviflorus* Nees. (8, 9; Helmlingen).  
*Inula britannica* L. (8, 9; ebendasselbst).  
 — *salicina* L. (7, 8; ebendasselbst).  
*Gnaphalium dioicum* L. (5, 6; Ottenhöfen (Simmersbach), Hardkopf).  
*Helichrysum arenarium* D.C. (7, 8; Iffezheimer Wald).  
*Arnica montana* L. (7, 8; Kroppenkopf, Breitenbronn).  
*Senecio paludosus* L. (7, 8; Strassburg, Memprechtshofen, Altenheim).  
*Centaurea solstitialis* L. (7, 8; bei Offenburg; leg. Leibinger).  
 — *nigra* L. (7, 8; im Vorgebirge an Rainen häufig).  
*Dipsacus silvester* Huds. (7, 8; Aspich, Altenheim).  
 — *laciniatus* L. (7—9; Altenheim).  
*Galium rotundifolium* L. (6, 7; Oberachern (Bienenbuckel).  
 — *ochroleucum* Wolff. (6—10; Rastatt).  
 — *saxatile* L. (6—8; gemein auf Triften der Vorberge).  
*Lonicera Periclymenum* L. (6, 7; Achern, Sasbachwalden).  
*Hydrocotyle vulgaris* L. (7, 8; Abtsmoorwiesen).  
*Sanicula europaea* L. (5, 6; Achern).  
*Helosciadium repens* Koch (8, 9; Abtsmoorwiesen, Müllen, Altenheim).  
*Sium latifolium* L. (7, 8; Abtsmoor, Wischtung, Memprechtshofen, Ichenheim).  
*Oenanthe Phellandrium* Lam. (7, 8; Gräben der Rheinfläche häufig).  
 — *fistulosa* L. (6, 7; ebendasselbst).  
 — *Lachenalii* Gmel. (6, 7; Altenheim).  
*Meum athamanticum* Jacq. (6—9; Bergmatten).  
*Selinum carvifolia* L. (7, 8; Memprechtshofen).  
*Peucedanum officinale* L. (7, 8; ebendasselbst).  
 — *Oreoselinum* Mch. (7, 8; Iffezheimer Wald).  
*Thysselinum palustre* Hoffm. (7, 8; Memprechtshofen, Ichenheim).  
*Chaerophyllum hirsutum* L. (mit var.  $\beta$ . *roseum*. (7—8; feuchte Wälder der Vorberge).  
*Saxifraga tridactylites* L. (4, 5; Achern etc. oft).  
*Chrysosplenium oppositifolium* L. (3—5; } zusammen an feuchten Stellen der Vorberge häufig).  
 — *alternifolium* L. (3—5; }  
*Adoxa Moschatellina* L. (3, 4; Lössraine bei Achern, Sasbach).  
*Parnassia palustris* L. (7, 8; feuchte Gebirgswiesen, Abtsmoor).  
*Ribes rubrum* L. (4, 5; Obersasbach, Gamshurst, in Wäldern).  
*Sedum Telephium* L. und var. *purpurascens*. letztere häufiger, (7—9, Achern, Windeck).

- Sedum dasyphyllum* L. (6, 7; Oberachern).  
*Lythrum Hyssopifolia* L. (7, 8; Kork, Müllen).  
*Peplis Portula* L. (7—9; Hanflöcher und Gräben der Rheinfläche, gemein).  
*Myriophyllum verticillatum* L. (7, 8; Sasbach).  
 — *spicatum* L. (7. Müllen).  
*Hippuris vulgaris* L. (7, 8; Auenheim, Altenheim).  
*Isnardia palustris* L. (7, 8; Kork).  
*Hippophaë rhamnoides* L. (4; Helmlingen, Ichenheim).  
*Mespilus germanica* L. (5, 6; q. sp. bei Lauf, Sasbachwalden).  
*Potentilla Fragariastrum* Ehrh. (4, 5; auf Lössrainen, gemein).  
 — *supina* L. (6—9; in Dörfern, z. B. Wagshurst, Oensbach, an Wegen).  
*Fragaria elatior* Ehrh. (5; Raine bei Achern).  
*Agrimonia odorata* Mill. (6—8; Achern, Lauf, Sasbachwalden).  
*Rosa tomentosa* Sm. (6; Hardkopf).  
*Sarothamnus vulgaris* Wim. (5, 6; die Vorhügel beherrschend).  
*Genista germanica* L. (5, 6; Oberachern (Bienenbuckel).  
 — *pilosa* L. (5, 6; auf allen Vorhügeln an Waldsäumen).  
*Ononis repens* L. (6, 7; durch das Gebiet auf Triften).  
*Melilotus macrorrhiza* Pers. (7, 9; Memprechtshofen).  
*Trifolium fragiferum* L. (6—9; Auenheim, Ichenheim, Schutterwald).  
*Tetragonolobus siliquosus* Rth. (6, 7; Ichenheim, Strassburg).  
*Astragalus glycyphyllos* L. (6, 7; Achern).  
*Coronilla varia* L. (6, 7; Achern).  
*Ornithopus perpusillus* L. (6, 8; Simmersbach).  
*Hippocrepis comosa* L. (5—7; Oberachern).  
*Lathyrus Nissolia* L. (5, 6; Sasbach).  
 — *silvester* L. (6—8; Querbach-Auenheim).  
*Orobus tuberosus* L. (4, 5; Neuweier).  
*Ilex aquifolium* L. (5, 6; in Bergwäldern häufig).  
*Polygala depressa* Wender. (5, 6; Kroppenkopf, Hornisgrinde, Simmersbach).  
*Oxalis stricta* L. (6—8; Unkraut in Gärten und Feldern).  
 — *corniculata* L. (6—10; ebenso).  
*Geranium pyrenaicum* L. (5—9; Renchen).  
*Hypericum humifusum* L. (6—9; Achern, Sasbachwalden etc.).  
 — *pulchrum* L. (7—9; Hardkopf, Sasbachwalden).

- Hypericum quadrangulum* L. (6—9; Gräben bei Achern, Sasbachwalden etc.)  
 — *tetrapterum* Fr. (7—8; )
- Elatine alsinastrum* L. (7, 8; Kork).  
 — *Hydropiper* L. (6—8; Kork und Renchen).
- Elatine paludosa* Seub. (6—8; Renchen).  
 — *triandra* Schk. (6—8; ebendasselbst).
- Myricaria germanica* Desv. (5, 6; Helmlingeu, Ichenheim).
- Drosera rotundifolia* L. (7, 8; Sasbachwalden, Hornisgrinde, Simmersbach).
- Viola palustris* L. (5, 6; Lauf, Sasbachwalden, Lautenbach).  
 — *hirta* L. (4, 5; Rheinau bei Rastatt).  
 — *Riviniiana* Rehbch. (4, 5; Waldschläge im Vorgebirge; häufiger als *V. sylvestris* Lam.).  
 — *pratensis* M. und K. (Auenheim an der Kinzig).
- Corrigiola litoralis* L. (7, 8; Oberachern, Ottenhöfen, an der Acher).
- Polycarpon tetraphyllum* L. (7—9; Kork).
- Portulaca oleracea* L. (6—9; Achern und auf dem Bahnkörper bis Appenweier).
- Montia minor* Gmel. (3, 4; lettige Ackerränder um Achern).
- Sceleranthus perennis* L. (5—10; Rastatt, Ottenhöfen).
- Sagina apetala* L. (5—7; Felder bei Achern, Oensbach).
- Alsine tenuifolia* Whlrbg. (5—8; ebendasselbst).
- Moehringia trinervia* Clairv. (5, 6; Achern etc. häufig).
- Stellaria glauca* With. (6, 7; Wiesen der Rheinfläche bei Gamshurst, Grossweier).  
 — *uliginosa* Murr. (5—7; quellige Stellen der Vorhügel, auch auf der Rheinfläche).
- Cerastium brachypetalum* Desp. (5, 6; Hardkopf).  
 — *semidecandrum* L. (3—5; Rastatt).
- Malachium aquaticum* Fr. (6—8; Achern, Oensbach).
- Tunica prolifera* Scop. (7—10; Windeck).
- Dianthus Armeria* L. (6—8; Gebüsche bei Sasbachwalden, Lauf).  
 — *superbus* L. (6—9; Wiesen der Rheinfläche, bei Schutterwald, Ichenheim sehr häufig).
- Silene gallica* L. mit var. *quinquevulnera* (7, 8; Niederbühl bei Rastatt).
- Nasturtium anceps* D.C. (6—9; Achern, Gamshurst).
- Cardamine hirsuta* L. (3—5; Achern, Rastatt).

- Cardamine silvatica* Lk. (4—5- Achern häufig).  
— *impatiens* L. (5—7; Yburg).  
*Erysimum cheiranthoides* L. (6—9; Memprechtshofen).  
*Sinapis Cheiranthus* L. (6—7; Rastatt).  
*Berteroa incana* D.C. (7, 8; Strassburg).  
*Teesdalia nudicaulis* R. Br. (4, 5; Sasbachwalden, Waldulm im Gebirge und auch Grossweier auf der Rheinfläche).  
*Corydalis lutea* D.C. (5—9; Achern, Offenburg).  
— *cava* Schw. und Krte. (4, 5; Rastatt).  
— *solida* Sm. (4; ebendasselbst).  
*Thalictrum flavum* L. (6, 7; Memprechtshofen, Altenheim).  
*Anemone silvestris* L. (5; Achern).  
*Ranunculus aconitifolius* L. (5—8; schr verbreitet auf Bergwiesen und bis zur Rheinfläche an der Acher herabsteigend).  
— *Lingua* L. (7, 8; Memprechtshofen, Abtsmoorwiesen).  
— *Flammula* L. und *β. reptans* (6—10; Gräben der Rheinfläche; *β.* selten; Grossweier, Altenheim).  
— *auricomus* L. (4, 5; Obersasbach, häufig).  
— *Philonotis* Ehrh. (5—8; Rencheu, Sumpfplätze).  
*Myosurus minimus* L. (5, 6; Aecker um Achern).  
*Aquilegia vulgaris* L. (6, 7; Windeck).  
*Aconitum Lycoctonum* L. (7, 8; Abtsmoorwald).

---

Nachträge vorbehalten. — Möge dieses reiche Verzeichniss zu recht fleissigem Besuche unseres Gebietes anspornen!

Achern, im August 1884.

Dr. Winter.

---

### Wanderungen im untern Wutachthale und auf den angrenzenden Höhen.

Einsender dieses hatte Gelegenheit, auf einer Ferientour das untere Wutachthal und die dasselbe begleitenden Jura-Höhen einige Tage zu durchstreifen und überzeugte sich bei dieser Gelegenheit, dass diese Gegend in botanischer Beziehung zu den interessantesten unseres Landes gehören dürfte. Die meist steilen Thalwände und die Thaleinschnitte mit Feldern, Wiesen, Wald und Gebüsch bieten dem Auge angenehme Abwechslung. An freundlichen Dörfern vor-