

Nachträge pro 1885

zu

- „Charakteristische Formen der Flora von Achern“.
- Adoxa Moschatellina* L. (3, 4; in grosser Menge im „Brufert“ bei Rastatt; Steinbach).
- Alectorolophus hirsutus* Rehbch. (5, 6; Bergwiesen bei Obersasbach, Sasbachwalden).
- Allium ursinum* L. (4, 5; Rheinwälder bei Helmlingen).
- Anemone ranunculoides* L. („Brufert“ bei Rastatt).
- Aronia rotundifolia* Pers. (4, 5; Baden-Baden, Felsen).
- Berula angustifolia* Koch (7, 8; Obersasbach).
- Bromus tectorum* L. (5, 6; Rastatt).
- Carex tomentosa* L. (5, 6; Rheinwaldungen bei Ichenheim, Memprechtshofen).
- *Hornschuchiana* Hoppe (5, 6; Ichenheim).
- **ligerica** Gay. (5, 6; Achern, Bahndamm).
- Cirsium acaule* All. (7, 8; Ichenheim).
- Coeloglossum viride* Hartm. (5, 7; Ichenheim (W. Baur)).
- Cynoglossum officinale* L. (5—7; Ichenheimer Schweinsweide).
- Dentaria bulbifera* L. (4, 5; Baden-Baden, Schlossberg).
- Gagea lutea* Schult. (4, 5; „Brufert“ bei Rastatt).
- Geum rivale* L. (5, 6; Wiesen zwischen Oos—Baden-Baden).
- Hyoscyamus niger* L. (6, 7; Ichenheimer Schweinsweide).
- Iberis amara* L. (6—8; Ichenheim).
- Iris sibirica* L. (6; Memprechtshofen, Rheinwaldungen).
- Leontodon hastilis* L. β . *glabratus* (6—10; Memprechtshofen).
- Leucojum vernum* L. (2, 3; Achern in Grasgärten; Unzhurst im Bruchwalde und auf Torfwiesen).
- Lithospermum officinale* L. (5—7; Memprechtshofen).
- Lotus tenuifolius* Reichenb. (5—10; Rheinwiesen bei Memprechtshofen).
- Marrubium vulgare* L. (7—9; Schweinsweide bei Ichenheim).
- Melica nutans* L. (5, 6; in grösster Menge im Rheinwalde bei Memprechtshofen).
- Orchis incarnata* L. (6; Sumpfwiesen bei Ichenheim u. Memprechtshofen).
- Orobus tuberosus* L. (4, 5; Waldwiese bei Ebersteinburg).
- Phyteuma nigrum* Schmidt (5, 6; Wiesen zwischen Gamshurst und Unzhurst).

- Polygala amara* L. (6—8; sumpfige Wiesen bei Ichenheim und Memprechtshofen).
Scandix Pecten Veneris L. (5, 6; Ichenheim, unter der Saat).
Scilla bifolia L. (3, 4; Rheinwald bei Helmlingen).
Sedum boloniense Loisl. (6, 7; Rheinwiesen bei Memprechtshofen).
Senebiera Coronopus Poirer (7, 8; Ichenheim).
Sorbus Aria Crantz (5; Baden-Baden, Felsen).
Stellaria glauca Withering (6, 7; Memprechtshofen).
Tamus communis L. (6, 7; Rheinwaldungen bei Memprechtshofen).
***Veronica peregrina* L.** (4, 5; Rheinsumpfungungen bei Memprechtshofen).
Viola elatior Fries (5—7; Waldränder bei Memprechtshofen).
Xanthium strumarium L. (7—10; Wegränder in Ottersdorf und Wintersdorf).
Zanichellia palustris L. (7, 8; Ichenheim, Altrhein).
 Achern, Ende Oktober 1885. Dr. Winter.

Nachtrag

zu dem in Nr. 24 und 25 enthaltenen Verzeichnis.

Nach gefälliger Mitteilung des Herrn Reallehrers Heinrich Waldner in Wassenheim wäre noch anzufügen:

- H. Waldner. Excursionsflora von Elsass-Lothringen. Heidelberg 1876. (Kaiserstuhl und Schwarzwald pag. 78—83.)
 H. Waldner. Beiträge zur Excursionsflora und Flore Vogéso-Rhénane. Heidelberg 1879. (Neue Fundorte von *Cladium* bei Achkarren etc.).
 H. Waldner. Europäische Rosentypen. Mit 1 fotogr. Tafel. 56 Seiten in 4^o. Verlag des Botanischen Vereins von Elsass-Lothringen. 3 M. Enthält auch neue Fundorte von Rosen in Baden.
 H. Waldner. Das oberrheinische Gebiet. Referat an die Commission für die Flora von Deutschland. (In den Berichten der deutschen botan. Gesellschaft.)
 H. Waldner. Deutschlands Farne. Enthält unter anderm auch das *Aspidium angulare* Lej. abgebildet und beschrieben, unicum bei Baden.

Über die Systematik der Brombeeren des rheinischen Gebietes enthält der Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins für Elsass-Lothringen 1884 einen Aufsatz von D. Waldner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1882-1888

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Nachträge pro 1885 zu "Charakteristische Formen der Flora von Achern". 234-235](#)