

## Flechten um Schramberg.

Von Pfr. Goll. (Fortsetzung von Nr. 100).

Im weitem Verlaufe der Zeit wurden entdeckt *Bryopogon bicolor* (Ehrh.) Link ster. im Trombach. *Cladonia silvatica* (L) form. *alpestris* (L) zu Finsterbach; *Parmelia tiliacea* c. fr.; *P. Mugeotii* mit wenigen Früchten am Falkenstein; *P. revoluta* Flk. und *sinuosa* Smft. ster. in Thalabhängen an Tannen zwischen Sulzbach und Lauterbach. *Sticta pulmonaria* (L) zeigte sich ster. im Dunninger Walde; *Xanthoria lichnea* (Ach) Th. Fr. Weiler c. fr. auf altem Holze.

### 3. Krustenflechten.

- Pannaria lanuginosa* (Ach) Körb, ster. Ramsteiner Loch.  
 — *brunnea* (Sw) Mass. c. fr. Gaishalde.  
*Massalongia carnosa* (Decks) Körb. c. fr. Faalkenstein, Berneck, Eselbach, Rohrbach.  
*Gasparrinia murorum* (Amphiloma Körb) an Mauern c. fr.  
*Placodium saxicolum* (Poll) Körb. c. fr. gemein.  
*Rinodina exigua* (Ach) Th. Fr. c. fr.  
 — *atrocinerea* Körb. c. fr.  
 — *caesiella* (Flk) Körb. c. fr. an Gestein des alten Schlosses.  
*Calloporisma vitellina* Ehrh. c. fr. an Holz und Gestein.  
 — *ferrugineum* (Huds) Th. Fr. ebenso.  
 — *cerinum* (Ehrh) Körb. c. fr. an Bäumen.  
*Icmadophila aeruginosa* (Scop) Trev. c. fr. an feuchten Waldstellen.  
*Lecanora sordida* (Pers) Th. Fr. c. fr. Laichbach.  
 — form. *subcarnea* (Sw) Th. c. fr. Rappenfelsen.  
 — *sulphurea* (Hoffm) Ach. Ramstein.  
 — — Hardt. c. fr.  
 — *intumescens* (Rébenst) Körb. c. fr. häufig an Tannen.  
 — *subfusca* (L) Ach. c. fr. in verschiedenen Formen.  
 — *pallida* (Schreb) Körb. c. fr. ebenso.  
 — *varia*. (Ehrh) Ach. c. fr.  
 — *sarcopis* (Whlbrg) Ach. c. fr. altes Holzwerk.  
 — *badia* (Pers) Ach. c. fr. an Gestein.  
 — *polytropa* (Ehrh) Th. Fr. c. fr. ebenso.  
 — *Hageni* (Ach) Körb. c. fr. an Bäumen.

- Aspicilia gibbosa* (Ach) Korb. an Stein gemein.  
 — *cinera* (L) Korb. c. fr. Falkenstein.  
*Ochrolechia pallescens* (L) Korb. c. fr. Hohsteig.  
 — *tartarea* (L) Mass. Lauterbachfelsen.  
*Urceolaria scruposa* (L) Ach. c. fr. an Gestein gemein.  
 — *broyphila* (Ehrh).  
 — form. *albissima* (Ach) *gypsacea* Korb. c. fr. Schlossberg.  
*Pertusaria rupestris* (D.C) Korb. c. fr. Schlossberg.  
 — *communis* (D.C) Hohsteig.  
 — *corallina* (L) Korb. gemein.  
*Bacidia rubella* (Ehrh) Mass. c. fr. Schlossberg, Aichhalden.  
*Bilimbia hypnophila* (Ach) Th. Fr. c. fr. hin und wieder.  
*Biatora lucida* (Ach) Fr. c. fr. Gaishalde, Schiltachthal.  
 — *granulosa* Rabenh. (*decolorans* Fr.) c. fr. Schlossberg, Bauernberg.  
 — *viridescens* (Schr.) Fr. c. fr. mehrwärts.  
 — *fuliginea* (Ach) Fr. c. fr. Ramsteinerloch.  
*Baeomyces roseus* Pers. c. fr. Steigwald.  
*Sphyridium byssnoides* (L) Th. Fr. c. fr. gemein.  
*Rhizocarpon geographicum* (L) D.C. c. fr. Hardt, Reuthe.  
 — form. *atrovirens* Fr. ebenda.  
*Lecidella enteroleuca* Korb. c. fr. überall.  
*Lecidea lapicida* (Ach) Ara. c. fr.  
 — *macrocarpa* (D.C) Th. Fr. c. fr. in verschiedenen Formen häufig.  
 — *crustulata* (Ach) Korb. häufig.  
*Opegrapha varia* Pers., die bekannten Formen.  
*Graphis scripta* (L) Ach. ebenso.  
*Arthonia radiata* (Pers) ebenso wie jene in verschiedenen Formen.  
*Coniocybe furfuracea* (L) Ach. c. fr. über der Gaishalde an Wurzeln, Eselbach.  
*Synechoblastus flaccidus* (Ach) Korb. c. fr. Schlossberg, Gaishalde, Heubach.  
*Collema pulposum* (Bernh) Ach. c. fr.  
*Leptogium lacerum* (Ach) Fr. Berneck, Gaishalde.  
*Polychidium muscicolum* (Sw) Korb. c. fr. Eselbach, Brandsteig.  
*Mallotium tomentosum* (Hoffm) Korb. ster. Schlossberg.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1892-1898

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Goll Wilhelm

Artikel/Article: [Flechten um Schramberg, \(1983\) 60-61](#)