Seele zuwider und wurden von ihm in der ihm eigenen originellen Art abgetan, wo sie ihm gegenübertraten.

Jedes Lob wurde von ihm in seiner schlichten Art abgelehnt. Auf ihn fand der Satz, dass der Mensch seine Sprache dazu habe, seine Gedanken zu verbergen, keine Anwendung; was er dachte und fühlte, sprach er auch aus. Solche durchaus auf sich gegründete Menschen, an denen jeder Zug originell und von keiner Seite entlehnt ist, die weder nach höherer Gunst streben, noch Untergebenen gegenüber durch Stellung und Wissen zu imponieren suchen, werden in unserer heutigen, alles nivellierenden Zeit leider immer seltener.

Die Einfachheit seiner Persönlichkeit und die Ehrlichkeit seines Wesens, seine väterliche Milde, die er gegenüber manchen Verfehlungen walten liess — kleinere Vergehen ahndete er oft nur durch eine humorvolle Bemerkung — waren für die ihm anvertrauten Zöglinge von grösserem erzieherischem Erfolge als eine mit drakonischer Strenge durchgeführte paragraphenreiche Hausordnung. Alle seine einstigen Schüler werden daher auch in späteren Jahren noch immer in Treuen ihres lieben "Papa Leutz" gedenken und das edle Bild ihres väterlichen Freundes und Lehrers stets in ihrem Herzen tragen. Aber auch seine lebenden botanischen Freunde, die ihm "die lieblichste der Wissenschaften" zugeführt hat und mit denen er Wald und Flur durchstreifte, werden dem seltenen Manne noch lange über das Grab hinaus ein ehrendes Andenken bewahren.

Karlsruhe, 9. Januar 1911.

A. Kneucker.

Beiträge zu Badens Käferfauna.

Von F. Hartmann, Fahrnau. (Schluss.)

Hypocyptini.

Hypocyptus seminulum Er. Bei Fahrnau aus Laub gesiebt; an der Wiese bei Lörrach von niedrigen Pflanzen gestreift; unter faulem Laub bei Kleinkems (10.3.10) und Hohe Möhr (24.4.10), bei Efringen auf Gebüsch (17.7.10).

Habrocerini.

Habrocerus capillaricornis Grav. Im Gesiebe häufig; Fahrnau, Gresgen (21.4.07), Efringen (23.5.09), Hünerberg (5.5.10).

Trychophyini.

Trychophyia pilicornis Gyll. Ein Stück bei Fahrnau aufgefunden.

Gymnusini.

Gymnusa brevicollis Payk. Einmal ein Stück dieser seltenen Art am Entegast ausgesiebt.

Myllaenini.

- Myllaena intermedia Er. Im Sande und unter Steinen im Schlierbach gefangen (12.7. und 10.8.08); Hohe Möhr gesiebt (28.3.10).
 - Kraatzi Sharp. Ein Stück am Entegast aus Genist gesiebt (12.4.09).
 - brevicornis Matth. In Gesellschaft der intermedia im Schlierbach gefunden; am Entegast auch aus Moos gesiebt (12.4.09), auf dem Hünerberg aus faulem Laub (5.5.10).

Pronomaeini.

Pronomaea rostrata Er. Bei Kleinkems am 10.3.10 aus faulenden Vegetabilien gesiebt.

Oligotini.

Oligota apicata Er. Fahrnau, am Wege zur Langenfirst an Pilzen (10.8.08).

Bolitocharini.

- Brachida exigua Heer. Am 21.4.07 ein Stück oberhalb Hausen aus Laub gesiebt.
- Gyrophaena obsoleta Ganglb. Fahrnau, auf der Langenfirst am 20.9.08 auf einem alten Baumstumpf an Schwämmen gefunden. Ganglbauer beschreibt die Art vom Wechselgebiet in Niederösterreich, sie scheint weitverbreitet und bisher vielleicht mit ähnlichen Arten verwechselt worden zu sein.
 - affinis Sahlb. An Pilzen; Fahrnau (28.4.97), Schlüchttal (27.5. 97), Efringen (23.5.09).
 - nana Payk. An Pilzen; Fahrnau, Efringen (26.9.09).
 - gentilis Er. Am Entegast an Pilzen (28.4.97).
 - fasciata Marsh. Am Wege zur Langenfirst an Pilzen (13.9.08).
 - laevipennis Kr. In einem Stück bei Achdorf (8/19.6.08) aufgefunden.
 - Poweri Crotch. Bei Fahrnau an Pilzen häufig (28. 4. 97 und 10.8.08).
 - strictula Er. Die häufigste Art, findet sich ebenfalls an Pilzen; Ilünerberg (26.4.95), Schopfheim (25.7.96), am Wieseufer (28.4.97), im Schlüchttal (27.5.97), auf der Langenfirst (10.8.08).
 - polita Grav. Am 13.6.10 auf der Hohen Möhr an Pilzen.
 - laevicollis Kr. Vor längeren Jahren einmal ein Stück und im Herbst 1907 wieder 2 Stück dieser seltenen Art bei Fahrnau aufgefunden.

Placusa atrata Sahlb. Am 16.2.08 am Entegast unter Rinde gefangen. Thectura cuspidata Er. Bei Fahrnau unter Kiefernrinde.

- Homalota plana Gyll. In Gesellschaft der Placusa atrata am gleichen Ort gefunden.
- Leptusa haemorrhoidalis Heer. Fahrnau, in der Moosmatt unter Eichenrinde im April; am Entegast (16.2.08); auf der Langefirst unter Rinde (8.12.09).
 - ruficollis Er. Mit der vorigen Art zusammen unter Rinde gefunden am Entegast (16.2.08), bei Gresgen ausgesiebt (21.4.07).
 - globulicollis Rey. Auf der Langenfirst aus dem Mulm eines faulen Baumes ein Stück gesiebt (5.4.96), nach Ganglbauer (Käfer Mitteleuropas B. II. p. 279) ist diese Art bis jetzt in der Schweiz, Bayern und Kärnten nachgewiesen worden. Schilsky führt die Art in seinem Verzeichnis als im Schwarzwald vorkommend auf. Am 28.3.10 in grösserer Anzahl am südlichen Abhang der Hohen Möhr in Moos aufgefunden.
- Euryusà optabilis Heer. Am 23.5.09 fand ich ein Stück unter fauler Weidenrinde bei Efringen, ein weiteres Exemplar am gleichen Ort am 26.9.09 aus feuchtem Laub gesiebt; am Entegast bei Lasius niger an alten mit Moos bewachsenen Eichen (20.3.10), auf dem Eggberg bei Säckingen bei Lasius brunneus (17.6.10).
 - sinuata Er. Am Entegast unter Eichenrinde bei Lasius brunneus (2.5.97).
- Bolitochara bella Märk. Häufig an Pilzen; Fahrnau (25.7.96), Schlüchttal (27.5.97).
- Autalia impressa Ol. In Pilzen; im Oktober 1907 im Holderboden auf dem Hünerberg, auf der Langenfirst (20.9.08).
 - rivularis Grav. Auf dem Eggberg bei Säckingen am 17.6.10 unter feuchtem Laub.

Myrmedoniini.

- Falagria sulcata Payk. und F. obscura Grav. Häufig unter Steinen, unter faulen Vegetabilien und im Gesiebe; Fahrnau, Achdorf (8./19.698), Kleinkems (10.3.10).
 - nigra Grav. Am Entegast unter Weidenrinde (27.9.08), am Wieseufer oberhalb Fahrnau unter Steinen (24.7.10).
- Tachyusa umbratica Er. Fahrnau, vor längerer Zeit einmal ein Stück aufgefunden.
 - constricta Er. Häufig im Schlierbach den ganzen Sommer hindurch unter Steinen.
 - balteata Er. Zahlreich an sandigen trockenen Stellen der Wutach bei Achdorf (8./19.6.08).
- Atheta fragilis Kr. Von dieser seltenen Art fand ich ein Stück bei Achdorf (8./19.6.08).
 - luridipennis Mannh. Fahrnau.
 - elongatula Grav. Fahrnau und Achdorf (8./19.6.08).
 - hygrotopora Kr. Hohe Möhr am 24.4.10 aus Genist.

- Atheta gemina Er. Am 26.6.10 auf der Hohen Möhr an Buchensaft.
 - deplanata Grav. Aus faulem Buchenlaub auf dem Hünerberg (5.5.10).
 - angustula Gyll. Fahrnau, am Entegast aus Laub gesiebt (22.3.08).
 - aequata Er. Unter Eichen und Buchenrinde, auch an Pilzen; Fahmau (25.7.96), im Kratten aus Moos gesiebt (12.4.09), Langefirst (5.12.09), Entegast (20.3.10), Hünerberg (6.3.10).
 - linearis Grav. Aus Mulm gesiebt bei Fahrnau, Hohe Möhr aus Moos (28.3 10).
 - brunnea F. Mit der folgenden Art,
 - occulta Er., bei Fahrnau aus Laub gesiebt.
 - arcana Er. Auf dem Entegast unter Laub (5.5.10).
 - amicula Steph. Fahrnau, unter Eichenrinde im April gefunden in Gesellschaft von
 - gagatina Baudi.
 - myrmecobia Kr. Im Nest der Formica rufa, Hünerberg (10.4.10).
 - sodalis Er. Bei Fahrnau an Pilzen aufgefunden.
 - pallidicornis Thoms. In der Moosmatt unter Eichenrinde im April.
 - nigritula Grav. In Pilzen bei Fahrnau.
 - nitidicollis Fairm. In Anzahl durch Aussieben von Laub und Moos erbeutet; Hohe Möhr (24.4.10) und Hünerberg (5.5.10).
 - crassicornis F. Bei Fahrnau in Pilzen aufgefunden (29.9.08), auch vom Feldberg in meiner Sammlung.
 - euryptera Steph. Bei Fahrnau im Sommer 1895 an Eichensaft gefunden, auf der Hohen Möhr im Genist eines Baches (24.4.10).
 - castanoptera Mannh. Fahrnau, aus feuchtem Buchenlaub gesiebt (März 95).
 - hypnorum Kiesw. Fahrnau.
 - pagana Er. Gesiebt aus Laub bei Kleinkems (10.3.10).
 - longiuscula Grav. Fahrnau, im Kratten am 12.4.09 aus Moos, bei Efringen am 23.5.09 aus Genist gesiebt.
 - cadaverina Bris. Im April unter Eichenrinde in der Moosmatt gefunden.
 - picipennis Mannh. Fahrnau.
 - putrida Kr. In der Sengele bei Schopfheim am 15.6.10 an Eichensaft.
 - marcida Er. Am Entegast an Pilzen und unter Rinde (16.2.08) aufgefunden.
 - ? Zosterae Thoms. Am 10.4.10 auf dem Hünerberg bei Formica rufa.
 - longicornis Grav. Fahrnau; am Ufer des Feldsees aus Moos gesiebt (31.7.10).
 - pygmaea Grav. Fahrnau, im Kratten unter Moos (12.4.09).
 - aterrima Grav. An Eichensaft am 15.6.10 in der Sengele bei Schopfheim.

- Atheta parens Rey. Auf dem Hünerberg 5.5.10 aus faulem Buchenlaub.
 - orphana Er. Mit der vorigen gleichzeitig zusammen aufgefunden.
 - fungi Grav. Am Entegast aus Mulm gesiebt (6.9.08 und 8.5.10), im Kratten aus Moos (12.4.09), bei Efringen aus feuchtem Laub (26.9.09), Hohe Möhr aus Moos (28.3.10), Hünerberg (5.5.10).
 - ? clientula Er. An der Hohen Möhr aus dem Genist eines Baches gesiebt (24.4.10).
 - laticollis Steph. Am Entegast aus Moos gesiebt (22.3.08), Hünerberg am 5.5.10 aus Laub.
 - subsinuata Er. Fahrnau.
 - analis Grav. Aus Laub gesiebt, früher und auch wieder am 5.5.10 auf dem Hünerberg aufgefunden.
 - talpa Heer. In den Nestern von Formica rufa, am Entegast und Kürnberg (24.6.02), Hünerberg am 10.4. und 5.5.10.
 - exilis Er. Aus Moos auf dem Hünerberg (6.3.10), Hohe Möhr (28.3. und 24.4.10).
- Sipalia circellaris Grav. Fahrnau, bei Formica rufu; unter Steinen bei Achdorf (8./19.6.08), unter Fichtenrinde auf der Langefirst (13.9.08), Entegast unter Rinde (16.2.08 und 27.9.08), gesiebt aus Moos am Entegast (22.3.08), aus faulenden Pflanzenstoffen bei Efringen (20.9.09), Hohe Möhr (28.3.10), auf dem Hünerberg bei Formica rufa (5.5.10).
- Notothecta flavipes Grav. In den Nestern von Formica rufa; Entegast (23.5.95), Hünerberg (10.4.10).
 - anceps Er. Mit der vorigen Art bei der gleichen Ameise; Hohe Möhr (16.5.97) und Kürnberg (24.6.02), auf dem Hünerberg (10.4.10).
- Thamiaraea cinnamomea Grav. Fand ich in Gesellschaft von Th. hospita Maerk. im Sommer 1895 an aussliessendem Eichensaft am Entegast. Beide Arten sind selten.
- Astilbus canaliculatus F. Überall häufig und zu jeder Jahreszeit unter Laub, Moos und Steinen aufzufinden.
- Zyras collaris Payk. Einmal bei Fahrnau gefunden, ein weiteres Stück aus einem faulen Weidenstock bei Aselfingen im Wutachtal ausgesiebt (8./19.6.08).
 - funestus Grav. Im Mai 1893 auf dem Rosskopf bei Freiburg unter einem Stein aufgefunden, bei Kleinkems am 10.3.10 in einem Nest von Lasius fuliginosus in Anzahl.
 - humeralis Grav. Auf dem Eggberg bei Säckingen am 17.6.10 ausgesiebt aus einem Formica rufa-Nest, das am Fusse einer alten Eiche angelegt war.
 - limbatus Payk. und Z. laticollis Maerk. In früheren Jahren bei Fahrnau erbeutet.

- Lomechusa strumosa F. Auf der Hohen Möhr (16.5.97) und im Schlüchttal (27.5 97) in Gemeinschaft mit Herrn Prof. Förster bei Formica sanguinea aufgefunden. Die Nester der Ameise befanden sich in faulen Fichtenstöcken.
- Atemeles emarginatus Payk. Zwei Stücke fand ich einmal auf dem Hünerberg in einem Ameisennest, das an einen Grenzstein angebaut war; da ich leider keine Ameise mitnahm, kann ich deren Art nicht angeben. Ein drittes Stück siebte ich am Entegast aus Moos (5.4.96).

Aleocharini.

- Phloeopora testacea Mannh. Fahrnau, in der Moosmatt unter fauler Eichenrinde (21.4.95), unter Rinde am Entegast (25.5.97).
 - angustiformis Baudi. Fahrnau, unter Eichenrinde (21.4.95) und unter Weisstannenrinde am Hünerberg (24.10.08).
 - teres Grav. Am Entegast unter Rinde (2.2.08).
 - corticalis Grav. Unter Nadelholzrinde in früheren Jahren in zwei Stücken aufgefunden.
- Ilyobates nigricollis Payk. Von dieser seltenen Art erbeutete ich vor längeren Jahren zwei Exemplare durch Aussieben von Laub auf der Langefirst bei Fahrnau; auf dem Eggberg (17.6.10).
- Chilopora longitarsis Er. Fahrnau, am Ufer der Wiese (20.5.95 und 4.6.07), auf dem Willaringer Torfmoor; Achdorf am Ufer der Wutach (8./19.6.08), unter Steinen im Schlierbach sehr häufig (22.5.10), Hünerberg aus Moos (16.10.10).
- Ocalea badia Er. Fahrnau, auf der Langefirst unter Moos (Oktober 1907), Efringen unter feuchtem Laub (26.9.09).
 - picata Steph. Am Entegast gesiebt aus dem angeschwemmten Genist eines Baches (22.3.08), im Kratten aus Moos (12.4.09 und 22.5.10).
- Oxypoda lividipennis Steph. Häufig im Frühjahr im Gesiebe aus feuchtem Laub und Moos; Fahrnau, Kratten (22.5.10).
 - opaca Grav. Wie die vorige Art vorkommend, Fahrnau (4.95), Efringen (8.6.09 und 26.9.09).
 - vittata Maerk. Auf dem Eggberg bei Säckingen am 17.6.10 aus Laub gesiebt.
 - longiuscula Grav. Am südlichen Abhang der Hohen Möhr am 28.3.10 in grosser Anzahl aus Moos gesiebt.
 - praecox Er. Bei Efringen aus feuchtem Laub gesiebt (26.9.09), ebenso auf dem Hünerberg (5.5.10).
 - alternans Grav. Im Frühjahr 1907 am Wege zur Langefirst an Pilzen gemein; bei Efringen an Schwämmen alter Weiden (26.8.09).
 - formosa Kr. An der Sengele bei Schopfheim am 15.6.10 an Eichensaft.

- Oxypoda haemorrhoa Mannh. und O. formiceticola Maerk. in grosser Anzahl beim Aussieben der Nester von Formica rufa am 10.4. und 5.5.10 auf dem Hünerberg erbeutet.
 - brachyptera Steph. In einem Stück mit den vorigen am 5.5.10 in den gleichen Nestern.
- Stichoglossa prolixa Grav. Diese Art fand ich unter Rinden in der Moosmatt (21.4.95).
- Thiasophila angulata Er. In den Nestern der Formica rufa in grosser Anzahl; Hohe Möhr (16.5.97), Kürnberg (24.6.02), Hünerberg (10.4. und 5.5.10).
- Microglossa pulla Gyll. Am 1.7.09 bei Fahrnau auf Lindenblüten ein Stück gefunden, ein zweites bei Efringen aus feuchtem Laub gesiebt am 26.9.08.
- Homoeusa acuminata Maerk. Am Entegast unter Moos an Eichen bei Lasius fuliginosus (23.5 95), im Kratten unter Steinen bei der gleichen Ameise (2.5.97).
- Dinarda dentata Grav. In den Nestern der Formica sanguinea; auf der Hohen Möhr (16.5.97) und im Schlüchttal (27.5.97) in Gesellschaft der Lomechusa strumosa aufgefunden.
 - v. Maerkeli Kiesw. Ein Stück auf dem Hünerberg bei Formica rufa (10.4.10).
- Aleochara curtula Goeze. Häufig in Dünger; Fahrnau (28.5.96).
 - crassicornis Lac. Weniger häufig wie die vorige, am Entegast gesiebt (28.3.97), Isteiner Klotz (23.3.96), Achdorf (8./19.6.08).
 - brevipennis Grav. Fahrnau, am Ufer der Wiese (20.5.97 und 20.7.02), am Entegast gesiebt (28.3.97).
 - morion Grav. Selten, bis jetzt nur 1 Stück bei Fahrnau aufgefunden.
 - tristis Grav. In Mist; Fahrnau und Achdorf (8./19.6.08).
 - moesta Grav. An Eichensaft im Kratten, aus Laub gesiebt am Entegast (20.7.02 und 22.3.08).
 - lanuginosa Grav. Eine der häufigsten Arten, lebt in Rindermist; Fahrnau, Belchen und Feldberg fast zu allen Zeiten anzutreffen.
 - villosa Mannh. Fahrnau in Dünger.
 - diversa J. Sahlb. An Eichensaft im Kratten gefunden, selten.
 - sanguinea L. Einmal bei Fahrnau erbeutet.
 - laevigata Er. Fahrnau.

Nachtrag.

(Die Namen der neu aufgefundenen Arten sind fett gedruckt). Cerambycidae.

Calamobius filum Rossi. Ein Stück dieser Art fand ich am 8.6.09 bei Efringen auf Pappelgebüsch.

Agapanthia cardui L. Auf dem Isteiner Klotz auf blühendem Schwarzdorn (8.609), am Rheinufer bei Efringen von Erlen geklopft (17.7.10).

Chrysomelidae.

- Cryptocephalus marginellus Ol. Zwei Stücke dieser seltenen Art bei Achdorf von niedrigen Pflanzen gestreift (8./19.6.08).
- Haltica tamaricis Schrank. Fand ich am Rheinufer bei Efringen auf Hippophaë rhamnoides ziemlich häufig (8.6.09).
- Phyllotreta nodicornis Marsh. Auf dem Wege von Achdorf nach Blumberg auf Reseda lutea 1 & (8./19.6.08), ein 2 auf der gleichen Pflanze am 8.6.09 auf dem Isteiner Klotz.
- Longitarsus rubiginosus Foudr. Am 26.9.09 bei Efringen von niedrigen Pflanzen gestreift.
- Cassida azurea F. (ornata Creutz). Ein Stück streifte ich von niedrigen Pflanzen auf dem Wege von Achdorf nach Aselfingen (8./19.6.08).
- Orina alpestris polymorpha ab. umbrosa Weise. Beim Eingang in das Gauchachtal bei der Wutachmühle auf Petasitesblättern.
- Mniophila muscorum Koch. Am Ufer des Feldsees aus Moos gesiebt (31.7.10).

Curculionidae.

- Otiorhynchus sulcatus F. Die wohlerhaltenen Flügeldecken eines Exemplares dieser Art fand ich im Hochwassergenist der Wiese oberhalb Fahrnau (22.3.08).
 - uncinatus Germ. Bei Aselfingen im Wutachtal 1 Stück aus dem Mulm eines faulen Weidenbaumes ausgesiebt (8./19.6.08).
- Liparus glabrirostris Küst. Von Strassenwart Rötheler in Aselfingen auf der Strasse nach der Wutachmühle aufgefunden (Frühjahr 1908) und mir übergeben.
- Cotaster uncipes Boh. In Gesellschaft des Otiorhynchus uncinatus und im nämlichen Gesiebsel aufgefunden (Aselfingen 8./19.6.08).
- Bagous claudicans Boh. Am Rheinufer bei Efringen aus feuchtem Genist ausgesiebt (23.5.09).
- Ceuthorhynchus rusticus Gyll. Auf dem Rheinvorlande bei Efringen ein Stück von niedrigen Pflanzen gestreift (8.6.09).
- Gymnetron antirrhini Payk. In meinem Garten auf Johannisbeeren (5.895), bei Achdorf von niedrigen Pflanzen gestreift (8./19.6.08).
 - bipustulatum Rossi. Zahlreich mit der ab. fuliginosum Rossi in steinigem Gelände bei Istein auf Scrophularia canina (8.6.09).
- Miarus longirostris Gyll. Auf Campanula persicifolia bei Efringen (8.6.09).
 - micros Germ. Auf niedrigen Pflanzen am Ufer der Wutach bei Achdorf (8./19.6.08).

- Cossonus parallelepipedus Hrbst. Zahlreich unter fauler Weidenrinde bei Efringen am 23.5.09 aufgefunden; am 8.6.09 ausgesiebt aus Laub am Fusse einer Pappel am gleichen Ort.
 - linearis F. Ein Stück am 8.6.09 gleichzeitig mit der vorigen Art aus Laub ausgesiebt.
- Apion ervi Kby. Bei Efringen auf dem Rheinvorlande von Gebüsch geklopft (17.7.10).
 - astragali Payk. Mit dem vorigen am gleichen Ort aufgefunden. lpidae.
- Ips curvidens Germ. Am 5.9.08 fand ich auf dem Hünerberg 3 und 2 an Fichten; an 4.10.08 eine grössere Anzahl 2 ebenfalls auf dem Hünerberg an alten Weisstannen gerade im Begriff sich in die Rinde einzubohren. Einzelne Bäume waren schon eingegangen und der ganze Bestand an Tannen musste im Jahre 1909 geschlagen werden.
- Xyleborus Saxeseni Ratzeb. Aus einer vom Winde gefällten alten Weide schnitt ich am 17.5.08 zwei 9 und am 27.9.08 1 3 und 1 9 dieser Art heraus, ebenso von
 - dispar F. an demselben Baum am 17.5.08 3 ♀ und am 23.8.08 1 ♂; Entegast, am Ufer der Wiese.
- Xyloterus domesticus L. Am 5.12.09 fand ich & und Q unter der Rinde morscher Buchenstöcke am Wege zur Langefirst.

Mitteilung.

In Nr. 239 der "Mitteilungen" vom 9. Juli 1909 veröffentlichte ich S. 308 eine Bitte an die Mitglieder unseres Vereins um Einsendung von Dubletten interessanter Pflanzen aus unserer heimatlichen Flora an das Grossh. Naturalienkabinet in Karlsruhe zum Zwecke der Anlage eines badischen Landesherbariums in Verbindung mit dem Naturalienkabinet. Bis jetzt sind folgende Zuwendungen gemacht worden:

- 1. Von Herrn Baron H. von Türckheim etwa 130 Exemplare sehr gut präparierter Pflanzen aus der Gegend von Lahr.
- Von unserem Vereinsmitgliede Herrn Apotheker Kopp aus Bruchsal ein allgemeines Herbar mit über 2000 Arten (darunter auch viele aus Baden) und eine schöne Sammlung Characeen.
- 3. Von Anna Freifrau Rüdt von Collenberg das sehr schöne, gut erhaltene, etwa 4-5000 Arten enthaltende allgemeine Herbarium ihres verstorbenen Herrn Gemahls, K. v. Rüdt, des früheren Ersten Präsidenten der I. Bad. Ständekammer. Das Herbar enthält auch sehr viele Pflanzen aus Baden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.</u>

Jahr/Year: 1911-1915

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Hartmann Fr.

Artikel/Article: Beiträge zu Badens Käferfauna. (1911) 30-38