

Senecio vernalis W. & K. Tritt in diesem Jahre (1913) in der Rheinebene zwischen Mannheim und Weinheim auf sandigen Äckern ungemein zahlreich auf und färbt ganze Strecken in der Luzerne gelb. Es finden sich 3 Formen: a) *f. typica Fr. Zimm.*, b) *f. glabrata Ascher.*, c) *f. discoidea Fr. Zimm.* Letztere bis jetzt sonst noch nirgends festgestellt. (Blütezeit: 1. Mai 1913.) F. Zimmermann.

Standorte badischer Farne und deren Formen¹.

Mitgeteilt von A. Löscher in Kirchzarten.

(Fortsetzung.)

Scolopendrium vulgare Sw. Oberschaffhausen, Gottenheim, Waltershofen, Kiechlinsbergen, Höllental, Hochburg, Kenzingen, Wiesental, Wehratal.

Athyrium filix-femina Roth. f. fissidens Döll. Aasen, Donaueschingen, Döggingen, Hinterzarten, Zastler, Höllental, Freiburg, Müllheim, Baden-Baden.

— — — *f. multidentatum Döll.* Kirchzarten, Höllental, Steinwasen, Feldberg, Baden-Baden.

— — — *f. elongatum Woll.* Ebersteinburg.

— — — *f. rhaeticum Moore.* Baden-Baden.

Missbildungen:

— — — *f. monstrosum dichotomum Klf.* Feldberg, Freiburg, Wolterdingen.

— — — *f. monstrosum laciniatum Moore.* Hirschsprung.

Athyrium alpestre Nyl. f. fissidens. Feldberg, Kandel, Kirnachtal.

— — *f. multidentatum.* Feldberg.

— — *f. lusus flexible Lowe.* Feldberg.

— — *f. inexplicatum Moore.* Feldberg.

Missbildungen:

— — *f. monstrosum bifidum.* Feldberg.

— — — *glomeratum Baenitz.* Feldberg.

— — — *furcatum.* Feldberg.

Asplenium viride Huds. Meersburg, Wolterdingen, Grimmelshofen, Feldberg, Liel.

— — *f. sectum Milde.* Fürstenberg.

Missbildungen:

— — *f. monstrosum furcatum.* Höllental.

— — *trichomanes Huds. f. lobatum-crenatum DC.* Isteiner Klotz.

¹ Die Standortsangaben machen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

- — *f. auriculatum* Milde. Hirschsprung.
- — *microphyllum* Milde. Höllental, Kleinlaufenburg.
- — *f. umbrosum* Milde. Bötzingen.
- — *f. monstrosum furcatum* Milde. Forbach, Burg Eberstein, Oberwinden, Himmelreich, Todtnau, Kappel bei Freiburg, Bötzingen.
- — *f. multifidum* Moore. Präg.
- *septentrionale* Hoffm. *f. depauperatum* Christ. Wertheim.
- — *f. simplex* Inst. Schm. Todtnau.
- *adiantum nigrum* L. Die badischen Formen schwanken zwischen *lancifolium* Heuf., *argentum* Heuf. und *obtusum* Milde: Kaiserstuhl, Zastler, Freiburg, Langackern, Gengenbach, Ettlingen, Eberstein, Kappelrodeck, Heidelberg, Schriesheim.

Missbildungen:

- — — *f. monstrosum furcatum*. Zastler.
- Phegopteris polypodioides* Fée. var. *obtusidentatum* Warnsdorf. Hubertshofen, Aasen, Schmelzplatz, Todtnau.
- — var. *laxum* J. Schm. Hofgrund.
- — var. *nephrodioides* Christ. Ravennaschlucht.
- — var. *alatum* Krieg. Schmelzplatz.

Missbildungen:

- — *f. monstrosum bifidum* J. Schm. Waldhausen, Zastler, Schmelzplatz.
- — var. *monstrosum geminatum*. Schmelzplatz.
- *dryopteris* Fée. Missbildung: *f. monstrosum furcatum*. Donaueschingen.
- *Robertiana* Al. Br. Missbildung: *f. monstrosum furcatum*. Günterstal.

Aspidium lonchitis Sw. *f. imbricatum* Geisenh. Feldberg.

Missbildungen:

- — *f. monstrosum bifidum*. Feldberg.
- — — *furcatum*. Ebd.
- *lobatum* Sw. *f. typicum remotum*.
- — *f. typicum versus aristatum* Christ. Belchen.
- — *f. typicum versus umbraticum* Kee. Zastler, Hirschsprung, Rosskopf bei Freiburg, Ballrechten, Baden-Baden, Weinergarten.
- — *f. typicum versus umbraticum remotum*. Zastler, Hirschsprung.
- — *f. — — umbraticum angustilobum laxum*. Zastler.
- — *f. — — subtripinnatum*. Baden-Baden, Bohrertal bei Freiburg.

- — — — — *remotum*. Zastler.
— — — — — *macrolobum*. Baden-Baden.
— — — — — *auriculatum*. Hirschsprung, Steinwasen bei Oberried, Wolfach.
— — — — — *remotum*. Zastler, Steinwasen.
— — — — — *microlobum angustatum*. Zastler.
— — — — — *rotundatum*. Zastler, Baden-Baden.
— — *f. umbraticum Kze.* Zastler, Hirschsprung, Günterstal, Baden-Baden, Weingarten.
— — — — — *laxum remotum*. Zastler.
— — — — — *versus subtripinnatum*. Ebd.
— — — — — *auriculatum*. Zastler, Steinwasen bei Oberried, Rosskopf bei Freiburg, Hirschsprung.
— — — — — *microlobum*. Zastler.
— — — — — *rotundatum*. Hirschsprung.
— — — — — *sbf. angustilobum*. Baden-Baden.
— — *f. subtripinnatum Milde*. Zastler, Bohrer bei Freiburg, Ballrechten, Baden-Baden.
— — *auriculatum Luerssen*. Zastler, Kybfelsen bei Freiburg, Badenweiler, Yburg.
— — — — — *versus subtripinnatum*. Zastler, Belchen, Baden-Baden.
— — — — — *laxum versus microlobum*. Zastler.
— — *f. microlobum Milde*. Baden-Baden, Yburg.
— — — — — *laxum*. Zastler.
— — — — — *platylobum Milde*. Zastler.
— — — — — *Plukenetii Loisl.* Zastler, Freiburg, Weingarten.
— — — — — *rotundatum Döll.* Feldberg, Belchen.
— — — — — *microlobum*. Baden-Baden.
— — — — — *aristatum Christ.* Zastler.
— — — — — *auriculatum versus microlobum*. Baden-Baden.
— — — — — *versus rotundatum*. Feldberg.
— — — — — *umbraticum*. Feldberg.
— — — — — *suptripinnatum*. Zastler.
— — — — — *pseudangulare Wilezck & Wirtgen*. Baden-Baden.

M i s s b i l d u n g e n :

- — — — — *monstrosum furcatum*. Zastler, Feldberg, Baden-Baden, Yburg.
— — — — — *daedaleum*. Zastler.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1911-1915

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Lösch Alfred

Artikel/Article: [Standorte badischer Farne und deren Formen \(1913\) 281-283](#)