©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Standorte badischer Farne und deren Formen.

Mitgeteilt von A. Lösch in Kirchzarten.

(Fortsetzung)

Aspidium aculeatum Sw. = *A. angulare Kist.* Günterstal, Rosskopf bei Freiburg, Langeneck (Münstertal), Yberg und Baden-Baden.

— *aculeatum var. hastulatum Kze.* Günterstal, Langeneck, Yberg, Baden-Baden.

— *aculeatum hastulatum microphyllum.* Langeneck, Baden-Baden.

— *aculeatum var. capellianum Christ in lit.* Baden-Baden.

— *aculeatum var. auriculatum Christ.* Yberg, Schweighof.

— *aculeatum var. umbraticum.* Langeneck.

— *aculeatum var. microlobum Warnsd.* Yberg, Baden-Baden.

Missbildungen:

— *aculeatum bifidum.* Baden-Baden.

— *aculeatum furcatum bifidum.* Baden-Baden.

— *aculeatum bifidum daedaleum.* Baden-Baden.

Aspidium lobatum × *aculeatum Christ.* = *Aspidium Bicknellii Christ.* Günterstal, Baden-Baden.

— *lobatum* × *aculeatum var. hastulatum.* Günterstal, Baden-Baden.

— *lobatum* × *aculeatum var. hastulatum auriculatum.* Langeneck.

Missbildungen:

— *lobatum* × *aculeatum bifidum.* Baden-Baden.

Aspidium lobatum × *Braunii Milde* = *A. Luerssenii Doerfler.* Zastler, Wehratal.

— *lobatum* × *Braunii var. subtripinnatum Milde.* Zastler, Hirschsprung.

— *lobatum* × *Braunii var. macrolobum.* Wehratal.

— *lobatum* × *Braunii var. microlobum.* Wehratal.

Missbildungen:

— *lobatum* × *Braunii bifidum.* Zastler.

Aspidium Braunii Spenn. Zastler, St. Wilhelm, Hirschsprung, Wehratal.

— *Braunii var. subtripinnatum.* Zastler, Hirschsprung, Wehratal.

— *Braunii var. rotundatum Christ.* Hirschsprung.

— *Braunii var. microlobum.* Zastler.

©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Missbildungen:

— *Braunii Spenn. erosum.* Zastler.
— *Braunii bifidum.* St. Wilhelm.
— *Braunii furcans.* Zastler.
— *Braunii furcatum.* Hirschsprung.
— *Braunii var. subtripinnatum daedaleum.* Zastler.

(Fortsetzung folgt.)

Rubus-Funde im Gebiete der Freiburger Flora.

Mitgeteilt von Dr. A. Thellung - Zürich [1].

R. apiculatus Weihe. Lorettoberg 1900, 1903 (?).

R. Bellardii W.N. Ravennaschlucht im Höllental 1903.

R. bifrons Vest. Zwischen Lorettoberg und Kreuzkopf 1900, Waldrand an der Waldseestrasse 1903. Eine der häufigsten und leichtest kenntlichen Arten.

R. caesius L. α ligerinus Genev. Deicheleweier bei Freiburg 1903.

R. caesius X *thyrsoideus Wimm.* (?) Kiesgrube beim Rennweg in Freiburg 1903.

R. caesius X *tomentosus* = *R. divergens P.J.M.* Lorettoberg (S. W.-Abhang) 1903.

R. hebecaulis Sudre ? Waldsee bei Freiburg 1903.

R. impolitus Sudre (?). Kyburg bei Freiburg 1903.

R. Menkei W.N. Zwischen Hirzberg und St. Ottilien bei Freiburg 1903, Ravennaschlucht im Höllental 1903.

R. procerus P.J.M. Zwischen Kyburg und Friedrichshof bei Freiburg 1903, Isteiner Klotz 1903.

R. rivularis P.J.M. (s. l.). Sternwald-Günterstal bei Freiburg 1903.

R. sulcatus Vest. Zwischen Hirzberg und St. Ottilien b. F. 1903.

R. tereticaulis P.J.M. (s. l.). Sternwald-Günterstal b. Freiburg 1903.

R. thyrsanthus Focke (?). Hirzberg am Schlossberg 1900.

R. tomentosus Borkh. St. Valentin bei Freiburg 1903.

[1] Sämtliche Pflanzen sind von Professor H. Sudre in Toulouse bestimmt bezw. revidiert worden. Wenn bei einzelnen die Bestimmung zweifelhaft bleiben musste, so ist dies nicht die Schuld des ausgezeichneten Monographen, sondern eine Folge unvollständigen Einsammelns der Exemplare. „Rubus-Exsikkaten ohne Schössling und Stengelblätter sind im allgemeinen unbestimmbar" (Sudre).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.

Jahr/Year: 1911-1915

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Lösch Alfred

Artikel/Article: Standorte badischer Farne und deren Formen. (1914) 344-345