©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz	N. F. **10**	3	549–557	Freiburg im Breisgau 1. August 1972

Pflanzenstandorte vom Hochrheingebiet, Südschwarzwald und Klettgau

von

ROBERT THOMMA, Oberhof *

Durch verschiedene Fundberichte, die in den vergangenen Jahren in den „Mitteilungen des Bad. Landesvereins" erschienen sind, wurde ich angeregt, auch einige meiner botanischen Funde der letzten zwanzig Jahre zu veröffentlichen.

In den Jahren 1920 und 1921 hat der Schweizer Botaniker BECHERER in den „Mitteilungen" über zahlreiche Funde aus dem genannten Gebiet berichtet. Diese Angaben liegen nun schon fünfzig Jahre zurück. In dieser Zeit hat sich die Landschaft durch vielerlei Einflüsse verändert. Vieles davon konnte bestätigt werden, manches scheint leider verschollen zu sein. Wertvolle Fundangaben aus dem Klettgau finden sich in der „Flora des Kantons Schaffhausen" (1937—1945) von G. KUMMER.

Die Reihenfolge der Pflanzen und die Nomenklatur richten sich nach der Exkursionsflora von OBERDORFER, 3. Auflage.

Jeder Fundstelle sind die Nummer der Topographischen Karte und die Gemarkung vorangestellt. Manche dieser Gemarkungsnamen sind bereits oder werden in den nächsten Jahren im Zuge der Verwaltungsreform verschwinden. Doch verbleibe ich bei den alten Namen, da ein Auffinden der Standorte mit den Topographischen Karten besser möglich ist. Die Fundangaben des Verfassers sind mit TH. abgezeichnet. Zahlreiche Angaben verdanke ich Prof. LUDWIG MAYER, Waldshut, dem langjährigen Beauftragten für Naturschutz im Landkreis Waldshut und dem besten Kenner der Orchideen im Gebiet. Doch wurde auf die Veröffentlichung der vielen Orchideenstandorte verzichtet, da der Schutz der Pflanzen Vorrang hat. Dank gebührt auch Dr. H. FECHTER, Waldshut.

Lycopodiella inundata (L.) HOLUB

(8114) Schluchsee: „Unterkrumen" auf Torfschollen am Ufer. TH. 1970 —
(8114) Menzenschwand: Scheibenlechtenmoos, MAY. 1919—1968 —

Lycopodium clavatum L.

(8215) Amrigschwand: „Rosen" in ca. 740 m FECH. 1966—1968 —

Matteuccia struthiopteris (L.) TODARO

(8216) Bettmaringen: Steinatal ca. 700 m unterh. Illmühle, FECH. 1961, TH. 1970 — 2. bekannter Standort im Steinatal.

* Anschrift des Verfassers: Oberlehrer R. THOMMA, 7881 Oberhof, Ldkr. Säckingen, Schulhaus.

©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM.

(8316) Grießen: oberes Netzbachtal, TH. 10. 1952 —
(8315) Tiengen: Wutachufer b. Lauffenmühle zahlr. MAY., TH. 4. 1966 —
(8315) Waldshut: „Haspel", FECH. 1966, Standort verschollen, —

Tofieldia calyculata (L.) WAHLENB.

(8116) Lembach: „Kalkofen" an Straßenböschung, FECH. 1949 —

Anthericum liliago L.

(8315) Aichen: Schlüchttalhalde gegen Witznau, TH. 6. 1950 —
(8315) Berau: Hänge zum Schlücht- u. Schwarzatal b. Witznau, MAY., TH. 1950 — Schlüchttal unterh. Schwedenfelsen, TH. 6. 1968 —
(8314) Buch: an der Albstalstraße bei Tunnel, TH. 6. 1955 —
(8216) Lembach: „Reute" im lichten Wald vereinz., TH. 8. 1969 —
(8416) Reckingen: Trockener Steilhang nö. Dorf, TH. 8. 1969 —

Scilla bifolia L.

(8414) Luttingen: Rheinufer und Dorfwiesen, zurückgehend, TH. 3. 1953 —
(8315) Waldshut: „Singeln", MAY. u. TH. 3. 1967 —

Polygonatum verticillatum (L.) ALL.

(8314) Immeneich: Albufer in ca. 620 m Höhe, TH. 6. 1953 —
(8216) Bettmaringen: Steinatal b. 600 m, FECH. 1969 —

Streptopus amplexifolius (L.) DC.

(8114) Menzenschwand: Krunkelbachtal bei 950 m, MAY. 1950 — im Möslewald ca. 900 m, MAY. 1970 —

Tamus communis L.

Die Pflanze zeigt eine besondere Häufigkeit im Gebiet von Waldshut-Gurtweil.
(8315) Waldshut: „Stunzingen", MAY. —
(8315) Gurtweil: „Birkhalde, Buchhalde, Rehle, Langergeten, Müßler", TH. 1965—1967
(8315) Aichen: „Bellenäcker" Waldrand, TH. 8. 1967 —
(8315) Detzeln: „Fockelten"-Südhang, TH. 1968 — „Lange Fohren", TH 1966 —
(8416) Küßnach: „Sommerhalde", MAY. —
(8416) Reckingen: Langwiesen" Waldrand, TH. 1971 —

Isolepsis setacea (L.) R. BR.

(8214) Schlageten: Ufer d. Stampfenbaches, TH. 9. 1952 — feuchte Wegstelle sü. Dorf, TH. 8. 1955 —

Rhynchospora alba (L.) VAHL.

(8214) Tiefenhäusern: Moor, MAY. —
(8214) Wolpadingen: „Tannenholz" u. „Ennersbachmoor", TH. 1954 —
(8114) Menzenschwand: „Scheibenlechtenmoos", MAY. 1919—1968 —

Carex appropinquata SCHUHMACHER

(8416) Lienheim: Rheinufer, TH. 7. 1969 —

Carex limosa L.

(8214) Ibach: Sumpf nw. Dorf, TH. 6. 1960 —
(8114) Menzenschwand: Scheibenlechtenmoos, MAY. 1919—1968

©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Carex pilosa Scop.

Die Pflanze wurde von Kummer und Stamm am Nordhang zwischen Riedern und Weisweil gefunden. Der Standort konnte 1955 bestätigt werden, außerdem:
(8316) Weisweil: „Hüller" Th. 1955 —

Bromus secalinus L.

(8314) Happingen-Wilfingen: Getreidefelder r. häufig, Th. 7. 1955 —
(8214) Schlageten: Th. 8. 1963 —
(8315) Weilheim: Straßenrand, Th. 7. 1969 —

Poa bulbosa L.

(8416) Hohentengen: über Kalkfelsen, Th. 5. 1953 —
(8415) Dangstetten: Trockenhang, Th. 5. 1953 —

Botriochloa ischaemum (L.) Keng

(8414) Luttingen: 1 Standort an Rheinuferböschung, Th. 9. 1952 —

Epipactis palustris (Mill.) Crantz

(8214) Schlageten: Waldsumpf bei Luchle, 920 m, Th. 7. 1955 —
(8416) Küßnach: Sumpf sü. Dorf, May. —
(8315) Bierbronnen: „Moos" üb. 100 Exempl. in 780 m, Th. 7. 1971 —

Epipactis purpurata Sm.

Die Pflanze, die im Gebiet selten vorkommt, ist nur bei Waldshut etwas häufiger.
(8315) Gurtweil: „Kapuzinerweg, Garwieden, Langergeten" Th. 1965—1967 —
(8315) Waldshut: „Spitalwald", May. —
(8315) Dogern: b. Ziegelhütte, Fech. —

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

(8214) Schlageten: Wiesensumpf am Weg nach Ballenberg, 760 m, Th. 8. 1953 —

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

(8314 u. 8214) Immeneich-Schlageten: Albufer r. häufig, Th. 1954 —
(8416) Lienheim: Rheinufer, Th. u. May 1969 —
(8315) Waldkirch: b. Friedhof, May. —

Dianthus armeria L.

(8315) Kadelburg: „Riffenhausen" an feucht. Waldrand, Th. 7. 1969 —

Helleborus foetidus L.

(8414) Albbruck: Rheinböschung, Th. 4. 1955 —
(8414) Hauenstein: Ruinenberg, Th. 1954 —
(8315) Leibstadt (Schweiz): Bahndamm b. Stauwehr, Fech. 4. 1970 —

Helleborus viridis L.

(8315) Aichen: „Tännlehau" an mehr. Stellen, Th. 1950—1969, May. — „Reckholderbuck", Th. 1952, May. —
(8315) Berau: Schlüchttal hinter Witznau, Th. 4. 1966, May. — Schlüchttalhang sü. Dorf, May. Fech. —

Aquilegia atrata Koch

(8216) Lausheim: „Schambach" vereinz., Th. 8. 1969 —
(8216) Lembach: „Kalkofen", Fech. 1968—70 —

©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Thalictrum minus L.

Im Gebiet sehr selten, außer dem bekannten Standort auf der Küssaburg:
(8316) Grießen: „Kätzler", TH. 1950 —
(8216) Untereggingen: „Im Heidelbach" SW-Hang, TH. 8. 1967 —
(8216) Obereggingen: „Stöckle", wen. Exempl., TH. 8. 1967 —

Sinapis alba L.

(8315) Gurtweil: Schlüchtdamm, TH. 1966 —

Thlaspi alpestre L.

(8314) Immeneich: Wiesenhänge sü. Dorf, TH. 1954 —
(8214) Schlageten: an mehr. Stellen, TH. 1954 —

Thlaspi montanum L.

(8316) Riedern: „Hornbuck", TH. 1953, FECH. 1970 —

Dentaria heptaphyllos VILL.

(8315) Gurtweil: „Langergeten", „Birkhalde" Nordhang, TH. 1950—1965 —
(8315) Tiengen: „Bürgerwald" Nordhang, TH. 4. 1967 —
(8315) Weilheim: Schlüchttal-Osthang sö. Dorf, TH. 4. 1968 —
(8315) Aichen: Seitentälchen der Schlücht, sw. Dorf, TH. 4. 1968 —
(8315) Breitenfeld: „Ziegelhalde" Nordhang, TH. 7. 1968 —
(8316) Untermettingen: Steinatal-Westhang b. „Rotlaube", TH. 4. 1968 —
(8316) Krenkingen: Steinatal b. „Herrenbühl", FECH. 1968 —
(8316) Grießen: „Kätzler" Nordhang, TH. 5. 1953 —
(8315) Waldshut: „Ibenkopf", „Stunzingen", MAY. —
(8316) Ofteringen: b. Reuentaler Mühle, MAY. —

Dentaria pentaphyllos L.

Kommt an ähnlichen Standorten wie vorige Art vor, doch viel häufiger:
(8315) Schlüchttal zwischen Gutenburg und Schwedenfelsen an vielen Stellen. TH. 1950 bis 1966 —
(8315) Im Unterlauf der Mettma, TH. 4. 1968 —
(8315) Steinatal zwischen Detzeln und Untermettingen, TH. 4. 1968 —
(8316) Am Nordhang des Klettgau-Jurazuges bei Grießen-Riedern-Weisweil. TH. 1950 bis 1955, FECH. —
(8216) Lembach: Osthang sü. Dorf, TH. 4. 1955 —

Sedum villosum L.

(8214) Ibach: Sumpf nw. Dorf. TH. 6. 1960 —

Saxifraga stellaris L.

(8114) Menzenschwand: Schlucht b. 900 m, MAY. 1910—1970. — Am Remplenbächlein b. 1050 m, MAY. 1948 —

Saxifraga paniculata MILL. *(S. aizoon)*

(8114) Menzenschwand: Rappenfelsen, MAY. 1930 —

Ribes petraeum WULF.

(8214) St. Blasien: Steinenbachtal, TH. 5. 1956 —

©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Cotoneaster integerrima MED.

(8416) Hohentengen: Trockengebüsch w. Dorf, TH. 5. 1953 —
(8216) Lembach: „Flühhalde" und Trockengebüsch ö. Dorf, TH. 5. 1955 —
(8316) Riedern: „Hornbuck", TH. 7. 1955 —
(8315) Waldshut: „Güllen", MAY. —

Amelanchier ovalis MED.

(8116) Lembach: ö. Dorf, TH. 5. 1955 —
(8216) Grimmelshofen: Steinbruch n. Dorf, TH. 8. 1967 —
(8315) Berau: Südhang über Witznau, TH. 7. 1967 —
(8215) Brenden: „Rappenfelsen", MAY. 1968 —

Potentilla alba L.

(8416) Herdern: „Mooshalde" ca. 20 Exempl., TH. 5. 1968 —

Potentilla rupestris L.

(8416) Hohentengen: Kiesgrube bei „Engrist", 5 Pfl., TH. 5. 1953, durch Abbau verschwunden —

Potentilla recta L.

(8316) Oberlauchringen: Bahnlinie ö. Dorf, 2 Exempl., TH. 8. 1969 —
(8214) St. Blasien: Westufer des Albstausees, FECH. 1968 —

Fragaria viridis DUCH.

(8416) Küssaburg: Südwaldrand, wenige Exempl., TH. 4. 1953 —

Aremonia agrimonoides (L.) DC.

Die von Becherer 1921 beschriebenen Standorte konnten größtenteils nicht mehr gefunden werden. Die Pflanzen sind vermutlich durch den dichten Baumbestand unterdrückt worden. Wieder gefunden wurden:
(8315) Kadelburg: „Jungbannhau" nur noch spärlich, TH. 6. 1966 —
(8415) Dangstetten: „Kernenwieden" spärlich, TH. 5. 1967 —
Neu gefunden:
(8415) Dangstetten: „Eichenberg" Nordhang reichlich, FECH., MAY., TH. 1967 —

Filipendula vulgaris MOENCH

(8316) Stetten: „Kalter Wangen", FECH. 1965 —
(8415) Dangstetten: „Eichenberg", TH. 6. 1955 —

Rosa gallica L.

(8316) Bühl: Straßengebüsch, TH. 1950 —
(8316) Riedern: „Hornbuck", TH. 1950 —
(8416) Reckingen: „Kohlgrube", TH. 1955 —
(8316) Stetten: „Kalter Wangen", FECH. 1965 —

Rosa pendulina L.

(8214) Schlageten: Bildsteintal u. „Kutterauer Halde", TH. 8. 1963 —
(8315) Indlekofen: Haselbachtal b. ca. 580 m, TH. 1966 —
(8214) Höchenschwand u. Amrigschwand: Schwarzatalhänge, MAY., TH. 1971 —

Trifolium montanum L.

(8215) Birkendorf: „Bergwiesen" auf Urgestein, TH. 6. 1968 —

©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Trifolium alpestre L.

(8315) Dangstetten: Felswand im „Berchenwald", TH. 8. 1967 —

Trifolium ochroleucon HUDS.

(8315) Bierbronnen: feuchte Wiese n. „Großfeld", TH. 6. 1964 —

Tetragonolobus maritimus (L.) ROTH

(8415) Rheinheim: Waldrand v. „Kernerwieden", TH. 1955, May., FECH. 1966 —

Coronilla emerus L.

(8316) Grießen: „Kätzler", TH. 5. 1950 —
(8315) Riedern: „Hornbuck", TH. 5. 1953 —
(8414) Albbruck: Rhein-Uferböschung, TH. 5. 1955 —
(8315) Waldshut: „Haspel", MAY., FECH. —

Ornithopus perpusillus L.

(8213) Adelsberg: Wegrand, TH. 1. 12. 1963 noch blühend, —

Geranium pratense L.

Im Gegensatz zu *Ger. silvaticum*, die im Gebiet häufig vorkommt, findet sich *G. pratense* im Steinatal und am Unterlauf von Schlücht und Wutach.
(8315) Detzeln: Steinatal-Wiesen sü. Dorf, TH. 6. 1968 —
(8315) Untermettingen: Steinatal unterh. Dorf, TH. 6. 1968 —
(8316) Bettmaringen: an der Straße zur Illmühle u. im Tal, häufig, TH. 6. 1964 —
(8315) Gurtweil: Keitlehalde und am Landgraben, TH. 1965 —
(8315) Tiengen: Wutachufer sw. d. Stadt, vereinz., TH. 6. 1969 —

Linum tenuifolium L.

(8315) Aichen: „Roßäcker", „Reckholderbuck" u. am Waldrand nö. Gutenburg, TH. 1950—1967 —
(8216) Küßnach; FECH. —

Dictamnus albus L.

(8316) Riedern: „Hornbuck", TH. 1950, 1953 —
(8316) Grießen: „Kätzler"-Westhang an 2 versch. Standorten, TH. 5. 1953, MAY. —

Impatiens glandulifera ROYLE

Die Pflanze kommt im Gebiet nirgends in größerer Menge vor. Oft wird sie durch Schutt verbreitet.
(8414) Albbruck: an Bach bei Albert, TH. 1960 —
(8414) Dogern: „Auhof" im Rheinuferwald mit bis zu 2,50 m hohen Exempl., TH. 8. 1968, „Obere Au", TH. 7. 1969 —
(8316) Degernau: „Dachshalden" auf Schutt, TH. 8. 1969 —
(8315) Waldshut: Rheinufer, FECH. 8. 1964; „Haspel", FECH.; „Singeln", MAY. 1969 —

Viola alba BESS.

(8414) Albbruck: Rheinufer auf Nagelfluh, TH. 4. 1955 —
(8416) Reckingen: Rheinhalde gegen Lienheim, TH. 5. 1967 —
(8416) Lienheim: „Wüstrütte" mehr. Ex., TH. 4. 1967 —
(8315) Tiengen: „Vitibuck" Südhang, TH. 4. 1968 —
(8315) Waldshut: „Ibenkopf", „Haspel", Schmitzinger Tal, MAY. —
(8415) Dangstetten: Matzental, FECH. —

©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Epilobium dodonaei VILL.

(8414) Luttingen: Kiesgrube gegen Westen, TH. 9. 1952 —
(8317) Altenburg: Bahngelände bei Bahnhof, TH. 8. 1968, FECH. 1969 —
(8416) Bergöschingen: Steinbr. im Weilergraben, häufig, TH. u. MAY. 7. 1969 —
(8315) Waldshut: „Aarberg"-Südhang, MAY. 1946 —

Astrantia major L.

(8313) Riedern: an der Schlücht w. Hagnau, 1 Expl., TH. 1949 —

Scandix pecten-veneris L.

(8316) Grießen „Bühl" vereinz.; Äcker w. Dorf, TH. 5. 1953 —
(8316) Horheim: „Rebler", TH. 6. 1966 —

Trientalis europaea L.

(8214) Ibach: Waldrand südl. Lindau, FECH. —

Gentiana lutea L.

(8216) Weizen: „Breitenfeld", TH. 5. 1955 —
(8116) Lembach: „Kalkofen", TH. 5. 1955, FECH. 1970 —

Gentiana cruciata L.

(8315) Aichen: Waldrand b. „Berg" ö. Gutenburg, TH. 7. 1949 —
(8116) Blumegg: „Im Weiler", mehr. Ex., TH. 8. 1967 —
(8315) Gurtweil: „Müßler" Waldrand, MAY. —
(8216) Obereggingen: „Stöckle" mehr. Standorte, TH. 8. 1967 —

Gentiana verna L.

(8215) Ühlingen: Wiesen w. „Hexeneich" an mehr. Stellen, zurückgehend, MAY., TH. 4. 1966 —
(8216) Bettmaringen: Beigenhölzle, FECH. 1966 —

Galium boreale L.

(8416) Küßnach: „Eichhalde", „Sommerhalde", TH. 1963 —
(8316) Riedern: „Hornbuck", TH. 6. 1953 —
(8414) Albbruck: Rheinböschung, TH. 6. 1955 —

Veronica peregrina L.

(8312) Haagen: im Dorf, TH. 5. 1968 —

Veronica urticifolia JACQ.

(8414) Laufenburg: Andelsbachtal, TH. 1949 —
(8315) Tiengen: Bürgerwald, TH. 7. 1970 —

Veronica scutellata L.

(8215) Riedern: Sumpf b. Riedernsteg, TH. 8. 1949 —
(8214) Wolpadingen: Leimenlöcher, TH. 9. 1953 —
(8214) Schlageten: Stampfenbachtal u. Luchle, TH. 7. 1955 —
(8314) Immeneich: an der Alb, TH. —

Digitalis lutea L.

(8214) St. Blasien: Umgehungsstraße, TH. 1960 —

©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Melampyrum cristatum L.

(8415) Dangstetten: „Eichenberg", TH. 6. 1955 —
(8316) Riedern: „Hornbuck", TH. 7. 1955 —
(8416) Küßnach: „Sommerhalde", TH. 6. 1966 —

Lathraea squamaria L.

(8315) Waldshut: Seltenbach an 2 Stellen, MAY., TH. 3. 1967 —
(8315) Kadelburg: „Berchenwald" NW-Hang, TH. 5. 1968 —

Adoxa moschatellina L.

(8315) Bierbronnen: Haselbachtal, TH. 4. 1964 —
(8315) Schlüchttal zwischen Gutenburg und Riedern, TH. 1966—1968
(8216) Schwaningen: am Mehrenbach, TH. 3. 1967 —

Campanula cervicaria L.

(8215) Staufen: an d. Straße Brenden-Schwarzabruck, MAY., FECH. 7. 1964 —

Campanula cochleariifolia LAM.

(8315) Tiengen: Wutachufer einzeln, TH. 5. 1966 —

Aster bellidiastrum (L.) SCOP.

(8216) Schwaningen: „Kalvarienberg"-Nordhang, TH. 5. 1955 —
(8116) Lembach: „Bohl", TH. 5. 1955; „Kalkofen", FECH. 1970 —
(8316) Küssaburg: Nordhang, TH. 1955, MAY.

Inula salicina L.

(8415) Dangstetten: „Eichenberg", TH. 7. 1955; „Berchenwald", TH. 8. 1967 —
(8316) Bergöschingen: Waldrand n. Dorf, TH. 8. 1967 —
(8316) Untereggingen: „Heidelbach" Südhang, TH. 8. 1967 —
(8315) Waldshut: „Stunzingen", MAY.

Bidens tripartita L.

(8315) Berau: Straßengraben in 650 m, TH. 9. 1949 —
(8316) Ofteringen: n. Reuental, TH. 8. 1969 —

Achillea nobilis L.

(8315) Berau: Schlüchttalhang über Witznau und schlüchtaufwärts vereinzelt bis Schwedenfelsen; Hang im unteren Schwarzatal, TH. 6. 1968 —

Carduus defloratus L.

(8416) Reckingen: „Auf der Laachen"-Steilhang, TH. 8. 1969 —
Dies ist der bisher einzige Standort im Klettgau-Jura auf deutschem Gebiet.

Carduus personata (L.) JACQ.

(8314) Wilfingen: Albufer ö. „Scheuermatt", TH. 6. 1964 —
(8214) Albtal zwischen Schlageten und St. Blasien an mehr. Stellen, TH. 1963 —
(8315) Tiengen: Wutachufer, Th. 6. 1969 —

Cirsium eriophorum (L.) SCOP.

(8216) Lausheim: „Im Schambach", 1 Pfl., TH. 9. 1969 —

Serratula tinctoria L.

(8315) Gurtweil: „Langergeten" vereinz., TH. 9. 1967 —
(8416) Reckingen: „Mäsern", TH. 8. 1967 —

©Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz e.V.; download unter www.blnn.de/ und www.zobodat.at

Centaurea montana L.

(8114) Menzenschwand: „Kriegshalde" MAY.

Scorzonera humilis L.

(8315) Bierbronnen: Waldrand b. „Großfeld", TH. 1961 —
(8214) Schlageten: Luchle, TH. 6. 1964 —
(8215) Birkendorf: „Scheibenwiese" nö. „Bergwiesen", TH. 6. 1968. MAY. —
(8114) Menzenschwand: am Schleifenbächle oberh. Steinbruch, May. 1920—1970 —
(8214) Ruchenschwand: SW von Punkt 1003, FECH. 1969 —

(Am 23. 12. 1971 bei der Schriftleitung eingegangen)

Nachtrag während der Drucklegung

Anthericum liliago L.

(8413) Säckingen: Röthekopf-Südhang, wenige Exemplare, TH. 6. 1972 —

Polygonum cuspidatum SIEB. et ZUCC.

(8314) Buch: in der Albtalschlucht südlich des Dorfes, TH. 3. 1972 —
(8414) Murg: Rheinufer westlich des Dorfes, TH. 5. 1972 —

Aquilegia atrata KOCH

(8216) Lausheim: an einer Böschung beim Bahnhof Lausheim-Blumegg, MAY. u. TH. 6. 1972 —

Coronilla emerus L.

(8413) Säckingen: Rheinufer gegen Murg ca. 20 Exempl. TH. 5. 1972 —
Rheinufer gegen Wallbach 1 Exempl. TH. 6. 1972 —

Geranium pratense L.

(8316) Geislingen: an der Bundesstraße, TH. 1971 —
(8216) Lausheim: an der Straße unterhalb des Dorfes, TH. 6. 1972 —
(8216) Lausheim: Wutachufer beim Bahnhof Lausheim-Blumegg, TH. 6. 1972 —

Impatiens glandulifera ROYLE

(8315) Waldshut: zwischen Strandbad und Kraftwerk an zahlreichen Stellen, teilweise recht häufig, TH. 7. 1971 u. 7. 1972 —

Primula media PETERM. = *Pr. elatior* X *Pr. veris*

(8414) Schachen: Mühlbachtal. Der Bastard wächst neben den Stammeltern in mehreren Exemplaren. TH. 4. 1972 —

Trientalis europaea L.

(8214) Strittmatt: Schwarzbächletal südlich Silberbrunnen in Sümpfen, schattigen Waldrändern und feuchten Wäldern stellenweise häufig, TH. 7. 1972 —

Gentiana cruciata L.

(8216) Weizen: „Breitenfeld" an 2 Stellen mehrere Exemplare, TH. u. MAY. 6. 1972 —

(Am 24. 7. 1972 bei der Schriftleitung eingegangen.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.

Jahr/Year: 1969-1972

Band/Volume: NF_10

Autor(en)/Author(s): Thomma Robert

Artikel/Article: Pflanzenstandorte vom Hochrheingebiet, Südschwarzwald und Klettgau (1970) 549-557